

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書


子部
第四二冊



魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0



9 787533 304782 >

EP6/02

四庫全書存目叢書·子部四二

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092毫米 16開本 53.125印張

1995年9月第1版 1995年9月第1次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第四二冊目次

子部·醫家類

安老懷幼書四卷

〔明〕劉宇輯
上海圖書館藏明弘治十一年自刻本

一

神應經一卷

〔明〕陳會撰
中國中醫研究院圖書館藏日本昭和四十九年東京都盛文堂據日本正保二年版翻刻本

一八六

醫史十卷

〔明〕李濂輯
上海圖書館藏明刻本

二二一

藥鏡四卷

〔明〕蔣儀撰
中國中醫研究院圖書館藏明崇禎十四年蔣儀刻本

三〇七

新編醫學正傳八卷

〔明〕虞搏撰
浙江圖書館藏明萬曆六年刻本

三七一

安老懷幼書四卷

〔明〕劉宇輯

上海圖書館藏明弘治十一年自刻本

附《四庫全書總目·安老懷幼書四卷》提要

老書序

家世時侍先府君暨

適先大父以庚辰

十致政而歸府君事之

次食一衣服一藥餌必躬

勸居聲容氣咳之

旋務底其懽心而

大父壽年八袞有四

皆謂先府君事親

竊見府君每於奉

一書以為法予方

誦意義請問之府君曰

書也曲盡人子事親之

少長即與授讀既而府

子居憂三載就學

卿薦登橋門倖竊

以年奔走仕途未遑檢拾

亡失成化甲午春

八宦邸祿養時年

天子昕夕侍養而恒

之宜每求是書而不

承乏御史編索

購求以

矣鶴髮童顏

書之力不可丙

七竹時貴致謫遠夷私

可筠陽太孺人以

叨兒儒叨中鄉闈

供侍亦授此書以

丁居宦邸每於瞻望之

康之信以自慰者亦惟

也憶昔先府君以

而獲幾上壽今予

太孺人而獲逾中壽

心書之有益於人也

本一失求之十

彼僻壤遐陬深

得是

訛舛

親校閱命工翻

書之流傳而不

世道也使無補於

考是書前一編

治之宜四時攝養

保護醫藥扶持之

十條名曰養老奉親書

子間興化令尹陳君直

二編備載古人嘉言

陶與夫膳羞藥石

具凡二百九十三條

新書乃有求大德

壑鄒君鉉所增補

合三編而一之

所

之心何

書流傳俾天下

知事親之有要

術佩服而行登親壽

興仁與孝之額其

既多乎予故不辭

首且總其名曰安

方同志者勉焉

庚戌秋九月上澣河南穎

均陽有斐堂書



刊安老懷幼書跋

一聞老與幼人之所

與慈人之所難

老懷幼而盡孝慈

方術之事不可不致

瑞州府時移所

心其差訛翻刊而

事長懷幼未濟其

有歎然者孤海丙

選抵

川借寓妻君某律

活幼專門洪武初殷

生子真欽承

皇帝命隨侍

潘永樂初

文皇帝徵為御醫聖名

雲川傳之子宏宏傳王

孫益粹玄妙活人

有婢雖五尺之童每

妻君心兒醫也因拘

欣然出秘傳邱幼集

一投閱之所用之

之而有者而其治

脩令之術又周而悉

而妙顧世之以醫名

而因有是功耶未

因求其書以歸

公義方憲副海公文

公本貞蔣公克明

栗友王公懋學

此以為宜與前安老

一於是通題其名曰安

書遂各稍俸錫梓以廣其

乎人多生也親無父

子孫我事父母而用

庶乎盡矣育子孫而

惡庶乎盡矣城能推

兄弟則友又能

尤者也兄弟壯者

也老之與壯壯之

移是焉則是書之

小補云乎哉

戊午二月丁卯

士茅中憲大友山西

使前監察御史清額



子

家幼書一卷

目錄

一飲食調治

二形體

三醫藥扶持

四性

五宴處起居

六

七戒忌保獲

八

九春時攝養篇

凡八條

十攝養篇

凡十二

時攝養篇

凡

時攝養篇

凡一

治養老序

凡九條

十四食治眼目方

凡十六條

十五食治五勞七傷諸方

凡

十六食治老人脾胃氣弱方

凡

十七食治老人瀉痢諸方

凡三十四

十八食治老人喘嗽諸方

凡十一條

十九食治脚氣諸方

凡十二條

二十食治諸淋方

凡十條

二十一食治老人遺塞諸方九十條

二十二食治冷氣諸方九十條

二十三食治諸痔方九十條

二十四食治諸風方九十條

二十五治傷損血出及諸毒散

二十六治失音咽乾散

二十七治鼻衄血散

二十八補下元烏髭髮壯神丸

二十九治一切洗眼方九十條

三十治腸風瀉血當日止方

三十一治一切惡瘡疼痛方九二條

三十二治手臂疼痛無力虎骨散

三十三風熱毒瘡發背黃耆散

三十四風氣神白散

三十五一切心腹刺痛應痛丸

三十六赤白痢疾方

三十七續添年老調養雜症九十條

目錄終

安老書卷之一

飲食調治第一

主身者神養氣若精益精若氣資氣若食故飲食進則穀氣充穀氣充則氣血盛氣血盛則筋力強故脾胃者五臟之宗也五臟之氣皆稟於脾故四時皆以胃氣為本生氣通天論云氣味辛甘發散為陽酸苦漏泄為陰是以一身之中陰陽運用五行相生莫不由於飲食也若少年之人真元氣壯根本強盛未易為患其高年之人真氣耗竭五臟

衰弱全仰飲食以資氣血若生冷無節饑飽失宜調停無度動成疾患凡人疾病未有不因風寒暑濕饑飽勞逸入邪而感為人子者得不慎之若有疾患且先詳食醫之法審其疾狀以食療之食療未愈然後命藥貴不傷其臟府也凡百飲食必在人子躬親調治無縱婢使慢其所食老人之食大抵宜其溫熱熟軟忌其粘硬生冷每日晨朝宜以醇酒先進平補下元藥一服女人則平補血海藥一服無燥熱者良尋以猪羊腎粟米粥一盃壓之

五味葱薤鴉膽等粥皆可至辰時服人參平胃散
一服然後次第以順四時軟熟飲食進之食後引
行一二百步令運動消散臨卧時進化痰利膈人
參半夏丸一服尊年之人不可頓飽但頻頻與食
使脾胃易化穀氣長存若頓令飽食則多傷滿緣
衰老人脾胃虛薄不能消納故成疾患為人子者
深宜體悉此養老人之大要也日止可進前藥三
服不可多餌如無疾患亦不須服藥但只調停飲
食自然無恙矣

形證肘候第二

上古天真論曰女子之數七丈夫之數八女子七
七四十九任脉虛衝脉衰天癸竭地道不通丈夫
八八六十四五藏皆衰筋骨解墮天癸盡脉弱形
枯女子過六十之期丈夫逾七十之年越天常數
上壽之人若衣食豐備子孫勤養承順慈親恭行
孝禮能調其飲食適其寒溫上合神靈下契人理
此順天之道也高年之人形羸氣弱理自當然其
有丈夫女子年踰七十而色紅潤形氣康強飲食

不退尚多秘熱者此理何哉且年老之人瘦瘠為
常今反此者非真陽血海氣壯也但診左右手脉
須大緊數此老人延永之兆也老人真氣已衰此
得虛陽氣盛充於肌體則兩手脉大飲食倍進雙
臉常紅精神強健此皆虛陽氣所助也須時有煩
渴熱大府秘結但隨時以常平湯藥微微消解
三五日則自然平復常得虛陽氣存自然飲食得
進此天假其壽也切不得為有小熱煩用轉瀉之
藥通利苦冷之藥疎解若虛陽氣退復歸真體則

形氣既羸藏府衰弱多生冷疾無由補復若是從
來無虛陽之氣一向億之之人全在斟量湯劑常
加溫補調停饘粥以為養治此養老之先也

醫藥扶持第三

常見世人治高年之人疾患將同年少亂投湯藥
妄行鍼灸以攻其疾務欲速愈殊不知上壽之人
血氣已衰精神耗耗危若風燭百疾易攻至於視
聽不至聰明手足舉動不隨其身體勞倦頭目昏
眩風氣不順宿疾時發或秘或泄或冷或熱此皆

老人之常態也不順治之緊用鍼藥務求痊癒往往因此別致危殆且攻病之藥或吐或汗或解或利緣衰老之人不同年少真氣壯盛雖汗吐轉利未至危固其老弱之人若汗之則陽氣泄吐之則胃氣逆瀉之則元氣脫立致不虞此養老之大忌也大體老人藥餌止是扶持之法只可用溫平順氣進食補虛中和之藥治之不可用市肆贖買它人惠送不知方味及狼虎之藥與之服餌切宜審詳若身有宿疾或時發動則隨其疾狀用中和湯藥調順三朝五日自然無事然後調停飲食依食醫之法隨食性變饌治之此最為良也

性氣好嗜第四

眉壽之人形氣雖衰心亦自壯但不能隨時人事遂其所欲雖居溫飽亦常不足故多咨煎背執等閑喜怒性氣不定止如小兒金在承奉顏色隨其所欲嚴戒婢使子孫不令違背若憤怒一作血氣虛弱中氣不順因而飲食便成疾患深宜體悉常令人隨侍左右不可令孤坐獨寢緣老人孤僻易

於傷感緣覺孤寂便生鬱悶養老之法凡人平生為性各有好嗜之事見即喜之有好書畫者有好琴棋者有好賭博者有好珍奇者有好藥餌者有好禽鳥者有好古物者有好佛事者有好丹竈者人之僻好不能備舉但以其平生偏嗜之物時為尋求擇其精絕者布於左右使其喜愛玩悅不已老人衰倦無所用心若只令守家孤坐自成滯悶令見所好之物自然用心於物上日或戲玩自以為樂雖有勞倦咨煎性氣自然減可

宴處起居第五

凡人衰晚之年心力倦怠精神耗短百事懶於施為蓋氣血筋力之使然也全藉子孫孝養竭力持護以免非橫之虞凡行住坐卧宴處起居皆須巧立制度以助娛樂棲息之室必常潔雅夏則虛敞冬則溫密其寢寐床榻不須高廣比常之制三分減一低則易於升降狹則不容漫風袖褥厚藉務令軟平三面設屏以防風冷其枕宜用夾熟色帛為之實以荷花制在低長低則寢無孽風長則轉

不落枕其兩坐椅宜作矮樺床樣坐可垂足履地
易於興居左右置欄面前設几緣老人多困坐則
成眠有所攔闌免閃側之傷其衣服制度不須寬
長長則多有難絆寬則衣服不着身緣老人骨肉
踈冷風寒易中若窄衣貼身暖氣著體自然氣血
流利四肢和暢雖遇盛夏亦不可令袒露其頸後
連項常用紫軟夾帛自頸後巾幘中垂下着肉入
衣領中至背甲間以護膝理尊年人肌肉瘦怯膝
理開踈若風傷膝中便成大患深宜慎之

貧富禍福第六

經曰自天子至於庶人孝無終始而患不及者未
之有也人子以純孝之心竭力事親無終始不及
之理惟供養之有厚薄由貧富之有分限人居富
貴有奉於已而薄於親者人所不錄天所不容雖
處富貴而即貧賤也人雖居貧賤能約於己而豐
於親者人所推仰天所時與雖處貧賤而即富貴
也作善降之百祥作不善降之百殃善莫大於孝
孝感於天故天與之福所以雖貧賤而即富貴也

子夏人於不孝不孝感於天故天與之禍所以雖
富貴而即貧賤也善惡之報真猶影響焉為人子者可
不信乎奉親之道亦不在日用三牲但能承順父
母顏色盡其孝心隨其所有此順天之理也其溫
厚之家不可慢於老者盡依養老之方勵力行之
其貧下糊口之家養老之法雖有奉行之心而無
奉行之力者但隨家豐儉竭力於親約禮設具使
老者知其罄力事奉而止將見孝心感格陰靈默
佑如姜詩之躍鯉孟宗之泣筍無非孝感所致此
行孝之明驗也慮孝子順孫有窘乏不能依此法
者意有不足故立此貧富禍福之說以齊之

戒忌保護第七

人萬物中一物也不能逃天地之數若天降數窮
則精血耗竭神氣浮弱返同小兒全假持護以助
衰晚若遇水火兵寇非橫驚怖之事必先扶侍老
人於安穩處避之不可喧忙驚動尊年之人一遭
大驚便致冒昧因生餘疾凡喪葬凶禍不可令吊
疾病危困不可令驚悲哀憂愁不可令人預報穢

惡臭取不可令食粘硬毒物不可令食弊漏卑濕不可令居卒風暴寒不可令冒煩暑燥熱不可令中動作行步不可令勞暮夜之食不可令飽陰霧晦暝不可令饑假借鞍馬不可令乘偏僻藥餌不可令服廢宅歌宇不可令入墳園塚墓不可令遊危險之地不可令行澗淵之水不可令渡闇昧之室不可令孤凶禍遠報不可令知輕薄婢使不可令親家緣冗事不可令管若此事類頗多不克備舉但人子慈意深慮過為之防稍不便於老人者皆宜忌之以保長年常宜遊息清閑崇尚佛事使神識趣向一歸善道此養老之奇術也

四時養老總序第八

四氣調神論曰陰陽四時者萬物終始死生之本也逆之則災害生從之則苛疾不起是謂得道春溫以生之夏熱以長之秋涼以收之冬寒以藏之若氣反於時則皆為疾癘此天之常道也順之則生逆之則病經曰觀天之道執天之行盡矣人能執天道生殺之理法四時運用而行自然疾病不

生長年可保其黃髮之人五藏氣虛精神耗竭若稍失節宣即動成危瘵蓋老人倦惰不能自調在人資養以延遐筭為人子者深宜察其寒溫審其體藥依四時攝養之方順五行休王之氣恭恪奉親慎無懈怠今集老人四時通用備疾藥法具陳于左

此方多用藥者宜參諸人所用

四時通用男女婦人方

治老人風熱上攻頭旋暈悶喜卧怔悸起即欲倒背急身強旋覆花散

通用人

旋覆花前胡麥門冬蔓荊子白木

三枳殼三棱甘菊花半夏防風

川大黃獨活甘草

右為末每服三錢水一盞入薑半分同煎至六

分去滓溫服不計時候

老人補壯筋骨治風走疰疼痛并風氣上攻下疰

羌活

羌活 牛膝 川練子 白附子 舶上

茴香 黃耆 青鹽 巴戟 黑附子

懷去 沙苑白蒺藜

右件等分一處搗羅為末酒煮麪糊為丸如桐子大每服十九空心臨卧鹽湯下看老少加減服

老人和脾胃氣進飲食止痰逆療腹痛氣調中木香人參散男子方

木香兩半人參兩半蘆頭兩半茯苓兩半白朮兩半微炒

肉豆蔻一分批把一分厚朴一分丁香一分藿香葉一分甘草一分乾薑一分陳皮一分浸去穢

右件一十二味修事了秤分兩搗羅為末每服二錢水一盞入生薑錢一片棗一枚同煎至六分去滓溫服此藥老人常宜合喫

老人和脾胃氣治胃膈症悶心腹刺痛不思飲食枳殼木香散男子方

木香兩半神麴兩半京三稜兩半青橘皮兩半甘草兩半益智兩半白芷兩半桂心兩半莪朮兩半白朮兩半枳殼兩半微炒

右件藥搗羅為末每服二錢水一盞入生薑鹽

各少許同煎至七分併滓熱服

鮮老人四時傷寒四順散男子方

麻黃兩半杏仁兩半甘草兩半荊芥穗兩半右同并為末每服一錢入鹽湯點熱服

治老人心脾積熱或流涎脚膝疼痛黃耆散男子方

黃耆兩半紅芍藥兩半牡丹皮兩半香白芷兩半沙參兩半甘草兩半肉桂兩半柴胡兩半當歸兩半洗復

右件等分搗羅為末每服二錢水一盞薑三片煎至五分日進二服春冬每煎時入蜜蒜小麥煎半匙忌粘食炙燥等物

橘皮散益元氣和脾胃治傷寒此藥不換金散

橘皮兩半人參兩半茯苓兩半白朮兩半木香兩半乾薑兩半官桂兩半厚朴兩半枳殼兩半草豆蔻兩半半夏兩半厚朴兩半同煎碎炒

枳殼兩半訶梨勒兩半甘草兩半右件藥搗羅為末每服一錢水一盞薑棗同煎

至七分熱喫不問食前食後並宜服忌如常

治老人藏府冷熱不調裏急後重關門不和香白

芷散

男子女
人通用

常歸

三錢 香白芷

三錢 茯苓

三錢 枳殼

三錢 麩炒

木香

錢一

右件為末每服一錢水半盞生薑少許同煎至

四分溫服

治老人大小便不通勻氣散

生薑

半兩

葱一莖

和根葉
用

鹽一捻

豉

三十
粒

右件四味搗爛安臍中良久便通

治老人小便不通地龍膏

白項地龍

苗香

用時看
多少

右件杵汁傾於臍內自然便通

治老人脚膝疼痛不能履地七聖散

杜仲

續斷

革薢

防風

獨活

牛膝

酒
浸

一茸草已上各
宿一兩

右件為末每服二錢酒調下

治老人脾胃一切病溫白圓兼治脾不承受吐逆

瀉痢及宿食不消方

半夏

二兩湯洗
姜汁浸

白朮

一兩
炮

丁香

一分

右件為末用生薑自然汁和飛麩為糊搜和前

藥末為圓如梧桐子大濃煎生薑湯下十圓空

心服如腹痛并嘔逆食後服

藥本散治婦人血氣丈夫筋骨四肢軟弱及卒中

急風并寸白蟲但常服並皆攻治或要出汗解傷

寒湯使如後

此方是孟
相公進過

藁本

牛膝

酒浸一
宿焙乾

當歸

麻黃

去
節

羌活

獨活

防風

肉桂

去
皮

芍藥

菊花

續斷

五加皮

芎藭

甘草

赤箭

枳殼

麩炒去穢以
上各半兩

黑附子

大者一個
製去皮臍

細辛

一分

去
藥

右件藥一十八味並涇州土好者使水洗過細

剉焙乾搗羅為末空心溫酒下二錢如不飲酒

薄荷湯下發汗解傷寒熱葱白酒下二錢併服

三五服為妙

治老人風冷展筋骨續斷散方

續斷一牛膝二芍一木瓜

右為細末空心時溫酒調下一大錢

堅痰化涎和脾胃人參半夏丸

半夏一兩生薑四兩取汁先以湯洗半夏七遍浸三日後於日內煎乾切作餅子焙乾

北磐一人參一茯苓一兩去皮

右為末以蒸餅水浸過却用紙裹煨熟為圓如

菴豆大每日空心夜卧用淡生薑湯下十五圓

開胃口薑棗湯下風涎用皂角一條薑三片蘿

蔔三片同煎湯下

書

十四

治老人暖食藥丁香圓消食治一切氣悶止醋心

腹脹利霄膈逐積滯方男子婦人通用

大烏梅一箇須是巴豆者一箇新肥胡椒五粒須有裙欄者

乾漆未炒半錢桂末炒半錢香墨乾漆桂末三味研入

右為末用馬尾羅子羅過用醋麪糊為劑日中

杵令勻如菴豆大溫酒下五圓至七圓茶下亦

得或入蠟茶末炒三錢更妙

香草散治婦人氣羸腸寒便白食傷積滯冷結腸

不和溫脾肺活榮生肌進食益衝任二經

蘭茹 桔梗 白芷 當歸 地榆 芍藥

檳榔 白荳蔻各半兩研香

右為末每服二錢水一盞薑棗同煎至數沸通

口食前日進三服

香枳湯治老人大腸秘澀調風順氣男子婦人通用

枳殼去穢防風各一兩甘草半兩

右為末每服二錢百沸湯點服空心食前各一

眼

治婦人男子久積虛敗壯元補血建胃暖脾止痰

書

十五

逆消飲食北亭圓

北亭二兩去沙石阿魏二兩去沙石

川當歸苗洗去厚朴去皮陳橘皮去白

官桂去皮乾薑炮甘草炙川芎洗胡椒好

縮砂去皮大附子上地皮茯苓二兩青鹽二兩

白朮切作片子五味子二兩

半斤之

右件依法修事為末將硃砂阿魏醋入麪者多

少同煎稀糊下藥更煉好蜜同搜和拌勻再入

治老人一切風烏犀圓

天麻雨地榆雨玄參雨川烏雨頭雨龍腦薄雨

荷葉香葉皂角

壽香

右為末煉蜜為膏如皂子大每服一圓嚙喫小

見半圓以上薄荷茶酒調下

鎮心丸養老人心氣今不健忘聰耳明目方

卷一百一十五

辰砂兩 桂兩 連志心 人參一

已上余辰並為朱各与

右煉蜜為丸如桐子大空心薄荷酒吞下十丸

至十五元，留少朱砂為衣，益心氣養神，宜常服。

治老人脾肺客熱上焦滯疾涼心潤肺消壅批把

葉散王疇進

枇杷葉味苦 人參 茯苓 白朮 羌活

黃耆 各一
甘草 炙
半夏 湯洗去汁切破
附子 炮裂各半兩

右爲末每服二錢水二盞入生薑薄荷煎至七分食後臨卧溫服

羌活散治老人耳聾眼暗頭項腰背疼痛軍身瘡

癰此乃腎藏風所攻也

菴活
枳殼
去殼
半夏
去殼
甘草
炙
大腹子

防風
桑白皮
各等分

右為鹿末每服二錢水一盞生薑煎至七分溫

服早辰日午時臨卧各一服

搜風順氣治老人百疾七聖丸



欖 木香 川芎 羌活 杜心
郭 二 一兩 去皮 天 大黃 一兩

右為末東齋為此同子大不計寺夫盥酒下七

九要刺動即加七九灸薑湯下亦尋

春時攝養第九

春屬木主發生宜戒殺茂於恩惠以順生氣春肝

氣王肝屬木其味酸木能勝土土屬脾主甘當春

之時其飲食之味宜減酸益甘以養脾氣盛者調

靈氣以利之順之則安逆之則少陽不生肝氣內

春時陽氣初昇萬物萌發正二月間乍寒乍熱
 高年之人多有宿疾春氣所攻則精神疲倦宿患
 發動又復經冬已來麻痺重衾喘咳飲熱至春成
 積多所發泄致體熱頭眩嘔噦四肢勞倦腰
 脚不仕皆冬所發之疾也常宜體候若稍覺疲
不可便行藥利恐傷厥
時別生餘疾如化痰之藥消解或只選食治方
 中性稍凉利飲食調停與進自然通暢若別無疾
 狀不須服藥常擇和暖日引侍尊親於園亭樓閣
 虛敞之處使故意登眺用擴滯懷以暢生氣時尋
 花木遊賞以快其意不令孤坐獨眠自生鬱悶春
 時若親朋請召老人意欲從歡任自遨遊常令嬌
 親侍從惟酒不可過飲春時人家多造饌米食
 等不令送與如水團蒸糰粘冷肥僻之物多傷脾
 胃難得消化大不益老人切宜看承春時過天氣
 燠煖不可頓減綿衣綠老人氣弱骨疎怯風冷易
 傷肌體但多穿夾衣過暖之時一重漸減一重
 不致暴傷也今具春時湯藥如後

春時用諸藥方

治老人春時多昏倦細辛散明目和脾胃除風氣
 去痰涎人通子
 細辛去一兩二分 甘草半兩
 右為末每服一大錢水一盞煎至六分熱飲可
 常服
 治老人春時熱毒風攻頭項頭痛面腫及風毒眼
 澁菊苑散
 菊花 前胡 旋覆花 芍藥 玄參 苦參
 治風各等
 右為末食後臨卧用溫酒調下三錢不飲酒用
 米飲調下亦得
 治老人春時頭目不利昏臥如醉壯熱頭疼有似
 傷寒慳慳九通
 桔梗 細辛 人參 甘草 茯苓 小麥根
 白米各一
 右為末煉蜜為丸如彈子大每服一九溫水化
 破治頭痛腰痛藥入口當下便惺惺
 治老人春時多偏正頭疼神効方通

旋覆花一兩 白僵蠶一分 石膏一分

右件為末以葱煨熟和根同杵為丸桐子大急痛用葱茶下二丸慢痛不過二服

治老人春時膏膈不利或時滿悶墜痰飲子

半夏不計多少以湯洗十遍為末 生薑一大棗七

右二味以水二盞藥末二錢慢火煎至七分臨

卧時去生薑頻服

老人春時宜喫延年草進食順氣御藥院常令進通用

青橘皮一兩少洗去穢甘草二兩細末 鹽二兩半炒

右三味先洗浸橘皮去苦水微焙入甘草同焙

乾後入鹽每早晨嚼三兩葉子通滯氣大好

治老人春時諸般眼疾發動黃耆散兼治口鼻生瘡

黃耆 川芎 防風 甘草 白蒺藜各以杵

各一兩 甘菊花三分不杵

右件洗嗽乾勿更近火搗為末每服二錢早晚

空心日午臨卧各一服乾熱或長飲調下暴赤

風毒淚昏澁痛癢等眼只三服三兩日永效內

外障眼久服方退忌房室毒物火上食凡患眼

切不得頭上鍼絡出血及服皂角牽牛等藥取

一時之快並大損眼

治老人春時膏膈不利痰壅氣噎及咽喉諸疾忒

粘湯方

黍粘子三兩炒甘草半兩

右為末搗羅網末每服一錢食後臨卧如常點之

夏時攝養第十

夏屬火主於長養夏心氣王心主火味屬苦火能

尅金金屬肺肺主辛其飲食之味當夏之時宜減

苦增辛以養肺氣心氣盛者調呵氣以疎之順之

則安逆之則太陽不長心氣內洞盛夏之月最難

治攝陰氣內伏暑毒外蒸縱意當風任性食冷故

人多暴泄之患惟是老人尤宜保護若簷下過道

穿隙破牕皆不可納涼此為賊風中人暴毒宜居

虛堂淨室水次木陰潔淨之處自有清涼每日候

晨進溫平順氣湯散一服飲食溫軟不令太飽受
日長永但時復進之渴宜飲粟米溫飲豆蔻熟水
生冷肥膩尤宜戒之緣老人氣弱當夏之時納陰
在內以陰弱之腹常冷肥之物則多成滑泄一傷
正氣卒難補復切宜慎之若須要食小菓之類量
虛實少為進之緣老人思食之物若有遠阻意便
不樂但隨意與之饒食之際以方便之言解之往
往知味便休不逆其意自無所損若是氣弱老人
夏至已後宜服不燥熱平補腎氣暖藥三二十服

合卷一

子

以助元氣若獲養丸八味丸之類宜往潔雅寺院
中擇座敞處以其所好之物悅之若要寢息但任
其意不可令久眠但時時令歇久則神昏直召年
高相協之人日陪閑話論往昔之事自然喜悅忘
其暑毒細湯名茶時為進之晚涼方歸謹選夏時
湯藥如後

夏時用藥諸方

治老人夏多冷氣發動膏膈氣滯噎塞脾胃不和
不思飲食豆蔻散

草豆蔻 一兩以蜜和 大麥藥子 十兩神麴

炒杏仁 四兩七 甘草 四兩 乾薑 三兩

右為末每服一錢如茶點之不計時候服

治老人夏月宜服平補下元明目養榮丸

養榮 四兩 巴戟 二兩 菊花 五兩 枸杞子 二兩

右為末煉蜜為丸桐子大每服鹽湯下二十九

治老人夏月暴發腹痛及泄瀉木香丸

輕好全乾蝎 二十箇每箇三兩 揀好胡椒 三百木香

粒生香

右件藥同搗為末濕紙裹燒粟米飯為丸如粟

豆大如患腹痛每服十五丸煎燈心陳橘皮生

薑湯下大便不調及泄瀉每服十五丸煎陳橘

皮湯下

治老人夏月脾胃忽生冷氣心腹脹滿痞悶泄瀉

不止訶子散

訶子皮 五兩 大腹 五兩 甘草 半兩 白木 半兩 草豆

蔻 十兩 煎用 五兩 人參 半兩 去芦頭

右為末每服二錢水一盞入生薑少許煮二箇

同煎至六分去滓溫服

治老人夏月因食冷氣積滯或心腹疼痛等宜服

京三稜三兩濕紙裹蓬莪朮一兩烏藥二兩益智二兩

去皮甘草三兩陳橘皮二兩如烏藥

右為末每服入鹽點之不計時候一錢

治老人夏月宜服三聖丸祛逐風冷氣進食和胃

去痰滯腰膝冷痛

葶藶仙淨洗去土揀擇乾薑二兩烏頭二兩

并臍

廿四

右件為末煮棗肉為丸如桐子大每服十五丸

至二十九溫薑湯下

治老人夏月宜服平補楮實丸方駐顏壯筋骨補

益元藏療積冷虛乏一切氣疾暖胃進酒食久服

令人輕健神效方

楮實半斤輕并去白及鹿茸四兩子芩為上

大附子四兩懷州牛

膝酒浸二宿紫巴戟四兩金釵石斛四兩

川乾薑二兩肉桂二兩

右件八味為末楮實子一味用砂盆別研二日

令爛細後旋入前藥末同研拌令細勻入棗

肉同研拌得所方入鐵臼杵二千下丸如桐子

大每服三十九溫酒下忌牛肉豉汁

治老人百疾常服四順湯

神麴四兩生薑四兩甘草一兩草豆蔻

大麥藥子二兩

右件為末鹽點之一錢

婦人年老夏月平補血海活血去風五倍丸

五倍子二兩旋覆花二兩

右為末蜜為丸如桐子大每日空心五更晚食

後溫湯酒下十五丸喫至半月日覺見漸安手

足有力眼目鮮明進得飲食大王血海請每一

日三服若見大段安樂一日只喫一服尤佳

治老人脾胃弱不思飲食吐瀉霍亂理中丸

人參 甘草 乾薑 白朮

右為末煉蜜為丸桐子大每服十五丸食前服

夏月消食和氣橘紅散

陳橘皮一斤半湯浸洗五七度用淨布包起乾
又用生薑五兩自然汁拌橘皮令勻淹
一宿焙乾
肉豆蔻半斤
甘草五兩

右先將甘草寸截用白鹽五兩一處同炒候鹽

紅色甘草赤色為度一處為末如茶點之
夏月平胃補老人元藏虛弱腑氣不順壯筋骨益
顏容固精髓八仙丸

澤瀉三兩茯苓二兩牡丹三兩官桂二兩附子三兩
兩去

生乾地黃八兩山茱萸四兩乾薯藥四兩
乾拌

右事持了焙乾惟桂不焙為末煉蜜為丸如桐

子米每日空心溫酒或鹽湯下三十九

秋時攝養第十一

秋屬金主於肅殺秋肺氣主肺屬金味屬辛金能
尅木木屬肝肝主酸當秋之時其飲食之味宜減
辛增酸以養肝氣肺氣盛者調咽氣以洩之順之
則安逆之則太陰不收肺氣焦滿秋時凄風慘雨
草木黃落高年之人身雖老弱心亦如壯秋時思
念往昔親朋動多傷感季秋之後水吟草枯多發
宿患此時人子最宜承奉晨昏體悉舉止有詳若

色不樂便須多方誘說使役其心神則忘其秋
思其新登五穀不宜與食動人宿疾若素知宿患
秋終多發或痰涎喘嗽或風眩痺癢或秘泄勞倦
或寒熱進退計其所發之疾預於未發已前擇其
中和應病之藥預與服食止其欲發今布秋時湯
藥

秋時用諸藥方

治老人一切瀉痢七寶丹此藥如父...
不若老人反脾洩滑大宜

服此藥

附子炮當歸 陳橘皮 乾薑已上各 吳茱萸
厚朴以姜南椒 已上五味 舶上硫黃一兩
右件七味細剉以慢火焙過搗羅為末與硫黃
末同拌勻一處煎米醋和作兩劑却以白麵半
斤和令得所亦令分作兩劑用眾藥如燒餅法
用文武火煨令麪熟為度去却麪於臼中搗三
百下丸如桐子大如患諸般瀉痢以米湯下二
十九丸空心日午服如患氣痛及宿食不消以薑

鹽湯下二十九空心日午服如患氣痛及宿冷並無忌此方如神如聖其效無及

治老人乘秋藏府虛冷滑泄不定攝脾丸

木香 訶子炮去 厚朴生薑 五倍子 白朮煨

右為末用燒粟米飯為丸桐子大每服十九米飲送下

治老人秋肺壅滯涎嗽間作胃脘痰滯塞悶不快

藏靈仙丸

乾薄荷取末皂角一斤不蛀肥者以河水浸洗

藥未煉精去 藏靈仙洗淨去土

右入前膏搜丸如桐子大每服三十九臨卧生薑湯吞下

薑湯吞下

治老人脾藏泄瀉中心氣不和精神倦怠不思飲食神授高青丸

食神授高青丸

高良薑 青木香各一兩

右二味為末黃棗肉為丸桐子大乾薑湯下十五丸至二十九

治老人秋後多發嗽遠年一切嗽疾并勞嗽痰壅

保救丹

蛤蚧一箇如連皮去其毒取肺前一截用之

不挂皂角二枚去黑皮并子乾地黃一分 熟地五分 五味子一分

分杏仁一分 代時一分 入蜜炒黃色便 半夏一分 桑葉一分

過丁香一分

右為末煉蜜為丸如桐子大每日食前一服五

丸薑湯下

治老人瞽滯肺疾痰嗽生薑湯

杏仁四兩去皮 生薑六兩去皮 甘草三分 桃仁半兩

失塩花研研潔器貯之湯點服

治諸般腹瀉不止及年高久瀉健脾散

川烏頭三錢 厚朴汁製 甘草炙 乾薑一兩

右為末每服一錢水三合生薑二片煎至二合熱服併進二服立止

冬時攝養第十二

冬屬水主於飲藏冬腎氣旺腎屬水味屬鹹水尅

火火屬心心主苦常冬之時其飲食之味宜咸鹹

而增苦以養心氣腎氣盛者調以氣以平之順之

則安逆之則少陰不感腎之水濁沉三冬之月最
 宜居處家室溫暖食服調其飲食適其寒溫大寒
 之日山藥酒肉酒時進一盃以扶衰弱以禦寒氣
 不可輕出觸冒寒風綠老人血氣虛怯真陽氣少
 若感寒邪便成疾患多為嘔吐逆麻痺昏眩之疾
 多傳煎爐之物尤宜少食冬月陽氣在內陰氣在
 外池沼之中水堅如石地裂橫壅寒從下起人亦
 如是故感冬月人多患瞞氣滿急之疾老人多有
 上熱下冷之患如冬月陽氣在內虛陽上攻著食
 炙博燥熱之物故多有壅噎痰嗽眼目之疾亦不
 宜淫冰陽氣內蘊之時若加湯火所逼須出大汗
 高年人陽氣發泄骨肉疎薄易於傷動多感外疾
 惟早眠晚起以避霜威晨朝宜飲少醇酒然後進
 粥臨卧宜服微涼膈化痰藥一服今列冬時湯藥
 如後

冬時用藥諸方

台老人大腸風燥氣秘陳橘丸 霍大使方
 陳橘皮 去核揷柳半斤 木香 一分 羌活 三分 獨活 一分

防風 半斤 青皮 半斤 枳殼 半斤 不蛀皂角
 皮 兩 郁李仁 兩 牽牛 兩 右為末郁李仁牽牛同研拌勻煉蜜為丸桐子
 大每服二十九食前用薑湯下未利漸加三十
 九以利為度

老人有熱壅滯不快大腸時秘結諸熱毒生瘡按
 風順氣牽牛丸

牽牛 二兩 木通 兩 青橘 一兩 桑白皮 一兩
 赤芍藥 兩 木香 兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服十五丸至二
 十九丈夫酒下婦人血氣醋湯下

解老人熱秘方

大附子一箇燒留性研為末每服一錢熱酒下

食治養老序第十三

昔聖人詮置藥石療疾病者以其五藏本於五行
 五行有相生勝之理也榮衛本於陰陽陰陽有逆
 順之理也故萬物皆稟陰陽五行而生有五色焉
 有五味焉有寒熱焉有良毒焉人取其色味以熱

良藥之性歸之五行厥為藥以治諸疾順五行之氣者以相生之物為藥以養之逆五行之氣者以相勝之物為藥以攻之或瀉母以利子或益子以補母此用藥之奇法也經曰天地萬物之盜人萬物之盜人所以盜萬物為資養之法其水陸之物為飲食者不啻千品其五色五味冷熱補瀉之性亦皆稟於陰陽五行與藥無殊大體用藥之法以冷治熱以熱治冷實則瀉之虛則補之此用藥之大要也人若能知其食性調而用之則倍勝於

藥也緣老人之性皆厭於藥而喜於食以食治疾勝於用藥况是老人之疾慎於吐利尤宜用食以治之凡老人有患宜先以食治食治未愈然後命藥此養老人之大法也是以善治病者不如善慎疾善治藥者不如善治食今以食醫心鏡食療本草診食要法諸家治饌洎太平聖惠方食治諸法類成養老食治方各開門目用治諸疾具列於左為人子者宜留意焉

食治養老益氣方

食治老人補虛益氣牛乳方

牛乳牛乳黃芩末牛乳

右件藥入銀器內以水三升和乳合煎取三升後入瓷合中每於食前煖一小盞服之

食治老人補虛羸之氣力法製猪肚方

猪肚猪肚如食法人參人參去去乾薑乾薑製製炮炮椒椒

去去日日不不開開口口葱葱白白切切糯米糯米合

石件搗為末入米合和相得入猪肚內縫合勿

令洩氣以水七升於罐內微火煮令爛熟空心

服放溫服之次暖酒一中盞飲之

老人益氣牛乳方

牛乳最宜老人平補血脉益心長肌肉令人身

體康強潤澤面目光悅志不衰故為人子者常

須供之以為常食或為乳餅或作新乳等恒使

恣意充足為度此物勝肉遠矣

食治老人養老以藥水飲牛乳服食方

鍾乳鍾乳者鍾乳細研細研人參人參二兩二兩甘草甘草五兩五兩炙炙劉劉

乾地黄乾地黄三兩三兩黃耆黃耆三兩三兩杜仲杜仲三兩三兩微皮微皮用用肉蓯蓉肉蓯蓉六兩六兩

白茯苓五冬門冬 去心兩 薯蕷石斛 二兩去

右藥為末以水三斗先煮粟米七升為粥放盆

內用藥一兩攪令勻少和冷水與渴牛飲之令

足不更飲之一日飲時患渴不飲清水平旦

取牛乳服之生熟任意牛酒三歲以上七歲以

下純黃色者為上餘色為下其乳當令犢子飲

之若犢子不飲者其乳動氣不堪服也慎蘇猪

魚生冷陳臭其乳牛清潔養之洗刷飲飼須如

法用心者之

食治老人煩遺重病虛羸不得平復宜服此枸杞

煎方

生枸杞根細切一斗 以水五斗白羊脊骨 剉碎

右件藥以微火煎取五升去滓取入瓷合中每

服一合與酒一小盞合煖每於食前溫服

食治老人補五勞七傷虛損法煮羊頭方

白羊頭蹄一胡椒 薑蒜 乾薑白切半

鼓將頭蹄 須用草火燒令黃色刮去灰塵

右件藥先以水煮頭蹄半熟內藥更煮令爛去

背空腹適性食之日食一具滿七具即止禁生

冷醋滑五辛陳臭猪雞等七日

治老人大虛羸困極宜服猪肪方

猪肪不中水

右入葱白一莖於鮑內煎令葱黃即止候冷暖

如身體空腹煩服之令盡暖蓋覆卧至日晡後

乃白粥調糜過三日後宜服羊肝羹

羊肝羹方

羊肝一具去筋 羊脊膂肉二條切 麴末半杓 杞根

升五斤 剉以水一斗 五

右用枸杞汁煮前羊肝等令爛入豉一小盞葱

白七莖切以五味調和作羹空腹食之後三日

慎食如上法

食治老人補虛勞油麴餅飢方

主胡麻油斤 浙粳米泔清 斤

右二味以微火煎盡泔清乃止出貯之取合鹽

湯二合將和麴作餅飢煮令熟入五味食之

食治眼目方

食治老人肝藏虛弱遠視無力補猪肝羹方

猪肝

一具切葱白一握去雞子二枚

右以豉汁中煮作羹臨熟打破雞子投在內食之

又方

青羊肝

一具切水

右以鹽醬醋和食之立効

又方

葱子

半斤

右為末每服一匙以水二大盞煎取一盞去渣

入米煮粥食之

食治老人青白翳明目除邪氣利大腸去寒熱馬

齒實拌葱豉粥方

馬齒實

半斤

右為末每服一匙煮葱豉和攪食之馬齒菜作

羹粥食並明目極佳

食治老人肝藏風虛眼暗烏雞肝粥方

烏雞肝

一具

右以豉和米作羹粥食之

食治老人目暗不明蒼耳子粥方

蒼耳子

半斤梗米三合

右件搗蒼耳子爛用布絞濾以水二升取汁和

米煮粥食之或作散煎服亦佳

食治老人熱發眼赤澀痛梔子仁粥方

梔子仁

一兩

右為末分為四服每服用米三合煮粥臨熟時

下梔子末一分攪令勻食之

食治老人益精氣強志意聰利耳目雞頭實粥方

雞頭實

三合

右煮令熟去殼研如膏入粳米二合煮粥空腹

食

治老人補中明目利小便蔓菁粥方

蔓菁子

三合粳米三合

右搗碎入水二大盞絞濾取汁着米煮粥空心

食之

治老人益耳目聰明補中強志蓮實粥方

蓮實半斤 剉去心

右先以水煮蓮實令熟次入糯米作粥候熟入運實攪勻熱食

治老人瞞上風熱頭目赤腫痛目視曉曉竹葉粥方

竹葉五片石膏三兩沙糖二兩新粳米三合

右以水三大盞煎石膏等二味取水二大盞去滓澄清煮粥候熟入沙糖食之

治老人久患耳聾養腎藏強骨氣磁石猪腎羹方

磁石一斤 碎水淘猪腎一對 去脂

右以水五升煮磁石取二升去磁石投腎調和以葱豉薑椒作羹空腹食之作粥及入酒並得磁石常開

治老人腎氣虛損耳聾鹿腎粥方

鹿腎一對 去脂粳米三合

右於豉汁中相和煮作粥入五味如法調和空腹食之作羹酒時得

食治老人五藏氣壅耳聾烏鷄膏粥方

烏鷄脂一斤 梗米

右相和煮粥入五味調和空腹食之烏鷄脂和酒飲亦佳

食治老人耳聾不差鯉魚腦髓粥方

鯉魚腦髓二兩粳米三合

右煮粥以五味調和空腹服之

食治老人腎藏氣憊耳聾猪腎粥方

猪腎一對 去脂葱二莖人參一分防風一分粳米二合雞白一合

右件藥末并米葱雞白着水下鍋中煮候粥熟熱撥開中心下腎莫攪動慢火更煮良久入五味空腹服之

食治五勞七傷諸方

腰壯陽道餅子方

附子二兩 炮裂神麴三兩乾薑一兩桂心一兩

五味子二兩肉蓯蓉一斤羊髓二大匙大棗二十枚酥二兩蜜四兩

勻麪黃牛乳半 漢椒半兩 去目及附

右為末入麪以酥蜜髓乳相和入煎餅熟搜於

盆中蓋覆勿令通風半日久即將出更搜令熟

捍作糊餅大面上以筋挑之即入爐燉中上下

以火燂令熟每日空腹食五枚一方入酵和更

佳

食治老人五勞七傷益下元壯氣海服經月餘肌

肉充盛老成少年宜服食雌鷄粥方

黃雌鷄一隻去 藏勝肉 菴酒浸一宿一兩 生薯蕷剉去

一切阿魏 煉過糲米二合 淘入

右以上先將鷄爛煮擘骨取汁下米及鷄肉菴

菴等都煮粥入五味空心食之

食治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力宜食羊腎後

菴羹方

羊腎一兩 去筋去 肉菴一兩 酒浸一宿

右件藥和作羹着葱白鹽五味末等一如常法

空腹服之

食治老人五勞七傷陽氣衰弱強益氣力鹿腎粥

方

鹿腎一兩 去脂去 肉菴一兩 酒浸二宿 糲米二合

右件藥先以水二盞煮米作粥欲熟下鹿腎後

菴葱

食治老人虛損羸瘦諸方

食治老人藏府虛損羸瘦陽氣乏弱雀兒粥方

雀兒五隻 治如 粟米一合 葱白三

右先將雀兒炒肉次入酒一合煮少時入水二

大盞半下米煮作粥欲熟下葱白五味等候熟

空心服之

食治老人虛損羸瘦下焦久冷眼昏耳聾骨汁煮

餅方

大羊尾骨一條 以水五 大盞五分 葱白五 薑去

麪三 陳橘皮一兩 湯浸 羊肉細切 荅一

右件藥都用骨汁煮五七沸去滓用汁少許後

搜麪作索餅却於汁中與羊肉煮入五味空腹

服之

食治老人虛損羸瘦助陽壯筋骨羊肉粥方

羊肉二斤黃耆一斤人參一斤白茯苓一斤棗五枚

穀米三合

右件藥先將肉去脂皮取精腎肉留四兩細切餘一斤十二兩以水五大盞并黃耆等煎取汁三盞去滓入米煮粥臨熟下切了生肉更煮入五味調和空心食之

食治老人虛損羸瘦令人肥白光澤鷄子索餅方

白麴四兩鷄子四兩白羊肉四兩炒

右件以鷄子清搜麴作索餅於豉汁中煮令熟

入五味和臍空腹食之

食治老人腎氣損陰萎因痺風濕肢節中痛不可持物石英水煮粥方

白石英二斤磁石三十兩煨碎

右件藥以水二斗器中浸於露地安置夜即揭

蓋令得星月氣每日取水作羹粥及煎茶湯藥

皆用之用却一升即添一升如此經年諸風並

差氣力強盛顏如童子

食治老人脾胃氣弱方

食治老人脾胃氣弱不多食四肢困乏無力黃瘦

羊肉索餅方

白羊肉四兩白麴六兩生薑汁二合

右以薑汁搜麴肉切作臠頭下五味椒蔥煮熟

空心食之日一紙如常作益佳

食治老人脾胃氣弱食飲不下虛勞羸瘦及氣力

衰微行履不得鯽魚熟鱸方

鯽魚肉半斤細

右投豉汁中煮令熟下胡椒薑并薑橘皮等

末及五味空腹食常服尤佳

食治老人脾胃氣弱飲食不多羸乏藿菜羹方

藿菜四兩鯽魚肉五兩

右煮作羹下五味椒薑并調少麴空心食之常

以三五日服極補益

食治老人脾胃氣弱不能飲食多困無力釀猪肚

方

猪肚一箇肥者人參半兩橘皮末半兩猪脾二枚

飯半碗葱白握

右總內猪肚中相和入椒醬五味乾縫口合蒸之令爛熟空心漸食之能作三兩劑兼補勞

食治老人脾胃氣弱不多進食行步無力黃瘦氣微見食即欲吐鷄子饅方

鷄子三枚白麴五兩羊肉二兩作

右件以鷄子白搜麴如常法作之以五味煮熟空心食之日一服常作極補虛

食治老人脾胃氣弱食不消化羸瘦舉動無力多引麴末索餅子方

麴末二兩白麴五兩生薑汁三兩白羊肉二兩作

右以薑汁搜麴末和麴作之加羊肉臠頭及下醬椒五味煮熟空心食之日一服常服尤益

食治老人脾胃氣弱勞損不下食羊脊粥方

大羊脊骨一具青粱米四合作

右以水五升煎取二升汁下米煮作粥空心食

之可下五味常服其功難及甚效

食治老人脾胃氣弱乾嘔不能下食羊血方

羊血一斤蔥白一握白麴四兩作

右煮血令熟漸食之三五服極有驗能補益藏府

食治老人脾胃氣弱虛嘔吐不下食漸加羸瘦粟米粥方

粟米一斗白麴四兩作

右以粟米拌麴令勻煮作粥空心食之一日一服極養腎氣和胃

食治老人飲食不下或嘔逆虛弱生薑湯方

生薑二兩皮細切漿水一斗作

右和少鹽煎取七合空心常作開胃進食

食治老人脾胃虛弱惡心不欲飲食常嘔吐虎肉炙方

虎肉半斤蔥白半握作

右件以椒醬五味調炙之空心食冷為佳不可熱食損藏

食治老人脾胃氣弱不多食痿瘦黃雌鷄饅方

黃雌鷄肉五兩白麴七兩蔥白二合作

右以切肉作饅能下椒醬五味調和炙熟空心

食之日一服皆益藏府悅澤顏色

食治老人瀉痢諸方

食治老人脾胃氣冷痢白膿涕腰脊疼痛瘦弱無力

力鯽魚熟鱠

鯽魚肉九兩切 豉汁七合 乾薑半兩 橘皮末兩半

右以椒醬五味調和豉汁沸即下鱠魚煮熟二味空心食之日一服其効尤益

食治老人脾胃冷氣痢下不止赤石脂罇飴方

赤石脂五兩碎 白麴七兩

右以赤石脂末和麴搜作之煮熟下葱醬五味

臞頭空心食之三四服皆愈

食治老人脾胃氣冷腸數痢黃雌雞炙方

黃雌雞一隻如常法

右以五味椒醬刷炙之令熟空心漸食之亦甚

補益藏府

食治老人脾胃虛氣頻頻下痢瘦乏無力猪肝煎

猪肝一具去膜切 好醋升一

右以醋煎肝微火令汁乾即空心常服之亦

明目溫中除冷氣

食治老人脾胃虛弱冷痛泄痢無常不下食椒麴

粥方

蜀椒一兩熬 白麴四兩

右和椒拌之令勻即煮空心食之日一服尤佳

食治老人冷熱不調下痢赤白腹痛不止甘草湯

甘草一兩生薑一兩切 烏豆一合

右以水一升煎取七合去滓空心服之不過三

日服三服

食治老人赤白痢刺痛不多食痿瘦鯽魚粥方

鯽魚肉七兩 青粱米一握 皮末

右相和煮作粥下五味椒醬蔥調和空心食之

二服亦治勞和減時

食治老人脾胃虛冷泄痢水穀不分白粥方

蓬白一握 粳米一握 葱白三握

右和作羹下五味椒醬姜蔥心食常作取效

食治老人脾胃虛弱冷痛泄痢無常不下食椒麴

方

神麴

二升 炙 搗 主 胃 氣 米 一 升

右相和煮粥空心食之常三五服立愈

食治老人赤白痢日夜無度煩熱不止車前子飲

車前子

五合 碎 取 一 升 水 二 升 煮 米 三 升

右取煎汁煮作飲空心食之日三服最除熱毒

食治老人痢不止日漸黃瘦無力不多食黍米粥

方

黍米

一合 阿膠 一 升 煮 黍 米

右煮粥臨熟下膠末調和空心食之一服尤效

食治老人下痢赤白及水穀不度腹痛馬齒菜方

馬齒菜

一斤 淨

右煮令熟及熱以五味或薑醋漸食之

食治老人水氣病身體腫悶滿氣急不能食皮膚

欲裂四肢常疼不可屈伸鯉魚臙方

鯉魚肉

十 斤 葱 白 一 升 煮 鯉 魚 臙 一 升 熟

右以水瀝麻子汁和煮作臙下五味椒薑調和

空心時漸食之常服尤佳

食治老人水氣病四肢腫悶沉重喘息不安

水牛肉

解 斤

右蒸令爛熟空心切以五味薑醋漸食之任性

為佳

食治老人水氣浮腫身皮膚燥痒氣急不能下食

心腹脹滿氣欲絕絕貓肉羹方

貓肉

一斤 葱 白 半 升 粳 米 四 合

右和煮作羹下五味椒薑空心常食之最驗

食治老人水氣腫滿身體疼痛不能食麻子粥方

冬麻子

一斤 研 鯉 魚 肉 七 兩

右取麻子汁下米四合和魚煮作粥以五味葱

椒空心食日二服頻作皆愈

食治老人煩渴藏府乾枯渴不止野鷄臙方

野鷄

一 隻 葱 白 一 升 粳 米 三 合

右切作相和羹作臙下五味椒薑空心食之常

作服佳妙

食治老人煩渴飲水不足日漸羸瘦因弱兔頭款

方

兔頭

洗一洗淨鼓心

右以水七升煮取五升汁渴即漸飲之最效

食治老人消渴煩悶常熱身體枯燥黃瘦牛乳方

牛乳

一升煮

右空心分為二服極補益五藏令人強健光悅

食治老人消渴壯熱燥不安無無力青梁米飲方

青梁米

一升洗淘

右以水三升和煮之渴即漸飲服之極治熱燥

並除

○

○

食治老人消渴熱中飲水無度常苦不足青豆方

青豆

二升

右煮令爛熟空心飢即食之渴即飲汁或作粥

食之任性亦佳

食治老人消渴煩熱心神狂亂躁悶不安冬瓜羹

方

冬瓜

半斤去皮鼓心

右以和煮作羹下五味調和空心食之常作粥

佳

食治老人消渴消中飲水不足五藏乾枯蘆根飲

蘆根

一升水一斗

青梁米五合

右以煎煮飲空心食之漸進為度益效忌鹹食

炙肉熟麪等

食治老人消渴諸藥不差黃瘦力弱鹿頭方

鹿頭

一枚炮去

右煮令爛熟空心日以五味食之并服汁極效

食治老人水氣諸方

○

○

食治老人水氣病身體腫悶滿氣急不能食皮膚

欲裂四肢常疼不更屈伸鯉魚臠方

鯉魚肉

一升

葱白一升

細研

右以水瀝麻子汁和煮作臠下五味椒薑調和

空心時漸食之常服尤佳

食治老人水氣病四肢腫悶沉重喘急不安水牛

肉方

水牛肉

一升

右煮令爛熟空心切以五味薑醋漸食之任性

為佳

食治老人水氣浮腫身皮膚燥痺氣急不能下食

心腹脹滿氣欲絕鰓肉羹方

鰓肉一斤切葱白半握切粳米三合淘

右和煮作羹下五味椒薑空心常食之最驗

食治老人水氣腫滿身體疼痛不能食麻子粥方

冬麻子一斤研鯉魚肉七兩切

右取麻子汁下米四合和魚煮作粥以五味葱

椒空心食日二服頻作皆愈

食治老人水氣脹悶手足浮腫氣急煩滿赤豆方

赤小豆三升淘淨樟柳根好者切一升

右和豆煮爛熟空心常食豆渴即飲汁勿別雜

食服三二服立効

食治老人水氣面腫腹脹喘乏不安轉動不得手

足不仁身體重困或疼痛郁李仁粥方

郁李仁二兩研以水薏苡仁五合淘

右以煎汁作粥空心食之日二服常立効

食治老人水氣面目手足浮腫腹脹風急桑白皮

飲

桑白皮四兩切青梁米四合研

右以桑汁煮作飲空心漸食常服尤佳

食治老人水氣疾心腹脹滿四肢煩疼無力白煮

鯉魚方

鯉魚一頭重二斤者橘皮二兩如常法

右和煮令爛熟空心以二味少青鹽食之

食治水氣脹滿手足俱腫心煩悶無力大豆方

大豆二升白木二兩鯉魚一斤

右以水和煮令豆爛熟空心常食之魚豆飲其

汁尤佳

食治老人水氣身體虛腫面目虛脹水牛皮方

水牛皮二斤刮去毛淨洗橘皮一兩

右相和煮令爛熟切以生薑醋五味漸食之常

作尤益

食治喘嗽諸方

食治老人上氣急喘息不得坐卧不安猪胰酒方

猪胰三具青州藥三十

右以酒三升浸之若秋冬三五日春夏一二日
蜜封頭以布絞去滓空心溫任性漸服之極驗
切忌鹹乾

食治老人上氣咳嗽膏中妨滿急喘桃仁粥方

桃仁三兩去青粱米二合

右調桃仁和米煮作粥空心食之日一服尤益

食治老人上氣咳嗽煩熱乾燥不能食飴煎方

寒食飴四兩乾地黄一升白蜜三合

右相和微火煎之令稠即空心每日含半匙細

金書

五

咽汁食後亦服除熱最妙

食治老人上喘嗽身體壯熱口乾渴燥猪脂方

猪肪二斤切

右於沸湯中投煮之空心以五味漸食之其効

不可比補勞治百病

食治老人上喘嗽氣急面目浮腫坐卧不得蘇煎

方

土蘇四兩鹿髓三合生地黄汁一升

右相和微火煎之如飴即止空心及食後當含

半匙細咽汁三兩日即瘳

食治老人氣急膏腸逆滿食飲不下棗煎方

青州棗三十枚土蘇二兩飴二合

右相和微火溫令消即下棗攪之相和以微火

煎令蘇飴泣盡即止每食上即啜一二枚漸漸

咽汁為佳忌鹹熱炙肉

食治老人咳嗽膏脇引痛即多唾涕與藥方

黃藥一作五孔蜀椒五升麵二升

右以蜀椒每孔內一顆軟麪軟裹放於塘灰火

金書

五

中候煨令熟去麪冷空心切食用三二服尤佳

不當及熱食之益甚須羊肚肝羹治之

食治老人上氣咳嗽喘急煩熱不下食食即吐逆

腹脹滿薑糖煎方

生薑汁五合沙糖四兩

右相和微火溫之一二十沸即止每度含半匙

漸漸下汁

食治老人咳嗽虛熱口舌乾燥涕唾稠粘甘蔗粥

方

汁一升 青粱米四分

右以蔗汁煮粥空心漸食之日一二服潤心肺

食治老人上氣熱咳嗽引心腹痛滿悶桃仁煎方

桃仁一兩去皮 赤楊四分

右相和微煎三五沸即止空心每度含少許漸

漸咽汁尤益

食治老人咳嗽煩熱或唾血氣急不能食地黃飲

生地黃半斤 研如水取汁

右以地黃汁煎作膏空心漸食之日一服極効

食治脚氣諸方

食治老人脚氣煩熱流腫入膝滿悶猪肚生方

猪肚一具肥者 切作生

右以水洗布紋令乾好蒜醋椒醬五味空心常

食之亦治熱勞補益効

食治老人脚氣毒悶身體不任行履不能紫蘇粥

方

紫蘇子五合 熟細 粳米四分

右煮作粥臨熟下蘇汁調之空心而食之日一

服亦溫中

食治老人脚氣逆悶嘔吐衝心不能下食猪腎生

方

猪腎二隻去脂 細切作生

右以蒜醋五味空心食之日一服佳極

食治老人脚氣衝逆身腫脚腫大小便秘不通

氣急喘急食飲不下郁李仁飲方

郁李仁二兩 細研以 薤白仁四分 研破

右以相和煮飲空心食之一二服極驗

食治老人脚氣逆心悶煩燥心神狂躁鯉魚膳方

鯉魚一斤 專菜四兩 粳米二合

右切以葱白一握相和煮膳下五味椒薑調和

空心食之常服亦治水氣

食治老人脚氣煩悶或吐逆不下食庫茹麻子粥

麻子一斤 煮汁 粳米四分

右以麻子汁作粥空心食之日一服尤益亦宜

治冷氣

食治老人脚氣煩燥或逆心問憤嘔逆水牛頭方

水牛頭一棧炮去毛洗之

右煮令爛熟切以薑醋五味空心漸漸食之效

食治老人脚氣毒衝心身面浮腫氣急熊肉臃方

熊肉二斤肥者切作塊

右切以五味作臠腊空心日炙食之亦可作羹

粥任性食之極效

食治老人脚氣攻心煩悶膏腹脹滿烏雞羹方

烏雞一隻治如常法葱白一握米二合

右煮令熟空心切以五味作羹常食之為佳

食治老人脚氣腎虛氣損脚膝無力因之生栗方

生栗一斤以蒸熟透風乾

右以每日空心常食十顆極治脚氣不測有功

食治老人脚氣煩痺緩弱不隨行履不能猪腎粥

方

猪腎二隻去膜細切用粳米四合葱白一握

右和黃作粥下五味椒薑空心食之日一服最

驗

食治老人脚氣痺弱五緩六急煩燥不安鼓心酒方

鼓心三升九蒸酒升

右以酒浸一二日空心任意溫服三盞極效

食治諸淋方

食治老人五淋小便澀痛常頻不利煩熱麻子粥

方

麻子五合熬研水瀝取汁青梁米四合

右以麻子汁煮作粥空心漸食之一日二服常

益加佳

食治老人淋病小便不通利秘澀心痛榆皮素餅

方

榆皮二兩切用水三升煮取一升半汁白麴六兩

右搜麴作之於榆汁拌煮下五味葱椒空心食

之常三五服極利水道

食治老人五淋病身體煩熱小便痛不利漿水飲

漿水三升酸青梁米所

右煮作飲空心漸飲之日二三服亦宜勿利

食治老人淋小便秘澀煩熱燥痛四肢寒慄葵菜羹方

葵菜四兩切青梁米三合葱白一握

右煮作羹下五味醬椒空心食之極治小便不通

食治老人淋煩熱小便莖中痛澀少不快利青豆方

青豆二升橘皮二兩麻子汁一升

右煮豆臨熟即下麻子汁空心漸食之併服其

汁皆驗

食治老人五淋久不止身體壯熱小便滿悶小麥湯方

小麥一升通草二兩

右以水煮取三升去滓漸食之須臾當差

食治老人淋病小便長澀不利痛悶之極藕蜜方

藕汁五合白蜜五合生地黃汁一升

右相和微火煎之令如錫空心含半匙漸漸下飲食了亦服忌熱冷炙肉

食治老人五淋燥痛小便不多秘澀不通蘇粥方

土蘇二兩青梁米四合漿水三升

右煮作粥臨熟下蘇攪之空心食之日一服佳

食治老人淋病小便下血身體熱盛車前子飲

車前子五合綿菜水煮取汁青梁米四合

右煮煎汁作飲空心食之常服亦明目去熱毒

食治老人五淋秘澀小便禁痛滿悶不利蒲桃漿方

蒲桃汁一升白蜜三合藕汁一升

右相和微火溫三沸即止空心服五合食後服

五合常以服之殊効

食治噎塞諸方

食治老人胃膈妨塞食飲不下漸黃瘦行履無氣

軟弱羊肉索餅方

羊肉白者四兩白麵六兩橘皮末錢四

右搗薑汁搜麴作之如常肉下五味葱椒橘皮

未等炒熟煮空心食之一服極肥健溫藏府

食治老人噎病心痛悶膈氣結飲食不下桂心粥

方

桂心末二兩粳米四合

右以黃作粥半熟次下桂末調和空心日一服亦破冷氣殊効

食治老人噎病食不通胃脇滿悶黃雌雞饅飴方

黃雌雞四兩切白麴六兩茯苓末二兩

右和茯苓末搜麴作豉汁中煮空心食之常作

三五服極除冷氣噎

食治老人噎病食飲不下氣塞不通蜜漿方

書一 卷二

白蜜一兩熟湯一升

右湯令熱即下蜜調之分二服皆愈

食治老人噎病氣塞食不通吐逆蘇蜜煎方

土蘇二兩白蜜五合生薑汁五合

右相和微火煎之令沸空心服半匙細細下汁

食治老人噎病胃滿寒悶飲食不下薑橘湯方

生薑二兩切陳橘皮一兩

右以水二升煎取一升去滓空心漸服之常益

食治老人噎藏府虛弱腸道滿飲食不下椒麴

粥方

蜀椒一兩白麴五合

右以苦酒浸椒一宿明旦取出以麴中令勻

黃熟空心食之日二服常驗

食治老人噎冷氣擁塞虛弱食不下煎餅子

土蘇二兩白麴六兩以生薑汁五合調之

右如常法作之空心常食潤藏府和中

食治老人咽食入口即塞澀不下氣壅白米飲方

白米四合春頭糠末一兩

右煮飲熟下糠米調之空心服食尤益

食治老人噎塞水食不通黃瘦羸弱饅飴方

雌雞肉五兩切白麴六兩葱白一握

右如常法下五味椒薑向雞汁中煮熟空心食

之日一服極補倍

食治冷氣諸方

食治老人冷氣心痛無時往往發動不能食桃

粥方

桃仁二兩去脂尖青梁米四合

右以桃仁汁煮作粥空心食之常服除冷温中
食治老人冷氣心痛不止腹脇脹滿坐卧不得菜
更飲方

菜羹分二青梁米研二合

右以水二升煎菜羹末取一升便下米煮作飲
空心食之一二服尤佳

食治老人冷氣心痛繳結氣悶桂心酒方

桂心末兩一清酒合六

右温酒令熱即下桂心末調之頻服一二服効

書 本四

食治老人冷氣心痛牽引背脊不能下食紫蘇粥

方

紫蘇子三合熟青梁米四合

右煮作粥臨熟下蘇子末調之空心服為佳

食治老人冷氣卒心痛悶澁氣不來手足冷塩湯

方

塩末一合沸湯一升

右以塩末內湯中調頻令服盡須臾當吐即

差

食治老人冷氣心痛嘔不多下食煩悶椒麴餅飲
方

胡椒一兩白麴三兩

右以椒末和麴搜作之水煮下五味調和食之
常三五服極効

食治老人冷氣心痛薑橘皮湯方

生薑一兩陳橘皮一兩

右以水一升煎取七合去滓空心食之日三兩
服尤益

書 六十五

食治老人冷氣心痛鬱結兩脇脹滿高良薑粥方

高良薑二兩青梁米四合

右以薑汁煮粥空心食之日一服極益効

食治老人冷氣心痛發動時遇冷風即痛萆薢羹

方

萆薢末二合胡椒末一合青梁米四合

右以羹作粥熟下二味調之空心食常服尤効

食治老人冷氣逆心痛結舉動不得乾薑酒方

乾薑末半升清酒一斗

右溫酒熟即下薑末投酒中頓服之立効

食治諸痔方

食治老人痔病下血不止肛門腫痒狸羹方

仔狸一兩治

右細切以麩及葱椒五味拌作片炙熟空心漸

食之亦可作羹粥任性尤佳

食治老人痔下血久不差漸加黃瘦無力鯉魚鱠

方

鯉魚肉一兩切作鱠如常法

食書

李本

右以蒜醋五味空心常食之日一服差忌鮮甜

食

食治老人痔常下血身體壯熱不多食蒼耳粥方

蒼耳子

五合熟拌水二升煎取一片半汁粳米四合

右以前件煮作粥空心食之日常服亦可煎湯

服之極効破氣明目

食治老人痔病久不愈肛門腫痛鰻鱺魚臠方

鰻鱺魚肉

一斤切作臠葱白半握

右煮作臠下五味椒薑空心漸食之殺蟲尤佳

食治老人痔病下血不止日加羸瘦無力鵝鵝散

鵝鵝淨洗令

右鵝為散空心以白粥飲服二方寸七日二服

最驗亦可炙食任性

食治老人五痔泄血不絕四肢衰弱不能下食杏

仁飲方

杏仁二兩去皮尖細粳米四合

右以杏仁汁和煮作飲空心食之日一服効

食書

李本

食治老人五痔久不愈生瘡疼痛野豬肉羹方

野豬肉一斤切葱白一握米二合

右煮作羹五味調和椒薑空心漸食之常作效

食治老人五痔下血常煩熱羸瘦桑耳粥

桑耳二兩水三升煎取二升汁粳米四合

右以桑耳汁煮作粥空心食之日一二服効

食治老人五痔泄血不止積日因勞無氣鴛鴦法

炙方

鴛鴦一枚炙法

右以五味椒醬臠炙炙之令熟空心漸食之亦療久瘰瘡絕驗

食治老人五痔血下不差肛門腫痛漸瘦鮫魚方

鮫魚肉一斤葱白把半

右以白羹令熟空心以蒜醋五味漸漸食之常作尤佳

食治諸風方

食治老人中風言語蹇澀神昏憤手足不仁緩弱不遂方

葛粉五兩荊芥一握合五

右以搜葛粉如常作之煎二味取汁煮之下葱椒五味臠頭空心食之一二服將息為效忌猪肉蕎麥

食治老人中風口面喎偏大小便秘澀煩熱荊芥

方

荊芥一握青果米四合薄荷葉半握鼓五合

右以水煮取荊芥汁下米及諸味煮作粥入少鹽醋空心食之常服佳

食治老人中風緩弱不仁四肢搖動無氣力炙熊肉方

熊肉一斤葱白半把椒醬等

右以五味臠炙之炙熟空心冷食之恒服為佳亦可作羹粥任性食之尤佳

食治老人中風汗出四肢頑痺言語不利麻子飲方

麻子五合熬細研粳米四合淨淘研之

右以麻子煮作飲空心漸食之頗作極補益

食治老人中風口目瞶動煩悶不安中勞神飢方

牛蒡根一升去皮白米合四合淨淘研之

右以牛蒡粉和麴作之向鼓汁中煮加葱椒五味臠頭空心食之恒服極効

食治老人卒中風口喎身軀反張不語大豆酒方

大豆一升清酒二升

右熬豆令聲絕即下酒投之煮一二沸去滓頓服之隨卧汗差口喎初灌之

食治老人中風頭旋目眩身體厥強筋骨疼痛手

足煩熱心神不安烏驢頭方

烏驢頭一投炮去毛淨治之

右以黃令爛熟細切空心以薑醋五味食之漸

進為佳極除風熱其汁如醪酒亦醫前患尤効

食治老人中風四肢不仁筋骨頑強蒼耳葉羹方

蒼耳葉五兩切鼓心二合好嫩者切

右和黃作羹下五味椒薑調和空心食之尤佳

食治老人中風熱毒心悶氣壅昏倒甘草豆方

甘草一斤為豆合生薑半兩切

右以水二升煎取一升去滓冷漸食服之極治

熱毒

食治老人中風煩熱言語澁悶手足熱烏雞臙方

烏雞半斤切麻子汁合葱白

右煮作臙次下麻子汁五味薑椒冷熱空心漸

食之補益

食治老人中風心神暗昧行即欲倒嘔吐白羊頭

方

白羊頭一具治如常法

右以空心用薑醋漸食之為佳

食治老人中風邪毒蔽府壅塞手足緩弱蘇煎

大蒜升去皮細切大豆黃

右以水一升和二味微火煎之似稠即止空心

每服食噉三二匙亦補腎氣

食治老人久風濕痺筋攣骨痛潤皮毛益氣力補

虛止毒除面肝宜服補腎地黃酒方

生地黃一斤切大豆二升生牛蒡根一升

右以絹袋盛之以酒一斗浸之五六日任性空

心溫服三三盞恒作之尤佳

食治老人風熱煩毒頑痺不仁五緩六急馳脂酒

方

野馳脂五兩煉之為上

右空心溫酒五合下半匙已上脂調令消煩服

之日二服極效

食治老人風攣拘急偏枯不通利鴈脂酒方

鴈脂五兩清之令散

右每日空心溫酒一盞下脂半合許調頓服之

食治老人風虛痺弱四肢無力腰膝疼痛巨勝酒方

巨勝酒二升薏苡仁升乾地黄半斤

右以絹袋貯無灰酒一斗漬之勿令洩氣滿五

六日任性空心溫服一二盞尤益

食治老人風冷痺筋脉緩急蒼耳茶方

蒼耳子二升熟

右每日煎服之代茶常服極治風熱明目

食治老人熱風下血明日益氣除邪治瘰癧利藏

府噴氣槐茶方

槐葉嫩者五斤蒸令熟為片

右每日煎如茶法服之恒益除風尤佳

治一切傷損血出消腫毒秦王背指散

宣連各等檳榔各等

右為末傷撲乾貼消腫冷水調鷄翎掃妙

治失音迴聲飲子

皂角一挺刮去蘿蔔三箇切

右以水二椀同煎至半椀以下服之不過三服

便語喫却蘿蔔更妙

治鼻衄醍醐酒

右以蘿蔔自然汁半盞熟酒半盞相和令勻再

用湯溫過服之立驗

補下元烏髭鬚壯脚膝進食悅顏色治腰疼杜仲

丸

杜仲一兩炙令補骨脂一兩炒令胡桃仁一兩

細研

右件三味研令勻煉蜜為丸如桐子大空心溫

酒下三十九

治一切眼洗眼方

膽礬一兩煨令白滑石一兩秦皮半兩膩粉二分

右用一字湯泡候溫閉目洗兩背頭以冷為度

補益療眼有黑花明目川椒丸

椒一斤每用鹽一斤拌淹一宿三度黑參半斤

右二味為末煉蜜為丸如桐子大每服鹽湯下

三十丸食後臨卧服之

治腎藏虛冷肝膈浮熱上衝兩目生翳黑花風毒

久不治者

青蘆一兩

蒼朮一兩

米泔水浸洗三日

木賊草一兩

治眼

右為末空心熟水調下一錢如大段青白不見

物者不過十服小可只三二服

治眼有冷淚木賊散

木賊

一兩為末

右件二味同研令勻每用三錢以清米泔煎熟

放溫調下食後臨卧各一服

書一

治腸風瀉血當日止方

附子

二兩炮去

綠礬

四兩用瓶子盛之大煨食

右二味一處研令勻粟米粥為丸如桐子大空

心用生地黃汁下三十九當日止一月除根亦

可久服助下元除風氣補益藏府

治瀉痢乳香和氣止藏毒瀉血腹內疔痛等

乳香

少許

訶子皮

一分

當歸

兩半

右細剉

乳香微炒

候當歸乾為度

并為末每

服二錢用陳米第三度泔六分一盞煎至五分
空心午前服此方最妙患及百餘日者服之即
愈

芸香丸治風血留滯下成腸風痔疾

鹿角

一兩燒令

芸薹子

半兩

右二味為末醋煮麪糊丸如桐子大每服十九

飯飲下溫酒下亦得空心食前服

白香散治一切惡瘡疼痛不可忍者

楓香

一分

賦粉

一分

書一

右二味同細研令勻每有患者先用口內含藥

水令暖吐出洗瘡令淨後以藥末乾敷疼痛立

止貼至差為度

治金瘡水毒及木簽刺癰疽熱毒等刻聖散方金

瘡此藥最妙

糯米

三升

去殼米入

瓦盆內

於端午日前四

日取出用乾生

手輕淘

轉碎去水

勿令攪

碎後至端午

日取出用乾生

藥大

右每旋取少許炒令焦黑碾為末冷水調如膏

藥大小最定瘡口外以絹帛包定更不更動着

候瘡愈若金瘡誤犯生水瘡口作膿烘漸甚者
急以藥膏敷定三食久腫處已消更不作膿直
至瘡合若癰疽毒瘡初發綿覺焮腫赤熱急以
膏藥貼之一宿便消喉閉及咽喉腫痛吃腮並
用藥貼項下及腫處若竹木簪刺入肉者臨卧
貼之明日揭看其刺出在藥內若貼腫毒乾即
換之常令濕為妙惟金瘡水毒不可換恐傷瘡
口

治手臂疼痛冷重無力虎骨散

虎骨

二兩為末炒黃

芍藥

一兩為末

羚羊角屑

二兩為末

右件酒浸一宿焙乾杵為末每服二錢食前暖

酒調下

治上焦風熱毒瘡腫黃耆散并治發背熱毒

黃耆

二兩為末

防風

半兩為末

甘草

一兩為末

右為末如茶點服一錢

治風氣神白散

白芷

二兩為末

甘草

一兩為末

右剉成散子大慢火一處炒令深紫色勿令焦

里放地上出火毒杵為末每服一錢半水八分
一盞薑二片薑二箇同煎至六分通口服如傷
寒時疾去薑薑却入葱白三寸豉五十粒依前
服如人行五七里已來更服汗出為妙

治一切心腹刺痛應痛丸

乳香

一兩為末

五靈脂

一兩為末

沒藥

一兩為末

川烏頭

二兩為末

右為末剉糊為丸如桐子大每服熟水吞下二

十九

治赤白痢方

黃連

二兩為末

漢椒

一兩為末

右同炒令黃色去火毒為末以多年水梅肉丸

如菜豆大每服二十九粒湯下小兒加減用之

續添

一年老豐肥之人入暑胃熱腹內火燒遍身汗流

心中焦渴忽遇冰雪以漿盡力而飲承涼而睡

久而停滯秋來不瘡則痢

一年老豐肥之人不可騎馬恐有墜墮宜別置乘

座器具穩當無失

一老人目暗耳聾腎水衰而心火盛也若峻補之則腎水涸涸心火彌茂

一老人腎虛無力夜多小便腎主足腎水虛而火不下故足痿心火上乘肺而不入肺囊故夜多小便若峻補之則火益上行肺囊亦寒矣

一老人喘嗽火乘肺也若溫補之則甚峻補之則危

一老人臍臍結燥大便秘澀可煩服猪羊血或菜血臍灸皆能疎利

老人可常服杏湯杏仁板兒炒熟麻子芝麻作湯服之亦能通利

安老懷幼二卷

目錄

顏氏家訓暨諸賢模範九二十九條

溫公耆英會約併哲儒辭賦壽序九三十六條

太上玉軸六字氣訣一篇

食後將息 養性 安車 遊山具

行具二肩 居山約 歇床 醉床

觀雪養 蒲花褥 湯鎗 羊羔酒

雪花酒 茶縻酒 香炭 降真香

四品奇香 御密和香 試茶 香茶

栢湯方 三妙湯 乾荔枝湯 清韻湯

橙湯 桂花湯 醍醐湯 洞庭湯

木瓜 韻梅湯 熟水 地黃粥

胡麻粥 乳粥 山芋粥 栗粥

百合粥 麋角粥 枸杞子粥 馬眼粥

諸山蔬可作粥 紫不訖方 造山藥麴法

造乾地黃法 芭蕉脯 牛蒡脯 笋脯

蓮房脯 蘆薈餅 乾蕨菜 石芥菜

苦益菜 松藥 白芷 防風芽

水苔 瓜瓞 菜菔 藕蕒

豆藿 藿羹 荀鱖 種植

東園新開九徑 歐陽公示謝道人種花詩

芸香 茅香 枸杞 井菊

地黃 五加 青蘘 黃精

苜蓿 合歡 牛蒡 蓮子

藕 鷄頭 脫果 百部

菖蒲石 相鶴 養龜 收畫

置琴 延方士 延名衲 肅客

記事 二老相訪 儲書

女老書卷之一

相氏家訓曰夫所以讀書學問本欲開心明目利
於行耳未知養親者欲其觀古人之先意承顏怡
聲下氣不憚劬勞以致甘腴惕然慙懼起而行之
此經史傳記述孝子順孫嘉言懿行聯篇累牘不
勝其紀今畧舉數十條以激發夫人孝愛之心必
有目之心之而興起者

文公家禮曰凡子事父母婦事舅姑天欲明成走
滋淑櫛總具冠帶時與適父母舅姑之所省問父

母舅姑起于供湯藥婦具晨羞供具畢乃退各從
其事

按內則曰子事父母婦事舅姑初鳴通父母舅
姑之所及所下氣怡聲問衣寒煖疾痛苛癢而
敬接之出入則或先或後而敬扶持之進盥漱
者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾問所欲而
敬進之柔色以溫之饌醢酒醢羹菹菹菹黍
粱秫唯所欲棗栗飴蜜以甘之薑薑粉榆兔蕪
醢醢以滑之脂膏以膏之父母舅姑必嘗之而

后退曲禮曰凡為人子之禮冬溫而夏清昏定而晨省

老萊子少以孝行養親年七十父母俱存着五色斑斕之衣為嬰兒戲於親側言不辨老為親取食上堂足跌而偃因卧地為嬰兒啼或弄鵲於親側欲親之喜身老壽而雙親具慶亘古今鮮儼者也

東漢黃香事父竭力致養暑則扇床枕寒則以身溫席晉王延事親色養夏則扇枕席冬則以身

溫被隆冬盛寒體常無全衣而親極滋味二人

孝行甚相類也

陳太丘詣荀朗陵貧儉無僕役乃使元方將車季方持杖從後長文尚少載着車中既至荀使叔慈應門慈明行酒餘六龍下食文若亦小坐着膝前于時奏真人東行兩家父子會聚之樂至矣哉

宋文公聚星亭畫屏贊云侍歟陳子神徽鍾英文淵懿節道實心平願言懷人曰我同志故則陵

君荀季和氏連峰劉起潔澤潛滋愛而不見有

照其思薄言造之顧無僕役獨呼二兒駕子以

出青芻黃犢布幘柴車策紀前衛杖謀後趨所

造伊何高陽之里雖時荀君聞至而喜顧謂汝

靖性應于門七龍矯矯布席開尊請肅而前翁

拜其辱何悞斯晨得見清穆命與行觴旅饋次

陳獻酬交錯禮度情親載笑載言固非德義益

速乃猷以輔斯世髭髯兩推亦置膝前源深本

固莫出匪賢崇臺回極于以占天猶曰茲野德

星萃焉高山景行好德所同課忠責孝獨樂余

表

有客詣陳太丘談鋒甚敏太丘乃令元方季方

炊飲太丘問炊何遲留元方長跪曰君與客語

乃具竊聽炊忘着草今皆成糜太丘曰爾頗有

所識否二子長跪俱說言無遺失太丘曰如此

俱成糜自可何必飯邪

王長豫為人謹順事親盡色養之孝丞相見長豫

輒喜歎豫輒嘆長豫與丞相語常以謹密為端

與其親之喜愾則其子之為人可知矣悅字長

子休子敬子思

王義之牽諸子抱弱孫一味之甘割而分之以娛目前

義之生七子義之又有之

長顯之子子嗣最繁

子敬字子敬孫

俊周季遷哲除真州刺史其本州也男女六十九

人緣綿十餘里第宅相次姬媵之有子者分香

其中遷哲鳴笛導從往來其間縱酒歡譁子孫

參見或忘其年名披簿以審之漢陸賈無男常

乘安車駟馬從歌鼓瑟侍者十人約其子曰過

汝汝給人馬酒食其往來擊鮮之樂未得如選

哲之子孫衆多唐郭子儀諸孫數十人每群孫

問安不盡辨頷之而已此亦可以為盛也子儀

今二十四考

年八十五

唐河東節度使柳公綽在公卿間最有名有家法中

門東有小齋自非朝謁之日每平旦輒出至小

齋諸子仲郢皆束帶晨省於中門之北公綽決

私事接賓客與公權及群從弟再會食自旦至

暮不離小齋燭至則命一人子弟執經史躬讀

一過訖乃講議居官治家之法或論文或聽琴

至人定鍾然後歸寢諸子復昏定於中門之北

凡二十餘年未嘗一日變易公綽公權公諒兄

其從兄弟也公綽一子四孫子仲郢孫映

公綽子仲郢事公權如事公綽見公權未嘗不

束帶為京兆尹出遇公權於通衢必下馬端笏

立候公權過乃上馬公權暮歸必束帶迎候於

馬首公權屢以為言仲郢終不官違有小改公

綽妻韓氏相國體之曾孫家法嚴肅儉約為縉

紳家楷範常命粉苦參黃連熊膽和為丸賜諸

子每永夜習字舍之以資勤苦仲郢以禮律身

居家無事常端坐拱手出內齋亦肅容束帶三

為大鎮廐無良馬衣不薰香公退必讀書手不

釋卷事事皆可法也

柳玘曰崔山南昆弟子孫之盛鄉族罕比山南曾

祖王母長孫夫人年高無齒祖母唐夫人事故

守節旦柳縱斧梓於階下即升堂乳其姑長孫

夫人不粒食數年而康寧一日疾病長幼咸萃

宣言無以報新婦有子有孫皆得如新婦孝教

則崔之門安得不昌乎

比前代八龍碑字樣
碑為山南西道節度使

張蒼口中無齒飲乳壽百餘歲穢城有人年一

百四十歲不復能食殺飲曾孫婦乳

見南史張須蕭印傳

東漢姜詩事母至孝妻奉順充篤母好飲江水水

去舍六七里妻常泝流而汲姑嗜魚鱸又不能

獨食夫婦常力作供鱸呼鄰母共之舍側忽有

涌泉味如江水每旦輒出雙鯉魚常以供二母

之膳子婦同心竭力以致其養不易得也

節孝徐先生事母謹嚴非有大故未嘗去其側日

具太夫人所嗜或不獲即奔走闕市若有所亡

人或慕其純孝損直以售之親戚故人或致自

龜誠不至禮不恭弗受也所奉饌皆手自調味

太夫人飲食時先生率家人在左右為兒嬉或

謳歌以說之故太夫人雖在窮巷而奉養與富

貴家等無須吏不快也

先生名積字仲車自兒童不為嬉戲寡言笑莊

毅如成人事母太夫人篤孝朝夕冠帶問起居

一日僕頭晨省外氏諸婦大笑之翌日復如是

笑不已被笑旬日彌恪自是至老不廢童蒙訓

云先生因具公裳見貴官忽自思云見貴官尚

必用公裳豈有朝夕見母而不具公裳者乎遂

晨夕具公裳揖其母先生應舉貢禮部不忍一

日去其親遂徒步載母西入京師中進士第同

榜第一人許安世率同年數十人拜太夫人於

堂上仍以百千為太夫人壽數往返先生終拒

之先生年過壯未娶或勉之答曰娶非其人必

為母病子非敢忘嗣固有待也初從安定胡先

生學潛心力行不復仕進其學以至誠為本積

思六經而喜為文詞老而不衰政和六年謚節

孝愛七

任元受事母盡孝母老多疾病未嘗離左右元受

自言老母有疾其得疾之由或以飲食或以燥

濕或以語話稍多或以憂喜稍過蓋言皆朝暮候之無毫髮不盡五臟六腑中事皆洞見曲折不待切脉而後知故用藥必效雖名醫不逮也張魏公作都督欲辟之入幙元受力辭曰盡言方養親使得一神丹可以長年必持以遺母不以獻公也况能舍母而與公軍事耶魏公太息而許之

程明道先生曰事親者不可以不知醫

陸放翁曰先公守南都時有直秘閣張山者開封

書三

八

人判留司御史臺事年八十餘矣視聽步履飲食悉如少壯或問何術至此曰吾無他術但頃嘗遇異人授一藥服之數十年未嘗一日輟耳其法用香附子薑黃甘草三物同末之沸湯點晨起空心服三四錢名降氣湯以為人所以多疾病者多由氣不降故下虛而上實此藥能導之使歸下爾鄉人有效之者或致致虛弱蓋香附子薑黃瀉氣太甚而然不知山何以獨能取效如此意其別有他術特託此藥以罔人及渡

江見一武官士昇者亦七十餘矣康強無病問何所服藥則與山正同而後知人之於藥各有所宜不可強也

祖光祿少孤貧性至孝常自為母炊爨作食王平

北聞其佳名以兩婢餉之因取為中郎補轉

清言溫嶠薦為光祿大夫又字叔元為平北將軍

吳隱之事母孝謹與太常韓康伯鄰居康伯母賢

明婦人也謂康伯曰汝若居銓衡當舉如此輩

人及康伯為吏部隱之遂階清級古人以孝行

書三

九

取人賢明之婦亦知此義

呂侍講希哲言孝子事親須事事躬親不可委之使

令也嘗說穀梁言天子親耕以供粢盛王后親

蠶以供祭服國非無良農工女也以為人之所

盡事其祖彌不若以已所自親者也此說最盡

事親之道又說為人子者聽於無聲視於無形

未嘗頃刻離親也事親如天頃刻離親則有時

而違天天不可得而違也

呂侍講字原明中國正獻公之長子正獻公

居家簡重寡默不以事物經心而申國夫人性
嚴有法度雖甚愛公然教公事事循蹈規矩甫
十歲祁寒著雨侍立終日不命之坐不敢坐也
日必冠帶以見長者平居雖甚熱在父母長者
之側不得去巾襪縛袴衣服唯謹行步出入無
得入茶肆酒肆市井里巷之語鄭衛之音未嘗
一經於耳不正之書非禮之色未嘗一接於目
內則正獻公與申國夫人教訓之嚴外則焦先
生千之字伯強化導之篤故公德器成就大異

合書

十

衆人公嘗言人生內無嚴父兄外無嚴師友而
能有成者少矣

司馬溫公曰凡諸卑幼事無大小毋得專行必咨
稟於家長又曰凡子受父母之命必籍記而佩
之時省而速行之事畢則反命焉或所命有所
不可行者則和色柔聲具是非利害而白之待
父母之許然後改之若不許苟於事無大害者
亦當曲從若以父母之命為非而直行已志雖
所執皆是猶為不順之子況未必是乎

讀之每句應諾閱畢再拜得父之書猶拜跪而
讀受父之命具敬佩而行當何如耶

包孝肅字希仁始及第以親老侍養不仕官且
十年人稱其孝

范忠宣字充夫再調官皆不赴文正公遠之公
曰純仁豈可重於祿食而輕去父母邪雖近亦
不能朝夕在側遂終養焉

二公以事親為重以仕進為輕可法也

合書

十

王逢原思歸賦云吾父八十母髮亦素尚爾為吏
負焉遐路教教晨鳥其子及哺我豈不如替其
誰素惟秋之氣慘慄感人日興愁思側睇江濱
憶為童子當此凜辰百果始就進進其珍時則
有紫菱長腰紅茨圓實牛心綠蒂之柿獨包黃
膚之栗青芋連區烏桺五出鴨脚受彩芋微核
木瓜饅母而成質青乳之梨頽壺之摘蜂蛹淹
醃檠檀漬蜜膳羞則有鵝鵲野鴈澤鳬鳴鵲溫
江之膏鱗寒水之鮮鱗胃以紫薑白以茱萸

浮黃菊如鴈青北山之松暈掃門前之桐
柳墮僕不諱圖書左右或靜默以終日或歡言
以對友信吾親之所樂安閑里其歲久切切余
懷欲辭印綬固非效淵明之福心恥折腰於五
斗

潘岳閒居賦云太夫人在堂覽止足之分庶浮雲
之志築室種木逍遙自得池沼足以漁釣春稅
足以代耕灌園鬻蔬供朝夕之膳牧羊酤醪俟
伏臘之資涼秋暑退熙春寒往微雨新晴六合

合書

年

新婦太夫人御板輿升輕軒遠覽王畿近周家
閣席長筵列子孫柳垂陰車結軌或宴于林或
禱于泥昆弟斑白兒童稚齒稱萬壽以敵觴或
一懼而一喜壽觴舉慈顏和浮杯樂飲絲竹駢
羅頓足起舞抗音高歌人生安樂孰知其他
王潘二賦仕宦而志於事親者良可詠味

黃山谷手書云王荅稚川元豐初調官京師寓家
鼎州親年九十餘矣尚問貴人家歌舞醉歸書
其旅邸壁間云鴈外無書為客久張邊有夢到

家多畫堂玉佩縈雲纓不及桃源欸乃歌余訪
稚川於邸中而和之詩曰五更歸夢常苦短一
寸客愁無奈多慈母每占烏鵲喜家人應賦
廢歌身如病鶴翅翎短心似亂絲頭緒多此曲
朱門歌不得湖南湖北竹枝歌王稚川既得官
都下有所吟忘歸余戲作林夫人欸乃歌二章
與之竹枝歌本出三巴其流在湖湘耳欸乃湖
南歌也花上盈盈人不歸棹下纂纂實已垂
臘雪在時聽馬嘶長安城中花片飛從師學道魚

合書

年

千里蓋世成功泰一炊日月倚門人不見看盡
林鳥返哺兒四詩之作可謂盡朋友責善之義
山谷至孝奉母安康君至為親滌虎子未嘗頃
刻不供子職故錫類之意力勸稚川以歸侍云
明道伊川二先生之母夫人侯氏事舅姑以孝謹
稱與太中公稱相待如賓客公賴其內助禮敬
尤至而夫人謙順自牧雖小事未嘗專必稟而
後行

伊川曰先夫人侯氏七八歲誦古詩曰女子不

夜出夜出秉明燭自是日暮則不復出房闥既長好文而不為辭章見世之婦女以文章筆札傳於人者則深以為非

姊誠齋夫人羅氏年七十餘每寒月黎明即起詣厨躬作粥一釜偏享奴婢然後使之服役其子東山先生故曰天寒何自苦如此夫人曰奴婢亦人子也清晨寒冷須使其腹中略有火氣乃堪服役耳東山曰夫人若凡賤事何例行而逆施乎夫人曰我自樂此不知寒也汝為此言必

合書二

古

不能如吾矣東山守其夫人於郡圃種紵躬緝績以為衣時年八十餘矣東山月俸分以奉母夫人忽小疾既愈出所積券曰此長物也令宜悉以謝醫則吾無事矣平居首飾止於銀象止於紬絹生四子三女悉自乳曰飢人之子以哺吾子是誠何心哉其家米稼土階如田舍翁三世無增飾史良叔守廬陵官滿來訪入其門外其堂目之所見無非可敬可仰可師可法者所得多矣因命畫工圖之而去誠齋東山清介

絕俗固皆得之天姿而婦道母儀所助者亦多矣左傳文伯之母老而猶績文伯曰以歡之家而主績績乎母曰王后親織玄紵公侯之夫人加以絃紵卿之內子為大帶命婦成祭服列士之妻加之以朝服自庶士以下皆衣其夫社而賦事烝而獻功男女勗績德則辟古之制也羅鶴林經大云觀誠齋夫人乃知古今未嘗無列女不嘗無賢母

合書三

主

竊漢胡氏宗系記序云吾家自上世以來事親從兄多以孝悌聞曾祖十四公有二兄雖也吳居每事必先咨長兄次咨仲二兄不取而後取二兄許行而後行曾祖妣余太君感足疾十年不離床席飲食起居梳沐盥漱便圜皆湏人抱負扶掖子孫婦女左右奉事惟懼不如其意祖妣章太君妣余氏叔祖妣吳令人更五直侍衣不解帶目不交睫朝夕匪懈余太君常慰勞之曰吾無以報汝等天當以祐汝等吳令人果膺福慶是生定公登巍科歷顯仕其立朝正色直言

無所假借所以納忠君父之意雖死不急憲昔
侍文定居漳濱十五年見其躬事二親可謂盡
之矣喬由白屋二親安樂享祿養者二十年皆
生受官邑之封此人間所稀有令人慈母也通
詩書達義理愉顏柔色以事之不足以為難中
大公嚴毅豪勇不可少犯文定所以事之者未
始徇其意每每以正道開說中大久而益親信
之有晚生兒女三人初以為慮文定視之如一
嫁幼妹與已女裝遣奩具無少異中大臨終以

合書三

未

二荆授文定曰二弟若不才為汝之羞可嚴教
之文定泣對曰誓不忍撻之其後循循然誘以
學術迪以道義立之婚宦皆克有成立至使一
家蒸蒸雖婦女兒童咸知恭順之道實由文定
躬行之化所及也孔子曰人之行莫大於孝有
子曰孝弟也者其為人之本歟後代子孫當務
勉行孝弟以無忝所生庶幾門風益振家聲不
墜豈不善哉

仁仲至知州二子長致堂寅字明仲仲五峯宏時
仲字寧符字致堂寅字明仲仲五峯宏時

元魏揚播家世純厚並教養讓昆季相事有如父

子椿津恭謙兄弟旦則聚於聽堂終日相對未
嘗入內有一美味不食廳堂間往往悵悵
臨陣為寢息之所時就休偃還共談笑椿年老
曾他處醉歸津扶持還至假寢間前承候安否
椿津年過六十並登台鼎而津常旦暮奉伺子
姪雖列階下椿不命坐津不敢坐椿每進出或
日斜不至津不先飯椿還然後共食食則津親
授匙飭味皆先嘗椿命食然後食津為辟州移
在京宅每有四時嘉味輒因使次附之若歲末
寄不先入口一家之內男女百口縱服同贊庭
無間言

無間言 椿字延慶事元魏揚播家世純厚並教養讓昆季相事有如父子

事明太極

椿嘗戒子孫云吾兄弟在家必同盤而食若有
近行不至必待其還亦有過中不食忍飢相待
吾兄弟八人今存者三不思別食也聞汝兄弟
時有別齋獨食者又不如吾一世也又云仕親

以來高祖而下七郡守三十二刺史內外顯仕
少比

司馬溫公與其兄伯康友愛尤篤伯康年將八十
公奉之如嚴父保之如嬰兒每食少頃則問曰
得無饑乎天少冷則拊其背曰衣得無薄乎
范忠宣知襄城縣承事伯兄照管湯藥飲食居
處衣服必躬必親如孝子之事嚴父事親從兄
仁義之實愛敬之理與生俱生仁之至義之盡
也

溫公耆英真率會約

序齒不序官

為具務簡素

朝夕食各不過五味

菜果脯醢之類各不過三十器

酒巡無筭深淺自斟主人不勸客亦不辭

逐巡無下酒時作菜羹不禁

召客共用一簡客注可否於字下不別作簡或

因事分簡者聽會日早赴不待促

遠約者每事罰一巨觥

公自序其詩云作真率會伯康與君從七十

八歲安之七十七歲正叔七十四歲不疑七

十三歲叔達七十歲光六十五歲合五百一

十歲口號成詩用安之前韻伯康溫公之兄

七人五百有餘歲同醉花前今古稀走馬聞鷄

非我事紆衣絲髮且相輝

經春無事連翩醉彼此往來能幾家切莫辭斟

十分酒儘使他笑滿頭花

南陽劉麟之為相冲長史冲嘗至麟之家麟之方

條桑謂冲使君既枉駕宜先詣家君冲詣其父

父命乃還拂短褐與冲言父使麟之自持濁酒

茹菜供賓冲勸人代之父辭曰若使官人則非

野人意也

德星之聚慈明行酒六龍下食宋胡侍講

治家甚嚴閨門整肅尤謹內外之分諸子常

侍立左右賓至則供億茶湯待各不用使令

而以子弟禮度姻雅杜子美詩亦有問答未及已兒女羅酒漿之句

橫渠先生曰若親之故舊所喜當極力招致賓客之奉當極力營辦務以悅親不可計家之有無然又須使之不知其勉強勞苦苟使見其為而不易則亦不安矣

唐張士嚴父病藥須鯉魚冬月冰合有獺銜魚至前得以供父父遂愈宋查道字湛然歙州人母病思鯉魚羹方冬苦寒道泣祝於河鑿冰脫巾

書三

十

以取之得鯉尺許以饋母疾尋愈孝感之事無世無之孟宗得笋之事尤奇陳道之鑑底飯蔡順之異器樵尤於患難中得力真西山參政性篤孝為母吳夫人祈福詞云天下之樂莫如以祿之及親人子之情尤欲其親之難老母疾愈熙謝詞云莫親乎母實為命以相依蓋高者天惟盡誠而可動顏損臣身之筭以延母氏之齡鑑董之燼未銷農藥之功已應孝行之簡在帝心若此為人子者可不敬諸

應璩古樂府云昔有行人陌上見三叟年各百

餘歲相與鋤禾莠住車間三叟何以得此壽上

史前置辭量腹節所受中史前置辭室內姬龐

醜下叟前置辭暮卧不覆首要哉三叟言所以

能長父晦翁語錄或云俗語夜飯減一口活得

九十九先生曰此出古樂府三叟詩

唐柳公度年八十有強力人問其術對曰吾平生

未嘗以脾胃熟生物暖冷物不以元氣佐喜怒

耳此下十數條述老人所以觀自養者

書三

五

富鄭公年八十書座右云守口如瓶防意如城

張廷老名珙年七十餘步趨拜起健甚自言夙興

必拜數十老人氣血多滯拜則支體屈伸氣血

流暢可終身無手足之疾

唐仲俊年八十五六極康寧自言少時因讀千字

文有所悟謂心動神疲四字也平生遇事未嘗

動心故老而不衰

太醫孫君昉字景初自號四休居士山谷問其說

四休笑曰麤茶淡飯飽即休補破遮寒暖即休

三平二滿過即休不貪不妬老即休山谷曰此
安樂法也夫少欲者不伐之家也知足者極樂
之國也四休家有三畝園花木鬱鬱客來煮茗
談上都貴游人間可喜事或茗寒酒冷賓主皆
忘其居與余相望暇則步草徑相尋故作小詩
遺家僮歌之以侑酒茗詩曰太醫診得人間病
安樂延年萬事休又曰無求不着者人面有酒
可以留人嬉欲知四休安樂法聽取山谷老人
詩

合書三

子

山谷四印云我從養生之四印君家所有更贈君
百戰百勝不如一忍萬言萬當不如一默無可
簡擇眼界平不藏秋毫心地直我肱三折得此
醫自覺兩踵生光輝團蒲日靜鳥吟時鑑薰一
炷試觀之四休四印老少富貧普同受用
東坡云舊說南陽有菊水水甘而芳居民三十餘
家飲其水皆壽或至百二三十歲蜀青城山老
人村有見五世孫者道極嶮遠生不識監醢而
溪中多枸杞根如龍蛇飲其水故壽

道人中往往多有耆壽者陸放翁云青城山上
道人此人也巢居食松朮年九十矣有謁之者
但粲然一笑有所請問則託言病瞶一語不肯
答予嘗見之於丈人觀道院忽自語養生曰為
國家致太平與長生不死皆非常人所能且當
守國使不亂以待奇才之出衛生使不夭以須
異人之至不亂不夭皆不待異術惟謹而已予
大喜從而叩之則已復言瞶矣

合書十

子

入平生未嘗有疾居會稽舜山天將寒必增屋
瓦補牆壁使極完固下帷設簾多儲薪炭杜門
終日及春乃出對客莊敬不肯多語予每訪之
殊無它語一日默作意欲叩其所待終入門即
引入卧內燒香具道其遇師本末若先知者亦
異矣夫
盱江有日峰丘道人號河南子年九十餘皓髮朱
顏冬夏一單衣雨雪不張蓋叔祖西巖守丞招
之來泰寧留十餘載攜一道簾繫一小牌子上

書詩四句云老選因性慢無病為心寬紅杏難
禁雨青松耐歲寒常跣足賣卜於市得錢則散
與小兒兒爭拾之黃玉彪與二三友扣問功名
皆笑而不言獨指玉彪云子壽高嘗問養生之
術但指小牌子上詩四句眠焉今歷五十餘年
信知其言之有味也

太乙真人七禁文其六曰義飲食養胃氣彭鶴林
和云夫脾為臟胃為腑脾胃二氣互相表裏胃
為水穀之海主受水穀脾為中夾磨而消之化

為血氣以滋養一身灌溉五臟故修身之事不
可以不美其飲食所謂美者非水陸畢備異品
珍羞之謂也要在乎生冷勿食塵硬勿食勿強
食勿強飲先飢而食食不過飽先渴而飲飲不
過多以至孔氏所謂食饒而餒魚饒而敗不
食等語凡此數端皆損胃氣非惟致疾亦乃傷
生欲希長年此宜深戒而亦養老奉親與觀順
自養者之所當知也

黃山谷云爛蒸同州羔灌以杏酪食之以延不以

筋南部機心麪作毘芽溫淘糝以裹邑抹猪炊
共咸香稍薦以蒸子鵝共與庖人所松江鱸鱸
繼以廬山康王谷水魚曾坑闢品少焉解衣仰
卧使人誦東坡赤壁前後賦亦足以一笑也此
雖山谷之寓言然想像其食味之美安得聚之
以奉老人之旨甘

東坡老饕賦云庖丁鼓刀易牙烹熬水欲新而釜
欲潔火惡陳而薪惡勞九蒸暴而日燥百上下
而湯鑿并項上之一嚙嚼霜前之兩螯爛櫻珠

之煎蜜瀟杏酪之蒸羔蛤半熟以含酒蟹微生
而帶糟蓋聚物之天美以養吾之老饕婉彼姬
姜顏如李桃彈湘妃之王瑟鼓帝子之雲璈命
仙人之萼綠華舞古曲之鬱輪袍引南海之玻
璃酌涼州之蒲萄顧先生之耆壽分餘瀝於兩
髦候紅潮於玉頰驚暖響於檀槽忽繁珠之妙
曲抽獨繭之長綵閱手倦而少休疑吻燥而當
膏倒一缸之雪乳列百粒之瓊艘各眼灑於秋
水咸骨碎於春醪美人告去已而雲散先生方

兀然而禪逃響松風於蟹眼浮雪花於兔毫先
生一笑而起海濶而天高

茗溪漁隱曰東坡於飲食作詩賦以寓之往往皆
臻其妙如老饕賦豆粥詩是也豆粥詩云江頭
千頃雪色蘆茅簷出沒晨煙孤山雄春杭光似
玉沙瓶煮豆軟如酥我老此身無着處讀書來
問東家住卧聽鷄鳴粥熟時蓬頭曳履君家去
又寒具詩云纖手搓來玉數尋碧油煎出嫩黃
深夜來春睡無輕重壓偏佳人纏臂金寒具乃

金書

二十六

捻頭也出劉禹錫佳話過子忽出新意以山芋
作玉糝羹色味皆奇絕天酥陀則不可知人間
決無此味也詩云香似龍涎仍馥白味如牛乳
更全清莫將北海金釐鱠輕比東坡玉糝羹誠
齋菜羹詩亦云雲子香抄玉色鮮菜羹新煮翠
茸纖人間膾炙無此味天上酥陀恐爾甜

宋太宗命蘇易簡講文中子有楊素遣子食經羹
蒸令換之說上因問食品何物最珍對曰物無
定味適口者珍臣止知薑汁為美臣憶一夕寒

甚雖痛飲夜半吻燥中庭月明殘雪中獲一
薑孟連咀數根臣此時自謂上界仙厨驚肺腑
胎胎恐不及屢欲作水壺先生傳紀其事因循
未果也上笑而然之

唐劉晏五鼓入朝時寒中路見賣蒸胡虀熱
氣騰輝使人買以袍袖包裙褐底啗謂同列
曰美不可言此亦物無定味適口者珍之意
也

倪正父思云魯直作食時五觀其言深切可謂知

金書

二十七

慙愧者矣余嘗入一佛寺見僧持戒者每食先
淡喫三口第一以知飯之正味人食多以五味
雜之未有知正味者若淡食則本自甘美初不
假外味也第二思衣食之從來第三思農夫之
艱苦此則五觀中已備其義每食用此為法極
為簡易且先喫三口白飯已過半矣後所食者
雖無羹蔬亦自可了慶貧之道也又云造物勞
我以生逸我以老少年不勤是不知勞也年老
奔馳是不知逸也天命我逸而我自勞可乎又

曰吾鄉有前輩三人其一施大任參政享年九十有四其一李季叔參政享年八十有一其一沈持要詹事今年已八十有二耳目聰明步履輕捷夜書細字三賢難老皆以絕欲早故効驗彰彰如此然則欲求長年者可不以為法乎

倪正父經祖堂雜誌述五事云靜坐第一觀書第二看山水花木第三與良朋講論第四教子弟第五述齊齋十樂云讀義理書學法帖字澄心靜坐益友清談小酌半醺洗花種竹聽琴翫鶴

焚香煎茶登城觀山寓意奕棋雖有他樂吾不易矣

劉後村云外舅林實章晚歲奉祠舊廬略繕葺小圃粗種藝體中佳時幅中短褐野眺露坐悠然忘歸二子公遇公選朝夕侍公跬步不離家庭謹肄偶有會意公輒喜曰天下至樂不出閨門之內公遇兄弟安隱約習苦淡者年一燈笑然語公達旦至言妙義不緣師授亦非言語文字可傳公遇號寒齋二子同字子真合字子常

寸寒齋年父之規子常事兄如父家政聽焉子真亦極愛愛連床之語至曙一膳之珍必剖制同字謹臨財同廉讓讀書同義趣作文同機

訓世傳一心百年如一日父子兄弟自為師友世未有如林氏家庭講肄之樂者也

林離大經云余家深山中年春夏之交蒼蘚盈階落花滿徑門無剽啄松影參差禽聲上下午睡初足按汲山泉拾松枝煮茗啜之隨意讀周易國風左氏傳雅騷太史公書及陶杜詩韓

蘇文數篇從容步山徑撫松竹與麝共偃息於長林豐草間坐弄流泉漱齒濯足既歸竹窓下山妻稚子作筍蕨供麥飯欣然一飽弄筆窓間隨大小作數十字展所藏法帖墨蹟盡卷縱觀之興到則吟小詩或草玉露一兩段再烹茗茗一盃出步溪邊邂逅園翁溪友問桑麻說抗稻量時校雨探節數時相與劇談一餉歸而倚杖柴門之下則夕陽在山紫綠萬狀變幻頃刻說可人日半竹笛聲兩兩來歸而月印前溪矣

唐子詩云山靜似太古日長如小年玩味此句最妙然識其妙者蓋少彼牽黃臂蒼馳獵於壑利之場者但見衮衣馬頭塵慙慙駒隙影耳人能真知此妙則東坡所謂無事以靜坐一日是兩日若活七十年便是百四十所得不已多乎易曰觀頤觀其自養也康節詩云老年軀體素溫存安樂窩中別有春盡道山翁拙於用也能康濟自家身此自養之旨也善自養如鶴林斯可以佚老矣

合書

三

邵康節先生年老逢春吟云年老逢春雨乍晴雨晴况復近清明天低宮殿初長日風暖園林未轉鶯花似錦時高閣望草如茵處小車行東君見賜何多也又復人間久太平首尾吟云堯夫非是愛吟詩詩是堯夫喜老時明着衣冠為士子高談仁義作男兒敢於世上明開眼肯向人前浪皺眉六十七年無事客堯夫非是愛吟詩凡十首惜芳菲吟云綠楊陰裏尋芳徧紅杏香中爭醉歸末聯云芳樽有酒慈親樂猶得堪

合書

三

前戲綠衣記四擊壤集一編老人怡神悅目時可吟玩無名公傳自叙尤詳性喜飲酒命之曰大和湯所飲不多不喜過醉其詩曰飲未微酡口先吟哦吟哦不足遂及浩歌所寢之室謂之安樂窩冬煖夏涼遇有懽思則就枕其詩曰墻高于肩室大如斗布被暖餘藜羹飽後氣吐宵中充塞宇宙聞人言人之善就而和之又從而喜之其詩曰樂見善人樂聞善事樂道善言樂行善意聞人之善如佩蘭蕙晚有二子教之以仁義授之以六經家素業儒口未嘗不道儒言身未嘗不道儒行其詩曰羲軒之書未嘗去手堯舜之談未嘗離口當中和天同樂易友吟自在詩飲歡喜酒百年升平不為不偶七十康強不為不壽老境從容善於自養孰有如康節翁者乎

呂東萊伯恭橫山吳氏佚老庵記云橫山吳君珉治側室之西偏榜以佚老休工歸役斤斧休聲輯杖立于前聞竊於階者曰基隴繩畦低粟京

稼籌算粗鹽菜貨四臻此吾主人翁所以佚其
老也少進至於門間行語於塗者曰豐林遠宇
樽俎清嘉鷗鷺不驚風月相答此吾豪長者所
以佚其老也又進至於郊間聚語於塾者曰培
嗣以學既樹既敷秩其老也他日吳君為予道
之予曰夫三者之言何如吳君曰階得吾粕塗
得吾滴塾得吾醇出浸遠吾名吾室義其究於
此乎予曰未既也畏嶠登與身閒心慄厭市築
壙日靜耳喧君雅善自伏踰闌以往肩頰腹枵

卷二

三十二

者踵相接歲或不升疇瘠困憊呻吟交於大達
專一室之佚樂乎哉君里中望也蓋勸族黨惕
勞振之已責紆逋同其美於是鄉則盡橫山表
裏皆吾佚老庵也其視尺椽半席廣狹何若君
謝曰厚矣子之拓吾境也顧童奴陷其說於壁
間以勸此記為勉耆美力行好事歛歲濟賑寔
積陰功必有紫府真人延之於上坐者
辛稼軒詞壽趙茂中即中時以置蕪濟倉里中賑
濟除直秘閣沁園春云

甲子相馬多首曾疑綠髮老人看長身王立
鶴般風度方頓悟虎樣精神文爛卿雲詩
凌絕調筆終駸駸更右渾渾餘事羨仙都夢
覺金闕名存門前父老所忻換奎閣新褒詔
語溫記他年帷幄須依日月只今劍履快上
星辰人道陰功天教多壽看到紹蟬七葉孫
君家裏是幾枝丹桂幾樹靈椿

卷二

三十三

又呈茂中前章記廣濟倉事滿江紅云我對君
侯長作見兩眉陰德更長夢玉皇金闕姓名
仙籍舊歲炊煙渾欲斷被公扶起千人活算
青中除却五車書都無物溪左右山南北花
遠近雲朝夕看風流被履蒼髯如戟種柳已
成陶令宅散花更滿維摩室勸人間且住五
千年如金石

趙龍圖白詠念奴嬌云

吾今老矣好歸來了取青山活計甲子一同
餘半紀諸盡人間物理婚嫁隨緣田園粗給
知足生慚愧心由安逸自然綽有餘地還是

初度來臨舊中野
服不咸貂蟬貴門外風波
煙浪惡我已收心無累第勸兄
醉兒歌女舞
樂得醺醺醉滿堂一笑大家百二十歲

年稼軒壽人七十感皇恩云

七十古來稀人人都道不是陰功怎生到松
婆雖瘦耐雲寒霜冷看君霜鬢底青青好樓
雪初晴庭閣嬉笑一醉何妨玉壺倒從今康
健不用靈丹仙草更有一百歲人難老
又為婦母王氏慶七十感皇恩云

七十古來稀未為稀有須是榮華更長久滿
床靴笏羅列兒孫新婦精神渾似箇西王母
遙想畫堂兩行紅綉妙舞清歌擁前後大男
小女逐箇出來為壽一箇一百歲一盃酒

最高樓詩洪內翰七十云

金閨老眉壽正如川七十且華筵樂天詩句
香山裏杜陵酒債曲江邊問何如歌窈窕舞
嬋娟更十歲太公方出將又十歲武公方入
留盛事看明年直須腰下添金印莫教頭

上欠貂蟬的人間長富貴地行仙

鵲橋仙為人慶八十席間戲作云

朱顏暈酒方瞳點漆閑傍松邊荷杖不須更
展畫圖看自是箇壽星模樣今朝盛事一杯
深勸更把新詞齊唱人間八十景風流長貼
在兒兒額上

又為岳母慶八十云

八旬慶會人間盛事齊勸一杯春釀胭脂小
字點眉間猶記得舊時官樣綵衣更看功名

富貴直過太公以上大家着意記新詞遇着
箇十年便唱

品令族姑慶八十來索俳語

更休說便是箇住世觀音菩薩甚令年容貌
八十歲見底道才十八莫獻壽星香燭莫祝
靈龜椿鶴只消得把筆輕輕去十字上添一
撇

張于湖

于湖詩帥潭州日壽黃倅詠母淑人木蘭花云
慈闈生日見說今年年九月歲綠盈門六底

兒七箇孫人間盛事只這一般難得似願我雙親都以君家太淑人

曾祖參政文靖公壽伯母太夫人上官氏木蘭花詞云吾家二老前有高平生於卯若到今辰詎止榮華九十齡共惟伯母九十新年還又五五相承好看重逢乙巳春上官氏朋溪寧國府判簿樸庵編修戶部提刑廳之母高平郡夫人江氏文靖公之祖母皆年過九十吾家二壽母也

又有鷓鴣天二闕云

九十吾家兩壽星今夫人賽昔夫人百年轉眼新開衆十月循環小有春十月二十日生生日到轉精神目光如鏡步如雲年年長侍華堂宴子子孫孫孫又孫

壽母開年九十三佳辰就養大江南縱屏晃耀新寧國繡斧欄斑老樸庵傾玉笋擘黃柑兩孫垂綬碧於藍便當我頌崆峒頂留與千年作美談

文靖公在朝日壽母昌國葉夫人詞云

帝里風光別是天花如錦繡柳如煙還逢令節春三二又慶慈闈歲八千壽華列長筵子孫何以詠高年各裒千首西湖什一度生朝獻一篇

任靜江經略安撫日元夕奉親出郊詞云

綵結輕車五馬隨傾城爭出看花枝笙歌十里巖前去燈火千門月下歸蓮炬引老萊衣蛾眉無數歡簾窺誰知萬里逢燈夕却勝尋常三五

時

壽母詞云

滿二望三時仲春春景方明媚又見蟠桃結子來王母初筵啓無數桂林山不盡離江水恁入今朝祝壽杯永保千千歲

樸庵編修戶部知平江府日壽母上官太夫人感皇恩云覓得箇州兒稍供綠戲多謝天公為排備一輪明醞作清蔗滋味傾入壽杯裏何妨醉我有餘書生母年萬記八十三那裏便和兒

算恰一百四十地這九千餘歲長隨侍

鵲鳴天云天遣豐年祝母齡人人安業即安親
探支十日新陽福來獻千秋古佛身兒捧壽婦
傾瓶更逢進上有嘉賓紫駟出釜雙臺饒玉節
升堂兩使星

家居日鵲鳴天壽詞云諸佛林中女壽星千祥百
福產心兩喜歸王母初生地滿勸麻姑不老泉
吾慶佛半千員一年一佛護庇萱數過九十從
頭數四百餘零一十年序云十月二十一日吉

合書二 三十九

母太淑人生日也今年九十仰荷乾坤垂佑賜
以福壽康寧願益加景獲令其耳目聰明手足
便順五臟六腑和氣流通常獲平安之慶子孫
賢順寸祿足以供甘旨也黃玉憶祖母張氏壽
八十有三乃翁怡軒居士賦詞有八十加三迎
九十還似嬰童之句其居與樸菴對門樸菴聞
之喜曰吾仁鄰亦有壽母如此即怡軒慶母年
開九表詩云又見梅粧碧玉校弟兄相聚看萊
衣西方佛慶明朝誕南極星騰壽日輝百歲阿

彌開九表兩房孫子戲重闌年年得侍高堂醉
坐對天花散漫那

劉隨如 壽趙路分八十感皇恩云八十最風流
那誰不喜况是精神可人意太公當日未必榮
華如此兒孫列兩行萊衣戲好景良辰滿堂和
氣唱箇新詞管教羨顏同彭祖尚有八百來歲
十分才一分那裏登此詞亦用那裏登三字
程滄洲壽後溪劉侍郎云朱顏白髮炯雙瞳一念
平生造物通內閣圖書真學士西園几杖老仙

合書三 三十九

翁永公金母人開現桂子祠孫壽籍同遙想絲
衣圖四世後溪無日不春風姚狀元賦呂氏宜
老堂云此堂清不著珠璣只要雙親佚老宜春
酒儘堪眉壽介珽衣長似乳時嬉婦垂鶴髮陪
姑繡翁撚銀髯課子詩飽飲菊花潭上水雞窠
猶自弄孫枝二詩貴華富艷人間至樂孰加焉
李守為 壽百壽 壽至 壽至 壽至 壽至 壽至
其相 壽百 壽百 壽百 壽百 壽百
下規 壽百 壽百 壽百 壽百 壽百
其相 壽百 壽百 壽百 壽百 壽百

唐之老圖白樂天詩序云胡累年八十九吉收平
八十八劉真年八十七鄭康年八十五盧真年
八十三張準年七十七居易年七十七於東都
履道坊合尚齒之會七老相顧既醉且歡靜而
思之此會希有因各賦七言韻詩一章以記之
樂天詩云

七人五百八十四拖紫紵朱紫白髮叢裏無
金莫嗟嘆樽中有酒且歡娛吟成六韻神還
旺飲到三盃氣尚龜龜我狂歌教婢拍婆娑

醉舞遺孫扶天年高邁二疎傳人數多於四

皓圖除却三山五天竺人間此會且應無

或傳諸好事者有二老年貌絕倫同歸故鄉亦

來斯會洛中遺老李元英年一百三十六禪僧

如滿歸洛年九十五皆年之尤高者也續命書

姓名年齒寓其形貌附于圖右樂天贈之詩云

雪作鬢眉雲作衣遠來華表暮雙歸當時一

鶴尤希有何況今逢兩令威

不洛陽耆英會文粹公年七十七留守西都富鄭

公年七十九敘政在里第二公猶亮三朝為國
元老典席司封故言等於韓公之第買酒相樂
賓主十有二人圖于妙覺僧舍司馬溫公年未
七十亦與焉溫公命溫公序其事諸公皆有詩
溫公詩云

洛下衣冠愛惜春相從小飲任天真隨家可
有自可樂為具更微難終貧不待珎羞方下
第只將佳景便娛賓庾公此興知非淺蔡肇
終難作主人

溫公請老致仕後再起平章軍國重事制書云

呂望惟賢起佐文王之治周公已老留為孺子

之師繼而請老復以太師致仕年九十二壽獨

高於諸公云

太上玉軸六字氣訣

黃庭山人
即應傳述

道藏有玉軸經言五臟六腑之氣因五味薰灼不
和又六欲七情積久生疾內傷臟腑外攻九竅以
至百骸受病輕則病癰甚則盲廢又重則喪亡故
太上憫之以六字氣訣治五臟六腑之病其法以

野而自瀉出臟腑之毒氣以及而自採天地之清
氣以補之當日小驗旬日大驗年後萬病不生延
年益算衛生之寶非人多傳呼有六曰呵呼四噓
嘻吹也吸則一而已呼有六者以呵字治心氣以
呼字治脾氣以四字治肺氣以噓字治肝氣以嘻
字治膽氣以吹字治腎氣此六字氣訣分主五臟
六腑也凡天地之氣自子至巳為六陽時自午至
亥為六陰時如陽時則對東方勿盡閉窓戶然忌
風入乃解帶正坐扣齒三十六以定神先攪口中

合書三

四十二

濁津漱鍊三百下候口中成清水即低頭向左
而嚥之以意送下候汨汨至腹間即低頭開口先
念呵字以吐心中毒氣念時耳不得聞呵字聲聞
即氣麓及損心氣也念畢仰頭閉口以鼻徐徐吸
天地之清氣以補心氣吸時耳亦不得聞吸聲聞
即氣麓亦損心氣也但可時令短吸時令長即吐
少納多也吸訖即又低頭念呵字耳復不得聞呵
字聲可訖又仰頭以鼻徐徐吸清氣以補心亦不
可聞吸聲如此吸者六次即心之毒氣漸散又以

天地之清氣補之心之元氣亦漸復矣再又依此
式念呼字耳亦不可聞呼聲又吸以補脾耳亦不
可聞吸聲如此者六所以散脾毒而補脾元也次
又念四字以瀉肺毒以及而補肺元亦須六次次
念噓字以瀉肝毒以及而補肝元噓以瀉膽毒吸
以補膽元吹以瀉腎毒吸以補腎元如此者並各
六次是謂小周小周者六六三十六也三十六而
六氣偏臟腑之毒氣消病根漸除祖氣漸完矣次
者是何臟腑受病如眼病即又念噓嘻二字各十

合書三

四十三

八編仍每次以吸補之總之為三十六訖是為中
周中周者第二次三十六通為七十二也次又再
依前呵呼四噓嘻吹六字法各為六次並須呼以
瀉之吸以補之愈當精虔不可怠廢此第三次三
十六也是為大周即總之為一百單八次是謂百
人訣也午時屬陰時有兩即對南方為之南方屬
火所以却陰毒也然又不若子後已前面東之為
陽時也如早起床上面東將六字各為六次是為
小周亦可治眼病也凡眼中諸證惟此訣能去之

他病亦然神神乎此太上之慈旨也略見玉軸
真經而詳則得之師授也如病重者每字作五十
次凡三百而六腑周矣乃漱練液叩齒訖復為
之又三百次訖復漱練液叩齒如初如此者三
即通為九百次無病不愈秘之秘之非人勿傳

四特攝養論中有云春肝氣盛者調虛氣以利
之夏心氣盛者調呵氣以疎之秋肺氣盛者調
呵氣以洩之冬腎氣盛者調吹氣以平之但言
調此四氣而書中未詳及四氣之訣今思曾叔

祖撰庵炎庵集中玉軸六氣全文以明之黃玉
總云愛山表倅得樸菴親傳每日子午卯酉四
時行持六字密室中竹簾布帷隔風為上亦嘗
得愛山親授口訣云

食後將息法

平旦點心訖即日以熱手摩腹出門庭行五六十
步消息之中食後還以熱手摩腹行一二百步緩
緩行勿令氣急行訖還休偃卧顯蘇煎藥要半升
以下人參茯苓甘草等飲覺似少熱即以麥門冬

竹葉茅根等飲性將理食飽不宜急行及走不
宜大語遠喚人喚喜卧睡覺食散後隨其所業不
宜勞心力腹空即須素食不宜忍飢生硬粘滑等
物多致霍亂秋冬間暖裹腹腹中微似不安即服
厚朴生薑等飲如此將息必無橫疾

養性

鷄鳴時起就卧床中導引訖擲漱即中正坐量時
候寒溫喫點心飯若粥若服藥先飯食服藥喫酒
消息訖入靜室燒香誦經洗雪心源息其煩慮良

文事子即出徐步庭院散氣地濕勿行但屋
下東西步令氣散家事付與兒子未宜關心平居
不得嗔叫用力飲酒至醉並為大害四時氣候和
暢之日量其時節寒溫出門行三二里及三百二
百步為佳量力行泊勿令氣乏喘而已親故相訪
問同行出遊百步或坐量力談笑緣得歡通不可
過度耳人性非合道者焉能無悶煩畜數百卷書
見老莊等第一勤洗浣以香露之身數沐浴令潔
淨則神安道一也也左右供侍之人得清淨手奉

心少遲鈍者自然事關無相惱令人氣和心平
凡人不能絕嘆若用無理之人易生嘆怒妨人導
性

二篇之旨養衛得理皆沈存中懷山錄所述存

括名

安車

輪不欲高高則搖車身長六尺可以卧也其廣合
轍輶以索繫合之索如條大可也車上設四柱蓋
密簾竹織絹糊黑漆少加搜搜重又蔽眼害於觀

合書三

四十七

眺箱高尺四寸設茵薦之外可以隱肘為法車後
為門前設扶板加于箱上在前可憑在後可倚臨
時移徙以鐵距子簪于兩箱之上板可闊尺餘今
可容書策及肴樽之類箱下以板鋪之卧則障風
近後為窳戶以備反卧觀山也車後施油幪幪兩
頭施軸如畫幘軸人如指有雨則展之傳于前柱
欲障日障風則半展或偏展一邊臨時以鐵距子
簪于車蓋梁及箱下無用則卷之立于車後車前
為約陞今可垂足而坐要卧則以板梁之令平琴

書酒榼扇帽之類挂車柱及蓋間車後可也

漢召申公以安車蒲輪闕子騫江革皆嘗為親
御車邵康節詩云喜醉豈無千日酒惜花還有
四時花小車行處人觀看滿洛城中都是家又
云大驚子中消白日小車兒上看青天司馬溫
公崇德待康節不至有詩云淡日濃雲合復開
碧嵩清洛遠紫迴林端高閣望已久花外小車
猶未來康節和章亦有萬花深處小車來之句
老人遊觀雅宜小車之適存中懷山錄以安車

合書三

四十七

為首云

遊山具

遊山客不可多多則應接人事勞頓有妨靜賞兼
僕衆所至擾人今為三人其諸應用物共為兩肩
三人荷之操几杖持蓋雜使更三人足矣肩輿者
未預客有所携則相照裁損無浪重複惟輕簡為
便器皿皆木漆輕而遠盜惟酒盃或可用銀錢三
千使人腰之操几杖者可兼也

行具二有

甲負

左衣篋一

衣被枕盥漱具手巾足巾

藥湯梳

右食匱一

竹為之二萬并底蓋為四食盤子三每盤米子櫟十矮酒樽一可容數升以備沽酒飽一盃三漆筒合子貯脯脩乾果嘉蔬各數品餅餌少許以備飲食不時

應猝惟三食盤相重為一萬其餘分任之暑月果脩皆不須携

乙肩竹藺二下為櫃上為虛藺

左藺上層書箱一

紙筆墨硯剪刀韻略

雜書冊

櫃中食梳梳各七箸各四生果數物削

果刀子

右藺上層琴一竹匣貯之

指疊基局一櫃中菓子茶二三品膳茶

即碾熟者蓋托各三瓢七等附帶雜物

小斧子刀子斷藥鋤子蠟燭

柱杖泥靴雨傘涼笠食鉢

瓦子急須子油筒

老人心閒無事每喜出遊康節詩所謂待天春暖秋涼日是我東遊西泛時也懷山錄述遊山之具適用之宜倪尚書心經釣堂雜誌記雪川城內外遊賞去處凡四十二所謂每月一遊則

日日可度每歲一遊則可閱三十年日日遊太頻勞費可厭歲一遊太疎今酌其宜每月往一處遊一月之中又擇良辰美景具山薇野蕨或邀一兩賓無賁携子弟同行庶疎數得中亦康

節所謂洛陽城可遊也

居山約

余營蕪山本以藏拙已就粗安可以忘歸諸兒之意眷戀挽留又難遂絕今與汝曹約每月二十日在山十日在家備甚暑甚寒雨月則全在家思山

中不便也山不可獨頂于第一人待置厝輪流
四子每人一句問而復始其當句者飲饌之類專
一掌之其餘在家有效時新各隨其意多少不拘
無亦不責其或有高議事合要來此不必當句自
宜前稟自六月為始各於句下書名如當句有私
幹兄弟那容何向書之子訓仁義禮和

老人之性有喜山居者沈存中云山林深遠固
是佳境獨性則多阻礙人則喧雜必在人野相
近心遠地偏背山臨流氣爽高爽土地良沃泉

石清美如此得十畝平坦處便可葺居左右映
帶岡阜形勝最為上地地勢好則居者安也締
造規模從人意正中門外作池可半畝餘種菱
荷菱茨逃池岸種甘菊既可採又可觀賞

歌床

如今之倚床但兩向施擋齊高合曲尺上平俗家亦有
編椅亦有之據然若背倚左擋則右擋可几臂
倚右擋則左可几臂左右几互倚令人不倦仍可
左右端足或枕擋角歌眼無不便適其度座方三

尺足高一尺八寸檔高一尺五寸後三尺至三尺半
製藤網或竹為之便增人

飽食緩行初睡覺一臥新茗侍兒煎脫巾斜倚
繩床坐風送水聲來耳邊裴晉公詩也

醉床

為床長七尺廣三尺高一尺八寸自半以上別為
子面歎大床中開子面廣二尺五寸長三尺皆木
製常縱之常縱之常下虛二寸牀底以板獨
之勿令通風子面底設一拐撐分為五刻子面首

掛一枕若欲危坐即撐起令子面直上便可靠
以枕承腦欲稍偃則退一刻盡五刻即與大床平
矣凡飲酒不宜便卧當倚床而坐稍倦則稍偃之
困即放平而卧使一童移撐高下如意不煩執定
務以盡四體之適大床兩緣有二尺餘前後各留
帘孔為直几撐其下為笥欲倚手則歎之於帘孔
中易轉二床便於佚老制度皆佳

觀雪簷

簷長九尺闊八尺高六尺以輕木為格細糊之三

而如沈昇風上以一格覆之而前就火暖中間可容小坐床四具不妨設火及飲具隨處移行背風侵之迫地即就雪中卓之比之體懷具而門洞不礙瞻眺施之別用皆可不獨觀雪也

此菴即東坡之釋勝亭也東坡守汝陰作亭以惟幕為之世所未有銘略云乃作新亭建楹梁鑿柄交設合散靡常不油仰承青慳四張我所往十夫可將與水升降除地布牀又云豈獨臨水無適不咸春朝花郊秋夕月場無匪而趨

書十

五十二

無翼而翔敞又改為其費易償榜曰擇勝不實允當觀此銘則其製度可備見也子由亦云子瞻以惟為亭欲往即設不常其處名曰擇勝作四言一章輒愛其文故繼之略云我兄和仲寒剛立柔視身如傳苟完不求山窮水竭習氣未瘳豈以吾好而俾民憂類尾甚頃頽曲孔坐風有翠帷而有赤油匪舟匪車亦可相攸養老亦親者為之良可以供遊觀之適云

蒲花褥

八月暖蒲略蒸不爾則生蟲暴令燥按布囊中將取花如柳絮者欲為坐褥或卧褥以帛為方囊端實蒲花札鞭令勻厚五六寸許其上復以褥表囊之虛軟溫煖他物無比春間不御則褫去褥表出囊復完燥履略暴之歲歲如此南方海間中有木綿亦不及蒲花之柔暖

湯鑪

溫酒為鐵銅鎗深三寸平底可貯二寸湯以酒盃排湯中酒溫即取飲冬時擁爐靜話免使僮僕紛

紛殊益幽致

書二

五十三

羊羔酒

米一石如常法浸漿肥羊肉七斤麴十四兩諸麴皆可將羊肉切作四方塊爛煮杏仁一斤同煮留汁七斗許拌米飯麴更用木香一兩同醞不得犯水十日熟味極甘滑此宜和化

雪花酒

半精膏肉一斤去筋膜溫水浸洗批作薄片用熟好酒一升煮令肉爛細切研成膏別用羊筒麴三

膏內并研令勻又入龍腦少許拌和傾入甕內候冷時取出切作薄片入酒盃中以溫酒浸飲之龍腦使極溫方入如無經入木香少許亦佳二味各入少許尤佳

二酒宜為甘香之素

茶蘼酒

好酒一斗用木香一塊以酒一盃於砂盆內約磨下半錢許用細絹濾入瓶密封包臨飲取茶蘼百

英浮沉酒面入不能辨查花和露紅小簪取十箇

共投用生紗袋盛掛於瓶口近酒面一寸許密

封瓶口三兩日可飲或飲湯柑皮旋滴汁幾點於

酒內亦佳

此酒色香味三絕宜奉老人清興醪醑本酒名

也世所開花元以其顏色似之故取其名唐書

百官志良醖著令供醪醑酒今人或取花以為

按囊故黃山谷詩云名字因畫酒風流付枕幃

香炭

以精石炭屑之生炭葉雜搗為餅錢大暴乾焚香雖致冷濕地火亦不滅石炭相郡煤子最佳餘處者性急動之則火滅不得已清泉者吹之長泉者又為下

一法杉炭末五兩胡粉黃丹各一兩合搗為細末着糯米膠和勻作餅子候乾火內燒通紅以紙灰埋香爐中焚香經夕不滅不消

降真香

虛堂清夜宴坐焚之降真香一斤沉香四兩龍腦

一分蜜和之

茅香時燒少許亦佳本草云可入印香中合香

附子末用

四品奇香

雪梅香 丁香一分沉檀半脛炭篩研半兩來捻

取夢兒爐口藝大人道是雪中梅

江梅香 人人盡道是江梅半兩丁香一分茴更

用藿零俱半兩麝香少許是良媒

百花香 一兩甘松二兩芎藭香少許蜜和同圓

如彈子安爐上恰似百花凝曉風

長春香 二兩箋香三兩檀麝香腦子一錢寬華

堂靜處爐煙起清韻長春賽蕙蘭

御愛四和香

沉香 檀香 降真 箋香 茅香 龍骨

海螵蛸各一錢 麝香二錢 樟腦半錢 蜜

右諸香剉碎蜜和勻後用龍骨麝腦碾細和入

新瓦瓶內封閉勿令氣出經三日方傾出限三

日過遇四更時分當天取露氣天明便收陰乾

香書三

如此三次研為末用蜜麥子黃蠟調作餅子用

甕器收遇燒時用水一盞傍香爐邊方燒香

香方甚多獨此方用龍骨鎖住其烟不散所

以為妙

試茶

採嫩芽先沸湯乃投芽煮變色挹取握去水小焙

中焙欲乾鎗內畧炒使香磨碾皆可坐團臨泉旋

攪旋烹芳新不類常韻

香茶

上春嫩茶芽每五百錢重以菴豆一升去殼蒸焙
山藥十兩一處細磨別以腦麝各半錢重入盆同
研約二千杵納罐內密封窖三日後可以烹點愈
久香味愈佳

栢湯方

採嫩栢葉線繫垂桂一大甕中紙糊其口經月取
如未甚乾更閉之至乾取為末如嫩草色不用甕
只密室中亦可但不及甕中者青翠若見風則黃
矣此湯可以代茶夜話飲之尤醒睡飲茶多則傷

香書三

人氣耗精害脾胃栢湯甚有益如太苦則加少山
芋尤佳外臺秘要有代茶新新飲然作藥味不若
栢湯隱居道話尤助幽尚

三妙湯

地黃枸杞實各取汁一升蜜半升銀器中同煎如
稀飴每服一大匙湯用酒調皆可實氣養血久服
彌益人

乾荔枝湯

蔗糖一斤 大烏梅肥者二兩湯浸時換水 桂二兩薄切

生薑二兩 薄切

右先將烏梅生薑為細末入在沙糖內與桂末拌和勻再取麝隔過如茶點如欲作膏子與烏梅用去核修事如上法不煨桂作小片為末薑切片不煨用水三碗煎至二碗湯調服暑熱心煩井水調服 葉龍圖傳者月可常合服之

清韻湯

縮砂仁三兩 石菖蒲一升 旱草半兩

右為末入鹽點服

橙湯

橙子兩 乾山藥一斤 甘草二兩 鹽四兩 白梅四兩 桂半兩

右先用橙子山藥甘草白梅一處研細捏作餅子焙乾為末入檀香半兩尤佳

桂花湯

黃桂花三斤 揀淨去青花 乾薑一兩

甘草一兩

右末和勻量入炒鹽盛貯莫令漏氣如常點服

暖調湯

神曲二兩 鹽一兩 官桂兩 甘草七兩 烏梅八兩

乾薑二兩

右先將五味焙乾為末後入炒鹽和勻作一處新破藥收

洞庭湯

真橘皮四兩 不去白一兩 帶一兩 生薑四兩

右將薑與橘皮同淹一宿曬乾焙乾入甘草一兩三錢炙黃好白鹽梅二十箇去核以白麴拍

作片子無油銚內煨乾入炒白鹽一兩半同一

慶為末沸湯點用

木瓜

生薑四兩 木瓜十兩 白鹽五兩 甘草五兩 紫蘇兩

右炒薑鹽拌和蘇瓜甘草三日取出曬乾為末

沸湯點服手足酸服之妙又一方加縮砂山藥

炒為末消食化氣吐胃

韻梅湯

半黃梅一斤 挑青椒四兩 揀薑皮一斤 鹽半斤

右伴安淨鉢內二處拌勻烈日曬半月以色變

稍紫為度更約度稀稠得所為佳須用曬半月

日安淨瓶內點用已上諸方皆得之秘傳宜供湯藥之用

熟水

稻葉穀葉楮葉橘葉樟葉皆可採陰乾紙囊懸之用時火炙使香湯沃暴其口良久

前朝翰林院定熟水以紫蘇為上沉香次之麥

門冬又次之蘇能下膏膈滯氣功效至大炙蘇

須隔竹紙不得離俟香以湯先泡一次傾却再

泡用大能分氣極佳

晨朝補養藥摩法

地黃粥

切地黃二合候湯沸與米同下鎗先取酥二合蜜

一合同炒今香熟別貯之候粥欲熟乃下同煮取

熟

胡麻粥

烏油麻去皮蒸一炊曝乾更炒令香熟每用白杭

米一升胡麻半升如常煮粥法為之臨熟加糖蜜

任意極香甘胡麻多治之臨時取用

乳粥

牛羊乳許可先浙細杭米令精細挫令極乾乃煎

乳令沸一依用水法乃投米煮之候熟即挹置碗

中每碗下真酥半兩置粥上令自銘如油遍覆粥

上食時旋攪美無比

山羊粥山羊一名山羊

山羊山生者佳同種者無味取去皮細石上磨如

細每碗粥用山羊一合以酥二合蜜一合同炒令

凝以匙搗碎粥欲熟投攪令勻乃出

粟粥

小粟去殼切如米粒每杭米一升粟肉二合同米

煮更無他法

百合粥

生百合一升切蜜一兩同水嘗熟投欲熟粥中每

益用三合

藥角粥

新藥角一具寸截流水內浸三日刷腥穢以河水

入砂瓶或銀瓶內以桑葉塞瓶口勿令漏氣炭火

似熟山芋，得酥軟即止。未軟更煮，慎勿漏氣。漏氣則難熟。取蒸乾為粉，其汁澄濾，候清冷以綿濾。作膠片，盤或風中吹乾。藥角膠別入藥，每粥一盞，入藥角粉五錢，鹽一匙同攪溫服。

枸杞子粥

枸杞子生研，取汁每一盞，粥可用汁一盞加少熟麥同煮。

馬眼粥

新黑豆一斗，淨淘入大釜中，如常用水煮令熟，癖去汁，再入釜以熟麻油浸之。豆上油深四指，密蓋之，慢火煮，直候露出豆，即以此拌轉，更煮直令泣盡，油即佳。每粥一釜，可下熟豆三五盞，欲熟入拌勻食之。

又法

白米二升，別煮令熟。大顆黑豆一升，先以薄灰汁煮，豆令熟，漉出豆，却以清水燒沸，依前入豆，再煮透出灰，氣漉出，却以沙糖六兩，開水而鹽化，透。

入鹽二兩，醬三兩，只用水取醬汁同煮。熟桃仁杏仁皆可為粥，生去皮尖，畧炒令香，細研水絞取濃汁，隨意入粥中煮。臨時加酥蜜亦可。金罌木煎亦可作粥，一如用糖法。

諸山蔬可作粥者皆只如菜粥法

禮記內則言：子事父母，婦事舅姑，進盥授巾之後，問所欲而敬進之，以饘醢為先。饘厚粥，醢薄粥也。故此編詳述懷山錄中諸藥糜法。陸放翁云：平旦粥後，就枕粥在腹中暖，而宜睡。天下第一樂也。

紫不託方

新黑豆煮取濃汁，搜麪作湯餅，極甘美，能去麪毒，令不蒸熱。服丹石人尤宜食此，雜蓴菜為羹，妙沈存中云：麪治壅熱，益氣力，但不可多食，致令憤悶。料理有法，節而食之，餠蒸餅及饊索餅起麪等法，在食經中。此法用黑豆汁搜麪，則無毒矣。

造山藥麪法

取山藥去皮薄以日中暴乾柳箕中按為粉下篩如常匙食之加酥蜜為導麪尤精益氣力長肌肉久服輕身耳聰目明不饑延年

造乾地黄法

九月末掘取肥大者去鬚熟蒸微暴乾又蒸暴乾食之如蜜可停

芭蕉脯

蕉根有兩種一種粘者為糯蕉可食取作手太片灰汁煮令熟去灰汁又以清水煮易水令灰味盡

合書二

李

取壓乾乃以鹽醬蕪荳椒乾薑熟油胡椒等雜物研過一兩宿出焙乾略搥令軟食之全類肥肉之味

牛蒡脯

十月以後取根洗乾去皮用慢火少煮勿太爛硬者熟煮並搥令軟下雜料物如芭蕉脯法泥焙取乾

笋脯一如牛蒡脯法

蓮房脯

取蓮房去蒂又去皮用井新水入灰煮泥一如芭蕉脯法焙乾以石壓令匾作片收之

蓴萄鮮

蓴萄花即拖子也採嫩花釀作鮮極香美矣白樂天方齋劉禹錫饋以菊苗蘆蘆服之鮮換取樂天六班茶二索以自醒酒

乾蕨菜

採嫩蕨菜蒸熟以乾灰拌之同爆極乾濯去灰又暴乾收之臨食湯浸令軟味如合草

合書二

李

石芥牽菜

此二物極辛為道大佳

苦益菜

苦益菜青葉苦麻皆可作羹

苦麻即今俗謂之胡麻者葉作羹大甘滑其葉

松藥

去亦受取嫩白者蜜漬之略燒令蜜熟勿太熟極香脆

白芷

蜜漬糟藏皆可食

防風芽

防風芽如胭脂色天門冬芽如馬椿芽菜芽又
有藤蕪枸杞芽菊芽芥菜水藻牛膝芽地黃嫩葉
皆如常菜治之

東坡詩云秋來霜露滿東園蘆蕪生兒芥有絲
我與何曾同一飽不知何苦食鷄豚况藥菜之
佳乎

水苔

立春前採嫩者淘淨令極淨其間多沙石蟬蟲取
得壓乾只入鹽油完抹切雞白同入瓶中釀為醃
醋浸食之甚佳又可油炒加鹽醬亦善

瓜藿

生甜瓜揀取未熟者每十斤隨辦切開去穰不用
就百沸湯綽過以鹽五兩勻擦翻轉豆豉末半升
醃醋并半匙醬斤半馬川椒乾薑陳皮甘草茴香
各半兩蕪蕒二兩並為細末同瓜一處拌勻入甕
瓮以海鹽冷處醃之經半日後則熟小色明透

琥珀味甚香美

菜藿

大菰菜葉採十字劈裂菜蕪取緊者破作兩畔
同向日中曬去水脚二件薄切作方片如錢眼于
大入淨罐中以馬芹茴香雜酒醋水等令得所調
淨盪洗之隨手舉罐擦觸五七十次蜜盪罐口置
甕上溫處仍日一吹如前法撼觸三日後可供菜
色青白間錯鮮潔可愛

藿藿

嫩藕稍隨意切作方塊如骰子大就蠅眼湯內快
手綽上取牽牛花搽汁淹菜片時投冷熟水中滌
過控乾以馬芹鹽花泡湯入少醋加蜜作藿澄冷
洗供之

豆藿

先取濕沙納藿器中以菜豆勻撒其上如種藝法
深桶覆藏室中勿令見風日一次掬水洒透俟其
苗長可尺許摘取蠅眼湯綽過以料藿供之亦豆
亦可種然不如菜豆之佳

齊民要術

東坡與徐十三書云今日食薺極美天然之珍雖不甘於五味而有味外之美其法取薺一二升許淨擇入淘丁米三合冷水三升生薑不去皮提兩指大同入釜中流生油一規設當於羹面上不得餽餽則生油氣不可食不得入鹽醋君若知此味則六腑八脉皆可服也天生此物以為幽人山居之採餌以奉傳不可忽也羹以物覆則易熟而羹極潤力佳也

本草薺和肝氣明目凡人夜則血歸於肝為宿血之醜過三更不睡則朝旦而色黃極意思荒浪以血不得歸故也若肝氣和則血而流通津液暢潤東坡嘗有詩云時遠麥田求薺薺強為得舍煮山羹陸放翁亦有詩云小薺生薑助滋味微加薑桂助精神風爐歎鉢窮家臨妙訣何事言授人

東坡回錢穆父書云竹萌最佳既取筍也其心專

餽和清水煮熟用薑蘆根自然汁及酒三物得入少鹽漸漸款洒之過熟可食不敢獨味此請依法作與老嫂共之

古人有性喜茹素不忍害物者菽水之奉在嘉蔬藥菜料理如法殊益於人杞菊芎朮等苗嫩時採食之或煮或羹或炒或爨悉用土蘇鹹豉汁加鹽下飲甚良蔓菁作羹最妙不斷五辛者春秋嫩韭四時採薺甚益菜豆紫蘇烏麻須宜貯俱能下氣其餘豉醬之類食所不可少皆須貯蓄肉食心不害物但以錢買猶愈於殺第一戒慎勿殺若肉須新鮮似有氣息則不宜食爛臧損氣切須慎之戒之

種植

庭園林間種植可愛翫之物如世間花果人家自有此不悉載今抄東坡一書誠齋一詩于左

東坡與程全父書

白鶴峰新居成從天侔求穀色界未太大則難活小則老人不能待當酌中者又須上礎稍大

不傷眼者

紅梅 抽 荔枝 楊梅 枇杷 松

含笑 拖子

護寫此數品不必皆有仍告書記其東西

城齋三三徑詩

東園新開九徑

江梅 海棠 桃李 橘 杏 紅梅

芙蓉

九種花木各植一徑命曰三三徑其詩云

書二

七

三徑初開是蔣卿再辟三徑是淵明誠齋

有二三徑一徑花開一徑行

歐陽公示謝道人種花詩云

淺深紅白宜相間先後仍須次第栽我欲四

時携酒去莫教一日不開花

西園胡休喜種花卉以窺造化生育之妙喜飲

鮮耐以寓經綸變理之方

芸香

古人藏書謂之芸香是也採直書帙中即去蠹置

席下去蚤虱栽園庭間香間數十步極可愛葉類

豌豆作小葉生秋間葉上微白如粉江南人謂之

七里香江南極多大率香草多只是花過則已縱

有葉香者須採擬嗅之方香此草遠在數十步外

已開已香自春至秋不歇絕可觀也

茅香

開地種之可洗手終日香一年數次刈割屋中時

時燒必許亦佳

本草云苗葉可煮作浴湯令人身香同藁本尤

書一

七

佳仍入印香中合香附子用

枸杞

揀好地熟斷加糞訖然後逐畦長開壟深七八寸

今寬乃取枸杞連莖剉長四寸許以草為索慢束

如羹碗大於壟中立種之每束相去一尺下束訖

別調爛牛糞稀如麪糊灌束子上令滿減則更灌

然後以肥土壅之滿訖土上更加熟牛糞然後灌

水不久即生乃如剪韭法從一頭起首割之得半

畝料理如法可供數人其割時與地面平高留則

無葉深剪則傷根剖仍趁熟及雨中但早朝為佳

又法但作束子握坑方一尺深於束子三寸即

下束子訖着好糞蒲坑填之以水沃糞下即更

着糞填以不減為度令蓋束子一二寸即得

生後極肥嫩數鋤壅每月一加糞尤佳

又法但畦中種子如種菜法土糞下水當年疎

瘦二年以後悉肥勿令長苗即不堪食如食不

盡即剪作乾菜以備冬中常使如此從來及秋

其苗不絕取甘州者為真葉厚大者是有刺葉

小者是白棘不堪服食

又法拘杞子於水盆內投令散訖暴乾斫地作

畦畦中去却五六寸土勿作壟縛草穰作穉似

臂長短即以泥塗穉令偏以安壟中即以子布

泥上一面令稀稠得所乃以細土蓋之令偏又

以爛牛糞蓋上令偏又布土一重令與畦平待

苗出時時澆灌及堪採即如剪韭法更不更糞

錄每種用二月初一每年但五度剪不可過也

凡拘杞生西河郡谷中及甘州者其味過於蒲

菊今蘭州西去鄯城靈州六原並大根莖尤大

計菊

移根最佳若少時折取苗乘雨濕種便活一年之

後落根地長服即老冬中收子剪如韭法

陸龜蒙杞菊賦云惟杞與菊偕寒互綠或頽或

落煙懷雨沐我衣敗締我飯脫粟羞慚齒牙苟

且梁肉蔓延駢羅其生實多爾杞未棘爾菊未

莎其如予何其如予何東坡云天隨生自言常

食杞菊及夏五月枝葉老硬氣味苦澁猶食不

已余守膠西與通守劉君循古城廢園求杞菊

食之捫腹而笑作後杞菊賦云人生一世如屈

伸肘何者為貧何者為富何者為美何者為陋

或發衰而瓠肥或梁肉而黑瘦何侯方丈度郎

二些較豐約於憂寐卒同歸於一朽吾方以杞

為樂以菊為粳春食苗夏食葉秋食花實而冬

食根尚庶幾乎河西南陽之壽張南軒賦云張

子為江陵之數月時方仲春草木敷榮經行郡

園意有所欣爰命採掇付之庖人汲清泉以細

五咏而不親甘脆可口蔚其芬馨盡日為之加飯而他物不足以前陳又云天壤之間孰為正味厚或腊毒淡乃其至也唇豹怡徒取詭異山鮮海錯紛糾莫計苟滋味之或偏在臍腑而成贅惟祀典苟微動不苦滑甘靡滯非若它蔬善嘔走水既瞭目而安神復沃煩而滌穢驕南陽於西河又賴齡之可制隨富必有約居足恃雪消壤肥其首歲誕與子婆娑薄言掇之古鉅瓦盆聚汁咀齋高論唐虞詠歌書詩嗟乎微

斯物孰同先生之歸於是相屬而歌殆日晏以忘飢

地黃

十二月耕地至正月可止三四遍細肥訖然後作溝溝闊一尺兩溝作一畦畦闊四尺其畦微高而平硬甚不啻雨水苗未生間得水即爛畦中又撥作溝溝深三寸取地黃切長二寸種於溝內訖即以熟土蓋之其土厚三寸以上每種一畝用根五十斤蓋土訖即取經冬爛草覆之候牙稍出以火

燒其草令燒去其苗再生葉肥茂根益壯自春至秋凡五六耘不得鋤八月堪採根至冬尤佳若不採其根太盛春二月當宜出之若秋採訖至春不復更種其生者猶得三四年但採訖比之明年耕耘而已參驗古法此為最良按本草二月八月採殊未窮物性也八月殘葉猶在葉中精氣未盡歸根二月新苗已生根中精氣已滋不如冬月採殊妙又與蒸暴相宜古人云二月八月非為種者將為野生當須見苗矣欲食葉但露散後摘取傍葉

勿損中心正葉甚益人勝諸葉

東坡詩云地黃飼老馬可便光鑒人吾聞樂天

語喻馬施之身白樂天採地黃詩凌晨前鋪去薄暮不盈筐携來朱家門賣與

光顧焉馬成粟救此苦飢腸我褒正伏櫪齒

耳氣不振移栽附沃壤今本草古稱地黃宜黃土

則根大蕃茂爭新春沉水得穉根言以水沉而

而多子云洋者名天黃半洋半沉者名重湯養陳新

人黃沉者名地黃其沉者佳也重湯養陳新

於鼎釜水中更以器投以東河清其用皮有老

少則膠和以北海醇崖蜜助其冷山薑發芳辛

古方用名地為寒食餚寒食日例杏仁湯
熟作瑞露珍丹田自宿火渴肺還生津顏餉內
熟子一洗膏中塵

五加

取根深掘肥地二尺埋一根令沒舊痕甚易活苗
生從一頭剪取每剪訖鋤土擁之

五加蓋天有五車之星精也金應五行人應五
德位應五方物應五車青精入莖有東方之液
白氣入節有西方之津赤氣入華有南方之光

七十六

玄精入根有北方之炁黃煙入皮有戊己之靈
五神鎮主相轉育成用之者真仙服之者反嬰
父服輕身耐老明目下氣補中益精堅筋骨強
志意五葉者良葉可作蔬菜食五月七月採莖
十月採根陰乾張子聲揚建始王叔才于世彦
皆服此酒得壽三百年有子二十入世世有得
服五加酒散而獲延年者不可勝計或只為散
以代湯茶而餌之驗亦然也

青葉胡麻

取八稜者吐中如葉法種之生苗為菜食秋間依
此法種之甚滑美

上好肥地加糞熟新訖春中取根大劈取辦於畦
中如種蒜法五寸一辦種之直作行又加糞灌水
苗出即鋤四邊令絕無草春後看稀稠得所處更
別移亦得畦中乾即灌水三年後其大如拳然後
取食之又取子種亦得或一年以後二年以來始
生甚遲不如種辦

黃精

七十七

擇取葉參差者是真取根摩破稀種一年以後種
稠種無得其苗否美可食

首蓿

擇肥地斫令熟作壠種之極益入還須從一頭剪
每剪加糞鋤土擁之

合歡也

孩根畦中稀種二年自稠春剪苗食如枸杞秋夏
不堪食

牛蒡

取子時種時乘雨即生若有水不候雨也地
須加糞灼然後肥早則沃水剪如一法菜中之尤
益者但多種食苗及根莖益於人

蓮子

八九月取堅黑子瓦上磨去頭直令皮薄取蓮土
作熟泥封如三指大長使帶頭重令磨頭尖泥
欲種時翻至池中重頭向下自能周正薄皮上易
生數日即出不磨者率不可生

藕

春初掘取藕三節無損處種入深泥令到硬土殼
兩前種當年有花

藕可作粉其法取藕藕不限多少淨洗截斷
三宿數換水者灼然潔淨然後漉出確中碎塊
以新布絞取汁重擠取汁盡為度又以密布漉
去麗惡物澄去清水如稠離澄以水攪之然移
澄看水清即瀉去一如造米粉法

雞頭

雞頭粉取新熟者去皮熟搗實如上法

菱角粉去皮如上法

薑粉以生薑爛研按汁如上法以和羹

葛粉去皮如上法開胃止煩熱

茯苓粉判如瘰子以水浸去赤汁如上法松栢粉

桑椹嫩葉如上法酒垂露採為之

經宿則無粉如嫩草鬱鬱可愛

脫果

水生之果八月間以牛羊滓和土包其鵝膝處

熟和如大杯以紙裹裹覆之麻繞令密緻重則

以杖柱之任其發花結實明年夏秋間試發一包

視之其根生則斷其本埋土中其花實皆晏然不

動一如巨木所結子在蕭山縣見山寺中楠木止

高一二天實皆如拳大蓋用此術也大木亦可為

之常見人家有老林檎木根已盡朽圓人乃去水

木二三尺許如上法以上包之一年後土中生根

乃截去近根處三尺許包入地後遂成心木

凡種果木須望前種實多望後種心木

百部

山地種之如百合法多種為佳取根授汁濯衣令
不生風仍潔白如用皂角也

右白杞菊以次為粥為蔬為脯為粉須自種植
充饒足用百部之種亦可為幹雇之供

菖蒲石

惟石奇峰以沙石器種之旦暮易水則茂水濁及
有泥滓則萎一寸九節者服之可以烏髮輕身延
年夜紫燈間置一兩盆可以收煙不薰人眼東坡
詩云碧玉梳成紅瑪瑙青盆水養石菖蒲曾茶山

詩云窓明凡淨室空虛盡道幽人一事無莫道幽
人無一事汲泉承露養菖蒲文石清漪斯亦几案
間良玩也

相鶴

相鶴不必如鶴經所說但取其標格立瘦喉聲清
徹者為勝凡老鶴所生則氣韻清古三年頂赤則
能疾細論其法頭欲細而長身欲人立而不橫足
欲瘦而節欲高頭肥則類鴈身橫則類鶩脰蒼韻
俗則類鸛聲濁體肥則類鵝皆不材也為雞食魚

稻甚多老則食穀漸少甚老則不食惟華亭縣
東村所出者為得地他處雖時有皆凡格也養鴈
須有廣水或木風月清曠之地常食生物則格韻
高野畜之籠樊飼以熟食則多肥濁而精彩羽毛
日漸摧殘類乎雞矣

養龜

龜者壽物養庭檻中可以愛玩愈於觀他物尤宜
畜山龜爾雅謂之攝龜者腹下殼能開合此龜啖
蛇蛇甚畏之庭檻中養此龜則蛇不復至以至園

園中多畜之大能辟蛇兼此龜不賴水陸地蓄之
不失其性予在隨州時寓法雲寺之後有竹園常
苦多蛇寺僧乃蓄龜于園中自爾不復有蛇

二事皆係
山錄所述

收畫

子弟遇好圖畫極宜收拾在前士大夫家有耕莘
築巖釣渭浴沂荀陳德星李郭仙舟蜀先王訪草
廬王羲之會蘭亭陶淵明歸去來韓昌黎盤谷序
晉廬山十八賢唐瀛洲十八學士香山九老洛陽

耆英古今事實甘繪為圖可以供老人閒玩共廣
友高談人物山水花木翎毛各有評品吟詠亦以
廣後生見聞梅蘭竹石尤為雅致瑤池壽鄉圖慶
壽近年有壽域圖備列歷代聖賢神仙耆壽者丹
青粧點尤為奇玩

王維字摩詰九歲知屬辭擢進士工草韻善畫
名盛於開元天寶間寧薛諸王待若師友畫思
入神至山平水遠雲勢石色繪工以為天機所
到別墅在輞川地奇勝與裴迪遊其中賦詩相

酬為樂東坡云味摩詰之詩詩中有畫觀摩詰之
畫畫中有詩秦太虛云余為汝南得疾卧直舍高
仲待携輞川圖示余曰閱此可以療疾余本江海
人得圖喜甚即使二兒從旁引之閱於枕上恍然
若與摩詰入輞川度華子岡經孟城坳憇輞口莊
泊文杏館上斤竹嶺並水蘭柴絕萊蕪泝蹕阿
窺塵紫返於南北喧航歇胡戲柳浪濯爽家漸酌
金屑泉過白石灘停竹里館轉辛夷塢抵漆園幅
中杖履甚爽若飲或賦詩自娛忘其身之匏繫於

汝南也數日疾良愈

龍眠居士李公麟字伯時能行草書善畫尤工
人物人以比顧陸顧凱之陸知微晚年致仕歸
老肆意於泉石間作龍眠山莊圖為世所寶韓
子蒼題太乙真人蓮葉圖云太乙真人蓮葉舟
脫巾露髮寒飈颺輕風為帆浪為楫卧看玉宇
浮中流中流蕩漾翠綃舞穩如龍驤萬斛舉不
是峰頭十丈花世間那得葉如許龍眠盡手老
入神尺素幻出真天人恍然坐我水仙府蒼煙

萬頃波鄰鄰玉堂學士今劉向禁直岩堯九天
上不須對此融心神會植青藜夜相訪觀畫之
趣二事可察

置琴

朱文公琴贊云養君中和之正性禁爾忿慾之邪
心乾坤無言物有則我欲與子鈞其深歐陽公云
予嘗有幽憂之疾退而間居不能治也既而學琴
於友人孫道滋受宮聲數引久而樂之不知疾之
在其體也夫疾生於憂者已寡之者能攻其疾

之衆而不若聲之至者能和其心之所不平心而
平不和者和則疾之忘也宜哉奉親者能琴時為
親庭鼓一二操亦足以娛悅其意和平其心
琴師六言云擘托抹挑打摘先後輕重疾徐最
是一般妙處更要其人讀書斯亦子弟藏脩息
游之一益云

延方士

湖州東林沈東老能釀十八仙白酒一日有客自
號回道入長揖於門曰知公白酒新熟遠來相訪

額求一醉公見其風骨秀偉楚然起迎徐觀其碧
眼有光與之語其聲清圓於古今治亂老莊淨圓
次之理無所不通知其非塵埃中人也因出酒器
十數於席間曰聞道人善飲欲以鼎先為壽如何
公曰飲器中鍾鼎為大屈危螺杯次之梨花蕉葉
最小請戒侍人次第遠斟當為公自小至大以飲
之笑曰有如顧愔之食蔗漸入佳境也又約周而
復始常易器滿斟於前笑曰所謂杯中酒不空也
回公興至即舉杯常命東老鼓琴曰浩歌以和之

又嘗園基以相娛止奕數子輒拂去笑曰祇恐基
終爛斧柯回公自日中至暮已飲數斗無酒色東
老欲有所叩回公曰聞公自能黃白之術未嘗妄
用且篤於孝義又多陰功此余每日所以來尋訪
而將以發之也東老因叩長生輕舉之術回公曰
四大假合之身未可離形而頓去東老攝衣起謝
有以喻之回公曰此古今所謂第一最上極則處
也飲將達旦甕中所釀止留糟粕而無餘瀝回公
曰久不遊浙中今日為公而來當留詩以贈然吾
不學世人用筆書乃就擘席上榴皮畫字題於庵
壁其色微黃而漸加黑其詩云西鄰已富憂不足
東老雖貧樂有餘白酒釀米綠好客黃金散盡為
收書已而告白東老啓關送之天漸明矣握手並
行至舍西石橋回公先度乘風而去莫知所適

延名衲

成都一僧誦法華經甚專雖經兵亂卒不能害忽
一山僕至云先生請師誦經引行過溪嶺數重煙
嵐中一山居僕曰先生老病起晚請誦至寶塔品

見報欲一聽之至此果出野服秋葉兩耳垂有焚
香聽經不入復出以藤盤竹箸秋飯一孟杞菊
數甌無鹽酪美若甘露得觀錢一環僕送出路口
問曰先生何姓曰姓孫問何名僕於僧掌中書思
邈二字僧大駭僕還失之三日山中尋求竟迷舊
路歸視視資乃金錢一百文也由茲一飯身輕無
疾天禧中僧一百五十歲後隱不見
款延方士談真誥時約名繼聽梵書二士共談
必說妙法真有所遇豈不樂哉

肅客

朱文公晚年野服見客榜客位云榮陽呂公嘗言
京洛致仕官與人相接皆以閑居野服為禮而嘆
外郡或不能然其指深矣其叨恩致事前此蒙賓
客下訪初亦未敢援此遂以老人野逸自居近緣
久病艱難動作遂以野服從事上衣下裳大帶方
履比之涼衫自不為簡所便者束帶足以為禮解
帶足以燕居且使窮鄉下邑復見京都舊俗之義
亦補助風教之一端也又云衰病之餘不堪拜跪

舊舊訪亦望察此非應受者並宜預告庶幾還
答不至闕禮

羅鶴林云余嘗於趙季仁處見其服上衣下裳
衣用黃白青皆可直領兩帶結之緣以皂如近
服長與膝齊裳必用黃中及兩旁皆幅不相屬
頭帶皆用一色取黃裳之義也別以白絹為大
帶兩旁以青或皂緣之見儕輩則繫帶見卑者
則否謂之野服又謂之便服

記事

周益公云蘇子容聞人引故事必令人檢出虞司
馬溫公聞新事即便抄錄且記所言之人故當時
諺曰古事莫語子容今事勿告君實

司馬公對賓客無間賢愚長幼悉以疑事問之
有草簿數本常致座間苟有可取隨手抄錄或
對客即書率以為常其書字皆真謹劉元城見
時已有三十餘冊

曾祖南谷文靖公叔祖樸庵提刑皆有日記凡
十年作一奏一日之事無論善惡必載焉限以

十年所以推一期進德與否也夫子三十而立
自是十年則有加於前矣至從心之時蓋滿歲
四十年聖人所以密推熟察以自驗其道藝所
造功力所成者至矣夫甲乙周而時已久矣時
愈久而行愈進此聖人之所以為聖人也溫公
之奏豈其原亦出於此歟

二老相訪

周益公以宰相退休楊誠齋以秘書監退休為廬
陵二大老益公嘗訪誠齋于南溪之上留詩云楊

全書二

八十八

十

監全勝賀監家賜湖豈比賜書華回環自闢三三
徑頃刻能開七七花門外有田供伏臘望中無處
不煙霞却慙下客非摩詰無畫無詩只設誇誠齋
和云相國來臨慶士家山間草木也光華高軒行
李能過李小隊尋花到院花留贈新詩光奪月端
令老子氣成霞未論藏去傳貽厥姑向田夫野老
誇好事者繪以為圖誠齋題云平叔曾過魏秀才
何如老子致元台蒼松白石青苔徑也不傳呼宰
相來用魏野詩翻案也誠齋家嗣東山先生伯子

以集英殿修撰致仕家居年八十雲集書無疑蓋
公門人也年尤高嘗携茶袖詩訪伯子其詩云寒
衣不待履霜回到得如今亦樂哉以類有時供
劇軒裳無用任塵埃眉頭猶自懷千恨興到何如
酒一杯知道華山方勝覺打門時伴若如來伯子
和云雪舟不肯半塗回直道荒林意感哉羅菊花
時披宿霧木犀香裏絕纖埃錦心繡口世金難月
露天漿呼玉杯八十仙翁能許健片雲得得出巢
來其風味庶幾可亞前二老云

全書二

八十九

二老相訪倡妍酬麗四詩可觀放翁詩云老人
無一事有興即吟詩唱者和者皆須興到也

戲書

邵康節詩云花木四時分景致經書萬卷號生涯
有人若問閑居處道德坊中第一家歐陽文忠公
六一堂記云琴一張碁一局酒一壺藏書一萬卷
集錄金石遺文一千卷以吾一翁老於此五者之
間是為六一陸放翁書巢記云陸子既老且病猶
不置讀書名其室曰書巢吾室之內或栖于牀或

陳子前或枕藉于床俯仰四顧無非書者吾飲食
起居亦常不與書俱間有意欲起而亂書園之至
不得行輒自笑曰此非吾謂黨者耶二公蓋儲書
以自佚其老者也丁度之祖顯蓋其家貲以置書
至八千卷且曰吾聚書多矣必有好學者為吾子
孫度力學有守登服勤詞學科仕至參政曾子固
平生嗜書家藏至六萬餘卷手自攤對白首不倦
此儲書以遺其子孫者也孟子有賢父兄之言惟
以書教子弟者而後為賢晉人有佳子弟之日惟

從父兄之教而知書者而後為佳

唐杜荀鶴詩云欺春只愛和醅酒諱老猶看夾
註書放翁詩云燈前目力依然在且蓋山房萬
卷書

歐公詩云至我天下樂終日在書案家仲本云
至樂莫如讀書至要莫如教子又云人家教子
不如養芝蘭然既積學以培植之又須積德以
澆灌之

子弟儲書正以備侍旁檢閱陳后山左右圖書

日以討論為務其志專欲以文章名後世夜與
諸生會宿忽思一事必明燭繡閣得之乃已或
以為可待旦者后山曰不然人情樂因循一放
過則不復省矣故其學甚博而精尤好經術非
如唐之諸子作詩之外他無所知魏衍昌世亦
彭城人從后山學年五十餘見異書猶手自抄
寫藏書數千卷云

安老書卷之二

安老懷幼書三卷

目錄

保養

服藥

貯藥

溫閣

集方

平胃散

易簡方

降氣湯

調氣散

養正丹

來復丹

震靈丹

紅九子

青州白九子

秘傳六和丸

神仙不老丸

三仙丹

八仙丹

草還丹

小丹

交感丹

降氣湯

揩牙法

神仙訓老丸

經進地仙丸

八味丸

雙補丸

二黃丸

扶羸黑丹

白丹

還少丹

勝駿丸

鱸鱉散

姜黃散

通利散

脾約丸

磨積丸

白芷丸

治眼昏育神丸

牢牙烏髭丸

東坡治脾節飲

飲食用暖

戒夜飲說

探湯泉穴

探腎膈穴

東坡酒經

仲長統樂志論

照袋

處方

食治方

真一酒

桂酒

天門冬酒

山藥酒

菖蒲酒九三條

菊花酒

紫蘇子酒

枸杞子酒

木酒

蘇合香酒

醉鄉賓屑

丁香餅子

柑皮散

石膏湯

鮮酒九三條

地黃煎

金櫻子煎

金髓煎

茯苓煎九二條

補骨脂煎

薄荷煎

麥門冬飲

甘露飲

糯米糕九二條

杏仁粥

人參粥

枸杞葉粥

燒肝散

參歸腰子

甲乙餅

茯苓麴

生蘿蔔

羊肺羹九四條

百合治肺臟

黃精餌

青娥丸

服椒法

服稀飯法

婦人小兒食治方

血氣諸方

猪肚粥

羊肉麴基子

猪腎基子

半夏撥刀

姪姪諸病

麥門冬粥

生地黃粥

陳橘皮粥

豉心粥	阿膠粥	鹿頭肉粥
鯉魚粥	慈粥	竹瀝粥
苧麻粥	鯉魚羹	黃鷄腫
鷄子羹	山羊粥 <small>凡二條</small>	鷄肉索餅
鷄子酒	小豆飲	慈豉粥
產後諸病		
鮑魚羹	猪蹄粥	猪蹄羹 <small>凡二條</small>
牛肉羹	鹿肉腫	三肉腫
蘇麻粥	茯苓粥	地黃粥
紫莧粥	滑石粥	羊肉粥
猪腎粥	黃雌鷄粥	黃雌鷄羹
猪肚羹	鯽魚羹	鯽魚鱠
脯鷄糝	猪腎腫	冬瓜撥刀
煨猪肝	生藕汁飲 <small>凡二條</small>	
小兒諸病		
四米湯	牧丹粥	扁豆粥
猪子吐	鷄子餌	牛乳飲
甘草豆方		目錄終

安老書卷之三

保養

安養之道惟善保養者得之孟子曰我善養吾浩然之氣水乙真人曰一者少言語養內氣二者戒色慾養精氣三者薄滋味養血氣四者無精液養臟氣五者莫嗔怒養肝氣六者莫飲食養胃氣七者少思慮養心氣人由氣生氣由神住養氣全神可得真道凡在萬形之中所保者莫先於元氣攝養之道莫若守中實內以陶和將護之方須在閑日安不忘危聖人預戒老人尤不可不慎也春秋冬夏四時陰陽生病起於過用五臟受氣蓋有常分不適其性而強云為用之過耗是以病生善養生者保守真元外邪客氣不得而干之至於藥餌往往招徠真氣之藥少攻伐和氣之藥多故善服藥者不如善保養康節先生詩云爽口物多終作疾快心事過必為殃知君病後能服藥不若病前能自防郭康伯遇神人授一保身衛生之術云但有四句偈則是在康受持偈云自身有病自心知

身病還將心自醫心境靜時身亦靜心生還是病
生時邪信用其言知自護愛康節強倍常年幾百
歲服藥

沈存中云人非金石况犯寒暑露既不調理必
生疾病常宜服藥辟外氣和臟腑也平居服七宣
丸鍾乳丸量其性冷熱虛實自求好方常服紅雪
三黃丸青水香丸中神明膏陳元膏春初冰解
散天行菌毒元散皆宜先貯之以防疾發忽有卒
急不備難求其防危救急不可闕者伏火丹砂保

精養經丸長服伏火硫黃益氣除痰理腰膝
能食有力小速丹愈疾去風伏火磁石明目堅骨
伏火水銀壓熱鎮心金銀膏養精神去邪氣如上
方藥固宜留心其餘丹火須臾神助不可卒致有
心者亦宜精懇或遇其真

貯藥

丸散皆以深筒沙合盛之勿用有油即受濕外為
漆指積筒亦欲深深則濕氣難入積中使灰淨磨
之勿漆則不受潮更集縐縐為襪厚襪之更以縐

冒積口縱有潤氣自縫中入亦為縐縐所收暑月
三焙之遇雨則入溫室貯茶如此亦善藥璞新甕
瓦盛蠟紙幕之懸東簷楣上令常得晨日勿令露
雨夕陰則一焙移置深室情復出之數品同一罌
可也喜蛀物用舊曾貯油麻罐淨拭置藥其中即
不蛀

溫閣

南方暑雨時茶藥圖籍皮毛膠糊物色衣筆
墨之類皆惡蒸溽悉可置在閣中若山居即依山
為閣其高去地一丈則不復有蒸潤閣中簾壁為
厨厨二層壁仍板彌之前後開窓梁上為長笕物
可懸者懸于笕餘悉置格上大日明燥即大開門
窓今納風日陰晦則密閉中設溫爐常令火氣鬱
鬱然

又法溫閣中布卧床床下新出炭實之乃置
物床上永不蒸潤更不須着火其炭至秋供燒
明手復易新炭床上慎不可卧卧者多瘡屢有
驗蓋為火氣所樂也

又法有餘力則設一小園子但去地盈丈以上
自無蒸戾

集方

凡人少長老其氣血有盛壯衰三等岐伯曰少火
之氣壯壯火之氣衰蓋少火生氣壯火散氣况復
衰火不可不知也故治法亦當分三等其少日服
餌之藥於壯老之時皆須別處之陳令尹集方俱
為老人備用今所續編亦皆據平日見聞為老人
對證處方者品列之

天下受拜平胃散

常服溫養脾元平和胃氣寬中進食仍治脾胃不
和苗氣噎塞嘔吐酸水氣刺氣悶脇肋虛脹腹痛
腸鳴胃膈痞滯不美飲食

川厚朴去皮陳橘皮去湯洗甘草以上各南京小

棗二百枚生薑和皮切茅山蒼朮五兩去皮米

右六味用水五升謾火煮乾搗作餅子日乾再
焙碾為細末每二錢入鹽少許點如泄瀉每服
三錢生薑五片烏梅二箇鹽少許水一盞半煎

八分服

此藥人人常服獨此方煮透滋味相和而美
與眾不同所以為佳老人尤宜服之

易簡方

縮脾飲草果烏梅縮砂甘草各等分乾葛白扁豆
各減半老人加附子每服五錢水一碗生薑十
片煎至八分浸以熱水令極冷暑月用此代熱
水飲之極妙

降氣湯老人虛氣上壅當間以生附子加生薑煎

臨熟以藥汁濃磨沉香水再煎一沸服之尤為

穩當

調氣散老人寒疝作疼不可攻擊改為咬咀每服

二錢一大盞生薑紫蘇鹽煎服或煎茴香鹽酒

調下末子亦得

養正丹年高入臟腑寒秘者尤宜服之

來復丹老人寒秘惡能主之一法治老人寒氣入
腹小便不通者用生薑半兩連根華和泥葱一
箇連一捻豆豉五十粒爛研略炒盒臍中心作

兩府足易服之以利為度亦良法也

寶丹老人血痢白梅茶下

紅丸子治大人小兒脾胃等患極有神效

治病不能傷氣真氣應老人小兒姪婦皆可服

黃明白丸子治一切痰涎為患常服有功咳嗽痰

實咽喉作聲老人小兒皆宜服之

子家已刊易簡方大字本茲不贅述本方

秘傳六和丸

益老枝氣助脾活血進美飲食第一平和之劑

熟地黃

兩十破故紙

兩十兔絲子

白茯苓

皮去黑

山藥

兩十破故紙

兩十兔絲子

白茯苓

皮去黑

右先將熟地黃破故紙兔絲子三味酒浸一宿

次早飯前上蒸日中曝乾九浸九蒸九曝候十

分乾次和白茯苓山藥二味并白中春令極細

為末次用胡桃研爛和五味令勻用酒煮乾

為丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒送下

下此方不記

神仙不老丸

不老仙方功效殊駐顏全不費工夫人參牛膝川

巴戟蜀地當歸杜仲俱一味地黃生熟用兔絲拍

子石菖蒲更添枸杞皮燕于細末蜜丸桐子如早

午臨眠三次服鹽湯溫酒任君須忌食三白并諸

血能便鬚鳥髮亦烏

人參

新羅者須是圓結重實潤去苦頭則洗

川牛膝

長三四尺而滋潤者去苦頭則洗

川巴戟

色黑紫沉重大而實心者佳若色淡黃

一宿焙

川當歸

甘芬香者去苦頭則洗

杜仲

取之身細者去其肉如肉厚者去其皮

法然

洗淨焙乾細切之如豆用桑地黃

浸冬

前取以水浸洗者為是色黑者為佳

出竹

刀切細焙乾各一兩是鐵器兔絲子

茶子

極堅硬者佳大而輕者非用新布織起

洗焙

乾以酒浸一宿又酒浸一宿出焙乾

石菖蒲

葉細節密者去苦頭則洗

枸杞子

用酒浸一宿焙乾

地骨皮

切細焙乾

右十二味選之貴精製之如法不可曬只用慢火焙若太燥則又失藥氣只八分乾即於風前略吹令冷熱相激便十分燥取淨秤分兩磨如細散煉白蜜以火日搜和入木石臼內搗數百杵丸如梧桐子大每日空心午間臨卧三次服每服七十粒鹽酒鹽湯任下忌食葱白薤白蘆菹豆粉及藕諸般血蓋藕能破血諸血能解藥力若三白誤食亦無它止令人鬚髮返白耳合時忌穢觸并婦人孝子雞犬等見

書三

陳書林 云此方非特烏髮且大能溫養榮衛補益五臟和調六腑滋充百脉潤澤三焦活血助氣添精實髓須是節慾使藥力相須乃見功效之速

三仙丹 又名長壽丸

一烏二朮三茴香久服令人壽命長善治耳聾并眼暗尤能補腎與膀胱順氣搜風輕腰膝駐顏活血鬚難蒼空溫酒鹽湯下誰知凡世有仙方

川烏頭 一兩去皮尖剉碎 茴香 二兩

蒼朮 二兩米泔浸一宿用竹刀刮去粗皮切片用葱白一握拌炒黃

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九空心食前溫鹽酒或鹽湯下一日兩服切忌諸血陳書林云先公晚年常服此飲啖倍進後見錢都倉年八十鬚髮皆黑詢其所以云自三十歲以後日進一服

八仙丹

治虛損補精髓壯筋骨益心智安魂魄令人悅澤駐顏輕身延年益壽閉固天癸

書三

九

伏火朱砂 真磁石 赤石脂 代赭石 石中黃 禹餘糧 五兩味並用醋洗乳香 沒藥 一兩 右為細末勻研極細糯米濃飲丸如梧桐子大或如豆大每服一粒空心鹽湯下

有人年幾七旬忽患漏瀉弱氣憊然虛損得此方服之頃爾強壯精氣閉固飲食如舊

草還丹

延年益壽耐寒暑能變修德行可登地仙

補骨脂 熟地黃 遠志 地骨皮 牛膝

石菖蒲

右等分末酒糊為丸如梧桐子大每服三五十丸空心日午溫酒下鹽湯熱水亦可

大治虛勞白濁乃翊聖真君降授與張真人方服之百日百病除二百日精髓滿視聽倍常神聰氣爽瘟咳不侵服三百日步履輕健髮鬚如漆反老還童

小丹

益壽延年安寧神志魂魄流滋氣血脈絡開益智

慧釋散風濕耳目聰明筋力強壯肌膚悅澤氣宇泰定

熟地黄 肉蓯蓉 酒浸各五兩 五味子 兔絲子 酒

各五兩 柏子仁 研石斛 巴戟 天門冬 各

蛇床子 炒覆盆子 各三續斷 澤瀉 人參

山藥 遠志 炒焦山茱萸 萸蒲 桂心

白茯苓 杜仲 剉炒絲綿 天雄 地黃 各

煉成鍾乳粉 服一兩氣完則拆去

右為末蜜丸如梧桐子大食前酒服三十九至

五十丸忌五辛生葱薤蕪飴理虛人多起去鍾

乳倍地黃多志倍遠志茯苓少氣神虛倍覆盆

子欲光澤倍柏子仁風虛倍天雄虛寒倍桂心

小便赤濁三倍茯苓一倍澤瀉吐逆倍人參

此方補勞益血去風冷百病諸虛不足老人

精枯神耗女子絕傷斷緒並皆治之

交感丹

俞居易之祖通奉云子年五十一歲遇缺甕申先

生授此秘術確志行持服食一年必有補益平日

肝服藥一切屏去而飲食嗜好不減壯歲此藥之

功大矣今年八十有五享天然之壽爰以秘方傳

之世人普願群生同登道果後有牙藥可同用之

伏神 兩香附子 一升用新水浸一宿日

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一九早辰細

嚼用降氣湯下

降氣湯

伏神 兩香附子 法如前製甘草 一兩

右為細末每服二錢沸湯點下前藥

揩牙法

香附子 五兩修治如前法搗生薑青鹽二兩研

同上

右每夜臨卧以少許揩牙如常法

神仙訓老丸

昔有宣徽使在鍾南山路邊見村庄一婦人年方二八持杖責一老兒年約百歲宣徽駐車令問何故婦人至車前云此老兒是妾長男宣徽恠之下車問其仔細婦人云適來責此長男家中自有神

藥累訓令服不肯服至令老邁鬚髮如霜腰曲頭低故責之宣徽因懇求數服并方以歸常服延年益壽氣力倍常齒落再生髮白再黑顏貌如嬰兒

生乾地黄 熟乾地黄各五兩 川椒 十兩不

牛膝 五兩酒 大黑豆 生用 乾山藥 兩五 雄何首

烏 各十兩 雄者 不 雄肉 後蓉 兩五 枸杞 兩五 藥本 上

右將雌何首烏為末用水瓶內旦辰蒸日出曬

夜間露如此九蒸九曬九露數足焙焦為末酒

糊為丸如梧桐子大空心溫酒湯下忌蘿蔔

此藥性溫無毒治百病補下元光澤皮膚嬰

兒亦可服之

經進地仙丸

凡丈夫婦人五勞七傷腎氣衰敗精神耗散行步艱辛飲食無味耳焦眼昏皮膚枯燥婦人臍冷無子下部穢惡腸風痔漏吐血瀉血諸風諸氣並皆治之

川牛膝 酒浸一宿切焙 肉苁蓉 酒浸一宿切焙 川椒 目去 附子 煨

上各 木鱉子 殼去 地龍 去土已上 覆盆子 白木

白附子 兔絲子 酒浸 赤小豆 天南星

防風 去骨碎補 何首烏 葶藶 川羌活

金毛狗脊 去毛 烏藥 以上各 綿黃耆 人參 各一

川烏炮 白茯苓 甘草 各一

右為細末酒煮麴糊為丸如梧桐子大每服三

四十丸空心溫酒下

陶隱居以此方編入道藏時有人母幼年得

風氣疾久治不瘥五十餘年隱居處此方修

今日進二服半母病頓愈髮白返黑齒落再

生至八十歲顏色如少年人血氣筋力倍壯
耳目聰明其家老僕七十餘歲竊服此藥遇
嚴冬御綿葛絨雪與寒色有別業去家七
十里每使老僕往近不移時又能負重非昔
時比幾成地仙

八味丸

劉戴花方老人常服延年

川巴戟兩一兩半酒浸去心用荔枝肉一高良薑
同炒赤色為度去門冬一兩半去心川練子二兩

書重十四

用降真香一兩到碎同吳茱萸一兩半去梗用
炒油出為度去降真香一兩胡蘆巴一兩用全蠍十四箇同炒
炮同用胡蘆巴一兩用全蠍十四箇同炒山藥
炒焦色一兩半用熟地黃同炒茯苓一兩用川椒一兩同

香附子一兩半去毛同杜仲皮一兩

右一處研為細末鹽煮麪糊為丸如梧桐子每
服四五十丸空心食前鹽湯下溫酒亦得

此方溫平補肝腎清上實下分清濁二氣
煖丹田接華池真水三車不敗五漏不生熱
不流於上瞞冷不侵於脾胃令人耳目聰明

治積年冷病除累歲沉痾兼治遺精白濁婦
人赤白帶下其効如神

雙補丸

劉上舍之祖在京師辟雍得史載之家傳方服此
四十載享年八十七歲

熟地黃半兩兔絲子半兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九

人參湯下

此方治下部虛冷平補不熱不燥氣不順沉

書重十五

幸

香湯下心氣虛茯苓湯下經煩燥酸棗仁
湯下小便少車前子湯下小便多益智湯下

○二黃丸

黃德延曰夫人心生血血生氣氣生精精盛則髮
髮不白顏貌不衰可以延年益壽其天開者多由
服熱藥性燥不能滋生精血也予深燭此理以謂
藥之滋補無出生熟二地黃天麥二門冬世人徒
知服二地黃而不知以門冬為引藥則服二地黃
者徒過去爾生地黃生精血用天門冬引入所生

之地四味互相該說載于本草可考而知而又以人參為通氣之主使五味併歸於心藥之滋補無出於此

生地黃 熟地黃 天門冬去心各一兩 麥門冬去心各一兩

右五味為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸空心溫酒鹽湯下

此方常服十日明目十日不渴自此以往可以長生予登真人之位此藥之功也

扶羸黑白丹

治年尊氣血虛耗精血少不能榮養經絡精神枯痺行步戰掉筋脉緩縱目視茫茫

黑丹

用麋茸去床骨皮毛酒浸一宿酥炙令黃又用鹿茸事治如麋茸之法各等分並為細末

酒糊為丸如桐子大

白丹

用鍾乳粉一味糯米糊為丸

石川此二月雜之而服如覺血少即多用黑丹如覺氣不足即多用白丹溫酒或米飲吞下空心食前服

史丞相常服此二丹

還少丹

西川羅赤脚方大補心腎治一切虛敗心神耗散筋力頓衰腰脚沉重肢體倦怠血氣羸乏小便昏濁服藥五日頓覺有力十日精神爽健半月氣稍壯二十日耳目聰明一月夜思飲食久服令人身

體輕健筋骨壯盛怡悅顏色婦人服之姿容悅澤

太煖子宮去一切等疾

山藥 牛膝酒洗一宿焙乾 遠志 山茱萸

白茯苓 五味子 肉蓯蓉酒浸一宿焙乾 石菖蒲

巴戟酒洗一宿焙乾 杜仲去皮切焙乾 茴香各一兩

枸杞子 熟乾地黃各半兩

右為細末煉蜜入棗肉為丸如梧桐子大每服

三十九溫酒鹽湯下日進三服空心食前

看症候加減用藥身熱如山梔子一兩心氣

不寧加麥門冬子一兩精液少加五味子一

兩陽氣弱加續斷一兩

勝駿丸

治老人元氣不足真氣虛弱及諸虛寒濕氣進襲手足拳攣屈伸不得筋脉不舒行步不隨常服益真氣壯筋骨治膚散一切風

附子一枚

重八兩 去皮 附子 當歸 一兩 酒 天麻 酒 酸棗仁 浸 一宿

炒防風

各二兩 熟地黃 酒 沒藥 研 木香 火 不見 全蝎 去頭足 羌活 甘草 炙 檳榔 草薢 炒 後客 浸

破故紙

巴戟 各一兩 木瓜 四兩 麝香 二錢 半 研

乳香

半兩 研

右二十味除乳香沒藥麝香別研外搗羅為末用生地黃三斤淨洗研爛如泥入無灰酒四升爛煮如膏以前藥拌勻杵令堅每兩分作十九每服一九細嚼臨卧酒送下如服半月見效甚速無事人服此亦壯筋力行步如飛故名勝駿此藥專在地黃膏要熬得好惟春夏好合以有生地黄也若合半劑每味減半

此方黃讓仲傳於永橋陳學論

聖散

老人脾胃久弱飲食全不能進兩服主効王醫繼先進高唐方

附子

七兩 丁香 藿香葉 官桂 木香 各三

人參

半斤

右為末每服二大錢以尋常辣糊薑半盞熱調服用匙挑服之

姜黃散

治老人脾泄

鷹爪黃連一兩斷作小段

生薑四兩淨洗和皮切作骰子塊

右於銀器內同炒得薑椒黃色去薑以黃連碾

為細末臘茶清調下二錢不拘時

吳興沈澹 德器傳

通利散

治老人秘澀

和劑方嘉禾散

須用廣州增城縣地風子

右每服三大錢水一盞半生薑三片棗二枚煎

至七分入二蜜一匙再煎去滓不拘時

制師謝尚書用此傳

脾約丸 治老人津液少大便燥小便澀其脾為約

大黃洗二兩 厚朴枳殼 白芍藥各半

麻子仁微炒 杏仁分三

右為末蜜丸如梧桐子大每服二十九溫水下加至三十九

磨積丸 治老人磨滯積去浮腫

厚朴 白薑 縮砂 胡椒 青皮 蒼朮

麥芽 陳菜莢 肉桂不見火

合書三 手

右用醋同鹽煮再焙乾為細末酒糊為丸如梧桐子大每服十九日午或臨睡吞附子煎湯吞下橘皮湯亦得此方老幼常服快脾進食

白芷丸 治老人氣虛頭暈

白芷 石斛 乾薑各一兩 細辛 五味子

厚朴 肉桂 防風 茯苓 甘草 陳皮各一兩

兩白朮一分兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九清米飲下不飢不飽服即致遠年一有三角此

疾得此方數服即愈楊吉

治眼昏夜光育神丸養神明育精氣主健忘益智
聽心補血不壅燥潤顏色遠近移時目不瞋眠
腑調適之眼光炯然神宇泰定語音清徹就燈
永夜服力愈壯並不昏澁不憊達旦亦不倦急服
三月後愈覺神清眼明志強力健步履輕快體氣
舒暢是藥之效常餌如飲食一日不可輟惟在修
合洗濯潔淨藥材須件件正當不宜草率

熟地黃洗 遠志洗 牛膝洗

兔絲子洗 枳殼洗 地骨皮

以上七味各等分逐一秤過分兩平除地黃兔

絲子別器用酒浸其餘五味同剉細共入一鉢

內或薏甕內若每件十兩都用第一等無灰濃

酒六升同浸三宿取出文武火焙乾須試火令

得所不可太猛恐傷藥性十分焙乾搗羅為末

以兩手拌令十分勻煉蜜為丸如梧桐子大每

服空心鹽酒下三十九加至四五十丸亦不

不飲酒鹽湯亦得但不如酒勝煉蜜法冬五
冰夏六七滾使冷以紙貼着去沫九後都入微
火焙少頃入甕收此藥林云黃壯仲司諫常服此藥晚年目視甚明因傳方
李守愚取黑豆緊小而圓者侵晨以井花水吞
二七粒謂之五藏穀到老視聽不衰
本草云熟地黃麥門冬車前子相雜治內障眼
有効屢試信然其法細搗羅家九如桐子大三
藥皆美搗羅和合異常甘香真奇藥也
牢牙烏鬚方

紹定壬辰江淮趙天使克復盱眙時納合行省相
公名買住來念陵予在趙監軍廳同會納合年逾
七十髮鬢鬚皆白質其所由謂吾國有行臺
出典審鎮鬚鬚皓然數載歸朝而鬚髮皆黑又性
其異自序遇一方牢牙烏鬚歲久得効因傳其方
却不言分兩續乙巳年會張經歷胡請始得分兩
云紫毫溫

旦方草三 又名旱蓮草
山草有二種一種是紫菊杞煙火客用之此

種再就北人始識之本草中名鯉腸草孫
其人千金方名金陵草浙人謂之蓮子草其
子若小蓮蓬故也

芝麻草三 此是壓油了麻枯餅是也

訶子二十箇 不蛀皂角三月蠶沙二青鹽二兩

蓋青鹽吾鄉少且貴價只以食鹽代之但藥力

減少用升麻三兩半最治牙疼

右為末醋打薄糊為丸如彈子大撚作餅子或

焙或曬以乾為度先用小口甕瓶罐子將紙筋

泥固濟曝乾入藥餅在瓶內煨灰火中燒令煙

出若煙淡時藥尚存性急取退火以黃泥塞瓶

口候冷次日出藥旋取數丸旋研為末早晚用

如揩牙藥以溫湯灌漱使牙藥時須少候片時

方始灌漱久用功莫大焉

烏鬚方甚多此方頗為奇異故抄之

吾祖知縣承議公家傳常用牢牙方

荊芥不見 土芎 細辛 當歸

右為末使時來可用水漱須令藥氣入牙內

三三蓋妙

菖蒲酒通血脉調榮衛主風痺治骨立痿黃醫肝
不治者服一劑經百日顏色豐足氣力倍嘗耳目
聰明行及奔馬髮白更黑齒落再生晝夜有光延
年益壽久服得與神通

菖蒲

右搗絞取汁五斗糯米五斗炊熟細麪五斤搗
碎相拌令勻入甕器密蓋三七日即開每溫服
一中盞日三

書三

書

又方菖蒲三斤薄切日中曬令乾以絹囊盛之
玄水一斗清者玄水者酒也懸此菖蒲密封閉一百
日出視之如絲菜色以一斗熟黍米內中封十
四日間出飲酒則三十六種風有不治者悉效
又方

菖蒲

一斗細生木皮一斗去

右二味都入絹袋盛用清酒五斗入不漏瓮中
盛密封春冬二七秋夏一七日取開每溫飲一
盞日三令人不老強健面色光澤精神

少呷參以坡公之說方省吳卿之言為信

飲食用暖

王介客入嘗食道傍有一老人進言飲食須用暖
蓋脾胃喜溫不可以冷熱犯之惟暖則冷熱之物至
脾胃溫矣又因論飲食太冷熱皆傷陰陽之和鼎氏

戒夜飲說

酒古禮也奉祭祀會賓親製藥餌禮有不可缺者
用之有時飲之有度豈可以為常而不知節哉禮

書三

玉

經賓主百拜而酒三行者蓋重其道而不容輕故
爾豈令人浮沉於其中乎予家祖父處世養生惟
務淡薄皆享年八九十上下予自幼年性喜恬退
今又七十餘矣飲酒止一二盞纔夜即睡明早即
起居常既罕病且康健亦自知節戒之功然也人
生天地間貧賤者多貴而富豈易得哉倘能戒夜
飲順陰陽正寤寐保精氣使一身神識安寧百邪
不侵安享天年豈不幸歟好生君子審而察之

見陳氏經方

擦湧泉穴

其元在足心之上濕氣皆從此入日夕之間常以兩足赤肉更次用一手握指一手磨擦數目多時覺足心熱即將脚指略略動轉則少歇或令人擦之亦得終不若自擦為佳陳書林云先公每夜常自擦至數千所以晚年步履輕便僕性懶每即時只令人擦至睡熟即止亦覺得力鄉人鄭彥和自太府承出為江東倉足弱不能陞辭樞筦黃繼道教以此法踰月即能拜跪雪人丁邵州致遠病

足半年不能下床遇一道人亦授此法久而即愈今筆于冊用告病者豈曰小補之哉

東坡云楊州有武官侍真者官於二廣十餘年終不染瘡面色紅臍腰足輕快初不服藥唯每日五更起坐兩足相向熱磨湧泉穴無數以汗出為度歐公平生不信仙佛笑人行氣晚年云數年來足瘡一點痛不可忍有人傳一法用之三日不覺失其法重足坐閉目固縮數道我驚為之兩足如氣速快氣極即休氣平復為之

日七八得暇即為乃般運捷法也文忠痛已即廢若不廢常有益又與王定國書云摩脚心法定國自已行之更請加工不廢每日飲少酒調節飲食常令胃氣壯健湧泉穴在足中

擦腎腧穴

陳書林云余司藥市倉部輪差諸軍請米受籌與人張成之為司農丞監史同坐時冬嚴寒余一二刻間兩起便溺問曰何頻數若此荅曰天寒自應如是張云某不問冬夏只早晚兩次余諭之曰有

導引之術乎曰然余曰旦夕當北面因暇專任叩請荷其口授曰某先為李文定公家壻妻弟少年遇人有所得遂教小訣臨卧時坐於床垂足解衣閉氣舌柱上嚅目視頂仍提縮穀道以手磨擦兩腎腧穴各一百二十次以多為妙畢即卧如是三十年極得力歸稟老人老人行之旬日云真是奇妙亦與親舊中篤信者數人言之皆得効今以告修練之士云

東坡酒經

南方之氓以糯與杭雜以卉藥而為餅喫之香噀之鍊揣之桴然而輕此餅之良者也吾始取麴而起肥之和之以薑液丞之便十裂繩穿而風戾之愈久而益悍此麴之精者也米五斗為率而五分之為二斗者一為五升者四三斗者以釀五升者以投三投而止尚有五升之贏也始釀以四兩之餅而每投以二兩之麴皆澤以少水足以散餅而勻停也釀者必甕投而井泓之三日而井溢此吾酒之萌也酒之始萌也甚烈而微苦蓋三投而後

書三

元

平也凡餅烈而麴和投者必屢嘗而增損之以古為權衡也既溢之三日乃投九日三投通十有五日後定也既定乃注以斗水凡水必熟而冷者也凡釀與投必寒之而後下此炎州之令也既水五日乃為得三斗有半此吾酒之正也先為半日取所謂贏者為粥米一而水三之揉以餅麴凡四兩二物并也投之糟中熟攪而再釀之五日壓得斗有半此吾酒之少勁者也勁正合為四斗又五日而飲則和而力嚴而猛也第不旋踵而為投

之少密則楷枯中風而酒病也釀之者酒醇而豐速者反是故吾酒三十日而成也

其內翰曰此文如太牢八珍咀嚙不嫌於致力則真味愈雋永今附編與耆英喜文章者玩之歎公醉翁亭記用二十一也字此經用十六也字每一也字上必押韻暗寓於賦而讀之者不覺其敷昂翺翹妙殊非世間筆墨所能形容也

仲長統樂志論

書三

子九

使居有良田廣宅背山臨流潯池環匝竹木園布場圃葉前果園樹後舟車足以代步涉之難使令足以息四體之後養親有兼珍之膳妻孥無苦身之勞良朋萃止則陳酒肴以娛之嘉時吉日則烹羔豚以奉之躊躇畦苑遊戲平林濯清水追涼風釣遊鯉弋高鴻諷於舞雩之下詠歸高堂之上安神閑房思老氏之玄虛呼吸精和求至人之彷彿典遠者載子論道誨書俯仰二儀錯綜人物彈南風之雅操發南音之妙曲逍遙一世之上睥睨天

地之間不受當時之責永保性命之期如是則可以陵霄漢出宇宙之外矣豈羨夫入帝王之門哉

照袋

王少保仁裕每天氣和暖必乘小駟從三四蒼頭携照袋貯筆硯韻略刀子戕紙并小樂器之類名園佳墅隨意所適照袋以烏皮為之四方有蓋并襟五代士人多用之偶聞此事富筆子孫視之存中遊山之具尤為簡便

療方

人有常言看方三年無病可治治病三年無藥可

金書年

三

用噫有是我余近苦脚膝酸疼呂惠卿處以經進

地仙丹連服三日而愈由是知天下無不可治之

病醫書無不可用之方特在於遇醫之明不明耳

地仙丹具前
第十一八方

食治方

凡飲養陽氣也凡食養陰也天產動物地產植物陰陽稟質氣味渾全飲和食德節適而無過則入於口達於脾胃入於鼻藏於心肺氣味相成陰陽和調神乃自生蓋精順五氣以為靈若食氣相惡

則傷其情形受五味以成體若食味不調則傷其

形陰勝則陽病陽勝則陰病所以謂安身之本必

資於食不知食宜不足以存生古之別五肉五果

五菜必先之五穀以夫生生不窮莫如五穀為種

之美也苟明此道安臟腑資血氣悅神爽志平而

去疾何待於外求哉陰真人謂醫者先曉病源知

其所以食治之食療不愈然後命藥陳令尹書

食治之方已備續編糜粥之法已詳此卷所編諸

酒諸煎諸食治方有草木之滋焉老人平居服食

可以養壽而無病可以消患於未然臨患用之可

以濟生而速効也

食治諸方不特老人用之少壯者對證療病皆可

通用負陰拘陽有生所同食味和調百疾不生保

生永年其功則一

真一酒

米麥水三一而已此東坡先生真一酒也

撥雲拔雲得乳臥蜜蠶又飲醉先生真一酒

子莊黃州
所製蜜酒也

稻黍麥仰陰陽足器潔泉新表裏清時日著
顏紅有暈春風入髓散無聲人間真一東坡
老與作青州從事名

東坡云予在白鶴新居鄧道士忽扣時已三鼓
家人盡寢月色如霜其後有偉人衣枕柳葉手
携斗酒丰神英發如吕洞賓曰子嘗真一酒乎
就坐三人各飲數盃擊節高歌神出一書授予
乃真一法及修養九事其末云九霞仙人李靖
既出恍然

桂酒

書三

圭

楚詞曰莫桂酒兮椒漿是桂可以為酒也有
隱居者以桂酒方教吾釀成而玉色香味超
然非世間物也

搗香篩辣入鉗盆益益春溪帶雨澤收拾小
山藏社甕招呼明月到芳樽酒材已遣門生
致菜把仍叨地主恩爛煮葵羹斟桂醕風流
可惜在蠻村

天門冬酒

醇酒一斗六月六日麴末一升如糯米五升
作飯天門冬煎五升米須淘訖曬乾取天門
冬汁浸先將酒浸麴如常法候炊飯適寒溫
用煎和飲令相入投之春夏七日動者勿令
熱秋冬十日熟

庚辰歲正月十二日天門冬酒熟予自漉之
且漉且嘗遂以大醉

自撥床頭一甕雲幽人先以醉奇芬天門冬
熟新年喜麴米春香並舍聞菜圃新疎花漠

漠竹扉斜掩雨紛紛擁衾睡覺知何處吹面
東風散縵紋

山藥酒補虛損益顏色用薯蕷於砂盆中細研然
後下於鉢中先以酥一大匙熬令香次旋添酒一
盞攪令勻空心飲之

川人黃葛峰次辰冬月霜晨常以待客

又方治下焦虛冷小便數瘦損無力生薯蕷半
斤刮去皮以刀切碎研令細爛於鐺中着酒酒
沸下薯不得攪待熟着塩葱白更添酒空腹飲

三二道妙

萬蒲酒通血脈制藥衛生風痺筋骨之藥黃帝所
不洽者服一劑經百日顏色足氣力倍常耳目
聰明行及奔馬髮白更黑齒落更生夜有光延
年益壽大服得與神通

萬蒲

右搗絞取汁五斗糯米五斗炊熟細麴五斤搗
碎相拌令勻入甕器密蓋三七日即開每溫服
一中盞日三

又方萬蒲三斤薄切日中曬令乾以絹囊盛之
玄水一斗清者泔水者選此萬蒲密封開一百
日出視之如綠茶色以一斗熱茶末內中封十
四日間出飲酒則三十六種風有不治者悉效
又方

萬蒲一斗生木一斗

右二味都入絹囊盛用清酒五斗入不滿瓮中
盛密封春冬二七秋夏一七日取開每溫飲一
盞日三令人不老強健面色光澤精神

菊花酒壯筋骨補髓延年益壽而若

菊花五斤生地黃五斤枸杞子根五斤

右三味都搗碎以水一石煮出汁五斗炊糯米
五斗細麴碎令勻入甕內密封候熟澄清每溫
服一盞

東坡云菊黃中之色香味和正花葉根實皆
長生也又云仙姿高潔宜通仙靈

紫蘇子酒

紫蘇子二升清酒三斗

右搗碎以生絹袋盛納於酒中浸三宿少飲
日華子云蘇子主調中益五臟下氣補虛肥
健人潤心肺消痰氣

枸杞子酒明目駐顏輕身不老腎筋骨耐寒暑療
虛羸黃瘦不能食服不過兩劑必得肥充無所禁
斷

枸杞子五升生地黃三升大麻子五升

右先搗麻子令熟攤去熱氣入地黃枸杞子相
和得所納生絹袋中以酒五斗浸之密封春夏

七日秋冬二七日取服多少任意令體中微有酒力醺醺為妙

諺云去家千里勿食蘿摩枸杞此言其補益精氣強盛陰道久服令人長壽葉和羊肉作羹益人

木酒水三十斤去黑皮淨洗搗碎以東流水二石於不漏器中漬之二十日壓漉去滓以汁於甕器中盛貯夜間候流星過時抄自已姓名置於汁中如是五夜其汁當變如血旋取汁以浸麴如家醞

書三

三

法造酒酒熟任性飲之十日萬病除百日髮白再黑齒落更生面有光澤久服延年不老忌桃李蛤肉服此酒者真康節所謂頻頻到口微成醉拍拍滿懷都是春也

蘇合香酒

蘇合香丸

有腦子者灸去腦子

右用十分好醇酒每夜將五九浸一宿次早溫服一盃除百病辟四時寒邪不正之氣舊酒尤佳

醉鄉寶昌

經進八仙散壯脾進食令人飲酒不醉宣和初華山貢士張老人號為鉄翁居士入山採藥遇道人住石巖坐共酌約有八人手中各出一物亦令張翁坐典以酒飲飲盡各賜手中之物張翁熟視之乃八味藥也燕求其名曰八仙剉散

乾葛

有粉細者

白豆蔻

去皮

縮砂仁

丁香

已大者

上

各半

甘草

一分

百藥煎

分一

木瓜

燒鹽

右件八味共細剉人不能飲酒者只抄一錢細

書三

三

嚼溫酒下即能飲酒醉鄉寶昌無如此方之妙丁香餅子溫胃去痰解酒進食寬中和氣仍治積滯不消心腹堅脹痰逆嘔噦噎酢吞酸脇肋刺痛背膈痞悶反胃惡心等證

半夏

湯洗

白茯苓

去皮

丁香

半兩

白木

炒

兩

川白薑

炮

甘草

一分

白扁豆

用姜汁浸

一兩

蒸

兩

橘紅

三兩

浸一宿

焙

右為細末用生薑汁煮薄麴糊為餅如大棊子大每服一餅細嚼生薑湯下不以時

桂皮散 治酒毒煩渴或醉未醒

柑子皮 二兩洗

右一味搗羅為散每服三錢匕水一盞煎三五

沸溫服或入少鹽未沸湯煎未效再服

石膏湯 治飲酒過多醉難醒

石膏 五兩 葛根 剉生薑半兩切各

右剉如麻豆大每服五錢匕水二盞煎至一盞

去滓溫服不拘時候

解酒

葛花 兩

右搗為散沸湯點一大錢匕不拘時亦可煎服

又方葛根細剉作釐米每服三錢水一盞煎去

滓溫服

又方乾桑椹二合用酒一升浸一時久取酒旋

飲之即解

大寒凝海惟酒不冰酒大熱不可多飲邵康

節詩云斟有淺深存變理飲無多少繫經綸

在老人斟酌問何如耳

補煎

地黃煎每年十月用生地黃十斤淨洗漉出一宿

後搗壓取汁鹿角膠一大斤半生薑半斤絞取汁

蜜二大升酒四升以文武火煎地黃汁數沸即以

酒研紫蘇子瀝取汁下之又煎二十沸已來下膠

膠盡下酥蜜同汁煎良久候稠如餳飴器中攪

晨取一七以溫酒調服之

東坡荅滕達道書蒙惠地黃煎扶衰之要藥若

續寄為幸又與崔東玉書云藥之膏油者莫如

地黃啖老馬皆復為駒吾晚學道血氣衰耗如

老馬矣欲多食生地黃而不可得也此藥以二

八月採者良

金櫻子煎經霜後以竹夾子摘取於未白中將作

却刺勿損之擘為兩片去其子以水淘洗過爛搗

入大鍋以水煎不得絕火煎約水耗半取出澄濾

過仍重煎似稀餳每服取一匙用煖酒一盞調服

其功不可具載

沈存中云金櫻子止遺泄取其溫且滋世之用

者待紅熟取汁熬膏大誤也紅熟則却失本性
今取半黃時採為妙十一月十二月採佳

本草云療脾洩下痢止小便利澀精氣久服
令人耐寒輕身方術多用之

金髓煎枸杞子不計多少逐日旋採摘紅熟者去
嫩蒂子揀令潔淨便以無灰酒於淨器浸之須是
氣候日數足漉出於新竹器內盛貯旋於沙盆中
研令爛細然後以細布濾過候研漉皆畢去滓不

合書三 四十

用即并前清藥酒及濾過藥汁攪勻量銀鍋內多
少升斗作番次慢火熬成膏切須不住手用物攪
恐粘底不勻候稀稠得所然後用淨瓶器盛之勿
令泄氣每早晨溫酒下二大匙夜臥服之百日中
身輕氣壯積年不廢可以延壽

茯苓煎白茯苓五斤去黑皮搗篩以熟絹囊盛於
三斗米下蒸之米熟即止曝乾又蒸如此三過乃
取牛乳二斗和合着銅器中微火煮如膏收之每
食以竹刀割取隨性任飽服之則不飢如欲食先

茯苓汁飲之任食無礙

又方養老延年服茯苓方華山鉗子茯苓研削如
棗許大令四方有角安於新甕瓶內以好酒浸以
三重紙封其頭候百日開其色當如餛糖可日食
二塊百日後肌體潤澤服一年後可夜視物久久
食之腸化為筋可延年耐老面若童顏

本草茯苓補五癆七傷安胎暖腰膝開心益智
止健忘忌醋及酸物

補骨脂煎唐鄭相公為南海節度七十有五越地

合書三 四十一

單濕傷於內外衆疾俱作陽氣衰絕乳石補益之
藥至端不應有訶陵國船主李摩訶獻此方經七
八日覺其功神驗自爾常服之其方用破故紙十
兩揀洗為末用胡桃肉去皮二十兩研如泥即入
前未更以好煉蜜和勻如飴盛瓷器中旦日以溫
酒化藥一匙服之不飲酒者溫熱水化下彌久則
延年益氣悅心明目補係筋骨但禁食芸薹羊血
五味子煎五味子紅熟時採得蒸爛研取汁去子
熬成稀膏量酸甘入蜜再火上待蜜熟俟冷器中

貯作湯肺虛寒人可化為湯時時服作果可以寄遠

五味皮肉甘酸核中辛苦有鹹味此則五味具也移門子服之十六年色如玉女入水不露入火不灼

本草云主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益精養五藏除熱生陰中肌入藥生曝不去子

薄荷煎消風熱化痰延利咽膈清頭目

龍腦薄荷葉一斤

川芎

三兩

桔梗

五兩

甘草

四兩

防風

三兩

縮砂仁

一兩

右為末煉蜜為劑此藥看之甚可忽用之大

有功倉卒之中亦可應手解利

治遍身麻痺百節酸疼頭昏目眩鼻塞腦痛語言聲重項背拘急皮膚瘙癢或生癰瘡及治肺熱喉腥脾熱口甜膽熱口苦又治鼻衄嘔血大小便出血及脫着傷風并沐浴後風並可服之

兩眼暴赤腫痛可以生薄荷取汁更調此藥令稀貼兩太陽臨睡更貼上下兩眼臉次日即散

治腸風下血可用此藥二貼和雪糕圓如梧桐子大作二服空心熱水下即止

麥門冬飲東坡詩云一枕清風直萬錢無人肯買此窓眠開心暖胃門冬飲知是東坡手自煎

本草云麥門冬根上子也安魂定魄止渴肥人治心肺虛熱并虛勞客熱頭痛亦可取苗作熟

水飲之

陶隱居云以四月採冬月作實如青珠根似穢麥故謂麥門冬以肥大者為好用之湯澤抽去不爾令人煩

甘露飲常服快利胃膈調養脾胃快進飲食

乾錫糟頭

六分

生薑

四分

淨洗

和皮

右相拌搗爛捏作餅子或焙或曬令乾每十兩用甘草二兩炙同碾羅為末每服二錢入少鹽沸湯點不拘時候

此方專治翻胃嘔吐不止飲食減少常州一
富人病翻胃往京口甘露寺設水陸泊丹岸
下夢一僧持湯一杯與之飲眾猶記其香味
便覺膏膈少快早入寺知客供湯乃是夢中
所飲者膏膈尤快遂求其方修製數十服後
疾遂瘥名曰觀音應夢散予得之常以待賓
易名曰甘露飲在臨汀

一書更旋愈切勿忽之

糯米糕 治小便數用純糯米糕一掌大臨卧失

令軟熟啖之仍以溫酒下不能飲溫湯下坐竹良
火待心間空便睡蓋糯米糕能縮水凡人夜飲酒者
是夜輒不尿此糯米之力也

又方有人渴用糯米稈斬去穗及根取其中心
淨器中燒作灰每用一合許湯一椀沃浸良久
澄去滓乘渴頓飲之此亦糯米縮水之力也

杏仁粥

杏仁二兩去猪肺一具去
古用瓦瓶煮粥令熟却將瓷碗放火上炙令熱

以猪肺粥在碗內便瀉粥蓋之更以熱湯抵令
熟後服之大能補肺氣

人參粥

人參半兩生薑半兩

右二味以水二升煮取一升入粟米一合煮為
稀粥覺飢即食之治反胃吐酸水

枸杞葉粥

枸杞葉半斤粳米二合

右二味於石器中相和煮作粥以五味末葱白

等調和食之

燒肝散 治男子婦人五勞七傷膏膈滿悶飲食
無味脚膝無力大腸虛滑口内生瘡女人血氣並
宜服之

肉豆蔻三箇官桂 香白芷 當歸 破故紙

人參 茯苓 桔梗各半

右為末每服四錢半羊肝四兩作片糝藥在上
以紙最後用南粉塗文武火煨熟米飲嚙下

參歸腰子 治心氣虛損

人參

半兩當歸半兩上去芦下共猪腰子一隻

右以腰子用水兩碗煮至一盞半將腰子細切

入二味藥同煎至八分與腰子以汁送下有喫

不盡腰子同上二味藥滓焙乾為細末山藥糊

為丸如梧桐子大每服三五十丸此藥多服為

佳

崑山神濟大師方獻張魏公丞相韓子常知

府閣下服之有效

平江醫者丁御幹謂葛樞密云此藥本治心

書三

氣怔忡而自汗者不過一二服即愈蓋奇藥

也

甲乙餅 治痰喘咳嗽

杏仁一兩去尖牡蠣粉一兩同杏青黛一兩

右研勻入蠟一兩鎔搜丸如彈子大捏作餅每

用一餅合日柿中濕紙裹煨約藥鎔方取出火

毒細嚼糯米飲送下

茯苓麩東坡與程正輔書云舊苦痔疾二十一年
今忽大作百藥不効欲休糧以清淨勝之而未能

令斷酒肉與酪醬菜凡有味物皆斷又斷糯米

飯惟食淡麩一味其間更食胡麻茯苓麩少許取

飽胡麻黑脂麻是也去皮九蒸曝白茯苓去皮

少白蜜為麩雜胡麻食之甚美如此服食多日氣

力不衰而痔漸退又云既絕肉五味只知此麩及

淡麩更不消別藥百病自去此長年之真訣但易

知而難行爾

蘿蔔菜 治酒疾下血旬日不止

生蘿蔔

書三

右一味揀稍大圓實者二十枚留上青葉寸餘

及下根用篋煮取并水煮令十分爛熟薑米浸

醋空心任意食之立止用銀器重湯煮尤佳

羊肺羹 治小便頻數下焦虛冷

羊肺一具羊肉細切

右二味入五味作羹空腹食之

又方

生山芋去皮小豆葉微者

右二味豉汁入五味煮羹食之

又方

生山羊

羊斤削離白切一

右二味以鼓汁煮入五味如常法空腹食之

又方

生山羊

羊斤削離白切一

右拍碎慢火煎酒二升候酒沸旋下山羊入鹽

椒葱白空腹飲之

百合

治肺藏壅熱煩悶

新百合

雨四

右用蜜半盞和蒸令軟時時含一棗大嚥津服

之

黃精餌黃精耐老不飢其法可取甕子去底釜上

安頓令得兩盛黃精令滿密蓋蒸之令氣溜即暴

之第二遍蒸之亦如此九蒸九暴凡生時有一碩

熟有三四斗方好蒸之不熟則刺人咽喉既熟曝

乾不爾朽壞食之甘美補中益氣安五藏潤心肺

輕身延年飢歲可以與老小休糧食療云根葉花

實皆可食之但相對者是不對者名扁精不可食

金櫻子丸補腎秘精止遺泄去白濁牢開鍵神妙

金櫻子

酒乾至一升以下去滓再煎成膏

桑白皮

一兩雞頭粉半兩桑白皮一兩

白龍骨

赤為末

右為末入前膏子搜為丸如梧桐子大空心鹽

湯溫酒下三十九丸如丸不就即用酒麵糊為之

青娥丸 治腎氣虛弱腰痛俯仰不利秘精大益

陽事老人服此顏色還童少年服此行步如飛

破故紙十兩以水淘過用香油炒杜仲六兩

大正兩到如服子白內搗五六十粒下只用

右丸如梧桐子大每服三十九丸空心鹽酒下

此方趙進道從廣州太守處得之久服大有

神效遂作詩一絕以紀其功

十年辛苦疾邊隅造化工夫信不虛奪得風

光歸掌內青娥不笑白豎髮

服椒法

書林陳暉括為之歌

血氣諸方

地黃粥 治婦人血氣不調

生地黃汁二合 粟米一合 粳米二合 訶黎勒炮半兩

鹽花

右以水三升先煮二米將熟次入訶黎勒末地

黃汁鹽花攪勻煮令稀稠得所分二服

猪肚粥 治婦人腹脇血癖氣痛衝頭面熯熯嘔

吐酸水四肢煩熱腹脹

白米二兩 檳榔二枚 生薑一兩半切炒

書三 五十二

右三味粗搗篩以猪肚一枚治如食法去涎滑

納藥於肚中縫口以水七升煮肚令熟取汁入

搜米及五味同煮粥空腹食之

羊肉麴基子 治婦人血氣癖積藏府疼痛泄瀉

小麦麴四兩 肉豆蔻去骨 畢撥為末 胡椒為末 蜀椒去

并開口炒出

右五味拌勻以水和作基子用精羊肉四兩細

切炒令乾下水五升入葱薤白各五莖細切依

常法煮肉以鹽醋和候熟瀼去肉將汁煮基子

空腹熱食之

猪腎基子 治婦人血積久懣冷氣心腹常疼

小麦麴四兩 良薑末 茴香末 肉蓯蓉去皮炙

蜀椒各一兩 猪腎切如雞卵大

右六味除腎外以水和作基子先將腎以水互

挽煮次入葱薤白各少許候腎熟以五味調和

如常法入藥基子再煮令熟分三次空腹食之

半夏撥刀 治婦人症癖血氣口吐酸水

大麥麴四兩 半夏湯洗去屑盡桂枝為末

書三 五十三

右三味同以生薑汁并米醋少許和切作撥刀

熟煮如常法空心食之

妊娠諸病

麥門冬粥 治妊娠胃反嘔逆不下

生麥門冬去心淨洗切碎 白粳米淨淘 薤苳各一合

仁淨洗去 生地黃肥者四兩淨洗切 生薑汁一合

右以水三盞先煮薤苳米薤苳仁二味令百沸

次下地黃麥門冬生薑三味汁相和煎成稀粥

空心溫服如嘔逆未定晚後更煮食之

生地黄粥 治妊娠下血漏胎

生地黄汁一合糯米二合

右先將糯米煮作粥熟後下地黄汁攪調勻服之每日空腹服

陳橘皮粥 治妊娠冷熱氣痛連腹不可忍

陳橘皮湯浸去白一兩 苧麻根刮去土曝乾一兩 良薑末三錢

白糯米擇淨半合

右四味除粳米外搗羅為散每服五錢七先以水五盞煎至三盞去滓入粳米半合鹽一錢煮

作粥食之空心一服至晚更一服

豉心粥 治諸種瘡疾寒熱往來

豉心二合以百沸 茈蒞錢末 桃仁湯浸去皮尖研

三十

右先將豉心桃仁以白米三合水半升同煮為粥臨熟入茈蒞末攪勻食之

阿膠粥 治妊娠胎動不安

阿膠一兩搗碎炒令黃燥為末 糯米

右先將糯米煮粥臨熟下阿膠攪勻溫食之

鹿頭肉粥 治妊娠四肢虛腫喘急脹滿

鹿頭肉半蔓刺子去土 良薑 茴香各半兩

右四味除鹿肉外搗羅為末每服四錢七先將

水五盞煮鹿肉候水至三盞去肉下白米一合

同藥末候米熟下五味調和得所分作三服一

日食進

鯉魚粥 治妊娠安胎

鯉魚一尾治糯米一合 葱二土豉半

右以水三升煮魚至一半去魚入糯米葱豉煮

粥食之

葱粥 治妊娠數月未滿損動

葱三錢 糯米三合

右以葱煮糯米粥食之如產後血運用之亦効

竹瀝粥 治妊娠常若煩悶

淡竹瀝三合粟米三

右以水煮粟米成粥臨熟下竹瀝更煎令稀稠

得所溫食之

苦麻粥 治妊娠胎不安腹中疼痛宜常食

生芋麻根一兩淨洗煮取汁二合

糯米二合大麦麴一合

陳橘皮半兩末

右四味以水同煮為粥令稀稠得所熟後入鹽

少許平分作二服空腹熱食之

鯉魚羹 治妊娠傷動胎氣不安

鮮鯉魚一頭理如食法黃芪炒剉當歸切人參 生地黃

各半蜀椒炒生薑一分陳橘皮湯浸去白一分糯米一合

右九味剉八味令勻細納魚腹中用綿裹合以

水三升煮魚熟將出去骨取肉及取魚腹中藥

同為羹下少鹽醋熱啜汁契極效

黃雞腫 治妊娠四肢虛腫喘急兼嘔逆不下

黃雄雞一隻去頭足及毛腸胃等先淨良薑一兩

桑白皮刮淨剉黃耆揀炒

右四味剉後三味與雞同煮候雞熟去藥取雞

留汁將雞細擘去骨將汁入五味調和入雞肉

再煮令滋味相入了隨性食之不計早晚不妨

別服藥餌

雞子羹 治妊娠胎不安

雞子一兩阿膠一兩

石取好酒一升微火煎膠令消後入雞子并檢

一錢和之分作三服相次食之

山芋麴 治妊娠惡阻嘔逆及頭痛食物不下

生山芋一箇於沙盆內研令芋麻根一握去皮

右研勻入大麥麴三兩和投細切如葦子大於

葱薑羹汁同煮熟旋食之

又方

木瓜一枚大蜜

右二味於水中同煮令木瓜爛於沙盆內細研

入小麥麴三兩投令相入薄捍切為葦子每日

空心用白沸湯煮強半盞和汁淡食之

雞肉索餅 治妊娠養胎藏及治胎漏下血心煩

口乾

丹雄雞一隻取肉白麴

右二味搜麴作索餅和臍任意食之

雞子酒 治妊娠血下不止

雞子五枚

右取好酒一盞同煎如稀錫頓服之未差更作服之以差為度

小豆飲 治妊娠漏胎血盡子死

赤小豆升蜀椒去目并閉口炒烏雞一隻理出汁十四粒此如食法

右三味以水二升同煮令熟取汁時時飲之未差更作服之

葱豉粥 治妊娠傷寒頭痛

豉一合葱白一握去根切生薑一兩半

右以水大盞煮至六分去滓分三服

產後諸病

論曰妊娠者十月既足百骨皆拆肌肉開解然後能生百日之內猶名產母時人將調一月便為平復豈不謬乎若飲食失節冷熱乖理血氣虛損因此成疾藥餌不和更增諸病今宜以飲食調治為良

鮑魚羹 治產後乳汁不下

鮑魚肉半斤細切麻子仁一兩半葱白一莖香豉半合

右先將水三升煮魚肉熟後入後三味煮作羹任意食之

猪蹄粥 治產後乳汁不下

母猪蹄一隻治如食法以水玉瓜根洗水通碎判

漏蘆各一兩

右四味除猪蹄汁外粗搗篩每服三錢匕以煮

猪蹄汁二盞先煎藥至一盞半去滓入葱豉五

味等并白米半合煮作粥任意食之

猪蹄羹 治產後乳汁不下

母猪蹄二隻淨洗木通一兩半

右先將木通以水五升煎取四升去木通和猪

蹄入五味如常法煮羹任意食之

又方

猪蹄一具粳米一合

右用不拘多少入五味煮作羹任意食之作粥

亦得

牛肉羹 治產後乳無汁

牛鼻肉淨洗切

右用水煮爛入五味如常法煮作羹任意食之

鹿肉臙 治產後乳無汁

鹿肉洗四兩

右用水三碗煮入五味作臙任意食之

三肉臙 治產後乳汁不下

龜肉三兩 羊肉三兩 麋肉三兩

右用水不拘多少入五味煮為臙食之

蘇麻粥 治婦人產後有三種疾鬱胃則多汗汗

則大便秘故難於用藥惟此粥最佳且穩

紫蘇子 大麻子各半 治風清頭目藥

右此粥不獨產後可服大抵老人諸虛久風秘

皆得力嘗有一貴人母年八十四忽腹滿頭疼

惡心不能食醫家供補脾進食治風清頭目藥

數日疾益甚懇子辯之子曰誤矣此老人風秘

藏府壅滯聚胸中則腹脹惡心不喜食至顛頭

痛神昏如得藏府流暢諸疾悉去子進此而氣

洩下結糞如胡椒十餘少間通利諸證悉去

詩學

茯苓粥 治產後無所苦欲睡而不得睡

白茯苓去黑皮取 粳米一合

右二味以米淘淨煮粥半熟即下茯苓末粥熟

任意食之

地黃粥 治初產腹中惡血不下

生地黄汁五兩 生薑汁二合 粳米三合

右先將米如常法煮粥臨熟下地黃及生薑汁

攪令勻空腹食之

紫萸粥 治產前後赤白痢

紫萸葉一握 粳米三合

右先以水煎萸葉取汁去滓下米煮粥空心食

之立瘥

滑石粥 治產後小便不利淋澀

滑石半兩 瞿麥穗一握 粳米三合

右以水三升先煎瞿麥取二升半濾去滓得汁

入米煮如常粥將熟入鹽少許葱白三寸方入

滑石末煮令稀稠得所分作三度食之

平四粥 治產後七日後宜食此粥

白羊肉大脂膜切 粳米淨淘 生地黃汁三

桂枝大粗皮切

右以水煮肉并米熟後入地黃汁并桂末令得所以五味調和空心任意食之

猪腎粥 治產後寒熱狀如瘧

猪腎六脂膜切 香豉合 白粳米 葱三莖切

右四味以水三升煮猪腎豉葱至二升去滓下米煮如常法以五味調和作粥食之未瘥更作

黃雌雞飯 治產後虛羸補益

黃雌雞一隻去毛及腸肚 生百合淨洗 白粳米飯

右將杭米飯百合入在雞腹內以線縫空用五味汁煮雞令熟開肚取百合杭米飯和雞汁調和食之食雞肉亦妙

黃雌雞羹 治產後虛損

黃雌雞一隻肥者 葱白五莖 粳米半

右三味依常法以五味調和為羹任意食之

猪肚羹 治產後積熱勞極四肢乾瘦飲食不生

猪猪肚一件淨洗先以小麥煮令半熟取出肚細切令安一處 黃耆半兩

人參三分 粳米三合 蓮實剉碎

右以水五升煮猪肚入人參黃耆蓮實候爛瀝去藥并肚澄其汁令清方入米煮臨熟入葱白

五味調和作粥任意食之

鯽魚羹 治產後乳無汁

鯽魚一斤 蟬蛸五箇

右依常法煮羹食後食之

鯽魚鱠 治產後白痢

鯽魚一斤治法 蔣蘿 陳橘皮湯浸 蕪荑

乾薑炮 胡椒各一錢

右取鯽魚作鱠投熟豉汁中入鹽藥末攪調空腹食之

脯雞糝 治產後心虛忪悸偏身疼痛

黃雌雞一隻去毛頭足腸胃淨洗以小麥兩合

蜀椒去目并閉口炒 茈胡一錢 乾薑半錢 粳米三合

右先取水再煮雞及米令爛入葱薤椒薑茈胡末等次入五味鹽醬取熟任意食之

猪腎 治產後風虛勞冷百骨節疼身體煩熱

猪腎一對去脂羊腎一對去脂

右以五味并葱白豉為臠如常食之不拘時

冬爪撥刀 治產後血壅消渴日夜不止

冬爪研取汁小麥麴兩地黃汁合

右三味一處搜和如常麴切為撥刀先將獐肉

四兩細切用五味調和煮汁熟後却瀉去肉取

汁下撥刀麴煮令熟不拘多少任意食之

煨猪肝 治產後赤白痢腰腹痛不能下食

猪肝四兩蕪荑

右將猪肝薄切糝蕪荑末於肝葉中五味調和

以濕紙裹煨火煨熟去紙食

生藕汁飲 治產後惡血不利壯熱虛煩

生藕汁各半地黃汁各半蜜一匙淡竹葉一握切以水一盞半

煎取汁

右四味同煎沸熟溫分三服日二夜一

又方 治婦人蓐中好食熱麴酒肉變成渴燥

生藕汁 生地黃汁各半

右二味相和溫暖分為三服

小兒諸病

四米湯 治小兒泄注

梁米 稻米 黍米各三蠟如半理

右以東流水二升煮梁米三沸絞去滓以汁煮

稻米三沸去滓用汁煮黍米三沸絞去滓置蠟

於汁中候蠟消每服半合空心午後各一隨兒

大小增減

牡丹粥 治小兒癖癥病

牡丹葉 漏蘆各一兩決明子各一兩

雄猪肝研去筋膜切

右以水三升煎前三味去滓取一升半入猪肝

及入粳米二合煮粥如常法空腹食之隨兒大

小加減

扁豆粥 治小兒霍亂

扁豆莖切人參二兩

右以水二升先煮扁豆莖令熟下人參煎至二

升去滓取汁煮豆米三合為粥與乳母食隨乳

兒時先將去少許冷乳汁熱後乳母當食此乳

佳
猪子肚 治小兒久痢

猪子肝

右切作片炙熟空心食之

雞子餅 治小兒秋夏中暴冷忽下痢腹脹作寒

乍熱渴甚

雞子二枚 胡粉半兩 炒黃蠟一錢

右先下黃蠟於餅子內微火上鑊次下雞子黃

卷三 六十五

及胡粉調和候冷作餅與兒空心午後食之

兒大小增減

牛乳飲 治小兒噤

牛乳一合 生薑汁一合

右於銀器中慢火同煎至六七沸一歲兒飲半

合仍量兒大小以意加減

甘草豆方冬月小兒解諸熱毒老人亦宜服之

大黑豆三升 甘草三兩

右用水六升煮令爛熟時以三五卜顆與小

兒食之汁亦可服又可用已煮過黑豆入香

對證用藥賦



夫人之深愛莫過其子醫學之難無如小兒痛楚不能言說憑醫診察須知醫乃精通妙理方知萬法千機一藥一病莫令毫髮差殊且如初生嬰兒臍風撮口天麻九保命丹胎驚同用夜啼腹痛藥藤膏當歸散能醫咳嗽傷風痰熱抱龍丸則可便青兒乳驚瀉暖驚餅何疑驚癇急慢長生餅保安丹速効怪怪散治變蒸發熱參蘇飲療停食

感冒羌活散發散四時風寒化滯九疎利三焦消導紫霜九化乳癖聖藏定命丹治胎風天吊止瀉俱作霍亂之疾矣天中暑玉液五苓甘露脾虛吐瀉補脾助胃香橘布袋丸治疳積腹大疳癰十全丹療癖痞四肢瘦瘠九子消腹腹脾瘕萬金九治痺黃久積眼赤肝熱瀉青丸亦治急驚目窵心神驚悸鎮心丸兼療發熱驚啼下痢赤白者新久而用按逆導氣疎通轉下方量大小宜風通腦相宜賦脫肛者服豆蔻九托赤石脂散小便澀

秘方導赤散八正散葱艾熨臍丹瘡毒溜眼化毒丹用鍼砭血重舌喉閉吹喉散絳雪尤奇平旦忽發驚搐切防瘡疹無事惺然驚叫是祟物客忤於兒頭面瘡癩方貼金華散服消毒飲鼻疳停耳方紅綿散月蝕散等藥扶持牙疳齒腐青金散磨脾胃傷虫動安虫散化虫丸慎食肥膩肺寒痰嗽風散散半夏丸服而自愈感冒傷寒清解散涼肌餅表和解攻裏柴胡湯用有日期咳嗽痰涎鈎輪化痰丸南星丸即止馬脾風風吹肺脹奪命散無價散涎喘皆除痰食俱作玉餅子葱白湯下口瘡瘰癧倒聖散敷貼脚底顛癰鼻塞通關膏貼顛即通驚風牙禁定搐散可審安危昇發瘡疹先使升麻乾葛透肌活血當用紫草參耆裏實者氣勾紅活裏虛者助裏涼肌用溫藥又防咽味之燥寒施涼劑恐怕裏脫而寒虛天麻防風九善療驚風驚熱心熱青州和蘇合能醫吐瀉後而生慢脾若下風痰破石奪命丹乃為劫劑病頗無度水養水香丸

神効不非臆冷鼻淵方次二黃散眼辛美散府眼
雀目方灸鼻準服夜明丸顯耀良醫行邊五軟展
茸九地筋補髓解頰頤陷也黃九頃腦滋基龜膏
肺聖百合丹疎痰定喘龍龜背灸肺腧而脊點
龜尿驚狂神亂諸心丸寧心膏安神定志癩癩健
妄寧志膏蝎虎先待用無遺妙法奇方起嬰孩之
痼疾俗言俚句諸賢明而改殊無大意之包含慈
誠心而拯濟

○ 辨小兒稟賦虎口三關脈理論

詩云天生蒸民有物有則民之秉彜好是懿德孔
子曰為此詩者其知道乎夫天地之中惟人為貴
稟茲父母二儀而成胚胎四肢百骸皆賤富貴疾
痛壽夭皆自先天根基而生且如嬰兒誕離母腹
形體壯弱則知見之有疾無疾其兒受胎骨大而
肉瘦聲清而目正其子少病而壽永其若胎肥而
骨細聲啞而目無神光其子必多病而不壽是以
烈女傳曰古者婦人妊子腹不側坐不遠立不暉
不食邪味目不觀邪色耳不聽淫聲誦詩書道正

蓋如此則生于形容端正才貌過人近世醫流治
病探源不知根本未明脈理以小兒難醫於大人
疾病病瘳言不難辨選醫診察辨明虎口三關雖
一指脈脈和云小兒三五歲當診八至脈又云一
歲變蒸已足方有脉自寸口而生愚見嬰兒初生
未滿一月手掌高骨之際亦有脉息吸及而動脉
者氣血之波瀾既主乃成人必有氣血焉得無脉
只不比大人察其端酌之意也診小兒之脉洪則
為實濡則為虛緊則為風緩則為積數則為熱遲
則為寒亦有虎口三關紋理兩手食指本節為風
關中節為氣關第三節為命關其紋曲直不同如
紋只在本節病易治透過中節而兩重過第三節
難治驚則紋青淡紅則寒熱在表淡紅必主傷寒
痘疹紋亂則病久紋細則腹痛多啼乳食不消紋
直刺指甲必主驚風惡候紋黑如墨必困重難
治此乃坤室功方之一端也又有吐瀉驚風風痰
積疳等症種種難辨於此論各分門類編

初生方

拭穢法 嬰兒在胎口中有惡物纔生候啼聲未
出急用軟帛或綿裹手拈蘸黃連草汁拭口惡
汁稍定更以蜜少許調硃砂末一字抹入口中或
牛黃細末少許鎮心安神解惡物之毒一生免瘡
豆之患妊婦臨月預辦之

刺泡法 小兒纔生下即死用此法可救活急看
見口中懸癰前脰上有泡以手指搗破用帛捏拭
血令淨若血入喉不可治

書四

五

回氣法 初生氣欲絕不能啼者必是難產或胃
寒所致急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶且將
胞衣置炭火爐中燒之仍作大紙撚蘸清油點着
於臍帶上往來遍帶燎之蓋臍帶連兒臍得火氣
由臍入腹更以熱醋湯盥洗臍帶須臾氣回啼泣
如常方可浴洗了却斷臍帶

通便法 初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦
人以溫水漱口了吸嘔兒前後心并臍下手足心
共七處每一處凡三五次漱口吸嘔取紅赤為慶

頭火自通不爾無生笑有此證遇此法可謂再生
奇方 治初生下遍身無皮方但是紅肉宜速以
白早米粉乾撲候生皮方止

治生下通身如魚泡又如水晶碎則成水腫
右用蜜陀僧研細羅羅過乾糝仍服蘇合丸

治七日腎縮乃初生受寒所致

右用硫黃葉莖各半兩末研大蒜調塗其腹仍
以蛇床子微燒熏之

書四

辰砂膏 治眼閉口噤啼聲漸小舌上聚肉如粟
米狀吮乳不得口吐白沫大小便皆通蓋由胎中
感受熱氣流於心脾故形見於舌或為風邪擊
持致之

辰砂 錢三 鵬砂 馬牙硝 錢半 女明粉 錢全 竭
真珠末 錢各一 生麝香 字一

右為末好油紙封裹自然成膏每服一豆粒許
用乳汁調付乳頭上吮下金銀薄荷湯調亦可
白潮橘月草湯眼

泥初生七日口集

右用牛黃一錢細研以竹瀝調一字灌之以猪乳點於口中

立聖散治臍風撮口

蜈蚣一條酒浸曬麥餅煨稍去毒直僵蚕七箇

右為末每服一字吹入鼻啼則可醫仍服薄荷調一字服

麝香丸治鎖肚撮口

赤脚蜈蚣一條麝香細川烏三箇

右為末每服半字金銀器湯調下

去臍散治臍中汁出或赤腫痛或因水與乳入臍所致

右當歸為末傅蝦蟇燒灰白石脂末油髮灰傅時可

僵蚕方 治面目黃赤氣臭喘急啼聲不出蓋由

胎氣挾熱流毒心脾故令舌強唇青口撮飲乳有妨

右用直僵蚕二枚去嘴畧炒為末蜜調傅唇中

効

蝎梢散 治胎風及百日內撮口臍風

右用蝎梢四十九箇每一箇用薄荷葉捲定以綿扎放砂鉢中裏轉炒令薄荷乾酥為度再用

白僵蚕四十九箇生薑汁炒乾去絲嘴同為末更以腦子生麝香少許研勻紫雄雞肝二片煎湯調下

奇方 治初生不飲乳及不小便

右用葱白一寸四破之以乳汁銀石器煎灌之

立効

又治初生口噤不開不飲乳

右用赤足蜈蚣一條去足炙令焦細研如粉每用半錢以猪乳汁二合和勻分三四次灌之

茯苓丸初生兒拭口不前惡穢入腹腹滿短氣不飲乳

赤茯苓杜川黃連等分

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服一九乳汁調灌下

川白薑散 治產婦取冷太過胎中受寒兒腹痛
不飲乳

木香 陳皮 檳榔 各一分 官桂 川白薑

甘草 各半

右剉每取一捻水一合煎以綿蘸與之啞加木

瓜丁香

龍膽湯 治孕婦被惡祟導其腹中令兒病也其
證下利寒熱去來毫毛鬚髮不悅憚及治婦人有
兒未能行時復有孕使兒飲此乳亦作此病

言四

九

龍膽草 北柴胡 去蘆 黃芩 桔梗 鈞藤皮

芍藥 甘草 各一分 茯苓 錢半 蟬蛻 枚二 大黃 紙裹

右剉散以水一升煮取五合為一劑十歲以下

兒皆可服若兒生一日至七日分一合為三服

八日至十五日分一合半為三服生十六日至

二十日分二合為三服二十日至三十日四十

日盡以五合為三服皆以得下即止此劑為出

腹嬰兒所作若日月長大者以次依此為例必

知容許及有鬼氣可以加人參當歸各二錢半

一百日兒加一錢一字二百日兒加二錢半一
歲兒加半兩餘准此

異方小兒初生無穀道者蓋由妊婦恣情所欲過
食煎煔之物生子穀道無穿急用銀簪看其端的
刺透用油熬潤塞又合之用火鍼刺之不可深
治胎風驚癇日久潮搐不省欲絕者服此方可再
甦

用新生嬰兒胞衣中水盛瓶中封裹埋地下遇
用取出傾一蜺殼入蜜少許或入硃砂末一字

書四

十

灌下即甦効不可述

變蒸 變蒸論

論曰變者易也蒸者熱也天地生萬物春萌夏秀
秋實冬藏人之生也亦皆如此夫小兒變蒸之理
如花之易苗木之秀實是以三十二日一變六十
四日一蒸一歲之週十變俱足筋骨完全匍匐能
行且言初變之時口唇之上人中之下起白泡如
珠乍寒乍熱驚悸不寧此初變脾氣生也乳乳噴
噴寒熱毛聳此二變肺氣生也體熱汗出煩躁怕

人此三變心氣生也晴青多睡露睛怒啼便
青此四變肝氣生也耳熱涎流發熱項骨強番身
此五變腎氣生也或喜或悲或驚或熱獨坐手能
握物此六變掌骨生也喜笑認人怕驚少睡此七
變精神備也腸鳴啼叫護乳臉澤肌潤此八變血
脉充也嬉戲匍匐發渴聽聲此九變筋骨全也學
語倚立扶步能食此十變臍骨堅也氣血盛者迎
暮而行氣血衰者不拘歲月此變蒸之太畧也又
有行遲語遲五軟五硬方論于後

書四 土

惺惺散退變蒸及溫壯熱宜服之

人參 白朮 伏苓 甘草 天花粉 桔梗

細辛各等分

右為細末生薑薄荷葉煎湯調下

人參散治變蒸骨熱心煩啼叫

人參 甘草 麥門冬心北 柴胡各二錢 龍膽草

防風各一錢

右剉散每服三字水一盞煎服

當歸散治變蒸有寒無熱

當歸二錢 木香 辣桂 甘草 人參各一錢
右剉散每服一錢水一盞薑三片紅棗一枚煎
食前服

調氣散 治變蒸吐瀉不乳多啼

木香 香附炒去毛 厚朴去蘖皮 人參 藿香

橘皮 甘草炙各一錢

右剉散每三字水一盞生薑三片棗一枚煎溫
服以上證狀治之但當以平和之劑微表熱實
者微利之或不治亦當自愈

書四 土

紫霜丸 治乳哺失節宿滯不化膏膈痞滿嘔吐

惡心便利不調乳食減少又治傷寒溫壯內挾冷

食大便酸臭乳食不消或已得汗身熱不除及變

蒸發熱多日不解因食成痢先寒後熱並宜服之

代赭石火煨醋 赤石脂各一兩 巴豆三十粒 杏仁

五十箇去尖麩炒同巴豆切

右為細末湯浸蒸餅丸如黃米大兒生三十外

可服三九一歲至三歲並服五九至十九乳汁

送下米飲亦得微利為度亦不虛人未利再服

更量虛實加減乳食後服

吐論 附中暑霍亂

經云脾虛則吐胃虛則瀉脾胃不和陰陽不順清濁相干或外感風寒之氣內傷生冷飲食致令脾胃不調嘔吐不食亦有冷熱二證夏月中暑發渴引飲霍亂吐瀉此為熱證可用五苓香薷等藥治之一有傷食停積胃膈秘悶腹肋脹滿痛此是因傷粘膩難消之物滯於中脘不上不下但食即吐面色青白發熱四肢逆冷此病不可便投止吐之

卷四

十三

藥當先取積消導寬利胃膈次用調脾和胃止吐更量虛實勿令傷脾吐多體軟虛極生風傳為慢脾因茲大橫者有之用藥之際務在熟察

藿香玉液散 治小兒霍亂吐瀉脾胃虛弱

藿香 丁香 各五 滑石 一兩

水煎食前溫服或為末空心米湯調下大小歲數加減

藿香正氣散 治停食感冒頭疼寒熱中暑濕霍

吐瀉

大腹皮 白芷 茯苓 紫蘇 各二兩 藿香 二兩

厚朴 白朮 陳皮 苦梗 半夏 甘草 各二兩

半兩

右咬咀薑棗煎服食前

白朮散 治小兒脾胃久虛嘔吐泄瀉頻併不止

人參 白朮 木香 藿香 白茯苓 甘草

各半 乾葛

右咬咀水煎不拘時 一方加黃芪白扁豆各

清暑六和湯 治伏暑氣不升降吐利飲食不進

卷四

十四

縮砂 半夏 杏仁 人參 甘草 各五 茯苓

白匾豆 木瓜 藿香 香薷 厚朴 各二兩

右咬咀生薑紅棗煎食前溫服

桂苓甘露飲 治中暑煩渴吐瀉

赤茯苓 澤瀉 各一兩 寒水石 石膏 各二兩

滑石 五兩 白朮 官桂 猪苓 各七錢

右咬咀水煎不拘時或為末白湯調服亦得一

方用甘草名桂苓白朮散

香薷五苓散 治中暑霍亂吐瀉

香薷 扁豆 厚朴 甘草 猪苓 白朮

茯苓 澤瀉 官桂 試用 加藿香

右咬咀水煎食前溫服

十味香薷飲 治脾胃不和乘胃暑氣心腹膨悶

飲食無味嘔噦惡心五心煩熱力乏體倦消暑健

脾進食

香薷 人參 白朮 陳皮 茯苓 黃耆

厚朴 木瓜 扁豆 甘草

右咬咀紅棗煎一方加藿香名藿茹湯

書

軟紅丸 治大人小兒冷熱不和吐逆不定煩躁

吐瀉不止霍亂

明信砒 明礞砂 乾胭脂 肥巴豆 去油

右研勻溶蠟二錢入油七點和旋丸大人菜豆

大小兒麻子大每服三四丸槐花甘草湯冷下

食前一服定效如神

觀音散 治小兒外感風冷內傷脾胃區逆吐瀉

不進飲食久則漸漸羸弱大抵脾胃虛則瀉胃虛則

吐脾胃俱虛吐瀉不已此藥大能溫養脾胃進美

散

人參 茯苓 神麴 二綿 白朮

木香 白朮 白朮 甘草 炙

右為細末每服一錢水一盞棗一枚藿香三葉

煎四分六澤溫服量兒大小加減一方加全蝎

羌活天麻防風名全蝎觀音散治吐瀉後慢脾

風

藿香半夏散 治胃虛中寒停痰留飲噦逆嘔吐

胃滿噎痞短氣倦怠不食飲食

書

丁香皮 用丁香如無藿香葉 一半夏 湯浸洗七次

右為散每服二錢水一盞生薑七片煎七分去

滓溫服

木瓜丸 治小兒初生惡物未下嘔吐黃汁

木瓜末 麝香 臍粉 木香末 檀榔末

字

右用研麴糊丸小黃米大每服一二丸甘草水

下無時

聖藥 治霍亂吐瀉

人參半丁香半大南星二白茯苓半砂仁四

同治霍亂吐瀉 白木半甘草半

古未生薑冬瓜子煎大小以意加減

勻氣散 治霍亂吐瀉

藿香葉 白豆蔻人參以上各半木香 丁香

乾薑一分甘草一分厚朴一分薑

右末薑棗湯或紫蘇木瓜湯點服

燒鍼丸 治小兒吐瀉

白礬二錢黃丹二錢

右二味同研極細煮棗肉為丸如芡實大每服

一丸用大鍼挑藥於燈焰上燒存性用米泔或

冷水化下空心服

瀉論 附脾胃

論曰小兒臟寒腑冷大腸不禁總謂之瀉分別輕

重究竟緩速有瀉有泄有滑有利有洞五者不同

豈可一藥而理之糖者糟粕不聚由其尚微似瀉

非瀉泄者無時不作或出不知利者直射滅溜氣

中脫滑者穀食直通腸胃不化洞者噴然下之

如桶散潰餘更不留即知其兒臟寒腑冷瀉之疾

作其來緩速輕重可知凡兒瀉糞出青色者蓋脾

受肝經所制肝屬乙木能剋已土所勝之功故現

本質由其臟之虛寒非謂驚也又瀉初黃良久變

青色乃臟寒之故又瀉藥物直過尤為寒滑凡虛

滑三五次即困乏若不急與溫其臟調其胃平順

三焦和正榮衛不爾即慢驚證候傳變如此之急

欲以止瀉藥次第理之性性不及惟務溫其臟腑

臟腑既溫寒何能留於腸胃之間或以熱藥頓止

到熱反為他疾須先投帶溫而然後生胃正氣與

服切不可意急過劑投之熱藥稍或臟腑至虛寒

孩童困乏四肢厥冷者是謂逆證當用附子人參

白朮乾薑即量輕重而用凡投熱藥瀉止即刺作

無疑理瀉良方已著在後請意度之

香橘餅子 治傷食泄瀉妨脾不化

木香一分青皮一分陳皮一分厚朴三分神麩一分

砂仁半兩 錢五

右為末煉蜜為丸如芡實大捏作餅子溫水化下米飲亦可空心一方加肉豆蔻呵子

補脾散又名益黃散 治脾胃虛寒泄瀉吐逆

陳皮兩 青橘皮兩 呵子肉兩 甘草半兩 切炒丁香錢二

右為細末每服二錢水一盞煎至六分食前溫服

和中散和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛思食

人參切去 白茯苓 白朮 甘草 乾葛

黃耆 白蘆豆 藿香葉各等分

右為細末每服二錢棘二箇薑五片煎食前溫服

調中丸

白朮兩 人參兩 甘草兩 乾薑四錢 炮

右為細末蜜為丸如棗豆大每服三九至五七

九至三二十九食前溫水送下

肉豆蔻丸 治小兒水瀉滑腸赤白痢瘡瘡泄瀉

木香 縮砂仁 白龍骨兩 呵子肉兩 赤石脂

七錢 枯白礬半 肉豆蔻半

右為細末調麝香為丸如黍米大一周歲兒每服三五十九三歲兒服百丸溫水飲下瀉甚者

異功散吞下瀉止住服不止多服

加減四君子湯 治脾胃虛弱泄瀉等疾

人參 白朮 茯苓 甘草

右咳嗽薑棗煎食前服如有別證可依後方加

減吐利四肢厥逆顛倒低陷加藿香葉 丁香

治脾胃虛弱生肌 加土夏麵炒沒石子

等分為細末一七分盛入冬瓜子少許同煎

治傷風身熱頭痛 加川芎防風 等分

細辛 羌活 甘草

發渴加乾葛 枇杷葉去毛 桑白皮同許

治驚啼手足瘳瘳睡卧不安加全蝎去尾

釣藤 白附子等分

痰涎咳嗽加杏仁湯泡去 半夏麴 桑白皮同許

赤白痢加芍藥赤當歸

白痢加乾薑煎

泄瀉加陳皮 厚朴 加減用之

銀白散 治小兒百病如慢驚搐搦用麝香飯飲

調下急驚定後用陳米飲調下驚吐不止丁香湯

調下天柱倒脚軟濃米飲調下夾驚傷寒薄荷葱

白湯調下疳氣肚脹氣急多渴百合湯調下渾身

壯熱面赤驚叫合銀薄荷湯調下赤白痢不思乳

食薑錢三片菓子三枚煎湯調下喫食不知饑飽

不長肌肉炒麥牙一撮同生薑煎湯調下暴瀉紫

蘇木瓜湯調下神形脫言語不止及大人吐瀉瀉

香湯調下諸病後無精神少氣力不思食煎生薑

棗湯調下稟受氣怯小兒可每日一服最妙

升麻 知母 甘草 炙山藥 白礬豆 炒人參

茯苓 白朮 各等

右為細末每服一錢湯使如前常服沸湯點不

計時

異功丸 消暑生津治渴止吐瀉

澤瀉二錢 猪苓二錢 茯苓三錢 官桂半兩 茯苓三錢

白朮半兩 人參半兩 辰砂半兩 研

右末煉蜜為丸如芡實大或夏出路轎裏含化

免與水妙若小兒夏月心熱煩渴飲引煎燈心

竹葉湯化過渴投之即止

助胃膏 治小兒胃氣虛弱乳食不進腹脹滿

腸鳴泄瀉乳便青或時夜啼胎寒腹痛

白豆蔻仁 肉豆蔻 丁香 人參 木香 各

白茯苓 皮 官桂 白朮 藿香葉 縮砂仁

甘草 炙橘紅 白朮 各四

右為細末煉蜜或膏每服如雞頭實大一丸

量兒大小加減米飲化下不拘時候

等住丸 治瀉瀉并一切瀉痢立効

當歸 硫黃 牡蠣 木香 各半

右為末麵糊丸粟米大每服二七丸糯米飲入

姜汁一二滴送下

驚 驚論 附心熱

經云神清則心寧心熱則驚惕怔忡煩躁小兒氣

血未充神魂未具不可令見異相之物及厲聲觸響則令子心血虛耗驚邪入於包絡又被寒暑相侵倏忽發熱有熱者必生痰痰熱既有必發驚搐若不速治傳變驚風後項方法審其緣因輕重較量加減用之

金箔鎮心丸 治小兒風壅痰熱心神不寧驚悸煩渴唇焦煩紅夜卧不安謔言妄語

紫何車 二錢用黑豆煮軟切 山藥 一兩 牙硝 一錢 甘草 五錢 茯苓 五錢 硃砂 一兩 人參 五錢 龍腦 一錢

麝香 半錢 金箔 半錢

右為細末煉蜜為丸每一兩半作五十九以金箔為衣每服一丸薄荷陽化下含化亦得食後臨睡常服安鎮心神散敗邪熱涼咽膈止驚啼寧心膏 治小兒驚熱煩躁心經不寧

人參 白朮 茯苓 山藥 羌活 龍腦

硃砂

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一丸薄荷湯化下不拘時服

暖驚餅子 治小兒嘔乳便青如辨不化胎寒腹痛

人參 辰砂 赤石脂 白朮 麝香 乳香 茯苓 右為細末煉蜜為丸如雞頭大捻作餅子每服一餅薄荷湯化下

牛黃涼驚丸 治驚熱

龍腦 防風 青黛 釣藤 牛黃 麝香 黃連 龍腦

右同研麪糊為丸粟米大每服三五丸至一二十丸煎金銀湯送下溫服

鎮驚保安丹 專治驚風大能去風痰開發之劑

南星 一兩用生薄荷 大半夏 川芎 白姜 各五錢用生薄荷 辰砂 白附 炮麥門冬 金蝎 薄荷葉 炙 天麻 各半 麝香 錢一

蛇黃 四兩火煨無灰數細研

右為細末糯米粉煮成餅和作劑為此樣保安丹錠兒水磨服薄荷湯亦可

牛黃通膈九利心經積熱治大小便不通

大黃兩一木通錢五牽牛取頭末

右為細末滴水為丸如麻子大每服三十九至五十丸白湯送下不拘時

五福化毒丹 治驚熱涼心膈治小兒蘊積毒熱

驚惕狂躁煩赤咽乾口舌生瘡夜臥不寧譫語煩

渴頭面身體多生瘡癰

玄參焙乾桔梗兩各甘草半錢麝香許少牙硝過青

黛研人參兩各茯苓半兩金箔銀箔各八片

書四

王五

右為細末入藥研煉蜜為丸每兩作十二丸一

歲兒一九分四服薄荷湯化下及瘡疹後餘毒

上攻口齒涎血臭氣生地黃自然汁化一九用

翎掃在口內熱痺肌肉黃瘦雀目夜不見物陳

粟米泔化下食後臨臥服

驚風散 治小兒一切急驚風

礬五大全四 雄三蟾五分 硃粉天竺黃

牛腦麝香亭 已上各一錢 更加三箇金

每服一字許 專治緊急驚

礬金五錢大黃 全蠍各四蟾酥五錢雄黃三錢硃砂

輕粉 牛黃 天竺黃 龍腦 麝香各一錢

金箔三箇

右為細末每服量兒大小加減一歲一字許金

銀薄荷湯調下不拘時服

寧赤散 治心熱小便不利

生乾地黃焙木通 甘草已上各

右同為末每服三錢水一盞入竹葉同煎至五

分食後溫服黃一本不用甘草用一方有

書四

王五

清寧散凡驚熱出於心肺須從小便利之

桑白皮炒葶藶炒赤茯苓 梔子仁等

車前子同上甘草半錢

右為末每服半錢薑棗煎服

奪命散 治小兒急慢驚風諸藥不効者此服

見効

白附子 黑附子地黃南星 地天麻 半夏湯

七防風 麻黃 硃砂研全蠍新薄荷葉

度麝香錢五

右為細末三歲服一錢生薑薄荷調下不拘時
候急驚加輕粉慢驚入酒調

治小兒大小便不通此心經積熱也

甘草木通梔子仁等分水一大盞燈心三葉連
鬚葱白七根煎半盞食前溫服

全蠲散 治小兒驚風中風口眼喎斜語言不正
手足便廢不舉

全蠲炒去毒 僵蚕去絲 川芎 黃芩

甘草 桂枝 赤芍藥 麻黃錢各二 天麻錢六

天南星錢三

右咬咀水一盞生薑七片煎不拘時服忌羊肉

疳 疳論 附丁奚哺露

小兒有五疳疳者乾瘦也如大人癆瘵一體五臟
有五種疳心疳者發熱面赤弄舌自汗驚悸煩躁
作渴引飲此病皆因心虛血弱神不守舍以此致
之治法可寧心退熱滋榮養氣清涼藥餌調理肺
疳者潮熱咳嗽痰喘嚔膿血鼻乾毛聳此病或
因傷寒傷風汗後勞復飲食鹹冷辛酸之物傷損

肺氣致使然也與勞證同治法先退其熱後平其

肺止嗽化痰調養用滋潤不燥之藥治之脾疳者

皆因飲食傷脾愈而復傷脾氣孤弱黃瘦面腫目

黃腹大洩瀉癖痞肚疼焦熱多睡噉煎此乃脾疳

之證治法磨積退黃和脾胃進飲食等藥治之肝

疳者多因胎患而得掃眉削眼脇痛便青體冷筋

寒唇紫目眦眦淡睛青遺白此乃肝之疳也治法

涼肝活血順氣補脾調飲食等藥治之腎疳之證

腎虛耳輪焦黃煇煇發熱疳氣奔上焦邪熱薰蒸

陽明之經則齒腐齲爛臭穢甚則齒落俗謂之走

馬疳此病多因痘疹後而生或多食甜膩之物而

得之治法用清涼肌表消毒退疳散熱之藥治之

又有蛔疳脊疼腦疳乾渴疳瀉疳痢腫脹疳勞

無辜疳丁奚哺露其病多因乳哺失常腸胃停滯

津液內竭故其為候頭皮光耀毛髮焦希頭縮鼻

乾口淡唇白兩眼昏眵採鼻掃眉春聳體黃聞甲

咬牙焦渴自汗漩白瀉酸肚脹腸鳴痞結潮熱或

身多瘡癢酷嗜瓜果鹹酸炭米泥土皆真證也

五洲消食丸 治小兒五疳八痢殺腹藏蟲治疳
勞及走馬疳牙齒唇爛肚大青筋此藥大能進食
悅顏色長肌膚

麥蘖 使君子去皮 黃連去鬚 橘紅焙 草龍膽
燕莢

石等分為細末粟米糊為丸如粟米大每服二三
十九空心米飲吞下不拘時候量兒歲數加減
金蟾丸 治小兒一切疳疾三五服見效

黃連 黃蘗 青皮 陳皮 三棱 義術

檳榔 鶴虱 無莢 川練子 苦楝根

右為細末雄膽汁浸蒸餅為丸如黍米大疳瀉

黃白紫蘇木瓜湯米飲鹽湯下疳蟲蝕腹痛更

君子湯下傷食嘔吐藿香湯下退疳熱麥門冬

湯下腹脹脾虛木香陳皮湯下不思乳食紅棗

湯下取小兒蟲清油湯下赤白痢甘草乾薑湯

常服米湯

蘆會丸 治疳殺蟲和胃止瀉

胡黃連 黃連 白無莢 蘆會 木香

青橘皮 雷丸開破白者佳赤者殺人不勿用 鶴虱微炒

麝香別研 右為細末粟米飯丸菜豆大米飲下一二十丸

不拘時服

仙方布袋丸 治小兒諸般疳疾腹大頸小面黃

蟲痛

夜明砂二兩 史君子二兩 無莢二兩 蘆會半兩 人參

白朮 茯苓 甘草各半

右為末湯浸蒸餅為丸如彈子大每服一九用

紗絹或細布作袋盛之用精猪肉一塊同煮肉

熟取出藥懸掛於當風處肉與汁與小兒食之

來日依前煮用藥盡為度

肥兒丸 治小兒疳病者多因開乳喫物太早所

致或因父患臟腑胃虛蟲動日漸羸瘦腹大髮豎

不能行步面黃口臭發熱面無精神此藥殺蟲進

食

神麩 炒黃連去鬚 肉豆蔻煨 史君子去

麥蘖 檳榔 木香

右為細末猪膽汁調麪糊為丸如粟米大每服
三十九量歲數加減熱水下空心服

麝香丸 治小兒一切驚疳等病

草龍膽 胡黃連 木香 瓜蒂 蟬殼 頭

又一本作去刺各一分 龍腦 麝香 牛黃 各
錢並各 研

右猪膽汁九桐子及菟豆大驚疳臟腑或秘或
瀉清米飲或溫水下小丸五七粒至一二十粒
疳眼猪肝湯下疳渴燂猪湯下猪肉湯下亦得

書四 五

驚風發搐眼上視薄荷湯下一丸更水研一丸

滴鼻中牙疳瘡口瘡研貼蟲痛苦練根或白蕪

英湯送下百日內小兒大小便不通水研封臍

中有蟲候加乾漆好麝香各少許并入生油一

二點溫水化下一大丸病急則研碎緩則浸化

小兒虛極慢驚者勿服尤治急驚痰熱

麝香丸內一本瓜蒂用二十一箇為末更用蘆

蒼去沙 熊膽各等

十全丹 治小兒手足極細項小骨高尻削體瘦

腹大臍突號哭胸陷或生穀瘕是名丁奚虛熱

往來頭骨分開翻食吐蟲煩渴嘔噦是為哺露

一者皆因脾胃之虛不能消化水穀以榮衛氣

弱致肌肉銷鑠腎氣不足復為風冷所傷柴骨

枯露亦有胎中受毒臟腑少血致之此皆無辜

種類之疾並難治宜服此神効

青皮去陳皮去蓬木去川芎 北五露脂

白豆蔻仁 鷄心檳榔 蘆薈各半 木香

史君子肉焙 蝦蟇炙 灰各三

書四 五

右為末猪膽汁浸糕糊丸麻子每服二十九米

飲下有薄荷湯下

蘆薈丸 治五疳癯瘦潮熱心怔煩赤俗名小兒

勞

蘆薈 人參 白朮 茯苓 山藥 木香

龍膽熊膽 胡黃連 蕪荑炒 史君子 陳皮

青皮 麥蘖炒 神麴炒 當歸 檳榔錢各半 麝香

許苦練根錢三

右為末猪膽汁浸糕糊丸如麻子大每服一

入十九空心米飲送下大小加減

風 風論 附陰陽

風者百病之長善行而數變夫人難以禁持何況小兒得之輕則為驚風重則為風癰其疾發作有急有慢有陰有陽急者陽也慢者陰也素問云諸風掉眩皆屬肝木其候來速而去遲者其搖弱病勢逆順知其輕重男子左手先搖握拳大指在外眼目左視此乃順也易治女子右手先搖握拳大指在內眼目右視此亦順也若男反右而女反左此證為逆必難療理又有五癰癰狂症瘧天吊角弓反張時發時省面色不改乳食依常雖困無害其或昏沉不省痰涎灌膈吹鼻不曉乳食不下太衝無脉此為驚風惡候十無一生治法方論不能具述以意詳之

至聖保命丹治小兒胎驚內吊腹肚堅硬目睛上視手足搐掣角弓反張但是痰涎壅盛一切急慢驚風悉皆治之

全蝎十四 白附子 天南星 炮白姜 桑葉 直昇

朱砂研麝香一錢防風去毒天麻二錢金箔十片

右為細末入研藥和勻以粳米燉飯取中心軟者搜為丸每兩作四十九初生兒半丸乳汁化下周歲兒一丸金銀薄荷湯化下十歲已上急急候者二丸薄荷湯化下常服鎮心安神化痰除一切驚風證候

天麻防風丸 治一切驚風身體壯熱多睡驚悸手足搐掣精神昏憤痰涎不利及風濕邪熱並宜服之

白姜 桑葉 乾蝎 天麻 防風 蘇人參 各兩 朱砂 雄黃 麝香 甘草 分一牛黃

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一丸至二丸薄荷湯化下不拘時候

蝎梢餅子治急慢驚風

赤足金頭蜈蚣一條蝎梢乳香另白花蛇肉酒

去皮硃砂研天南星炮白姜桑葉麝香研右為末酒糊為丸如櫻桃大捏作餅子成為錠

徑四分人參湯或薄荷湯磨下不拘時

宣風膏 治驚風腹脹大便不通

攪柳二橘皮 甘草各半 牽牛用半 生

右為末煉蜜為丸如雞頭大每服一丸白湯化

下

瀉青丸 治肝熱驚風搐搦眼目暴赤腫痛

當歸切去蘆頭 龍膽切 川芎 山梔子仁 川大

黃蘆紙 羌活 防風去蘆頭切

右為末煉蜜和丸雞頭大每服半丸至一丸煎

竹葉湯同 糖化下食後服一方硃砂為衣驅

風膏

小續命湯 治卒暴中風不省人事漸覺半身不

隨口眼喎斜手足顛掉語言蹇澁肢體麻痺神情

氣亂

防己 肉桂去皮 黃芩 杏仁去皮尖 芍藥白

甘草炙 芎藭 麻黃去根 人參去蘆 防風去

半附子 附子炮半

右咬咀生薑五片水煎不拘時熱服

省風湯 治卒急中風口喎全不能言口眼喎斜

筋脈掣急抽掣疼痛風威痰實旋暈僵仆頭目眩

重膏瞖煩滿

防風大 蘆南星生用 半夏白切 黃芩去

二甘草生用

右咬咀每服四大錢用水二大盞生薑十片煎

至一中盞去滓溫服不拘時候

防風湯 治中風外有六經之形證內有便尿之

阻隔用此藥導之

防風 川芎 羌活 枳實 厚朴 甘草炙

大黃一

右咬咀生薑水煎不拘時服

大効疎風散治中風痰厥大小便不通

大黃三 牽牛三 朴硝一 檳榔 陳皮各二

右為細末每服二錢蜜湯調下不拘時服

大續命湯 治中風痲身體不能收口不能言

冒昧不知疼痛筋脈拘急小兒凡得中風之疾先

可服此

麻黃半一 桂一 去皮當歸 人參 白姜各一

川芎 甘草 炙白芍藥各半 續加防風

犀角屑

右以咀每服三錢水一盞薄荷葉同煎

八仙散 治虛風搐搦氣視

天麻 白附子 白花蛇肉 防風 南星

半夏 冬瓜仁 全蝎

右以咀每服三錢生薑二片棗一枚司煎有熟

加薄荷無陽加附子

又方

真川烏一枚生用 全蝎 人參 甘草錢一

右以咀分三服生薑煎旋服之

吉州醒脾散用之 治吐瀉後生慢脾風

白朮 人參 甘草 橘紅 白茯苓 全蝎

半夏 木香各一 白附子四箇 南星二枚

地陳倉米二升

右以咀每服三錢生薑三片棗二枚煎食前旋

服之

又方定吐瀉驚風

青州白丸子 金液丹 五靈脂 青皮末各一

右以件一處和劑蒸餅為丸如黍米大大小加

減米湯送下食前

又方治慢脾風

附子錢一 全蝎七枚 白附子三箇 南星錢二

右為細末每服半錢生薑冬瓜子仁煎湯調下

治慢驚風

真川烏一枚生用 全蝎錢一

右二件以咀咀生薑四十片煎旋滴口中

又方用驗

赤足金頭蜈蚣一箇頭尾全 白姜七枚 麝香

右以辰砂一字 全蝎七箇 朱砂七箇 外以麻線繫定慢

火上 青州白丸子三十粒

右末煎人參麥門冬湯調急驚加腦子金銀薄

荷湯調

張侍郎家傳治癩癧及婦人心風血邪効方

甘遂末一錢用猪心一箇取三管頭血三條和

日連末如血多以隨藥木多少以之世猪心披
作二片將研和藥入在內再合作一箇用線縛
定外以皮紙裹水濕文武火內煨熟不可過度
取出去紙將藥細研入辰砂末一錢和勻分作
四丸每服一丸用所煨猪心煎湯化下再服別
用猪心煎湯亦可過半日大便取下惡物次調
胃氣

治年久驚癇血氣心神不足

蝎虎一枚褐色者剪刀取下四足以連血細研

三九

三九

三九

三九

入生硃末麝香腦子各少許一處研細薄荷湯

調作一服先須用奪命散控下涎次服之能奪

造化雖數年癲癇亦能除之此藥所以神効者

蓋癲病所以心血不足此物守宮其血與心血

類也取下如室女之童服之於心故能補也心

全則病瘥豈非神聖功巧乎

青州白丸子 治小兒慢脾風痰涎壅盛吐瀉

冷和蘇合香丸服治半夏白好水浸洗

川烏頭兩半兩南星兩白附子二兩

右搗羅為細末以生絹袋盛用片氈水蘸末出

者更以手揉令出如有滓更研再入絹袋搥盡

為度放磁盆中日中晝夜露至曉棄水別用井

花水攪又晒至來日早再換新水攪如此春五

日夏三日秋七日冬十日去水晒乾候如玉片

碎研以糯米粉煎粥清為丸如菜豆大初服五

九加至十五丸生薑湯下不計時佳

延生錠子名丹 治小兒急慢驚風痰涎潮搐目

睛上視手足瘳瘳角弓反張癲癇等疾此藥常服

鎮心安神

三九

三九

蛇含石

一斤火煨熟去殼研末辰砂

白附

子

麝香 天南星 金箔

各不拘

右為細末陳米粉煮糊為劑作錠每服量兒大

小如減用金銀薄荷湯化下亦治文夫婦人心

神不安恍惚夜夢驚悸風痰潮搐

真珠天麻丸 治急驚風請量用之以通為度

此方仍治吊腸鎖肚撮口至為妙絕功效無比

天南星 炮天麻 白附子 炮各賦粉巴霜字

燕莢炒 全蝎炒 滑石各一錢半

右為細末水煮麪糊為丸如麻子大初生患者

三日三九五日五九七日七九一歲十九大小

加減薄荷湯點茶清送下加青黛名青黛丸

紫神餅子 治小兒急慢驚風

南星 麝香 蝎尾 蜈蚣一條 白花蛇肉酒浸去皮

朱砂 乳香 鈇錒粉 草烏頭尖亦用兩

牛黃各等分

右為細末酒糊為丸如鷄頭大捏作餅子每服

一餅人參湯化下薄荷湯亦可

辰砂膏 治小兒一切驚風

全蝎四錢 防風五錢 桔梗三錢 薄荷四錢 麝香半錢 甘草二錢

半姜蚕錢五 人參錢五 雄黃錢一 辰砂錢二 天麻錢五

右為細末先以雄黃另研和末一處煉蜜丸如

彈子大硃砂麝香為衣每服一丸燈心湯化下

蛇頭丸若見搐搦不已驚狂迷悶角弓反張或昏

沉嚙齒雙目直視頻喚不省變為癰證亟宜服此

藥以除之却不可多進更須以疎風藥相間調理

凡服此藥亦須先以木香烏藥枳殼檳榔麝少許

灌之却服庶使開節通透藥力無不到

花蛇頭酒浸去皮 全蝎去毒 紫粉錢五 生麝香

半五靈脂錢五 朱砂錢三 真麝金 沉香 白附子

各五錢 金銀箔各五片 蛇含石煎甘草湯淨以手擦

一方加防風白蚕南星天麻各五片 腦子半

右為末煉蜜丸小指頭大每服大者一九小者

半九隨證依後大風膏湯引下

大風膏定諸般風搐

花蛇酒浸去皮 蜈蚣酒浸去 全蝎去毒 蛇含石煎甘草湯淨以手擦

防風兩一 青黛 紫粉錢三 姜蚕錢五 絲白附子

辰砂錢五 麝香錢半 天南星汁三兩

右為細末煉蜜為丸或麪糊為丸如小指頭大

每服大者一九小者半九慢驚冬瓜子仁煎湯

化下搐搦 血薄荷湯急驚斑竹葉薄荷湯

下化涎桑白皮湯退潮熱薄荷磨刀水止嗽丸

五味子杏仁湯夜啼燈心露心土蟬退湯濃麝

灌之 壽星丸 治小兒急慢驚風荏苒經日諸般癇証

累易醫者無効但是惡候不問陰陽灌藥一服得

睡即安 蛇含石 錢石 鷲 火 蟻 酒 大 赭 石 朱 砂

鉄粉 雄黃 五靈脂 乳香 川烏 炮 蛇 皮

天漿子 筒 烏蛇肉 酒 浸 去 皮 蛇 皮 炒 蛇 頭

浸 酒 僵 蚕 皂 角 水 浸 一 蟬 殼 天 麻 蜂 房

南星 薑汁 炒 羌活 川芎 麝香 腦子

吐瀉後加煨附子右末糊為丸如芡實太金箔

為水三歲一丸薄荷入酒山許磨服或作散亦

得一方加酸棗仁二錢炒去皮

痰 痰論 附喘嗽

痰者風之苗熱生於心痰生於火火者痰之根靜

則伏於脾土動則發於肺金水澄則清水沸則渾

小兒痰嗽乃心火剋制肺金或寒邪停留肺膈寒

化為熱必生痰喘咳逆上氣肺脹胸膈俗為馬脾

風又為風喉若不速治立至危殆

礞石奪命丹 治大人小兒風涎灌膈利痰去風

石用青礞石二兩槌碎用煖酒一兩入於瓦鍋

內煨通紅消盡為度取出冷地上出火毒如金

色者研為細末同煉蜜為丸量意加減生薄

荷汁送下 小抱龍丸 治傷風瘟疫身熱昏睡氣喘滿痰

實雲云及驚風潮搐盡毒中暑並可服之壯實小

兒宜與服之 天竺黃 雄黃 水 飛 辰 砂 麝香 等 分

天南星 臘月 臘黃牛 膽中 陰乾 百日 者 如 魚

右為細末煮甘草水為丸如皂夾子大每服一

丸溫水化下百晷內者作三服或用臘雪水煮

甘草膏汁和藥尤佳

辰砂化痰丸 治風化痰安神定志利咽清頭

目止咳嗽除煩悶

子 42-148

白礬枯過研辰砂飛研各南星炮一半夏洗七
三兩作

右以白礬半夏麴天南星為末合和勻用生薑汁煮麴和為丸如梧桐子大別用朱砂末為衣每服十九生薑湯下食後服亦治風壅小兒痰嗽一歲兒服一九槌碎用生薑薄荷湯送下辰砂半夏丸 治小兒肺壅痰實咳嗽喘急胸膈痞滿心忪煩悶痰涎不利呀呬有聲

半夏洗半兩 葶藶水研杏仁各半兩 辰砂研五

書四

四五

右為末更研勻生薑汁煮麴糊丸如桐子大每服五十九生薑湯下一方五靈脂半兩色地紫甚效小兒麻子大丸

天南星炮半夏湯浸七次白礬飛各雄黃細研各

右為細末熬皂莢膏為丸入少許麴作糊丸如麻子大每服二三十九淡生薑湯送下

無價散 治風熱喘促悶亂不安俗謂之馬脾風

辰砂二錢輕粉錢半遂錢半

右為細末每服一字用溫漿少許上滴小油一

點枳藥在上沉下却去漿水灌之立効如神
金珠五色丸 治小兒咳嗽痰多喘急風涎滿喉
急驚風

天南星錢五南半夏錢五白礬錢五珍珠末錢二輕粉錢二
雄黃錢五朱砂錢五青黛錢五

右除後四味外將前五味為末分作五分除白丸外各另研入硃砂雄黃青黛京墨四色各另研用生薑皂角取汁打糊為丸如麻子大每

書四

四五

服五十九食後生薑湯或薄荷湯送下
牛黃奪命散 治小兒肺脹喘滿膏高氣急兩脇掣動陷下作坑兩鼻竅張目亂嗽渴聲嘎痰涎潮塞俗云馬脾風

白牽牛一兩半黑牽牛一兩半川大黃一兩

檳榔一兩末五錢

右為細末量兒大小分漿水入蜜調下涎多加

臍粉少許

玉餅子又名白餅子 治腹中有癖但飲乳而咳

嗽吐痰涎

滑石 輕粉 半夏 天南星 各一錢

巴豆 一丁 四箇 去皮膜 水一升

右研勻巴豆後入衆藥以糯米飯為丸小葉豆

大捏作餅子三歲已上三五餅已下一二餅煎

葱白湯下臨卧服

金華奪命散 治小兒風熱肺脹喘急聲啞痰涎

不利

箭金 二錢 牙硝 半錢 朱砂 一分 輕粉 半錢

右為細末每服量兒大小煎麥門冬湯調下

金星丸 治風熱結聚喉內痰鳴喘急咳嗽面腫

赤腫咽痛瞽目閉多眵發狂言煩躁多渴欲生

驚風或大便不通如血諸熱痰壅並宜服之

鬱金末 雄黃 一分 輕粉 半錢 巴豆 七粒

右末米醋糊丸如麻子大煎薄荷臘茶湯送下

加金蠟梢半錢南星半錢佳

瀉肺散又名瀉白散 治肺實咳嗽氣喘面目浮

腫

桑白皮 炙黃地骨皮 洗去土 日草 半

右件為末每服一二錢水一鍾煎入糯米百粒

同煎至六分食後溫服一方加石膏

補肺散又名阿膠散 治肺虛咳嗽氣急肺無津

液

阿膠 一兩 半黍粘子 一分 馬兜鈴 半兩 甘草 一分

炙杏仁 七箇 糯米 一

右為末每服一二錢水一盞煎至六分食後溫

服

葶藶丸 治乳食衝脾傷風咳嗽面赤痰盛身熱

喘促

甜葶藶 土於糖中 黑牽牛 炒漢防已 杏仁

湯去皮尖

右為末研入杏膏拌勻取蒸陳棗肉和再搗為

劑丸如麻子大每服五丸至七丸淡生薑湯下

乳食後或夜服量大小加減服之

積 積論 附癖症

論曰食者人之本飲食五味雖能養生亦能害生

是以譬語云爽口味多終作疾小兒但知飲食不知飽足或食飽傷脾或睡臥濕地或不避寒暑以致而成積也夫積者有五積六聚七癥八瘕瘕瘕瘕皆總名為積也經云積者五臟所生以此難治聚者六腑所成以此易治隨其陰陽氣血四時感得則知何臟腑受積以何藥蠲除或磨或取或鉞或灸勿傷脾胃勿動元氣斯可謂之良工矣况小兒有積腸胃脆軟不可用烈毒之藥攻擊之則脾虛飲食減少或吐或利變生他證取積之法調

合書

平九

脾和胃緩急次序攻之切勿失其胃氣有因下積傷脾反生潮熱脾虛生風因茲敗陋者戒之慎之三稜煎丸 治嬰孩小兒食傷生冷粘膩熱毒等物脾胃積滯久不化令兒肚熱脚冷瘡癰寒熱及瘰癧瘰癧中脫不和腫脹上膈氣壅心腹不得宣通所以作疾此藥溫良但是諸疾積滯並宜服之

京三稜 蓬莪朮 並炮各半兩 芫花 驚甲 去毒半兩

淡豆豉 重二錢 巴豆 二錢 當歸 半兩 杏仁 去尖一

右前六味一處以米醋一椀煮乾就炒為末次入當歸末又入杏仁巴豆豉和勻水糊為丸如麻子大每服二十九生薑湯送下大小加減服之

木香化滯丸 治小兒宿食不消心腹脹嘔吐壯熱

木香 錢五 京三稜 青橘皮 去各補骨脂一兩

黑牽牛 取末二兩 黑

石五味搗羅為末滴水為丸如黃米大每服二

合書

五

三十九溫水送下不拘時候

五色丸 治小兒諸般積滯驚風

青丸 青黛 南星 錢各五 巴豆霜 錢半

紅丸 硃砂 半夏 錢各五 巴豆霜 錢半

白丸 白附子 生寒水石 錢各五 巴豆霜 錢半

黃丸 大黃 礬金 錢各五 巴豆霜 錢半

黑丸 五靈脂 全蝎 錢各五 巴豆霜 錢半

右各為末麪糊為丸如黍米大每服五七丸生薑湯下急風薄荷湯送下慢驚金蝎姜蚕湯下

福九子 治小兒陰陽不和臟腑怯弱乳食不消
心腹脹滿嘔逆氣急或腸鳴泄瀉頻併腹中冷氣
痛食癆乳癖痰氣痞結積聚腸胃或秘或利頭面
浮滿不思乳食及療五種疳氣八種利疾肌肉消
瘦氣衰腹大神色昏憤情意不樂常服散冷熱氣
調和臟腑去疳積止瀉痢進乳食生肌肉悅顏色
功效非常不能盡述

蘿蔔子生半 陳皮白去 青皮白去 黑牽牛半一兩
蓬莪朮雨地 胡椒雨半 木香雨半

右一方加胡黃連半兩苦練半兩蘿蔔子只使

一兩
右為細末麪糊為丸如麻子大每服三五十丸
蘿蔔子湯送下

搗脾散 治小兒脾立效

海蛤粉 黃丹 舶上硫黃各等

右初代口修合為細末用好米醋調成膏攤於
新烏盆內晒乾研為細末一歲兒服一分三心
米湯調下取出脾臟如藍汁為驗

進食丸 治積氣乳癖痰痞食癆

米香 枳殼炒 當歸 代赭石研 麝香微
硃砂錢三 巴豆錢一

右末面糊丸如米大一歲二三九大小加減服
此藥後或有積不除或多壯熱或疳積肚疼常
服消食永無癖之疾余常用之功不可盡述

三稜散 治小兒瀉白者由乳哺失節過傷於脾
胃使清濁不分而白也久則成疳宜疎脾土消食
化氣滯亦治疳積疳疔

京三稜炒 義朮半兩 益智子去殼 甘草炙半
神麪炒 麥蘖炒 橘紅半兩

右末白湯點服二錢

消食丸又名消乳丸 治傷食脾胃不和

香附子二兩 縮砂仁一兩 橘皮 甘草炙 神麪炒
京三稜炒 麥蘖炒 義朮半兩

右末化蒸餅為丸如黍米大食後溫水下一歲
十九加減

異香散 治積氣心腹疼痛

蓬朮 三稜 青皮 陳皮 藿香 桔梗

甘草 香附子 木香 官桂 砂仁

益智仁

右以咀薑棗煎不拘時服

枳實湯 治小兒傷食腹脹大便不通

枳實 厚朴 三白草 二黃 官桂

右以咀生薑煎不拘時服

七聖丸 治小兒傷食積痞肚腹疼痛手足面目

浮腫

京三稜 蓬朮 川練子 青皮 陳皮

芫花 先用醋浸一宿炒乾入三稜蓬朮各等分杏仁

半兩去

右末入巴豆二十一粒去油同杏仁另為泥入

前件研勻麪糊為丸如黍米大一歲常服二丸

臨睡熱水下二十九所食之物一夜而化永無

疳疾停滯

紅丸子 治血膜包心僻側於脇傍時時作痛發

寒熱瘡疾中脫多蓄黃水日久結癖亦效

三稜 蓬朮 芫花 桃仁 另去皮尖

杏仁 另去皮尖 烏梅 另去核 硃砂 研為巴豆

右為細末醋糊丸如菉豆大硃砂為丸米湯下

萬金九磨積去黃瘰

白朮 陳皮 厚朴 製甘草 夜明砂 針砂

精淨

綠礬化水黃糊為丸或黃棗肉為丸如菉豆大

每服五十九粒空心米飲下

治癖丹方用鉄脚藏靈仙不拘多少為細末煉蜜

丸如彈子用紅絹袋盛藥一丸同精猪肉一塊

黃肉熟去藥令食肉

雄黃丸 治癖積痰嗽嘔吐

雄黃 另研半夏末 一神麪末 一巴豆 另研

白麪 用

右和勻滴水為丸如菉豆大用米糠炒赤色每

服七丸加至十丸嘔吐薑湯下痰嗽瘰水下不

拘服

瘰癧丸 治疔消瘰癧進食止瀉和胃進蟲

綠礬二兩 須真者 膽礬真者一錢 去核 大棗四十箇 好醋

升一 又已上四味同熬令棗爛和後藥

史君子二兩 去皮 枳實三兩 去穢 黃連一兩 去核 訶黎勒取一

兩各為 巴豆二兩 去膜 另研

已上五味同炒令紫色

夜明砂一兩 蝦蟇灰性一兩 三分 苦練根皮末

又已上三味史君子等為細末用前棗肉膏和

劑量稀稠未成旋入棗肉亦不可多恐服之難

化太稠即入溫水可丸即丸如菉豆大每服二

三十九米飲湯下溫水亦可不拘時

痢 痢論 附脫

小兒痢疾醫云五腑八痢究其理種數多端輕重

不一豈可定言痢者利也痢之為疾無疾不成及

至積化成痢且脾胃亦虛轉下之後不可更下善

理痢者生其胃溫其脾厚其腸和其氣無不愈也

若成痢必更不可下下之及虛作渴浮腫痞滿脹

急不食亦未可便補補則傷熱能令脫肛不收先

與禁却一切毒食之物頻與生胃調氣或赤或白

即是冷熱不能調或受暑致濕即與分陰陽氣利

水穀道若裏急即與厚腸胃腹肚痛即與和順氣

溫臟腑或純白者乃積冷毒加之即與去其毒

却與溫其脾胃其痢自止凡痢疾能飲食可以治

之妙藥調理無不瘥愈稍失胃氣不能飲食疾名

禁口有不食至死又有毒氣侵胃口亦不飲食或

患痢疾因食毒物不見腸流鮮血頻滴肛門寬大

深黑可畏腹肛疔痛裏急後重名曰利腸日夜頻

併飯食直過者名曰滑腸此三種痢疾最為惡候

乃是一十二種中皆能傳受而作此候凡言小兒

美飲食者飲謂飲乳食謂食飯若病中能飲水漿

喜食果子魚肉之類者亦助其虛不能令臟腑充

實須是白粥爛煮飯可矣若以糍粿粘膩不堪脾

胃難消之物猶其增困幼者吻乳剋化漸安五臟

平和六腑調貼然後陰陽自均氣脉自壯固散湯

劑不必抑之或有餘毒宜以順調緩助不可攻擊

又有時氣作痢薰習相染而成由天氣晴雨不常

陰濕之氣冷熱相干腸胃糟粕不聚遂成其疾

肚疔痛裏急後重也藥莫治者宜與木香黃連之地
榆川芎當歸白芍藥肉豆蔻等藥調之仁存先生
孫景思小兒、前說夫小兒八痢曰冷曰熱曰痞
曰驚曰冷熱不調曰休息曰瀉痢曰蟲毒諸熱無
積不或冷痢白積熱痢赤積冷熱不調積下赤白
疳痢黃白積下無時度驚痢青積休息而黃黑如
魚腸愈而復作瀉痢停積而又下肚大飲食不為
肌膚臭氣大便秘澀疼痛啼叫蟲毒痢下紫血不
可不詳察

水黃末者丸 治一切赤白膿血相雜裏急後重
或臍腑滑泄自後無度或積寒久冷臍腹疼痛不
思飲食

陳皮

去白

甘草

炙青皮

白木香

各一

白芍藥

當歸

去白

乾薑

炮

訶子皮

去白

各一

罌粟殼

去白

棗殼

黃芩

去白

石為細末煉蜜丸每一兩作六丸每服一元水

一鍾羹至七分和查空心溫服

導氣湯 治下痢赤白裏急後重

白芍藥

六當歸

黃芩

大黃

各一

黃連

木香

檳榔

各六

加黃柏

右咬咀水煎食前服

阿膠梅連丸

治下利無間久新赤白青黑疼痛

諸證

金井阿膠

淨草

明白

另研

黃連

烏梅肉

各一

黃藥

炒

當歸

赤芍藥

乾薑

炮

赤茯苓

各等

右為末入阿膠研勻水丸如桐子大溫米飲下

二十九食前

煎夜五

服小兒九

如菜

固腸丸

治腸胃虛弱肉挽生冷腹脹泄瀉時時

刺痛裏急後重下痢赤白或變膿血晝夜頻併經

久不瘥

烏梅肉

黃連

去白

訶子皮

罌粟殼

去白

各一

炙肉豆蔻

各半兩

當歸

去白

各一

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸至

五十九空心食前飯飲下如小兒作小丸煎甘

草乾薑下

胃風湯

治大人小兒風冷乘虛客入腸胃水

瀉

瀉

瀉

瀉

瀉

瀉

瀉

瀉

瀉

瀉

不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴切痛及腸胃濕毒
下如豆汁或下瘀血日夜無度並宜服之

白朮 芍藥 人參 白芍藥 當歸 肉桂

去蘆 茯苓 等分

右為麤末每服二錢以水一大盞入粟米百餘
粒同煎至七分去滓稍熱服空心小兒量力減
如聖散 治初痢急可服之效

聖藥散 一兩半生 陳皮 一兩半 甘草 一兩半

右為末百沸湯泡用盞蓋定勿令透氣候溫澄

本草

服兩度粗併加烏梅生薑煎服一方加當歸

小駐車丸 治痢裏急後重初痢急宜服之

黃連 六兩 乾薑 一兩 當歸 二兩 洗 阿膠 三兩 炒

右末陳米醋打糊丸如黍米大飯湯送下空心

三十九

紅感應丸 治一切痢疾心腹疼痛積聚

黃丹 二兩 杏仁 四十九箇 木香 二兩 丁香 一兩

用半 乾姜 一兩 肉豆蔻 二箇 巴豆 研去心 臘 另

乳香 一兩

右為細末用黃蠟四兩鎔化以綿濾去滓好酒

一升煮蠟鎔數沸傾出候酒冷其蠟自浮取蠟

秤用九黍夏修合用清油一兩秋冬用油一兩

半於銚內熬令沫散香熟次下蠟四兩同化作

汁就鍋內冷熱得所拌和前項藥末勻成劑分

作小錠子以油單紙裹旋丸如桐子大小兒如

麻子大每服二十九食前米湯送下

香連湯 治下痢腹痛

木香 黃連 當歸 芍藥 甘草 白朮

本草

地榆 阿膠 阿子 京三稜 茯苓

右咬咀水煎食前服

香連丸 厚腸胃除餘積止瀉痢

黃連 一兩半生 半 木香 半兩

右末化蒸餅丸如黍米大陳米湯下三十九空

心脈

沒石子丸 治疳痢及釀瀉

木香 兩 黃連 分 沒石子 枝 肉豆蔻 二枚 麝

呵子肉 簡

右末爛飯丸如黍米大一歲二十九白湯下大
小以意加減

青橘丹 治赤白痢肚疼

青皮一兩湯洗當歸一兩洗黃連一兩乾薑

厚朴半兩肉豆蔻兩半

右末化蒸餅為丸如黍米大一歲十五九二歲

三十九米湯送下大小加減

赤石脂 治小兒因痢後軀氣下推出肛門不入

伏龍肝 赤石脂各等分

右件細研為散每用半錢傅腸頭上每日三上

用

參香散 治大人小兒臍氣虛怯冷熱不調積在

臍腑作成痢疾或下鮮血或如豆汁或如魚腦或

下瘀血或下紫黑血或赤白相雜或五色裏急

後重日夜頻併臍腹絞痛甚不可忍及噤口疳

時虛諸痢無問新舊並能治之

白蘆豆炒人參木香各二次苓肉豆蔻

赤石脂去粟殼去藜蘆各

右為細末每服三大錢用米飲調下不拘時候
竟神效

以鷄子 治休息痢及疳瀉日久不能安者

右用鷄子一枚打破用黃蠟一塊如指大鉗內

密以雞子拌和炒熟空心食之

傷寒 傷寒論

論口天有六淫寒暑燥濕風火人有七情喜怒悲

哀憂恐驚素問序云外有寒暑之相盪內有喜怒

之交侵仲景論曰冬傷於寒春必病溫春傷於風

夏必病泄夏傷於暑秋必病瘧秋傷於濕冬必咳

嗽是以一歲之中病無不以長小兒感患必當仔細

分別熱有數種有變蒸有傷食有麻痘其疾發作

與傷寒相似夫傷寒之為病有表有裏有汗有下切

不可便用下藥恐是瘡痘失下之者已無及矣如

二三日間先當發散至五六日間表證已罷午後

潮熱方可下之傷寒之熱各有辨認如手稍微冷

惡寒而無汗面色青慘而不舒左額有青紋者傷

寒熱也手足稍微溫發熱自汗面赤無光者傷風

熱也目胞腫而右額角青筋發熱而頭額腹肚最甚或兼嘔吐腹痛者傷食熱也面色青紅額正中
有青紋手掌心有汗時作驚惕手絡脉微動而發熱者此驚熱也又有漸熱者發散有時壯熱者一向熱而不已如憎然不分一槩調治鮮不敗事臨病之際不可不審哉

人參羌活散 治小兒四時感冒傷寒發熱頭疼及發散痘疹驚風

羌活 獨活 柴胡 川芎 人參 甘草

白茯苓 兩各一 前胡 桔梗 地骨皮 天麻 酒

枳殼 兩各半

右咬咀每服三五錢生薑薄荷棗煎不拘時熱服亦發散瘡疹

柴胡升麻湯 治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾心胃煩滿寒熱往來痰盛咳嗽涕唾稠黏

此胡 升麻 前胡 羌活 乾葛 石膏 赤芍藥 各十
升麻 五 荆芥 六 黃芩 六 桑白皮 六

右咬咀每服三大錢水一盞半生薑三片豆豉十餘粒同煎一盞去 桑熱服不拘時量兒大小加減

清解散 治感冒發熱頭疼鼻塞流涕及溫壯

北參 防風 天麻 北前胡 茯苓 北梗

枳殼 甘草 細辛 柴胡 川芎 錢

右咬咀薄荷三葉畧煎溫服

參蘇飲 治停食痰飲發散風寒

紫蘇 甘草 乾葛 半夏 前胡 人參

白茯苓 枳殼 桔梗 陳皮

右咬咀薑棗煎不拘時服

雙解散 治普解風寒暑濕勞倦

防風 川芎 當歸 赤芍 大黃 薄荷

麻黃 連翹 芒硝 石膏 黃芩

桔梗 滑石 甘草 荆芥 白朮

小枳 各一

石咬咀生薑葱白淡豆豉五十粒煎不拘時服

風散 治感冒發熱氣喘咳嗽痰傷寒症疹

未發

人參 柴胡 茯苓 知母 白朮 桑白皮

半夏 桔梗 苦葶藶 杏仁 貝母 麻黃

甘草

右咬咀每服五錢發散生薑葱白煎喘促加馬

兜鈴裏熱加大黃痰盛送下玉餅子

大柴胡湯變除表裏傷寒六七日可用

柴胡 枳實 各二兩半 夏 一兩 赤芍 一兩八錢

黃芩 一兩 大黃 三兩 七錢半

右咬咀生薑紅棗煎不拘時服

小柴胡湯和解表裏三四日可用

柴胡 五錢 半夏 一分半 人參 甘草 黃芩 各

錢一

右咬咀生薑紅棗煎不拘時服

小承氣湯 治滿而不噎乃小結胸也

大黃 厚朴 枳實 各四錢

右咬咀生薑煎不拘時服

大承氣湯 治大滿大實乃大結胸也

大黃 芒硝 厚朴 枳實 各四錢

右咬咀生薑煎不拘時服

三乙承氣湯 治傷寒無病通用下藥

大黃 芒硝 厚朴 枳實 各三錢 甘草 五錢

右咬咀生薑煎不拘時服

白虎湯 治傷寒三陽合病腹滿身重難以轉側

口乾不仁面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額

上生汗手足逆冷若自汗出

知母 二錢 石膏 七錢 甘草 二錢 粳米 一升

右咬咀水煎服加涼膈散又名涼膈白虎湯

肝甲散 治發熱頭疼日久不痊不解加麻黃裏

不解加大黃

柴胡 當歸 草龍腦 白茯苓 人參

知母 甘草 川芎 麻黃

右咬咀生薑葱白煎不拘時服

柴胡飲子 治解一切骨蒸傷寒後餘熱潮熱產

後發熱咳嗽等疾

柴胡 人參 黃芩 甘草 大黃 當歸

芍藥各半

右咬咀生薑三片水煎

紅綿散 治夾驚傷寒

麻黃 金蠋炒甘草炙天麻 大黃濕紙

白附子 炮蘇木等分

右咬咀水煎大小加減

防風羌活散 治傷寒兼解麻豆熱及驚瘡

羌活 防風 川芎 人參 葛根半升麻

甘草炙犀角屑半兩旋

〇書四 卷之七

右咬咀生薑薄荷葉煎不拘時服

人參前胡湯退餘熱 一方治瘡加地骨皮知母

前胡一兩柴胡半兩半夏各半黃芩 人參

桔梗各半甘草各半

右咬咀生薑棗煎

柴胡清涼飲 治熱病後餘熱不除咳嗽

右四順清涼飲對小柴胡湯大便秘大黃藥

前見

痘疹 痘疹論

諸問云諸痛癢瘡瘍皆屬心火人生自幼至長未有不患瘡痘者總錄云小兒稟受純陽臟腑純熱或遇時度遂變痘疹必先壯熱而後發出其屬心火故也世俗云痘疹乃是天瘡不敢服藥以悞小兒諸病多矣亦不知古人置良方妙藥善用之者能獲萬全用藥之際審思明辨寒者溫之熱者涼之虛者補之實者瀉之不偏倚而其中乎臨病之際貴在熟察如痘瘡雖出而不漸長發則必安其裏而發其表其瘡日生而日長為循循如度不可

〇書四 卷之八

要藥以雜藥諸物發之使毒氣併出不惟小兒難禁以致變壞是以古人云痘瘡首尾平和服藥者慎首尾虛寒不補者悞首尾實熱不下者悞誠哉是言也

升麻葛根湯 治小兒斑疹不出此藥發散

升麻 白芍藥 甘草各三錢葛根四分

右咬咀水煎不拘時服對參蘇飲名升麻散

人參羌活散傷寒方見前

四聖散 治痘瘡出不快倒靨或小便赤色餘熱

不除

紫草茸

木通

剉碎

甘草

黃耆

切

分

等

右為麝末每服一錢水一盞煎至八分無時溫

服

透肌散

紫草

升麻

甘草

各等

右以咀水煎不拘時溫服

活血散 治痘瘡出裏虛不紅澤

右用白芍藥為末酒調一錢如欲上痛只用熟

水調下

民望方 治瘡疹漸黑面陷大便不固乳母同服

亦可

人參

白朮

肉豆蔻

白茯苓

黃耆

甘草

右以咀薑棗煎或大瀉手足冷加炮附子

塞耳丹 治瘡疹入眼有翳膜遮睛

右以水銀一錢國丹五錢同九作六丸入銚銀

高中國瓦蓋上濕紙糊護定用香爐盛炭火燒

一日取出以綿裹之痘在右眼塞右耳在左眼

塞左耳立見効

紫草飲子 治痘瘡欲發未發或未透者

紫草

北芍藥

去

麻黃

節

當歸

甘草

各等

右剉散每服二錢水一盞煎不拘時服

紫草木香湯

治瘡出不快大便泄利

紫草

木香

茯苓

白朮

甘草

各等

右剉散每服二錢水一盞糯米三十粒煎溫服

蓋紫草能利大便木香白朮可以佐之也

紫草木通湯

治瘡疹出不快

紫草

人參

去

木通

皮

茯苓

糯米

各等

甘草

右剉散每服二錢水一盞煎服大便利者可入

南木香去紫草

快斑湯 治痘瘡出不快

紫草

蟬退

去

土

人參

白芍藥

各一

木通

錢甘草

右剉散每服二錢水一盞煎溫服

水解毒 治瘡豆已發或為風冷所折榮衛不和
或為宿食所傷內氣壅遏以致水硬並主之

白皮去陳皮白桔梗去枳殼去當歸尾半夏洗
川芎水通節去乾葛去甘草炙紫蘇人參

蘇紫草等

右剉每服二錢薑三片棗一枚煎服未效加枳
根三寸

異功散 治豆出欲醫未醫之間頭溫手冷腹脹
渴瀉急服此切不可與蜜水紅柿西瓜梨果食之

木香當歸半官桂去白米茯苓

陳皮厚朴去薑汁炒人參去肉豆蔻丁香

附子皮半夏錢五分

右剉散每服二錢水一盞薑三片棗二枚煎服

三豆飲子 治天行疹豆活血解毒或覺鄉井有

此證預防之則不染

赤小豆 黑豆 萊菔一甘草研

右淘淨水浸熟逐日空心任意服已染則輕鮮
未染服七日不發

水香散 治瘡痘正出觸化胃氣吐瀉悶亂

木香九腹皮細人參去桂心赤茯苓去

青皮前胡去丁香訶梨乾半夏洗甘草炙

三錢

右為散每服三錢水一大盞生薑三片煎至
六分去滓空心溫服量大小以加減

人參清肺散 治痘疹後潮熱咳嗽鼻乾涕稠

和

人參 柴胡 當歸 芍藥 知母 桑白皮

白米 黃耆 紫苑 地骨皮 茯苓 甘草

桔梗各一黃芩研石膏滑石各一

葉實加大黃

右為散每服三錢水一大盞生薑三片煎至

六分去滓溫服不拘時量大小加減服之

前胡枳殼湯 治痘瘡實熱喘促腹脹大小便五

六日不通量用之

前胡一枳殼 赤茯苓 大黃 甘草炙半兩
右為散每服三錢水一大鍾煎至六分去滓

溫服不拘時候服量大小加減如身溫脈微瀉者不可服

蟬殼一物湯 治痘瘡發癢

右用蟬蛻二十一箇洗去泥水一盞慢火煎七分去滓量大小溫服不拘時候

甘露飲子 治胃中客熱口臭不思飲食或饑煩不欲食或齧腫疼膿血滿口咽中有瘡赤眼目臉重不欲開瘡疹已發未發並宜服之

天門冬焙去心 麥門冬焙去心 熟乾地黄 枇杷葉

熟乾地黄 黃芩 石斛

茵陳 甘草各

右剉散每服二錢水一盞煎食後臨卧服

萬金散 治瘡疹已出未能勻瑣色不紅潤

防風三錢 人參 蟬退各三錢

右為末蘿蔔煎湯調下服了急用芥子末白湯調如膏塗兒脚心乾即再傳其毒漸漸復出瘡疹依前紅活

奇方 治瘡疹出不透腹痛甚或黑靨者

右以蟬退二十五箇去足翼洗淨為末每服一錢熱水調下腹痛立止而出透神效乳母亦可服一錢

又方 用乾山楂子為細末湯點服立見出透紅活荔枝殼煎湯溫服亦効

消毒加味犀角飲 治毒氣壅遏壯熱心煩瘡疹雖出未能勻透口舌生瘡不能吮乳

牛蒡子三兩 荊芥穗五錢 甘草一兩 防風

川升麻各七錢 犀角二錢 麥門冬各五錢 桔梗五錢

右剉散每服二錢水一盞煎去滓冷溫時時令呷或頻灌之六便利不宜服

大連翹飲 治瘡疹壯熱小便不通餘毒未解

連翹 瞿麥 荊芥 木通 車前子 防風

赤芍藥 當歸各三錢 柴胡三錢 滑石 蟬退 甘草

右剉散每服二錢加紫草煎溫服

宣毒膏 治毒盛入心黑陷倒靨臘八日刺瘡諸

尾血一升用新盆盛

硃砂水研乳香一另研甘草末 腦子研馬牙硝

另研各麝香一另研

右前件同猪尾血拌和勻用一寬竹筒留底下

一節入藥在筒內以紙數重繫合筒口邊通一

竅以麻縛了垂斷屋梁上至清明日取出曝乾

更入腦麝各一錢研細滴水為丸如皂角子大

每服量兒大小用人參湯化下若毒盛瘡黑倒

廢者服即紅活再長神妙

木筆化散 治豆瘡出後有餘瘡生塞鼻中不能

勝賦

口書四

下

右用木筆花研為細末加生麝香少許葱白蘸藥入鼻中數次即通

黃芩甘草湯 治挾熱作疹瘡不出煩燥不得眠

黃芩七錢五分赤芍藥 甘草各五錢

右剉散每服三錢水一盞煎服若胃中虛冷其

人能食飲水即熾脉浮發熱口鼻中燥或衄加

大棗一枚嘔者加半夏少許生薑三片煎食以

者加人參紅棗煎量大小加減

胃氣散 治豆瘡出嘔吐泄瀉煩渴胃中虛冷

糯米一兩乾木瓜三錢甘草多藿香葉 紫蘇葉各錢

丁香四十九粒

右為末煎粟米棗子湯調下量大小加減

胡荽酒

胡荽四兩切細以好酒二盞煎一兩沸

右每吸一兩口微噴從項至足勻遍再噴頭面

病人左右常令有胡荽即能辟去汗氣瘡疹出

快瘡疹忌外人及微觸之物雖不可受風冷然

亦不可擁遏常令衣服得中并虛涼處坐卧

百祥丸一名南陽丸 治痘瘡耳尻反熱毒氣歸

腎變壞黑靨紅牙大戟不以多少陰乾漿水煮極

軟去骨日中暴乾復內元汁中煮汁盡焙乾為末

水丸如粟米大每服一二十九研赤芝麻湯下吐

利同無時不得已而用之

清涼飲子 治小兒血脉壅實臍臑生熱頰赤多

渴五心煩躁睡卧不寧四肢驚掣伏熱於心經不

退欲發驚癇又治風熱結核頭面瘡癰癰赤咽痛

瘡疹餘毒一切壅滯服之合涼貼散或消毒飲隨
證用之

當歸去蘆 芍藥 大黃 赤芍

右等分為簾末每服一錢水一盞煎至七分去
滓溫服量兒大小虛實加減微瀉利為度食後

安斑散調理瘡痘

川升麻 赤茯苓 黃耆 羌活 人參 甘草

枳殼 桔梗 甘草

右咬咀紫草薄荷煎服

楊氏太和散 治痘瘡後寒熱往來嗜卧煩躁悶

亂

生地黃 川當歸 地骨皮 人參 甘草

赤芍藥

右咬咀水煎不拘時服

治瘡痘黑陷藥不能發神驗秘方

穿山甲一味燒存性為細末酒調下一服見效

雖變身黑而欲絕亦能暫甦而發紅也但目閉

無魂者不復生矣

瘡 瘡論

論曰瘡者瘡之母小兒或因飲食傷脾或因暑濕
侵襲久則結積於太陰之經發為寒熱陽氣虧損
陰氣偏勝則寒多而熱少陰氣衰弱陽邪偏勝則
熱盛而寒微病乃客邪也人身中血氣乃正氣也
邪正交爭時作戰慄治法量其稟受強弱病之新
久當先去脾家之涎次調脾胃退寒熱養陰助陽
病去如釋縛

清脾湯 治瘡疾熱多寒少飲食減少

青皮 厚朴 白朮 草果 柴胡 茯苓

半夏 黃芩 甘草

右咬咀生薑煎不拘時服

常山飲 治瘡疾日久者用亦能治瘴發潮熱

常山 知母 草果 甘草 良薑

烏梅

右咬咀生薑紅棗煎

露星飲 治久瘡成勞

秦艽 柴胡 白朮 茯苓 檳榔 常山

黃芩 甘草 半夏 麴 官桂 各等

右咬咀酒醋水各一半煎星露一宿次日空心服之

茅先生鬼哭飲 治瘧疾

常山 大腹皮 白茯苓 鱉甲 醋甘草

右咬咀桃柳枝各七箇煎臨發時服畧吐涎不妨

南斗散 治瘧疾有瘕

常山 香白芷 南星 生用各等分

右咬咀酒煎發日五更服

又方 上等臘茶 硫黃 研別

右二件各頃一處寒多倍硫黃熱多倍臘茶發

日五更米飲調一錢或引飲宜服五苓散

驅瘧湯 治諸瘧久瘧

草果仁 青皮 人參 陳皮 茯苓 半夏

厚朴 蒼朮 白朮 檳榔 雞心者用甘草兩半

良薑 錢

右咬咀薑五片棗二枚烏梅一箇空心煎服

胃蒸 胃蒸論

論曰小兒胃蒸潮熱者與大人瘵疾大同小異十五已上為勞十四已下為瘵其疾有數種有因飲食而得之者有因病後而得之者有因稟賦素怯而得之者有因父母兄弟姊妹有此病相傳染者各不同要知何臟受病因飲食而得之者必是腹中有積癖面色痿黃潮熱腹痛此脾胃受病也瘵積調脾胃順理三焦其熱自退因病後得之者或因傷寒勞復或因瘵疾不已久則虛弱而成此疾宜

滋養血氣調和五臟逐其寒熱病漸自愈有因稟賦素弱而得之者謹避風寒以護其外調和飲食以安其內五臟既安氣血充實潮熱何由而生或有傳尸骨蒸之疾此乃父母情德廣行方便道經云有三十六癯若行陰陽癯癯平復仁人君子當審察之

鱉甲散 治疳勞胃蒸

鱉甲 九肋者用童便浸炙黃青 白芍藥 各一 地黃 生

各半 地骨皮 人參 當歸 各半

右咬咀水煎不拘時溫服

猪肚丸 治腎蒸癆勞人形羸瘦

木香兩半 宣連兩 生地黃兩 青皮兩 柴胡兩 銀甲兩

九肋者小 便各一兩

右咬咀用猪肚一枚入藥於內麻繩繫定口於

砂鉢內爛煮熟取出藥焙乾為細末搗研猪肚

如膏去筋膜和丸如黍米大日三服米飲下不

拘時

清骨散 治男子婦人童男童女初覺勞瘵五心

煩熱去骨熱如神

柴胡 生地黃各二兩 熟地黃 人參 防風

秦艽 赤茯苓各一兩 胡黃連半兩 薄荷葉七錢

右咬咀水煎服

地骨皮散 治虛熱潮作亦治傷寒壯熱餘熱

知母 柴胡 甘草 人參 地骨皮 半足

赤茯苓

右咬咀水煎食後服有半夏生薑煎服

黃耆湯 治疴勞嗽喘不定虛汗骨蒸渴而後瀉

乳食遲進

黃耆各當歸 川芎 白芍 生乾地黃

蝦蟆去足 鱉甲各三錢 人參 白茯苓

橘皮 半夏各二錢 麵 北柴胡 史君子二十 甘草

右剉散每服二錢水一盞薑二片棗二枚煎食

後服

驚血丸

治疳癆

人參兩半 川芎 蕪荑 北柴胡各一兩 史君子二十

胡黃連 川黃連

右用驚血一盞吳荑荑一兩拌和二連淹一宿

次早炒乾透出荑荑并血只用二連夾餘藥杵

末粟米粉糊丸麻子大每服二十九食前熟水

下

青蒿飲 治傳尸勞瘵不問遠年近日皆可治之

此藥其妙不可言也

阿魏一分 桃枝一大 檳榔兩 青蒿握 甘草

葱白十

右件六味以童子小便二升浸桃枝蒿葱甘草
四味煎取六合許然後入阿魏更煎二三沸作
二服時入楨樹半兩同服如覺惡心必吐吐後
後令心安時再服一服其勞蟲定出送藥人不
可與患人對立恐蟲傷人若男人患以女人煎
藥女人患以男人煎藥忌雞犬等物觸之患者
冬則三服一年內五服其病自盡去其根

生犀散 治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱
夜有盜汗五心煩燥四肢困倦飲食雖多不生肌

肉及大病差後餘熱不解或傷寒病後因食羊肉
體熱不除

羚羊角 地骨皮 秦艽 麥門冬 枳殼

柴胡 茯苓 赤芍藥 桑白皮 黃耆

人參 鱉甲 大黃 黃芩

右以咀每服二三錢青蒿以許同煎或為末青

蒿湯調

蟲痛 蟲痛論

論曰小兒疾病多有諸蟲或因臟腑虛弱而動或

因食甘肥而動其動則腹中疼痛發作腫聚往來
上下痛無休止亦攻心痛叫哭合眼仰身撲手心
神悶亂嘔噦涎沫或吐清水四肢羸困面色青黃
飲食雖進不生肌膚或寒或熱沉沉嘿嘿不的知
病之去處其蟲不療則子母相生無有付止長
尺則害人

化蟲丸

胡粉 鶴虱 苦練根 白礬

兩粒

右為末以麪糊為丸如麻子大一歲兒服五丸

溫漿水入生麻油一兩煎打兩下之溫米飲下

亦得不拘時候其蟲細小者皆化為水大者自

下

史君子丸 治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹時

復疳痛不進飲食漸致羸瘦並宜服之殺蟲

厚朴 陳皮 白川芎 史君子 仁

右為細末煉蜜丸如皂子大三歲已上一粒已

下半粒陳米飲化下大治小兒腹痛

史君子丸 治賦賦虛滑及疳瘦下痢腹脹滿
可思乳食常服安蟲補胃消痔肥肌

史君子丸 治因食食虛肥甘生熱肌瘦體虛口
史君子丸 治因食食虛肥甘生熱肌瘦體虛口

右為末米飲調痛時服空心未洗面前服或凡
飲化下兒生百日已上三歲已下服半丸乳汁
化一方用青蜜

史君子丸 治因食食虛肥甘生熱肌瘦體虛口

史君子丸 治因食食虛肥甘生熱肌瘦體虛口

史君子丸 治因食食虛肥甘生熱肌瘦體虛口

史君子丸 治因食食虛肥甘生熱肌瘦體虛口

史君子丸 治因食食虛肥甘生熱肌瘦體虛口

史君子丸 治因食食虛肥甘生熱肌瘦體虛口

史君子丸 治因食食虛肥甘生熱肌瘦體虛口

右同研勻每服一字淡猪肉湯食前調

安蟲散 治因食物食皮膚消瘦蟲生腹中極痛
不可忍

真胡粉 炒 擯榔 川煉子 炒 去 鶴虱 炮 各 白礬
二錢半 生用

右為末米飲調痛時服空心未洗面前服或凡
如麻子大一歲兒五九溫漿水入清油一二點
打勻溫米飲下其蟲小者化為水大者自下

萬靈丸取蟲宣積

黑牽牛 半斤 取頭末 大腹子 扁者四兩 取末

荆三稜 錢二兩 炮 廣木香 一兩二錢 半 雷丸 二兩
炮 蓮木 五錢

右為細末用好皂二兩去皮絃子切碎用水一
大盞浸一宿冬月二宿榻去麓滓銅磁器內熬

數沸白汁出放冷為度和藥必須揉杵搗丸如
桐子大小兒如麻子大每服四錢五更沙糖水

送下

月蟾丸 治小兒脾癖癥瘕

木香 人參 黃耆 當歸 桔梗 黃連

三棱 蓬朮 紫甲 夜明砂 綠礬 枳實

蝦蟇 三分 史君子 苦練根皮 桐子 已上各

右件為細末九如菜豆大每服三四十九食前

米飲湯送下忌生冷雜果子傷脾之物大人癰

癰服九如桐子大空心服或夜明砂蝦蟇黃連

眼五十九

沉香海金沙 治一切聚積散脾濕腫脹肚大

青筋羸瘦惡瘡

沉香 海金沙 乾粉 一牽牛末

右為末研獨頭蒜如泥九如桐子大每服五十

九煎燈草湯下量虛實加減九數取利為驗大

便利止後服海金沙散

疝氣 疝氣論

論口小兒疝氣有數種有因胎患而得之者此是

姪婦傷感啼哭冷氣入胎中故成此疾有因父坐

濕地而得之者有因兒多啼不已冷氣吸入小腸

傳化流入腎經而得之者又有木腎有腎種有腎

癰有偏墜有癰疝有育豚有疝瘕種種不同其疾

發作小腹釣痛面青垂沫陰囊腫急重則小便閉

澁或遺瀝連腰背急痛諸疝皆因腎虛寒邪冷濕

之氣浸入膀胱之經留而不散故陰核腫硬沉墜

治法先宜疎利次用逐寒溫臟之藥按元炙之惟

木腎腎癰瘡毒之氣入於腎經久則成膿治法外

用拔毒之藥敷貼內服消散癰毒排膿利水道等

藥療之

小橫柳丸 治疝氣小腹引腰脊彎曲身不能

直

芫花 醋浸 木香 檳榔 三稜 半炒 枳殼

青皮 白去 金蝎 肉桂 附子 炮 砂 各一

右為細末將硃砂浸洗去土頓在湯瓶上後成

膏子和糖醋打麵糊丸如菜豆大每服三十九

空心溫酒送下未效再服

金鈴散 治疝氣作痛時先曲腰啼哭眼中無淚

脚冷痰乾額上多汗或外腎釣上陰囊偏大

金鈴子 去核 碎 縮砂 去殼 半 草澄茄 木香

右為末每服一錢大者二錢薑湯或好酒調服
金鈴子丸 治疝氣小腹引腰脊變曲身不能

直
木香 檳榔 三棱 蓬朮 地青皮 白川練肉

羌花 醋浸炒 辣桂 牽牛 生取仁 川巴豆肉 去不

錢油一

右為末麵糊丸麻子大每服三九空心午前各
一服薑湯下

當歸散 治疝氣大疝秘小腹陰囊牽引撮聚甚

痛

辣桂 牽牛 各半 當歸 此大黃 桃仁 去

皮各 全蝎

右劉散每一錢入蜜煎溫服以利大便利后以

青皮陳皮枳殼木香縮砂甘草為散生薑煎和

胃唇青不治

釣藤膏 治盤腸內釣腹中極痛乾啼

明乳香 沒藥 同上 木香 薑黃 各半 木鱉子

十二箇

右以木鱉子蜜搜和四味末為丸櫻桃大煎釣
藤湯化下一歲可服半九次服麝香散

麝香散用蓬朮木半兩真阿魏一錢先以溫水化
開阿魏浸莪朮一日夜焙乾為末每服一字或半

錢煎蘇葉米飲空心調下

橘核丸 治四種癰病卵核腫脹有大小或堅硬
如石痛引臍腹甚則膚囊腫脹成瘡時出黃水或

成癰潰爛
橘核 海藻 昆布 海帶 各 川練子 炒 肉

桃仁 去 桂心 火 木香 各 木通 枳實 煨玄胡索

皮去 桂心 火 木香 各 木通

右為末酒糊丸如桐子大每服七十九空心薑
酒鹽湯任下虛寒甚者加熟川烏一兩堅硬久

不消者加硃砂二錢醋煮旋丸

丹毒 丹毒論

論曰丹毒有數般有赤遊丹白遊丹家火丹野火

丹發竈丹其病則一其名不同月溜之作皆因嬰

兒在胎時母多食五辛生下嬰兒顛顛濕浴濕毒

浸湯以小兒血氣充盛皮肉嫩薄毒氣遊行貫注
血脉流走不定若行於小腹之間陰囊如青傷者
不治赤丹者血溜也家火丹者行遲也野火丹者
行疾也發龜丹者驟發紅如胭脂遍身也治法先
用鍼砭去血外用拔毒涼肌之藥敷掃內服清心
去濕熱之藥莫使毒氣入裏腹脹則殺人

內托散 治丹毒

紅內消 當歸 茄片 甘草節 羌活

黃芩 各半 麝香 微半

右為末每服二錢煎湯調成或生地黃亦可

治赤流丹毒可用一小鍼刃子疎去流頭赤暈惡
血毒汗次用牛黃散

朴消 一大黃 細水

右二味相合新汲水攪調勻用鷄毛蘸藥時時
塗掃

芎根白朮散 治一切赤白丹腫

白朮 一錢 茯苓 三錢 木香 半錢 芍藥 半錢 枳殼 錢

半去 甘草 二錢 芎根 三錢

右以咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服
不拘時量兒大小加減服之

又方用綿羊腦搗朴硝傳之

化毒丹 方見前

消毒飲 治丹毒

荊芥 牛旁子 防風 甘草 各等

右以咀水煎食後服或加黃連清心湯合半煎
服之

治小兒十種丹癰腫毒所起無候方

一飛龜丹從頂頭上起用葱白自然汁塗

二古龜丹從頂上紅腫痛用赤小豆細末鷄子

清調塗

三鬼火丹從面上赤腫用竈心土為末雞清調

塗

四天火丹從背起用桑白皮末綿羯羊脂調塗

五天龜丹從兩背赤腫黃色用柳木燒灰水調

塗

六水丹從兩脇虛腫用生鉄末入猪糞水調塗
七胡火丹從臍上腫起用檳榔細末米醋調塗
八野火丹從兩脚赤腫起用乳香末羊脂調塗
九煙火丹從兩脚赤白點起用猪槽下土清油

調塗

十胡漏丹從陰上起用屋漏處土羊脂調塗
凡十種丹毒變易非輕治之或緩終不能救余不
惜是方逐一子細辨認依方法治之萬不失一如
經三日不治攻入臟腑則終不可救也

眼 眼論

論眼目經云稟賦天地之間眼目所屬內應五臟
外貫五輪氣血精華以保清明洞視萬物莫不貴
乎眼目者也倘因六淫外感七情內鬱或胎氣中
稟受或乳母多食五辛遂成眼疾變化不一或則
昏花重則障翳視一物見二物係肝腎二經不足
遠視見近視不見陽有餘而陰不足近視見遠視
不見陰有餘而陽不足此之謂也當用修肝氣生
腎水之藥取其平和以保洞明而已矣

地黃散 治小兒心肝壅熱目赤腫痛生赤脉或

白膜遮睛四邊散漫者猶易治若暴遮黑睛多致

失明宜速用此方亦治疹瘡入眼

生熟乾地黃各切當歸去芦頭切焙防風去頭焙

羌活 生犀末 蟬殼去土并足木賊 穀精草

白蒺藜去尖沙苑蒺藜各一錢甘草半錢玄參半錢大黃

去皮取尖者木通一錢半又一方一方用黃連

去右為細末每服一字或半錢量大小煎羊肝湯

書四

食後調下日三夜一忌口將息亦治失人

羊肝散 治小兒痘瘡入眼及無辜氣入眼

密蒙花二青箱子 決明子 車前子各一

右為細末各別取之每取密蒙花末三錢餘藥

各一錢拌勻用羊肝一大片薄批擦上濕紙裹

煨熟量多少空心食之

蟬殼散 治斑瘡入眼半羊以後一作裏者一方

取效

猪懸蹄甲二兩罐子內鹽蟬殼去土用

右二味鑊八鈴羊角細末一分拌勻每服一字

百日外兒半錢三歲以上一二錢溫水或新水

調下日三四夜一二食後服一年以外難治

空青散 治小兒眼中生翳遮睛或生丁翳痘瘡

空青 曾青錢各一 爐甘石子一錢八服用童龍腦

右研極細用燈心點眼中

涼肝丸 治痘後目赤腫痛

防風雨二人 參 赤茯苓半一兩 黃芩 羌藟子

黑參 大黃 知母各一

右為細末煉蜜為丸如菜豆大量大小食後茶

清送下

秦皮散 治眼熱毒肝經有熱

秦皮雨二 秦艽 細辛 防風各一 甘草雨半

右以咀水煎澄清洗眼

仙靈脾散 治痘後食毒物目睛突出

仙靈脾 歲靈仙各等

右以咀水煎

除熱飲子 治丁翳熱毒

黃芩 玄參 桔梗 知母 芒硝 防風

羌藟子 大黃錢各半

右以咀水煎

歲靈仙散 治目中生翳

歲靈仙 仙靈皮 赤茯苓 甘草 青箱子

大青 赤芍藥 黃芩 大黃各等

右為末羊肝擦藥莖葉包裹包麻皮纏縛米泔

煮熟放冷喫

浮萍散 治目眼疼痛

右浮萍陰乾為末每服一錢隨兒大小以羊乳

肝半箇入器皿以杖子刺碎投水半合絞取肝

汁調下食後不甚者一服差已傷目者十服差

瓜蒌散 治痘後目中生翳

決明子 赤芍藥錢各一 甘草錢一 瓜蒌根雨半

右為末食後蜜水調下量兒大小加減

羚羊角丸 治赤脉侵睛

羚羊角屑 黃芩 大黃 芥子 當歸

玄參 甘草 木賊 蟬脫 硃砂 決明子

各半 荊芥穗 香白芷 蒼朮制各二兩 羌活各一兩

右為末煉蜜為丸如彈子大細嚼食後荊芥茶湯送下量兒大小加減用

再明膏 治目生白翳遮睛

晉礬 黃丹 白丁香 青黛

右等分淨研極細和熊膽膏或春雪膏少許點之

之

還明飲 治小兒至夜不見物名雀目

蒼朮一兩米泔浸 穀精草 黃苓 決明子 荊芥

地膚子各一分

右咬咀水煎臨睡服

還明丸 治小兒疳眼白翳遮睛

夜明沙 井泉石 穀精草 海蛤粉各等分

右為末煎黃蠟丸如鷄頭大三歲一丸用猪肝

一片切開安藥在內煮熟先薰眼後食之效

一方無井泉石一名黃肝散

曾青膏 治小兒眼患白翳遮睛

空青一錢 曾青半錢 芦甘石一錢 龍腦半錢 白礬 青葙

張明一

右除龍腦外用水一大碗將六味煮十數沸研

砂青鹽已化汁乾取出後用黃連玄參木賊穀

精草當歸煮汁一盞却將蘆甘石火煨燒紅淬

七次同前藥研極細入片腦研勻用少許點眼

中翳

熊膽丸 治眼目諸疾

熊膽一分 黃連 密蒙花 羌活各二兩 防已二兩

半草龍膽 蛇蛻 炙地骨皮 大木賊去節 瞿麥

仙靈脾各一兩 旋覆花 甘菊花各半 麝仁一錢 半

麒麟竭錢二 蔓菁子水淘

右為細末以羯羊肝一具煮其半焙乾雜於藥

中取其半生者去膜乳爛入藥和而丸之如桐

子大每服三十丸食後米湯送下

龜膏 龜背論

論龜膏龜背此病皆因姪母好食辛辣炙煿淹藏

之物生下嬰孩膏高背壘形如龜狀此肺經受熱

也行動喘乏但遇風寒或多食則痰嗽氣急喘滿

肢體僵痺瘦悴久而不治將成痼勞之疾治法宜
鍼灸肺腧取龜尿點脊縫中常服平肺潤燥之藥
不爾則成痼疾矣

百合丹 治胸高脹滿其狀如龜此肺經受熱所
致也乳母酒麪無度或夏月熱煩熱乳與兒吮之
或乳母多食五辛亦成此疾

川大黃 三分 天門冬 焙去心 杏仁 去皮 百合

木通 桑白皮 紙上 甜葶藶 紙上 爛石膏 各半

右為末煉蜜丸菜豆大每服一十五丸食後臨

卧熱水化下

松葉丹 治嬰兒生下不能護背客風吹脊入於
骨髓致之或坐太早亦致偃僂背高如龜多成痼
疾

松花 枳殼 防風 獨活 各一兩 麻黃 前胡

川大黃 桂心 各半

右為末蜜丸黍米大每服十粒粥飲下量兒加
減

灸法肺腧穴第三椎骨下兩傍各一寸半膈腧穴

第七椎骨下兩傍各一寸半以小兒手中指中節
為一寸艾炷如小麥大但三五壯而止

取龜尿點脊法將龜放於青荷葉上用鏡照之其
尿自出鍼點脊腧中

辛夷散 治肺虛為四氣所干鼻內壅塞不已涕
出或氣息不通或不聞香臭

川芎 木通 各半 防風 各半 甘草 炙 辛夷 細辛

上藥本若升麻 香白芷 各半

右為細末每服二錢食後茶清調下

解頤解頤論

論曰小兒解頤人稟天真之氣虛實不同實則根
本固腦髓盈頭顱骨厚顱戶易開少病虛則精神
少而眇白色而顱解多病蓋腎氣不足故也宜補
腎氣久而不聞者不治又有顱填顱陷此候亦是
腎虛水火不能既濟或因驚熱則顱戶起驚風
之候忽然而至矣或有因土瀉脾虛顱四作坑
盡是者此亦是脾元虛損精神耗散久而不起
多致不救

地黃丸 治年大小兒頭縫開解不合腎主髓腦
為髓海腎氣有虧腦不足所以腦顱開而不能合
凡腦髓欠少如木無根不遇十日終成廢人

大熟地黃

四錢

山茱萸

乾山藥

各二錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

各半錢

右為末煉蜜丸梧桐子大每用一二丸溫水空
心送下兒小則化服仍用大南星微炮為末米
醋調傳於緋帛上烘熱貼之

三辛散

治頭骨應合不合頭骨開解名曰解顱

細辛

桂心

各半錢

乾薑

半錢

右為末以乳汁和傳顱上乾復傳之而面赤即
愈

又方蛇蛻炒焦為末用猪頰車中髓調傳頂上日
三四度有人作頭巾裹遮護之久而自合亦良法
也

又方顱頭骨不以多少燒灰研細以清油調敷顱
縫中治顱陷單方小兒因臍腑有熱渴飲水漿致
成泄利久則血氣虛弱不能上交腦髓故顱陷如

坑不得滿平宜用黃狗頭骨炙黃為末鷄子清調
勻傳

治小兒肝盛風熱交攻致令顱填凸起宜服瀉青
丸

方見前

五軟

五硬論

論曰五軟五硬行遲語遲手足蹇變不舒此病蓋
因五臟受氣不足項軟乃肝受風熱傳入心脾或
因吐瀉而致此病者可以助脾胃去肝家風熱項
筋自直語遲者嬰兒在胎其母卒有驚怖驚氣乘

於包絡之經生子心神不足不通舌本故使不能
言五硬者肝受風邪乳母強力布氣不均故令子
頸項四肢硬直冰冷又如鶴節俗謂之鼓椎風此
亦腎虛精髓內耗膚革不榮枯瘁如鶴脚之節乎
又有肝氣怯弱致使筋脉攣縮兩手不能舒伸又
有腎氣不足血弱不能榮筋兩足蹇攣不能行步
已上證候皆由胎稟不全筋脉不續骨力微寡故
不能行也久而不治以成無辜篤廢之疾不可不
知

天柱丸 治風氣頸項軟頭不得正或去前或去後

蛇含石 大一塊 煨七次 川礬金末 許

右碾細末又入鉢內研極細和前藥米入少麝

香和勻用雪白大米飯丸龍眼大每服一丸荆

芥湯化下或又入生薑汁一二滴或用金銀薄

荷湯早晨不拘時下風熱項軟合用涼肝丸前

五加皮散 治頸軟

右用五加皮為末酒調塗傅頸骨上

健骨散 治久患疳疾體虛不食及諸病後天柱

骨倒醫者不識謂之五軟

白僵蚕為末三歲兒半錢薄荷酒調下後用生

筋散貼

生筋散 治如前

木鱉子 六箇 去殼 麻子 六十箇 去殼

右研細先抱起顧摩項上令熱津唾調貼之効

又方用附子土用去皮臍天南星切各等分生

薑自然汁調貼項軟處

菖蒲丸 治受胎其母卒有驚怖邪氣乘心舌本不通四五歲長猶不能言

人參 石菖蒲 麥門冬 去心 遠志 研碎 姜川芎

當歸 各二滴 乳香 朱砂 各一錢 另研

右為末煉蜜丸麻子大每服十九粒粳米飲下

薏苡丸 治所受肝氣怯弱致兩脉變縮兩手伸

展無力

當歸 秦艽 薏苡仁 酸棗仁 防風

羌活 各一兩

右為末煉蜜丸雞頭大每服一粒至二粒麝香

荆芥湯化下

海桐皮散 治稟受腎氣不足血氣未榮脚指拳

縮無力不能伸展

海桐皮 牡丹皮 當歸 熟地黃 牛膝 各一兩

兩山茱萸 補骨脂 各半兩

右為末每服一錢葱白二寸煎食前服

地黃丸 治氣血不充骨髓不滿軟弱不能行或

肝腎俱虛肝主筋筋弱不能束所致一方加川牛

膝五加皮酒炙鹿茸妙亦治鶴節方見前

又方虎骨丸

虎脛骨酒炙生乾地黃 酸棗仁酒浸去辣桂

白茯苓 防風 當歸 川芎 牛膝

右等分為末煉蜜丸麻子大每服五十九酒吞

下或木瓜湯下

五加皮散 治三歲不能行

真五加皮分一牛膝 酸木瓜乾各半

右為末每服一錢半粥飲調次入好酒兩點再

調食前服日二劑

鷄頭丸 治小兒諸病後不能語

雄鷄頭一箇 鴨蟬三箇 大黃一兩 黃耆切 遠志

甘草一兩 當歸分切 木通兩半 黃耆切 遠志

去麥門冬各三分 人參半兩 切

右同為細末煉蜜丸小豆大平旦米飲下五九

空心日三四兒大者加之久服取效鷄蟬二物

宜求死者用之不可旋殺孫真人所謂殺生求

生去生更遠不可不知

羚羊角丸 治兒腎虛或病後筋骨弱五六歲不
行宜補益腎肝

羚羊角火細不 鹿茸酒炙 虎脛骨酒炙 生乾地黃

酸棗仁酒炙 白茯苓各半 桂枝去皮 炙甘草

防風切 當歸同 黃耆切 各

右為末煉蜜和劑每服一皂子大兒大者加之

食前溫水化日三四服效

紫金丸 治酒疸食黃五積六聚七癥八癰心腹

疼痛潮熱等疾不問大人小兒皆可服

青皮 陳皮 厚朴 二 百草霜 秦艽

枳殼 香附子 三 棗 蓬 木 石 留 九 金 魚 鱉

乾漆 附子 檀榔 甘草 五

一方加仙朮 白朮

右為末用大肥棗煮爛攤去皮取肉作泥為丸

大人如梧桐子大小兒如麻子大每服六七十

九空心米湯送下以乾物壓之

雜方

菴蓉丸 治稟受血氣不足不能榮於髮

當歸去尾生熟地黃 肉苁蓉酒洗 楊芍藥各二兩

胡粉五錢

右為末煉蜜丸如黍米大每服十粒煎黑豆湯

送下兼磨化塗抹頭上

芎黃散 治齒不生齒者由骨之所終髓之所養

稟氣不足則髓不能充於骨故齒久不生

川芎 乾地黃 當歸 山藥 白芍藥各一兩

沉香半兩 粉草三錢

右為末溫鹽湯調服半錢用以許揩齒脚亦可

單方雄鼠糞二十七粒兩頭尖者是每日用一粒

揩齒根上至二十一日當生

瓜蒌丸 治初病脫肛鼻梁青脉唇白齒根焦黃

久病兩頰光眉赤唇焦多啼哭久痢腹疼

黃瓜蒌箇一白礬半兩

右將白礬入瓜蒌內固濟火煨為末米糊丸每

服三十丸米湯送下空心服

水聖散子 治脫肛不收

右用浮萍草不以多少并為細末貼於患處

尿血方

生蒲黃 生地黄 赤茯苓 甘草各一分

右剉散每服一錢水一小盞煎調油髮灰少許

食前服

心經散 治十餘歲因驚之使心氣下行小便淋

瀝日夕三四十次漸覺黃瘦宜服

韭子炒 琥珀研 磁石研 金毛狗脊去土 白茯苓

石燕子去土 石薺去土 石菖蒲去土

右為末每服一錢非湯調日二服

三白散 治一脫肛熱風熱相乘陰囊腫脹大小

便不利

白牽牛二兩 桑白皮 白朮 木通去土 陳皮去白

右為末每服二錢薑湯調空心服

桃仁丸 治一啼叫怒氣閉擊於下結聚不散水實

不行發為此一服

桃仁去尖 三棱去土 牽牛去土 白蒺藜去土

刺牡丹皮 大黃二兩

右為末煉蜜丸如麻子大每服五丸至七丸青

皮木通葱白鹽少許煎湯灌下或煎大流氣

研青木香九灌下

遇仙方 治風熱外腎焮赤腫痛日夜啼叫不數

日退皮如鷄卵殼愈而復作用老杉木燒灰入臍

粉清油調傳効

畫眉膏 斷乳法

梔子 三箇燒存性 雌黃 朱砂各少

右為末入生清油輕粉少許調勻候兒睡着濃

抹於兩眉醒來自不喫乳未效再用即驗

倒聖散 治小兒口瘡

大天南星 去皮只取中心如龍眼大為細末

右用醋調塗脚心

二黃散 治腦寒鼻中冷涕不覺非時注下

硫黃 黃丹 香白芷

右為細末每用少許吹入鼻中

金華散 治小兒一切濕瘡癬疥瘡等

黃藥 黃連 各半兩並黃丹一兩輕粉一麝香

研一字

右同研勻先以溫水洗後貼之

通雲散一名紅線散 治小兒癰耳

黃丹 龍骨 乳香 輕粉 白礬 火麝香

坯子胭脂 各一錢

右同研勻每用少許先用綿裹枝子擦淨搽之

龍石散 治大人小兒上唇壅毒口舌生瘡咽

腫塞疼痛妨悶每用少許搽貼患處嚥洋小兒瘡

疹毒氣攻口齒先用玉福化毒丹掃後仍再用此

藥搽貼立効

硃砂 研飛二兩半 寒水石 燒赤五兩 生腦子 研二錢半

右為末每日五七次用夜卧搽貼妙

吹喉散 治三焦大熱口舌生瘡咽喉腫塞神思

昏悶並能治之

蒲黃 一盞硝一兩 青黛 半兩 紫河車 五錢

右為末細研一方口紫河車薑蚕二錢一處研

細每用一字或半錢搽於口內良久出涎吞之

不妨或喉中腫痛用筒子入藥半錢許用力吹

之立效

綠雪治因候腫痛口舌生瘡

水飛硃砂 調消

右研勻搽口中含化亦得

治小兒鵝口舌上生白屑如堆粟米粉用亂髮纏手指上掠之

又方治底耳用桑螵蛸燒存性入麝香末少許用香油調藥入耳中

又治小兒鵝瘡用硫黃五白礬一

半黑勝煉油調藥先用滾水洗頭刺淨貼之

治小兒湯火燒瘡背陰牆上青苔而末香油調敷

立效

治膿瘡多年不瘥用出子黃茹切片貼之效

治發背癰疽方

羌活一兩穿山甲醋炒焦生人參半兩西

麝香許少

右件煎麻黃薄荷酒調如陰瘡頭平向內者即之即突出其功效不可具述若小兒痘瘡黑陷

者只一服而起萬不失一

治蚰蟥入耳

信花錢雄黃一

右為細末先用藥一字點耳中用猫尿灌之用

生薑擦猫牙覆盆中其尿自出

治發背熱腫用野人糞底下土水調敷患處

通關膏 治吹着兒鵝令兒鼻塞不能吮乳

香附子 川芎 荊芥 姜蚕 細辛

猪牙皂角

右等分為末用葱白搗爛入藥和勻担作餅貼

於顙上

口瘡綠袍散 治重舌滿口內外瘡毒咽候不利

薄荷 荊芥錢各五青黛 玄明粉 硼砂錢各二

栢藥煎 甘草錢各三

右件剉碎末除硼砂玄明粉研勻或以新水調

貼舌上

育金散 治小兒濕癬逆淫等瘡

白膠香二錢蛤粉五錢青黛二錢半

金散 治走馬牙疳

人言 銅青 輕火 鐵屑 五分另研

右為細末少許如米泔水調敷

治小兒陰囊或腫痛

右以生甘草汁調地龍糞輕塗之

治偏正頭疼西江月

此藥名為不吐 細辛甘草人參 川芎白芷

二錢停 半兩藜蘆為定 搗羅研為細末

專醫偏正頭風 二合水藥次鼻中 時下交

君便應

又方 此藥名為六聖 乳香沒藥川芎 雄黃

白芷二錢停 半兩盆硝共用 右件研為細

末 專治眼疾頭風 耳鳴鼻塞腦不清 一

搗牙疼便定

血竭紫金丸 治酒疸食黃五積之聚七癥八腹

心腹疼痛潮熱

青皮 朴鼓木三錢 續抑香附針砂沉 皂莢

二錢日草喝 百霜決二一凡泰 醋調棗肉

每服加添七十均 酒疸食黃癥結

瘰癧 黃疸化作美顏人

止渴 沉香 青皮 厚朴 各二

枳殼 百草霜 秦艽 各一 三棱 醋浸

蓬朮 皂莢 黃石 留禁 二兩 炒

香附子 乾漆 炒 檳榔 二

甘草

一方加仙木 白木

右為細末用大棗 爛 打州為丸如桐子

大每服六七十丸 酒 米飲亦可乾物

壓之

治停耳膿耳不問新久疼痛不止用黃蠟如皂角

子大槵成條外用好綿艾揉熟裹了點着薰耳患

處疼止住量

治暴赤眼用棗刺鍼灸取汁或鐵器燒紅取汁

點入眼角

書卷之終

老懷幼書為平卷山西
 一氣川劉志大先生之所集刻
 是是舊述二書于先生先生
 合而一而題以之其時之
 由與刻之立前序具矣獨
 合不平百餘年未人文漸
 岩高山滴壁藏冢掩者往之出
 於人間好之而購而刻之
 然或江雜以神
 未終篇輒棄去不復省錄者蓋
 名所發於義理而不足以
 事功故耳之是未刻既成凡
 人子為人者誠得而讀
 完之誠將見四海之內
 或無天札而得其天
 天性不佐

其功細矣較之世之所
 八淫難心神者豈可同日語也
 先生之用心可謂仁心已先普
 示君臣以仁立國王元之著
 壽域碑以頌之先生異時秉鈞
 當軸得盡用其術以佐
 聖天子開壽域於八荒則予也雖
 雖不敢元
 今日續之
 治十一年四月廿又六日
 賜進士出身奉政大夫山西按察
 司提學僉事南陽王鴻儒書



安老懷幼書四卷

浙江朱葵尊家
曝書亭藏本

明劉宇編宇字志大河南人成化壬辰進士官至
山西按察司副使初宋咸淳中陳直撰養老奉親
書元大德間鄒鉉續爲壽親養老新書黃應紫合
爲一篇刻之宇於成化戊戌得其本宏治庚戌重
爲刊行改名安老書仍爲三卷後六年丙辰復得
雪川婁氏卹幼集又補刻於後總爲四卷題曰安
老懷幼書雪川婁氏明洪武永樂間御醫也字得
之於其曾孫云

神應經一卷

〔明〕陳會撰

中國中醫研究院圖書館藏日本昭和四十

九年東京都盛文堂據日本正保二年版

翻刻本

附《四庫全書總目·神應經一

卷》提要

重刊神應經序

恭惟我

主上殿下之六年也

命禮曹申嚴醫教設鍼灸專門法擇其精於術者爲師而資性明敏者爲弟子勸勵之法甚悉焉適有目本釋良心以神應經來獻兼傳其

本國神醫紀介氏黃霞氏治癰疽八穴法其八穴雖未試用神應經其傳授遠有取自而取論折量補瀉法皆古賢所未發者其取穴又多起發古人所未盡屢其取穴者穴皆撮其切要而得効多者文簡而事周令人披閱皆列間證與穴驗

然在目

聖上嘉歎命以八穴法付於神應經之
末鈔梓廣布且以永其傳焉臣竊
惟醫療之方藥餌鍼灸不可偏廢
但藥非本國所產者頗多大槩皆
求之中國而又非盡出於中國也
轉々市易得之甚難豈真屬陳新

之可擇而貧窮下賤與遠方之人
亦未易遍及也唯砭熨之方無費
財遠求之勞採集合和之難一鍼
一艾備應無方運於指掌辨於談
笑貧富貴賤遠近緩急無適不宜
況於取効常在藥力所不及攻處
而其功用神妙難以備述庸醫不

知以爲卑辱至相詬病而不肯爲
故世之病者生死壽夭率皆付之
平覲淫祀豈不哀哉

聖上愍其然乃設專門益嚴勸督適有
遐方之獻不以珍奇可玩之異物
而以此救民濟世之神方不期而
至以孚我

聖上仁民愛物之盛德夫豈偶然哉成
化十年十一月二十一日推忠定
難翊戴純誠明亮經濟佐理功臣
崇祿大夫西平君臣韓繼禧謹序

神應經序


唐虞之紀官，非剡子不能以明其制，
義軒之製藥，非師襄則無以審其音。
是以聖人師之醫道之學，吾未能也。
故有吾不如老農之嘆，然人之有身，
血氣所醉，嗜欲所汨，寒暑所搏，萬慮
所攻，鮮有不至於疾者，非至人曷能

安之？是以聖人因之而制砭熇之方，
出焉。昔在太朴之世，未有藥物，獨用
砭熇之道，活生民於掌握。此醫道之
大者也。予喜其無藥物咀咀之勞，而
能回生於指下，可謂易矣。乃求其術
於醫者，久而得之者十有餘家，獨宏
綱乃遇信卿席真人，取授之術，故其

補瀉折量之法，其口訣指下之妙，與
世醫之取不同，出於人者見於此也。
其徒二十四人，獨劉瑾得其指下之秘，
能繼宏綱之術而無墜也。予謂千將
雖神使之補瀉，莫若一針之能，良藥
雖衆至於劫病，莫若一針之捷。藥以
氣味而達之，故其宜利經絡也。遲針

以剡刺而取之，故其疏通血脈也。速
沉加以冰臺灼以神燧，助其真陽，逐
其陰邪，而元氣充矣。奚何病之有哉？
若人遇夜或在路，倘有微恙，藥不可
得也。惟砭熇之術可以應倉卒之用。
士之於世欲治生者，不可不知予故
愛而學之。乃命醫士劉瑾重校其師

宏綱先生既傳廣愛書十卷予止取其穴之切于用者為一卷更其名曰神應經內五百四十八證計二百一十一穴又擇其劉瑾之經驗者六十四證計一百四十五穴纂為一冊目曰神應秘要而以此心推之於眾庶不負宏綱廣愛之仁也此書世既未有用傳於世今命刊行以紀於首章云時在洪熙乙巳四月二十一日書



年

成化九年癸巳孟冬日本國島山殿所使副官人信州隱士良心言我國二百年前有兩名醫一為和介氏一為丹波氏此二醫專治癰疽疔瘡癰瘰等症定公處灸法甚有神效

八穴灸法

頭部二穴 諸瘡發于頭部則耳尖上周圍用木桿量之耳尖上起端為第一穴以其桿當結喉下至項後及無先上還至起端為第二穴以其桿當結喉下至項後及無之以厚人其橫握其端而切去之其桿中央當結喉下未而斷之施針針一夫之法其桿端當處脊中骨上點之瘡出左者去中骨半寸灸左出右者灸右出左右者並灸左右



手部二穴 瘡發于手部則自肩至高骨端為第一穴至第三指

頭部二穴 瘡發于頭部則自耳尖上周圍用木桿量之耳尖上起端為第一穴以其桿當結喉下至項後及無先上還至起端為第二穴以其桿當結喉下至項後及無之以厚人其橫握其端而切去之其桿中央當結喉下未而斷之施針針一夫之法其桿端當處脊中骨上點之瘡出左者去中骨半寸灸左出右者灸右出左右者並灸左右

背腹部二穴 瘡發于背腹則乳上周圍用木桿量之乳上起端為第一穴以其桿當結喉下至項後及無先上還至起端為第二穴以其桿當結喉下至項後及無之以厚人其橫握其端而切去之其桿中央當結喉下未而斷之施針針一夫之法其桿端當處脊中骨上點之瘡出左者去中骨半寸灸左出右者灸右出左右者並灸左右

足部二穴 瘡發于足部則並立兩足令相著自左大拇指端至右大拇指端用繩量之足大拇指端起端為第一穴以其桿當結喉下至項後及無先上還至起端為第二穴以其桿當結喉下至項後及無之以厚人其橫握其端而切去之其桿中央當結喉下未而斷之施針針一夫之法其桿端當處脊中骨上點之瘡出左者去中骨半寸灸左出右者灸右出左右者並灸左右

梓桑君鍼道傳宗圖



神應經

宏綱先生 陳會 善同 撰
醫士 臣 劉瑾 永懷 重校

宏綱先生曰太匠誨人能與人規矩不能使人巧會用針法四十手于茲矣間有不鄙相與譁明者每設法開悟惟恐人之不達也初嘗著廣靈書一十二卷為詩為賦自謂頗無餘蘊又慮其浩翰廣漠或者厭繁而習倦卒不能力底于成道以言而傳文以言而誨於是擇其必須熟記者纂為廣靈書拾斯亦約矣猶慮不知入門之要致有窺竊之嘆故復編取一百一十九穴為詩為圖仍集治病要穴總成一帙以為學者之規矩此既謂約之又約者可不謹識而習熟之乎若

夫神聖工巧出於驪黃牝牡之外者是又在於領意會時變通蓋有難言傳者當俟其真積力久而自得之可也故作是書以示後學

砭烙科目

- | | | |
|------|-------|----------|
| 百大法歌 | 折量法 | 補瀉手法 |
| 灸法圖 | 灸四花穴法 | 諸風 |
| 傷寒 | 痰喘咳嗽 | 諸般積聚 |
| 腰痛脹滿 | 心脾胃 | 心邪頭症 |
| 霍亂 | 瘧疾 | 脰脹附紅瘰癧瘰癧 |
| 汗 | 痺厥 | 腸痔木便 |
| 陰疝小便 | 頭面 | 咽喉 |
| 耳目 | 鼻口 | 胸背脇 |

手足腰肢
瘡毒

婦人
雜病

小兒
迷日人神所在

百穴法歌

手之太陰經屬肺 尺澤肘中約紋是
經渠寸口陷脈記 太淵掌後橫紋頭
少商太指內側尋 本節前取二間定
手陽明經屬大腸 岐骨陷中尋合谷
本節後取三間志 曲池曲肘外輔當
三里曲池下三寸 五分俠孔取迎香
足陽明經屬胃之經 頭維本神寸五分
頰車耳下八分是

地倉俠陽四分陷 伏兔陰市上三寸
三里膝下三寸取 上廉里下三寸主
鮮髕腕上繫鞋處 冲陽陷谷上二寸
內庭次指外間求 厲兌如韭足次指
足之太陰經屬脾 隱白太指內角宜
太白後下一寸為 公孫節後一寸得
內踝三寸陰交穴 陰陵膝內輔下施
手少陰經屬心之經 少海肘內節後明
神門掌後兌骨橫 小指之端取少澤
手太陽經屬小腸 腕骨腕前起骨下
後髕節後仍外側 陽谷小下腕中得
小海肘端去五分 聽官耳珠如菽側

大陽膀胱何處看 睛明目眥內角畔
絡却後髮四寸半 肺俞三椎膈前七
腎俞十四椎下傍 膏肓四五三分第
承山腓下分肉斷 崑崙腓下後五分
申脉腓下節骨間 可容小甲慎勿亂
少陰腎骨所當 然谷踝前骨下識
照海踝下四分的 復溜內踝上二寸
手厥陰兮心包絡 曲澤肘內橫紋作
內關二寸始無錯 太陵掌後兩筋間
手少陽兮三焦論 小次指間名液門
陽池表腕有穴存 腕後二寸外關絡
天井肘上一寸許 角孫耳廓開口分
睛明目眥內角畔 橫竹兩眉頭陷中
肝俞九椎之下按 委中膝膈約紋中
金門腓下陷中撰

耳門耳關非虛文 耳前陷中分明揣
足少陽膽取聰會 目窓泣上一寸存
臨泣之穴於頰在 帶脉肋下寸八分
肩井骨前看寸半 陽陵膝下一寸求
風市髀外兩筋頭 五瀝膝前有陷中
絕骨腓上三寸從 依髕小次岐骨縫
依髕肝經果何處 大敦每指有毛髮
大冲節後有脈據 中封一寸內踝前
章門臍上二寸量 橫取六寸看兩傍
直下寸半二肋端 期門乳傍一寸半
腎脉水溝鼻柱下 上星入髮一寸者
百會正在頂之顛

風府後髮一寸把 瘰癧後髮五分 太樞第一骨上存
腰俞二十一椎下 請君子細詳經文
任脉中行正居腰 關元臍下三寸銀 氣海臍下一寸半
神關臍中隨所欲 水分臍上一寸求 中脘臍上四寸取
臍中兩乳中間索 承漿定之唇下搜

折量法

巨理曰夫鍼灸之術其旨微矣穴法之訛其來遠矣
如背俞骨有數穴皆起死迴生之要穴而折量分寸
皆致訛誤 巨獲善同陳先生親授「穴」法毫厘有
差且如背俞前寶書中皆云夾脊各寸半是共折三
寸分兩傍取之殊不知言夾脊其穴字是除脊而言

若無脊骨當以兩傍各二寸共折四寸分兩傍又如
背脊二穴當除第一椎小骨不數若連第一椎數下
當在五椎下兩傍各三寸半共折七寸分兩傍按其
瘰癧處乃是其穴 巨每依此灸療多獲痊愈又折量
之法世俗盜學妄傳自頭部背脊手足部一藥用同
身寸量之殊不知頭部有頭部之尺寸腹部有腹部
之尺寸橫直尺寸俱不同各有其要惟背脊手足部
並用同身寸取之學者不察不可不注意焉故書此
以正之

頭部

前髮際至後髮際折作十二節為一尺二寸前髮際不明
者取眉心上行三寸後髮際不明者取太樞上行三寸前

後髮際不明者共折作一尺八寸
橫寸以取肉背角比至外背角為一寸頭部橫寸並用此
法
神庭至曲差寸至平神寸至頭維各一寸半自神庭
至頭維共四寸半

背脊

太樞穴下至尾骶共二十一椎通折作三尺
上七椎每椎一寸四分一厘共九寸八分七厘
中七椎每椎一寸六分一厘
十四椎與臍平共二尺一寸二分四厘
下七椎每椎一寸二分六厘
第二行夾脊各寸半除脊一寸共折作四寸分兩傍

腹部

第三行夾脊各三寸除脊一寸共折作七寸分兩傍
橫寸膺部腹部分用郭間橫折作八寸腹部應有橫寸悉
依上法
臍中中行心蔽骨下至臍共折作八寸人若無心蔽骨者
取岐骨下至臍心共折九寸取之
臍中至毛際橫骨折作五寸
天突至臍中為橫折作六寸八分下行一寸六分中庭
上取天突下至中庭共折作八寸四分一
手足部 並用同身寸取之

補瀉手法

馮飲直說

臣璉曰：昔宏綱先生校曰：取穴既正，左手大指揣其穴，右手置針於穴上，令患者咳嗽一聲，隨咳，針至分寸候，數穴針畢，停少時，用右手大指及食指持針，細令動搖，連退挫捻其針，如手顫之狀，謂之催氣，約行五六次，覺針下氣緊，即用瀉法，如針左邊用右手大指食指持針，以太指向前食指向後，以針頭輕提往左轉，如有數針候依此法俱轉畢，仍用右手

楠訣直說

臣璉曰昔宏綱先生授曰凡人有疾皆邪氣聚滯雖病人瘦弱不可專行補法經曰邪之所湊其氣必虛如患赤白等疾明見其為邪熱所致可專行瀉法其餘諸疾只宜平補平瀉須先瀉後補謂之先瀉其邪後補其氣此乃先生不傳之秘訣也如人有疾依前法針用平法催氣聚氣瀉之既畢却行

補法冷病人吸氣一口隨吸轉針如針左邊捻針頭輒向右邊以我之右手太指食指持針以食指向前太指向後仍捻針深入一二分使真氣深入肌肉之分如針右邊捻針頭轉向左邊以我之左手太指食指持針以食指向前太指向後仍捻針深入一二分如有數穴依此法行之既畢停少時却用手指於針頭上輕彈三下如此三次仍用我之左手太指食指持針以大指連提三下觀之飛將針深進一二分以針頭轉向左邊謂之一進三飛依此法行至五六次寬針下沉緊或針下氣熱是氣至足矣冷病人吸氣一口隨吸出針急以手按其穴此謂之補法也

穴法圖



百會 在頂中陷中容豆許去前髮際五寸後髮際七寸灸
 上星 在鼻上入髮際一寸針三分以細三稜針泄諸陽氣
 目窓 在臨泣後一寸灸五壯針三分三度刺目大明
 臨泣 在目上直入髮際五分陷中針三分灸五壯
 風府 在項後髮際上一寸大筋內宛々中針四分灸五壯
 風池 在項後入髮五分宛々中仰頭取之針三分灸五壯
 耳門 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯
 地倉 在口吻四分之外近下有脉微々動是也針三分
 迎香 在鼻旁五分針三分不灸
 頰車 在耳下八分近前迎頰端上陷中針四分灸目七壯
 聽會 在耳後前陷中上開下一寸動脈宛々中開口取之
 耳門 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯
 耳中 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯
 耳前 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯
 耳後 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯
 耳內 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯
 耳外 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯
 耳上 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯
 耳下 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯

絡却 在腦後髮際上兩傍起肉上各一寸三分腦後梳骨
 俠腦戶自髮際上四寸半針三分灸三壯
 角孫 在耳廓中間上開口有空針八分灸三壯
 肩井 在缺盆上大骨前寸半以三指按當中指下陷中上
 可五分若深冷入悶倒速三里下氣
 有髃 在肩端兩骨間有陷宛々中針八分灸五
 壯可日七至二十
 睛明 在目眥內角針寸半雀目者可久留針然後速出禁
 灸
 攢竹 在兩眉頭小陷宛々中三分三度刺目大明宜針
 出血
 絲竹空 在肩後陷中針三分宜滿不宜補禁灸之使人
 目小無所見
 頭維 在額角入髮際本神傍寸半取曲髻一寸針三分灸
 迎香 在鼻旁五分針三分不灸
 頰車 在耳下八分近前迎頰端上陷中針四分灸目七壯
 至七七
 聽會 在耳後前陷中上開下一寸動脈宛々中開口取之
 針七分不補日五壯止三七壯
 耳門 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯
 耳中 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯
 耳前 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯
 耳後 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯
 耳內 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯
 耳外 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯
 耳上 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯
 耳下 在耳中起肉當耳缺陷中針三分灸五壯

半灸，日七，二十七重者，七

水溝 在鼻柱下溝中央，針四分，灸不及針，水腫，惟得針，此

日三壯，止二百壯

承漿 在頤前唇稜下宛中，針三分，灸日七壯，止七壯，注依

小筋頭大

豐中 在乳兩間折中而取之，有陷是穴，仰而取之，禁針灸，

七壯，止七壯

期門 在乳傍，一寸半，直下又一寸半，第土肋端縫中，其寸

用，胸前寸折量針四分，灸五壯

中腕 去腋骨尖四寸下至臍四寸，針八分，灸至七至一百壯

止四百壯

水分 在臍上一寸，水病灸之大良，禁針，水盡即死，針八

分，灸七壯至四百壯

章門 在臍上二寸兩傍各六寸，其寸用，胸前兩乳間橫折

八寸內之六寸，側臥屈上足伸下足取動脈，灸日七壯至

二十七壯

帶脉 在季肋下一寸八分，臍上二寸兩傍各七寸半，針六

分，灸七壯

神闕 當臍中，禁刺之，使之使，臍中瘍潰屎出者死，灸百壯

氣海 當臍下一寸半，宛中，針八分，灸百壯


關元 在臍下三寸，自臍心至橫骨，通折五寸，針八分，灸百

壯至三百壯，不及針

大椎 在脊骨第一椎上陷者，宛中，人髮不明者從此穴

上行三寸，針五分，灸以年為壯

寅手太陰肺經



肺俞 在第三椎下兩傍各一寸，灸百壯，針出之，二日卒

膈俞 在第七椎下兩傍各二寸，灸百五壯

肝俞 在第九椎下兩傍各二寸，灸七壯，針中之五日卒

腎俞 在第十四椎下與臍平，兩傍各二寸，灸以年為壯，針

出之，六日卒


膏肓 在第五椎下兩傍各三寸半，四肋三間去臍骨容側

指許灸，百壯，止一斗

腰俞 在二十一椎下自大椎至此折三尺，舒身以腹挺地


兩手相重，雙額四指後，乃取之，針八分，灸七壯至十七

經 陽 明 大 手 少




尺澤 在肘中約紋上兩筋間動脈針三分不可針深灸五壯
 列缺 在手側腕上一寸半以手交中指頭末兩筋間骨節中針三分灸七壯
 經渠 在寸口陷中動脈應手針二分灸三壯
 大淵 在掌後內側橫紋頭動脈針二分灸三壯
 魚際 在大指本節後白肉際針三分
 少商 在手大指內側去爪甲如韭葉針一分灸三壯可鑱針

經 胃 明 陽 足 辰




商陽 在手大指次指內側去爪甲角如韭葉針一分灸三壯
 二間 在手大指次指本節前內側陷中針三分灸三壯
 三間 在手大指次指本節後內側陷中針三分灸三壯
 合谷 在手大指次指岐骨間陷中針三分灸三壯孕婦不可針
 陽谿 在手腕中上側兩筋間陷中針三分灸三壯
 手三里 在曲池下三寸臂之肉起兌向端針三分灸三壯
 曲池 在肘外輔骨曲肘橫文頭陷中拱肘取之針七分灸七壯可灸七至二百

經脾陰太足己




伏兔 在腓市上三寸循起肉坐而取之針三分灸三壯
 腓市 在腓蓋上三寸并而取之針三分灸三壯
 三里 在膝蓋下三寸胫骨間大筋內坐而取之針八分灸
 止百壯
 上廉 在三里下三寸兩筋兩骨鑄陷宛之中蹲坐取針三分
 下廉 在上廉下三寸取穴法與上廉同針三分灸七壯
 解谿 在冲陽後寸半腕上繫帶處取之針五分灸三壯
 冲陽 在足趺上骨陷二寸骨間動脈是穴針五分灸三壯
 陷谷 在足大指次指外間本節後陷中去內庭二寸針三
 分灸三壯
 內庭 在足大指次指外間陷中針三分灸三壯
 厲兌 在足大指次指端去爪角如韭葉針一分灸一壯

經心陰少手午




隱白 在足大指端內側去小甲如韭葉事不止刺之立
 愈針二分灸三壯
 大都 在足大指本節後內側白肉際陷中針三分灸三壯
 公孫 在足大指本節後一寸針四分灸三壯
 太白 在足大指內側大都後一寸下針三分灸三壯
 商丘 在內踝下崑崙前陷中前有中封後有照海其穴居中
 針三分灸三壯
 三陰交 在內踝上陷中三寸骨下陷中針三分灸三壯
 陰陵泉 在膝下內側輔骨下陷中針三分灸三壯對陽陵
 泉而稍高一寸針曲脈取之針五分灸七壯

經 筋 小 陽 太 手 未




少海 在肘內筋後去肘端五分曲肘取之針三分灸三壯
通里 在腕後一寸隨中針三分灸七壯
神門 在掌後兌骨端隨中針三分灸七壯炷如小麥
靈道 在掌後一寸半

經 筋 膀 陽 太 足 申



少澤 在手小指端去爪甲一分隨中針一分灸一壯
前谷 在手小指外側本節前隨中針一分灸三壯
後谷 在手小指外側本節後隨中針一分灸三壯
腕骨 在手後側腕前起骨下隨中有岐骨鐮縫針二分灸
三壯
陽谷 在手外側腕中兌骨下隨中針一分灸三壯
小海 在肘內大骨外去肘端五分隨中屈肘向頭取之針
三分灸三壯


酉足少陰腎經



委中 在足脛中央兩筋間約紋中動脈處針八分
 承山 在脛肚尖下分肉間陷中針八分灸否及針止十七
 崑崙 在足外踝後五分跟骨陷中針三分灸三壯
 申脉 在足外踝下陷中容八甲白肉際前後有筋上有踝骨
 下有軟骨其穴居中針三分
 金門 在足外踝下少後在壺後申脉前針一分灸三壯炷如
 小麥

十九


戌手少陰心包絡經



然谷 在內踝前起大骨下陷中針三分灸三壯不宜見血
 太谿 在內踝後五分跟骨上有動脈針三分灸三壯
 照海 在內踝下四分前後有筋上有踝骨下有軟骨其穴
 居中針三分灸七壯
 復溜 在內踝上陰蹕二寸蹕後五分與太谿相直針三分
 灸三壯
 湧泉 在足屈足卷指取之宛々中白肉際


二十

經焦三陽少手亥




曲澤 在肘內廉筋中屈肘取之太筋內側橫紋中動脈針
三分灸三壯
間使 在手掌後橫紋上三寸兩筋間陷中去腕後三寸針
三分灸五壯
內關 在手掌後橫紋上二寸兩筋間針五分灸三壯
中冲 在手申指端去爪甲如韭葉針一分灸一壯
太陵 在掌後橫紋中兩筋間陷中針五分灸五壯
勞官 在掌心屈指取之在無名指尖盡處是穴

經膽陽少足子




液門 在手小指次指間屈掌取之針三分灸三壯
中渚 在手小指次指本節後陷中針三分灸三壯
陽池 在手表腕上同骨陷中針二分灸三壯
外關 在腕後二寸兩骨間陷中針三分灸五壯
支溝 在腕後三寸兩骨間陷中針二分灸二壯
天井 在肘外大骨後肘上二寸兩筋間陷中又手按膝頭
取之屈肘取亦可針一寸灸三壯

丑足厥陰肝經



環跳 在髀樞中即碗骨下死々中也側卧伸足屈上
足取針二寸灸五壯止五十壯
風市 在膝上外側兩筋間直針手着膝當中指盡頭陷中
陽陵 在膝下一寸外廉陷中膝下外尖骨前木分灸七壯
陽輔 在外踝上除骨四寸輔骨前絕骨端如前三分去半
通七寸針五分灸三壯
懸鐘 下名絕骨鐘白外踝上除踝三寸必以絕隨處為穴
針六分灸五壯
丘墟 在外踝如前陷中去臨泣三寸針五分灸三壯
臨泣 在足小指次指本節後陷中去俠谿寸半針一分灸
三壯
俠谿 在足小指次指岐骨間本節陷中針一分灸三壯



灸四花穴法

自圍長桑裏 黑點不是灸處

太敦 在足大指端去爪甲如一韭葉針二分灸三壯
行間 在足大指本節前上下有筋前後有心骨尖其穴正
居陷中有動脈應手針六分灸三壯
太冲 在足大指後內間有絡耳連橫至地五會二寸骨縫鐘
間動脈應手陷中針三分灸五壯
中封 在內踝前一寸貼太筋後仰足伸足取而得之針四
分灸三壯
曲泉 在膝內輔骨下太筋上小筋下陷中屈膝取之當膝
曲腋橫紋頭內外兩筋間宛々中針六分灸三壯

第一次二穴

先令患人平身正立取一細繩用繩多之勿令展縮以繩頭於左文右脚大指端比齊順脚底下繩定引繩至脚根直上脚肚至曲臂中大橫紋前令患人解衣分兩邊腰見頭縫自頭門平分至脚後乃平身正坐將此繩子一頭於左端上按定引繩向上循頭縫至脚後貼肉垂下當脊骨正中繩頭盡處以墨點記之

婦人纏足者不遂生成自然之理若以足量必不及也當於右肩鵞穴點定以繩頭接其穴上伸手引繩向下至中指盡處截斷長穴男子亦可

却令患人合口以短繩繞一頭自口左角按定鈎起繩子向上至鼻根斜下至口右角作△此樣就齊口角截斷將

此繩展令直損取中以墨點記之將於先脊骨墨點處以繩子上中心墨點正壓脊骨墨點上兩頭取手勿令高下於繩子兩頭以墨點記之此是二穴也

已上是第一次點二穴

次二穴

令患人平身正坐稍縮臂膊取一細繩繞項自太推骨上掛往向前取每與肩尾尖齊將繩子從項下過肩下至足尾也即收截斷將繩頭向項後繞過喉嚨結骨上按佳以其繩夾項收截後脊骨上正中繩頭盡處以墨點記之

却令患人合口以短繩繞於口上橫量如一字樣齊兩吻截斷取前指中於脊骨上墨點處橫量如前法繩子兩頭

盡處以墨點記之此是四花穴橫二穴也

已上是第二次點穴通前共四穴同時灸各七壯至二十七壯至百壯壯或一百五十壯為初候次漸發時力依後法灸二穴

又次二穴

以第三次量口吻短繩子於第二次雙繩頭盡處脊骨上墨點處以短繩中盡處壓脊骨上墨點上下直放務要中正相傳於上下繩頭盡處以墨點記之此是四花穴上下二穴也

已上是第三次點穴謂之四花穴灸兩穴各百壯三次共六穴取灸日灸之唯用二用三日艾最佳百日內慎飲食房室安心靜養稍過一月後仍覺未愈

後於初穴上再灸

諸風部

偏風半身不遂	肩髃	曲池	列缺	合谷	手三里
環跳	風市	三里	委中	絕骨	丘墟
崑崙	照海				陽陵泉
足無膏澤	上廉				
左癱右瘓	曲池	陽谿	合谷	中渚	三里
陽輔	崑崙				
肘不伸屈	臑骨				
偏腫	列缺	冲陽			
身體反折	肝俞				

中風肘案

內開

目戴上 絲竹空

吐涎 絲竹空 百會

不識人 水溝 臨泣 合谷

脊反折 啞門 風府

風痺 天井 尺澤 少海 委中 陽輔

驚癇 尺澤 少冲 前項 束骨

風癇 神庭 百會 前項 湧泉 絲竹空

神關 一壯 鳩尾 三壯

風勞 曲泉 勝前俞七壯

風疰 百會三壯 肝俞三壯 脾俞三壯

腎俞 年為壯 膀胱俞

風眩 臨泣 陽谷 腕骨 申脉

中風 臨泣 百會 肩井 肩髃 曲池 天井

間使 內關 合谷 風市 三里 解谿 崑崙

照海

口眼喎 列缺 大淵 二間 申脉 內庭 行間

通谷 地倉 水溝 頰車 合谷

瘡癰 支溝 間使 合谷 魚際 靈道 陰谷

復溜 然谷 通谷

口禁 不開 頰車 承漿 合谷

凡患風癰瘡癰則僅仆在地 灸風池 百會

黃帝問岐伯曰凡人中風半身不遂如何灸之答曰人未

中風時兩月煎或三五箇月前非時足膝上忽發痠疼類

痺良久方醒此將中風之候也便須灸三里與絕骨穴

四處各三壯後用薄荷及桃柳葉煎湯淋洗灸完令驅逐

風氣於瘡口中出也灸瘡若春好秋更灸秋好春更灸常

灸二足上若有瘡瘡為邪凡人不信此法或飲食不節酒色

過度忍中此風言諸瘡瘡半身不遂道於七處各灸三壯

板風在左灸右在右灸左

一百會 二耳前髮際 三有井

四風市 五三里 六絕骨

七曲池

右七穴神効極多依法灸之萬無一失也

黃帝灸法 瘡中風眼戴上及不飲諸瘡

灸第一椎并五椎上各七壯同灸姓如半身不遂灸

傷寒部

身熱頭疼

橫行 大陵 神門 合谷 魚際

中渚 液門 少澤 委中 太白

通淋惡寒 令懷鼓頤 魚際

身熱 陷谷 呂細 足寒至膝乃出針 三里 後溜

俠谿 公孫 太白 委中 湧泉

寒熱 風池 少海 魚際 少冲 合谷 後溜

臨泣 太白

傷寒汗不出 風池 魚際 經渠各四 二間

過經不解 期門

餘熱不盡 曲池 三里 合谷

諸般積聚部

氣塊冷氣一切氣痰氣海

心氣痛連脇 百會 上脘 支溝 太陵 三里

心下如杯 中脘 百會

結氣上喘及伏氣氣 中脘

脇下積氣 期門

血結如杯 關元

青脈氣 章門 期門 中脘 巨關 氣海百壯

氣逆 尺澤 商丘 太白 三陰交

喘逆 神門 陰陵 崑崙 足臨泣

噎氣上逆 太淵 神門

噎逆 支溝 前谷 太陵 曲泉 三里 陷谷

然谷 行間 臨泣 肺俞

咳逆無所出者 先取三里後取太白 三里

煎際 太谿 竅陰 肝俞

咳逆振寒 少商 天突灸三壯

久病咳 少商 天突灸三壯

厥氣冲腹 解谿 天突

短氣 太陵 尺澤

少氣 間使 神門 太陵 少冲 三里 下廉

行間 然谷 至陰 肝俞 氣海

太氣 通里 內庭

諸積 三里 陰谷 解谿 通谷 上脘 肺俞

臍俞 脾俞 三焦俞

腹中氣塊 塊頭上穴針二寸半灸二七壯 塊中穴

針一二寸灸三七壯 塊尾穴針三寸半灸七壯

胸腹膨脹氣喘 合谷 三里 期門 乳根

灸法 天突 尾翳灸

又背上下穴其法以線一條套頸上垂至臍尾尖上截

斷牽往後脊骨上線頭盡處是穴灸七壯妙

腹痛脹滿部

腹痛 內關 三里 陰谷 陰陵 復溜 太谿

崑崙 陷谷 行間 太白 中脘 氣海 臍俞

脾俞 腎俞

食不下 內關 煎際 三里

小腹痛急痛不可忍及小腸氣外腎疝疝氣諸氣痛心痛灸足

大指次指下中節橫紋當中灸五壯男左女右極妙二足

皆灸亦可

小腹痛脹痛 氣海

繞臍痛 水分 神關 氣海

小腹痛 陰市 承山 下廉 復溜 中封 大敦

小海 關元 腎俞 隨年壯

夾臍痛 上廉

臍痛 曲泉 中封 水分

引腰痛 太冲 太白

腹滿 少商 陰市 三里 曲泉 崑崙 商丘

通谷 太白 大都 隱白 陷谷 行間	腹脹滿 陽陵 三里 上廉	心腹脹滿 絕骨 內庭	小腹脹滿 中脘 然谷 內庭 大敦	腹脹 天澤 陰市 三里 曲泉 陰谷 陰陵	商丘 公孫 內庭 太谿 太白 厲兌 隱白	肺俞 腎俞 中脘 大腸俞	腹而胃痛 膈俞	腹堅大 三里 陰陵 土壅 解谿 冲陽 期門	水分 神闕 膀胱俞	寒熱堅大 冲陽	藏腹 接溜 中封 公孫 太白 水分 三陰交	腹寒不食 陰陵泉	痰癖腹寒 三陰交	腹鳴寒熱 接溜	胸腹膨脹氣喘 合谷 三里 期門
心脾胃部															
心煩 神門 陽谿 魚際 腕骨 少商 解谿	胃脘痛 太谿 魚際 三里 兩乳下各一寸各三十壯	心痛食不化 中脘	心痛 通谷 心俞 巨關 七壯	心痛 曲澤 間使 內關 大陵 神門 太谿	心痛 太谿 通谷 心俞 巨關 七壯	心痛 太谿 通谷 心俞 巨關 七壯	心痛 太谿 通谷 心俞 巨關 七壯	心痛 太谿 通谷 心俞 巨關 七壯	心痛 太谿 通谷 心俞 巨關 七壯	心痛 太谿 通谷 心俞 巨關 七壯	心痛 太谿 通谷 心俞 巨關 七壯	心痛 太谿 通谷 心俞 巨關 七壯	心痛 太谿 通谷 心俞 巨關 七壯	心痛 太谿 通谷 心俞 巨關 七壯	心痛 太谿 通谷 心俞 巨關 七壯

公孫 太白 至陰	煩渴心熱 曲澤	心煩怔忡 魚際	卒心疼不可忍吐酸水 灸足太指次指內紋中各下壯炷如小麥大立愈	思慮過多無心力忘前失後 灸百會	心風 心俞 中脘	煩悶 肱骨	虛煩口乾 肺俞	煩怒不卧 太谿 公孫 隱白 肺俞 陰陵泉	煩心喜驚 少商 太谿 陷谷	心痺悲恐 神門 太陵 魚際	懈惰 照海	心驚恐 曲澤 天井 靈道 神門 太陵 魚際	二間 液門 少冲 百會 厲兌 通谷 巨關	章門	腎助 百會 天井 三間 二間 太谿 照海	厲兌 肝俞	腎助不言 肺俞	不得卧 太谿 公孫 隱白 肺俞 陰陵泉	三陰交	支滿不食 肺俞	振寒不食 冲陽
----------	---------	---------	-------------------------------	-----------------	----------	-------	---------	----------------------	---------------	---------------	-------	-----------------------	----------------------	----	----------------------	-------	---------	---------------------	-----	---------	---------

胃熱不食	下廉	胃脹不食	水分	心恍惚	天井	巨關	心俞	心喜笑	陽谿	陽谷	神門	大陵	列缺	魚際	勞宮	復溜	肺俞	胃痛	太淵	魚際	三里	腎俞	肺俞	胃俞	兩乳下	灸于食二十壯	翻胃	先取下脘	後取三里瀉	胃俞	臍俞	百壯	中脘	脾俞	噎食不下	勞宮	少商	太白	公孫	三里	中脘	在中指第二節尖	臍俞	心俞	胃俞	三焦俞	中脘	大臍俞	不飲食	少商	三里	然谷	臍俞	胃俞	大腸俞	不嗜食	中封	然谷	內庭	厲兌	隱白	陰陵泉	肺俞	脾俞	胃俞	小腸俞	食氣飲食聞食臭	百會	少商	三里	灸重中	食多身疲	脾俞	胃俞	脾寒	三間	中渚	液門	合谷	商丘	三陰交	中封	照海	陷谷	太谿	至陰	腰俞	胃熱	懸鐘	胃寒有痰	臍俞	脾虛腹脹數不消	臍俞	三陰交	脾病滯泄	三陰交	脾虛不更	商丘
------	----	------	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	--------	----	------	-------	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	---------	----	----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	---------	----	----	----	-----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	---------	----	-----	------	-----	------	----

臍虛嘔逆熱上氣	三陰交三十壯	心邪癲狂部	心邪癲狂	攢竹	尺澤	間使	陽谿	癲狂	曲池	小海	少海	間使	陽谿	陽谷	大陵	合谷	魚際	腕骨	神門	液門	冲陽	行間	京骨	肺俞	臍俞	癲癇	攢竹	天井	小海	神門	金門	商丘	行間	通谷	心俞	後谿	鬼眼	四穴在手太指足太指內側爪甲上	癲疾	上星	百會	風池	曲池	尺澤	陽谿	腕骨	鮮谿	後谿	申脉	崑崙	商丘	然谷	通谷	承山	針三分瀉重灸是	狂言	太淵	陽谿	下廉	崑崙	狂言不樂	太谿	多言	百會	癲狂言語不攝	多言	又用鋼刀割斷更佳	狂言數呬頤	陽谷	液門	喜笑	水溝	列缺	陽谿	太谿	喜哭	百會	水溝	目妄視	風府	鬼擊	間使	支溝	鬼邪	間使	仍針後十三天
---------	--------	-------	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---------	----	----	----	----	----	------	----	----	----	--------	----	----------	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	--------

寒瘧不食

冬瘧 中渚

熱多寒少

脾寒發瘧

腫脹部

渾身浮腫

三陰交

水腫

三里

冲陽

四肢浮腫

神農經

三里

風溼身腫

脾水氣脹滿

水脹脇滿

偏身腫滿食不化

鼓脹

消痺

傷飽身黃

紅瘧

黃疸

脾俞

公孫 內庭 厲兌

商陽 丘墟

間使 三里

太樞 間使 乳根

曲池 合谷 三里 內庭 行間

腕骨 合谷 間使 陽陵 陰谷

鮮谿 陷谷 復溜 公孫 厲兌

胃俞 水分 神闕

曲池 通里 合谷 中渚 液門

神農經

三里 三陰交

鮮谿 復溜 神闕

陰陵泉

腎俞 百壯

公孫 中封 太白 水分

復溜

章門

合谷 三里 委中

腕骨 三里 湯泉 中腕

大谿 中封 然谷 太冲

勞官 大谿 中封 然谷 太冲

汗部

無汗

上星

合谷

厲兌

汗不出

自汗

大敦

少汗

多汗

神農經

風痺

瘰癧瘰癧

寒厥

瘰癧

尸厥

身寒痺

中封

厥逆

如脈絕

尸厥

列缺

中冲

瘰癧 風府 風池 支溝 經渠

太陵 陽谷 腕骨 前谷 中渚 液門 魚際

合谷 中冲 少商 商陽 大都 委中 陷谷

厲兌 俠谿

汗不出 曲澤 魚際 少澤 上星 曲泉 復溜

自汗 曲池 列缺 少商 崑崙 冲陽 然谷

大敦 湧泉

少汗 先補合谷 次瀉復溜

多汗 先瀉合谷 次補復溜

神農經

風痺 尺澤 陽輔

瘰癧瘰癧 臑俞

寒厥 大淵 液門

瘰癧 丘墟

尸厥 死及不知人事 灸厲兌三壯

身寒痺 曲池 列缺 環跳 風市 委中 商丘

中封 臨泣

厥逆 陽輔 臨泣 章門

如脈絕 灸間使

尸厥 列缺 中冲 金門 大都 內庭 厲兌

或針伏瀉

神農經

五痔 委中 承山 飛揚 陽輔 復溜 太冲

陰莖痛天 陰陵 曲泉 陰谷 行間 太冲 三陰交

大敦	大谿	腎俞	中極
陰莖痛	陰汗濕	太谿	魚際
腎藏虛冷	目眩	少氣	遺精
腎胞不固	淋瀝	開元	
遺精白濁	腎俞	開元	三陰交
夢遺失精	曲泉	百壯	中封
太冲	至陰		
肺俞	脾俞	三陰交	
寒熱氣鬱	陰陵		
淋瀝	曲泉	然谷	陰陵
湧泉	氣門	百壯	
小便黃赤	陰谷	太谿	腎俞
開元		氣海	膀胱俞
小便五色	委中	前谷	
小便不禁	承漿	陰陵	委中
大敦		太冲	膀胱俞
小便赤如血	大陵	開元	
婦人胞轉不利	小便	灸開元	二七壯
遺溺	神門	魚際	太冲
陰痿九竅	陰谷	陰交	然谷
陰痿九竅	中封	太冲	
陰痿九竅	太冲	少府	照海
氣喘喘急	以少繩	患人口	兩角
如△排	以二角	患心	兩角
灸右患	右灸左	二七壯	立愈
膀胱氣攻	兩脇	膝下	陰骨入腋
		灸膝下	六寸兩傍各一

頭痛	百會	上星	風府	風池	攢竹	絲竹空
小海	陽谿	大陵	後谿	合谷	腕骨	中冲
中渚	崑崙	陽谿				
頭強痛	頰車	風池	肩井	少海	後谿	前谷
頭偏痛	頰車	頰車				
腦瀉	頰車	通谷				
頭風	上星	前頂	百會	陽谿	合谷	開冲
崑崙	俠谿					
腦痛	上星	風池	腦空	天柱	少海	
頭風	面赤	通里	解谿			
頭風	牽引	腦頂痛	上星	百會	合谷	
偏正頭風	合谷	攢竹	頭維			
風池	合谷	攢竹	三里			
醉後頭風	合谷	豐隆	解谿	風池		
頭風眩暈	合谷	豐隆	解谿	風池		
面腫	水溝	上星	攢竹	支溝	間使	中渚
液門	解谿	行間	厲兌	噤嘻	天應	風池
面痒腫	迎香	合谷				
頭項俱痛	百會	後頂	合谷			
頭風冷發	攢竹	合谷				

頭痛項強，重，公能舉者，反折，公能反項，承漿先瀉，後補。

風府

腦脊目赤

攢竹

面腫項強，龜生患肉

承漿三分推上復下

頭旋

目赤百會

申脉至陰絡却

頭腫

上星前頂

太陵出五公孫

頰腫

頰車

頤頰腫

陽谷

腕骨

前谷

商陽

丘墟

俠谿

牛三里

風動如虫行

迎香

頭項強急

風府

頭目浮腫

目窓陷谷

神應經

四十五

眼臉腫動

頭維攢竹

腦風而疼

少海

頭重身熱

腎俞

肩後痛

肝俞

髮焦脫

下廉

面浮腫

厲兌

面腫

灸水分

頭目眩疼皮腫生白屑

灸顙會

咽喉部

喉痺

三頰車

合谷

少商

尺澤

經渠

陽谿

大陵

二間

前谷

鼓頤

少商

咽中如蠶

間使

三間

咽腫

中渚

大谿

咽外腫

液門

咽痛

風府

喉食不下

灸中

咽中閉

曲池

合谷

咽喉腫痛閉塞水粒不下

合谷

少商

兼以三棱針刺手木指背頭節上甲根下排刺三針

雙鶴

玉液

金津

少商

單鶴

少商

合谷

廉泉

咽喉腫閉甚者

以細三棱針刺於華管中

微言以收藥

神應經

四十六

腫痺癰乃刺之否則病人恐誤不飲愈疾

耳目部

耳鳴

百會

听會

听官

耳門

絡却

陽谿

陽谷

前谷

後谿

腕骨

中渚

液門

商陽

腎俞

耳生瘡有膿汁

耳門

翳風

合谷

耳所無所聞

耳門

風池

俠谿

翳風

听會

听官

目赤

目窓

大陵

合谷

液門

上星

攢竹

經竹空

目眦赤爛

陽谷

赤弱 攢攢 後給 液門

目赤重 太淵 俠給 攢攢 風池

目翳 合谷 臨泣 角孫 液門 後給 中渚

睛明

白翳 臨泣 肝俞

睛痛 內庭 上星

冷淚 睛明 臨泣 風池 腕骨

迎風有淚 睛明 頭維 睛明 臨泣 風池

目淚出 臨泣 百會 液門 後給 前谷 肝俞

風生 卒生 眼膜 兩目疼痛 不可忍 者 睛明

手中指本節間火三壯

青盲無淚見 肝俞 商陽 左 右 取 左

眼機半倒 絲竹空

目皆急痛 三間

目昏 頭維 攢攢 睛明 目窓 百會 風府

風池 合谷 肝俞 腎俞 絲竹空

目眩 臨泣 風府 風池 陽谷 中渚 液門

魚際 絲竹空

目痛 陽穀 二間 太陵 三間 前谷 上星

風目 睛爛 風淚出 頭維 賴膠

眼痒 睛疼 光明瀉 五會

目生翳 肝俞 命門 臆子 竅 在 目 外 眥 五 分 提 氣 乃 瀉

合谷 商陽

小兒 雀目 夜不見物 灸 手 大 指 甲 後 一 寸 內 廉 橫 紋 頭

白肉際各一壯

鼻口部

鼻有瘻肉 迎香

衄血 風府 曲池 合谷 三間 二間 後給

前谷 委中 申脉 崑崙 厲兌 上星 陰白

熱衄 風府 二間 迎香

鼻塞 上星 臨泣 百會 前谷 厲兌 合谷

迎香

鼻流清涕 人中 上星 風府

腦瀉鼻中泉 鼻淵 出 曲差 上星

鼻衄 上星 灸 二七壯 絕骨 頭會

又下法灸項後髮際兩筋間宛中

久病流涕 不愈 百會 灸

口乾 尺澤 曲澤 太陵 二間 少商 商陽

咽乾 太淵 魚際 承漿 金津 玉液 曲池 勞宮

消渴 水溝 商五 然谷 隱白 百已上 背 九 不可灸

太冲 行間 商五 然谷 隱白 百已上 背 九 不可灸

唇乾有涎 下廉 復溜

舌乾涎出 復溜

唇乾飲不下 三間 少商

唇動如虫行 水溝

唇腫 迎香

口喎眼喎 頰車 水溝 列缺 太淵 合谷

二間 地倉 絲竹空		口紫 頰車 支溝 外開 列缺 內庭 厲兌	失音 小指 間使 支溝 靈道 魚際 合谷	陰谷 復溜 然谷	舌緩 太淵 合谷 冲陽 內庭 崑崙 三陰交	風府	舌強 痙門 小商 魚際 二間 中冲 陰谷	然谷 魚際	古黃 魚際	齒寒 少海	齒痛 商陽	齒齲 牙關 合谷 厲兌	齒齲 少海 小海 陽谷 合谷 液門 二間	內庭 厲兌	齒齲 角孫 小海	舌齲 承漿 勞宮 壯	牙疼 曲池 少海 陽谷 陽谿 二間 液門	頰車 內庭 呂細 在內踝骨尖上灸二土壯	上牙疼 人中 太淵 呂細	灸臂上起肉五壯	下牙疼 龍玄 在側處交叉處 承漿 合谷	腕上五寸兩筋中間灸五壯	不供養物 角孫	牙疳 蝕爛生瘡 承漿 柱如小筋頭大灸七壯
-----------	--	----------------------	----------------------	----------	-----------------------	----	----------------------	-------	-------	-------	-------	-------------	----------------------	-------	----------	------------	----------------------	---------------------	--------------	---------	---------------------	-------------	---------	----------------------

胸中寒 室中		有背痠疼 風門 肩井 中渚 支溝 後谿	腕骨 委中	心胸痞 曲澤 內關 太陵	胸滿血膨有積塊霍亂腸鳴善噦 三里	期門 血氣刺二寸不補不瀉	脇滿 章門	脇痛 陽谷 腕骨 支溝 臑俞 申脉	缺盆腫 足臨泣 太淵 商陽	脇與脊引 肝俞	背脾項急 大椎	腰脊強直不能轉側 腰俞 肺俞	胸滿 經渠 陽谿 後谿 三間 間使 陽陵	三里 曲泉 足臨泣	胸痺 太淵	胸膈悶 肩井	胸脇痛 天井 支溝 間使 太陵 三里 太白	血壅 陽輔	胸中澹 間使	胸滿支腫 內關 臑胸	胸脇滿引腹 下廉 丘墟 俠谿 腎俞	胸煩 期門
--------	--	---------------------	-------	--------------	------------------	--------------	-------	-------------------	---------------	---------	---------	----------------	----------------------	-----------	-------	--------	-----------------------	-------	--------	------------	-------------------	-------

腰脊痛

李中

復溜

腰脊痛

風池

肺俞

背拘急

經渠

二間

商陽

李中

崑崙

肩背相引

魚際

李中

崑崙

京骨

偏脇痛

李中

魚際

崑崙

京骨

脊痛

李中

風池

合谷

崑崙

脊脊強痛

天肱

合谷

崑崙

崑崙

脊內辛疼

天肱

合谷

復溜

崑崙

脊強身痛

期門

章門

丘墟

行門

胸連脇痛

期門

章門

丘墟

行門

湧泉

期門

章門

丘墟

行門

有痺痛

天井

曲池

陽谷

闕沖

有痺痛

天井

曲池

陽谷

闕沖

有痺痛

天井

曲池

陽谷

闕沖

手足腰腋部

手臂痛

曲池

尺澤

肩髃

三里

大淵

陽池

陽谷

前谷

合谷

外關

腕骨

陽谷

合谷

液門

臂寒

天澤

神門

太淵

陽谷

臂內廉痛

太淵

陽谷

合谷

液門

臂腕側痛

陽谷

合谷

液門

手腕動搖

曲澤

少府

陽輔

丘墟

腋痛

少海

間使

少府

陽輔

申脉

少海

間使

少府

陽輔

腕勞

天井

曲池

太淵

腕骨

列缺

液門

手肘無力

列缺

通里

手三里

肘臂痛

有翳

曲池

通里

手三里

肘臂痛

尺澤

有翳

小海

間使

太陵

魚際

尺澤

有翳

小海

間使

太陵

肩臂疼重

支溝

支溝

支溝

支溝

支溝

肘臂手指不舒屈

支溝

支溝

支溝

支溝

支溝

手臂麻木不仁

天井

曲池

外關

經渠

支溝

陽谷

腕骨

上廉

合谷

合谷

合谷

手背冷痛

有井

曲池

下廉

下廉

下廉

手指拘攣筋緊

曲池

陽谷

合谷

合谷

合谷

手熱

曲池

內關

列缺

經渠

太淵

中冲

少冲

旁官

旁官

旁官

旁官

手背紅腫

曲池

通里

中渚

合谷

手三里

液門

液門

液門

液門

液門

液門

兩手拘攣

曲池

通里

中渚

合谷

手三里

風痺肘掌

尺澤

曲池

合谷

合谷

合谷

肩膊煩疼

有翳

有井

曲池

曲池

曲池

五指皆疼

外關

外關

外關

外關

外關

手掌指痛

少商

少商

少商

少商

少商

掌中熱

列缺

經渠

太淵

太淵

太淵

腋肘腫

尺澤

小海

間使

太陵

太陵

掌中熱

列缺

經渠

太淵

太淵

太淵

腋肘腫

尺澤

小海

間使

太陵

太陵

腰痛不舒 俠脊二穴在腰脊下陷中
 膝以上病 灸環跳 凡市
 膝以下病 灸犢鼻 膝關 三里 陽陵
 足踝以上病 灸三陰交 紀骨 崑崙
 足踝以下病 灸照海 申脉
 腿痛 寬骨
 氣脚 一風市 五十壯 二伏兔 針三分 三犢鼻 五十壯
 四膝眼 五三里 百壯 六上廉
 七下廉 百壯 八絕骨
 脚轉筋發時不可忍 脚上二壯 內筋急灸肉
 外筋急灸外
 脚轉筋多年不愈諸藥不効者 灸承山 二十七壯

婦人部

月脉不調 氣海 中極 帶脉一壯 三陰交
 腎俞
 月事不利 足臨泣 三陰交 中極
 過時不正 隱白
 下經若冷來無之時 關元
 女人漏下不止 太冲 三陰交
 血崩 氣海 大敦 陰谷 太冲 然谷 三陰交
 中極
 瘦聚 關元
 赤白帶下 帶脉 關元 氣海 三陰交

白環俞壯 間使三十壯
 小腹堅 帶脉
 絕子 商五 中極
 因產惡露不止 氣海 關元
 產後諸病 期門
 乳癰 下廉 三里 俠谿 魚際 委中 足臨泣
 少澤
 乳腫痛 足臨泣
 難產 合谷 三陰交 太冲
 橫生死胎 太冲 合谷 三陰交
 橫生手先出 右足小指尖 三壯 立產 妊如小麥大
 子上過心氣悶欲絕 巨關 合谷 三陰交 四

如子手拘攣心生下男左女右手心有針痕可斷不難產
 入中或腦後有針痕 支溝 三里 三陰交
 產後血暈不識人 有井 五介若竟關急針三里
 臨胎後手足如冰服逆 有井
 胎衣不下 中極 有井
 陰挺出 曲泉 照海 大敦
 無乳 重中灸 少澤 補此二穴神效
 血塊 曲泉 復溜 三里 氣海 丹田 三陰交
 婦人經事正行與男子交日漸羸瘦寒熱往來精血相競
 百勞 腎俞 風門 中極 氣海 三陰交
 若以前証依虛勞治者非也
 女子月事不來面黃乾嘔妊娠不成

世世 支瘰 三里 三陰交
經脈過多 通里 行間 三陰交
無時隔下 三陰交
欲斷產 右足內踝上一寸
又一法 灸臍下二寸三分三壯
一切瘰癧 灸關元
月水不調因結成塊 針間使

小兒部

大小五癰 水瘰 百會 神門 金門 崑崙
巨關 腦骨
瘰癧五指 陽谷 腕骨 崑崙
抽頭張口反折 金門
風癰目帶上 百會 崑崙 絲竹空
脫肛 百會 長強
卒病 太冲
角弓反張 百會
濕癰 神闕
赤瘰癧 百會 委中
秋深多癰 灸臍下二寸及三寸動脈中
吐乳 灸中庭 在臍中下六分
卒癰及瘰癧 巨關灸三壯
口有瘰癧 臭穢氣衝人 勞官二穴各一壯

卒患腹痛 肚皮青黑 灸臍四邊 各半寸三壯
鳩尾 骨下一寸三壯
驚癰 頂上旋毛中灸二壯 耳後青絲三壯 瘰癧如小麥大
風癰 手指屈伸如蟬蛻者 瘰癧形瘰癧中灸三壯
二三歲兩目青赤 大指次指間拔一寸五分灸三壯
顙門不合 臍上臍下各五分二天 灸臍內先灸
夜啼 百會三壯
腎腹偏墜 關元灸三七壯 大敦七壯
猪癰如尸厥 巨關三壯
食癰先寒熱瀉瀉乃發 鳩尾上五分灸三壯
羊癰 九椎下節間灸三壯 又法 大椎上三壯
牛癰 鳩尾三壯 又法 鳩尾 大椎各三壯

瘡毒部

治癰疽瘡毒 鴉竹扁灸法用薄篋置患人手心足澤穴
橫紋起起循風至中指尖止截斷外用竹柱一條以竹柱
兩頭置篋上令患人去衣將竹柱以足微點地以先比篋
尖柱上點篋上為上為最要點只是取中非灸
穴也更以薄篋置手中指節兩橫紋為一寸將篋於所點
處上兩旁各量一寸是穴各灸五壯或七壯止不可多灸

馬癰 僕參三壯 又法 風府 臍中各三壯
大癰 兩手心 足太陽 肋戶各灸一壯
鷄癰 足諸陽各三壯
疥癩癰 承漿針灸皆可

此法及之無不愈者蓋此二天心脈所通凡難疽之疾皆由
氣留滯故生此毒矣此則心脈流通即時安痊可以起死
回生有非常功

熱風瘰癧

有瘰癧 曲池 曲澤 環跳 合谷

湧泉

瘰癧 少海 先施 實 上三針 小海 針 內 針

天池

章門 陽位 支溝 陽輔 百 手三里

肩井 直 手 壯

疥癬瘡

曲池 支溝 陽絡 陽谷 太陵 合谷

後絡

委中 三里 陽輔 蠡 行間 三陰交

百虫窠 即 陽 眼

瘡腫 寒

少海

腋腫 馬

陽輔 太冲 足臨

癰疽

肩井 委中 以蘇片貼瘡上灸炷五炷

疔瘡

上 口角 灸合谷 生手 上灸曲池

生背

委中 行間 通里

小海

太冲 陽位

癰疽 生瘡

曲池 合谷 三里 蠡骨 膝眼 灸

雜病部

人脈微細不見或時無脈以圓利針刺足少陰經復溜穴

針至骨頭針柱下刺之候血陽脈生方可出針

蝎蟻蛇犬蜈蚣傷痛不可忍者各詳其經絡部分逆順感

氣刺之蓋逆順感氣有使其毒氣隨經直泄不欲呼吸使

毒氣行經也用針呪曰天靈即榮願保長生太玄之一字
其真形五藏神君各保安寧神針一下萬毒皆形急之如
律令攝死針點愈咒一施吹氣在針上想針如火龍便從
病人心腹中出其病速愈

傷死經宿可救 即解死衣帶灸臍中

狂大傷人 灸咬傷處上

蛇傷 灸傷處三壯仍以蒜片貼咬處灸蒜上

逐日入神所在

一日在足大指厥陰分刺之附腫

二日在足外踝少陽分刺之筋經緩

三日在股內少陰分刺之小腹痛

四日在腰太陽分刺之腰痠無力

五日在口太陰分刺之舌強

六日在手陽明分刺之咽喉不利

七日在內踝少陰分刺之陰經筋急

八日在手腕太陽分刺之腕不取

九日在尻厥陰分刺之病急

十日在腰背太陰分刺之腰背痠痛

十一日在鼻柱陽明分刺之齒面腫

十二日在髮際少陽分刺之令人重聽

十三日在牙齒少陰分刺之氣寒

十四日在胃脘陽明分刺之氣腫

十五日在通身不宜補漏針灸大忌

十六日在胸太陰分刺之經息

十七日在氣衝陽明分刺之難息

十八日在股內少陰分刺之引陰氣痛

十九日在足厥陽明分刺之發腫

二十日在內踝少陰分刺之經筋亦手

二十一日在手小指太陽分刺之手不仁

二十二日在足外側少陽分刺之經筋發

二十三日在膝及足厥陰分刺之發轉筋

二十四日在手陽明分刺之咽喉中不利

二十五日在足陽明分刺之胃氣脹

二十六日在胸太陰分刺之喘咳

二十七日在膝陽明分刺之足經厥逆

二十八日在少陰分刺之小腹急痛

二十九日在膝陽明分刺之筋脈無力

三十日在足太陽分刺之有傷胃氣

考之破曉一科雖有養生經針灸四書其間浩濶廣遠不能殫其異妙考宋綱陳先生得梓來君家傳之秘乃纂其補遺編為是書以便後學今重校正定其詳畧尤為切要使天下後世咸躋於仁壽之域也

神應經

終

正保二年五月吉日

二条鶴屋町田原仁左衛門開校

神應經一卷 浙江朱要尊家 舉書亭藏本

明陳會撰劉瑾補輯會字善同稱宏綱先生瑾字永懷號恒菴均不知何許人瑾所附論皆冠以臣字亦不知何時進御本也案宦官劉瑾武宗時流毒海內終以謀逆伏誅斷無人肯襲其姓名者此書當在正德前矣所論皆針灸之法有歌訣有圖有說傳寫訛謬不甚可據前有宗派圖一頁稱梓桑君席宏達九傳至席華叔十傳至席信卿十一傳至會會傳二十四人嫡傳者二人一曰康叔達一即瑾也又有席宏達誓詞謂傳道者必盟天歎血立誓以傳當於宗派圖下注其姓名如或妄傳非人私相付度陰有天刑明有陽譴云云是直道家野談耳

醫史十卷

〔明〕李濂輯

上海圖書館藏明刻本

附《四庫全書總目·醫史十卷》

提要

纂輯醫史凡例 上條

一歷代名醫凡史傳所載者謹備錄之於前五卷矣其有散見各家文集者亦錄之以備遺則俱列於後五卷

一古之名醫前史已有傳者既錄之矣乃若張仲景王叔和啓玄子皆醫之宗也良不可無傳今皆補之其絕無事實如巫咸巫彭矯氏俞氏盧氏崔文子公孫光之類則闕之

一凡各家文集中所載序記雜文凡為名醫而作者竊錄其篇悉弗錄蓋不可勝錄也

一諸名醫學本素難方術醇正者則錄之如晉書所載佛圖澄單道開之類頗涉幻誕悉點之不錄恐滋後人之惑

一凡區區別有見聞本傳之所未及者或間有一得之愚亦附傳後以諗觀者

一近代名醫如劉守真張子和李明之諸子平生著述頗多其治療奇驗不可勝數而金元史載之甚畧今姑依史錄之不敢增也

一山林素居書籍鮮少故於古之名醫蒐羅未盡牆廣補遺以俟博雅君子 凡例畢

醫史目錄

浚儀李漁輯

卷之一

左傳二人

醫和傳 緱

史記二人

扁鵲傳

大倉公傳

卷之二

後漢書四人

郭玉傳

華佗傳

弟子吳普
樊阿

晉書一人

葛洪

宋書八人

徐文伯傳

曾祖熙
叔衡

祖秋夫
子雅

父道度

徐嗣伯傳

伯宗

南齊書一人

褚澄傳

北齊書一人

馬嗣明傳

卷之三

後魏書九人

李脩傳

徐塞傳

徐之才傳

王顯傳

崔或傳

子景哲
景哲弟景鳳

周滄傳

後周書二人

姚僧垣傳

褚該傳

卷之四

隋書二人

許智藏傳

許澄

舊唐書九人

孫思邈傳

許胤宗傳

甄權傳

第五言

張文仲傳

李慶緒

常慈航

孟詵傳

宋俠

卷之五

宋史六人

龐安時傳

許希傳

僧智緣傳

王克明傳

皇甫坦傳

錢乙傳

遼史三人

直魯古傳

耶律敵魯傳

金史五人

劉完素傳	張從正傳	張元素傳
李慶嗣傳	紀天錫傳	
元史一人		
李杲傳		
卷之六	<small>自此卷以後皆各家文集所載者</small>	
張仲景補傳	王叔和補傳	
啓玄子補傳	張擴傳	
吳源傳		
卷之七		
卅溪翁傳	王履補傳	
戴原禮補傳	<small>墓誌銘附</small>	
卷之八		
櫻寧生傳	救山老人傳	<small>墓誌銘附</small>
卷之九		
滄洲翁傳	葛應雷補傳	<small>子乾孫</small>
卷之十		
抱一翁傳	蔣月文傳	
橘泉翁傳	張養正傳	

醫史卷之一

左傳二人

醫和傳

醫和者秦醫也晉平公十七年公疾病求醫於秦秦景公使和視之曰疾不可為也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志良臣將死天命不祐公曰女不可近平對曰節之先王之樂所以節百事也故有五節遲速本末以相及中聲以降五降之後不容彈矣於是和煩手淫聲墮心耳乃忘平和君子弗聽也

物亦如之至於煩乃舍也已無以生疾君子之近琴瑟以儀節也非以悖心也天有六氣降生五味發為五色徵為五聲淫生六疾六氣曰陰陽風雨晦明也分為四時序為五節過則為節陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾雨淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾女陽物而晦時淫則生內熱惑蠱之疾今君不節不時能無及此乎出告趙孟趙孟曰誰當良臣對曰主是謂矣主和晉國於今八年晉國無亂諸侯無闕可謂良矣和聞之國之大臣榮其寵祿任其大節其當禍與而無改焉必受其咎今君至於淫以生疾將不能圖恤社

稷禍孰大焉主不能禦吾是以云也趙孟曰何爲蠱
對曰淫溺惑亂之所生也於文皿蟲爲蠱殺之飛亦
爲蠱在周易女惑男風落山謂之蠱皆同物也趙孟
曰良醫也厚其禮而歸之是歲也趙文子卒十年而
平公薨先是晉景公十九年公疾病亦使求醫於
秦秦桓公使醫緩爲之未至公夢疾爲二豎子曰彼
良醫也懼傷我焉逃之其一曰居盲之上膏之下若
我何緩至曰疾不可爲也在盲之上膏之下攻之不
可達之不及藥不至焉不可爲也公曰良醫也亦厚
爲之禮而歸之無幾而景公薨或曰緩即和也音訛

醫史

卷一

二

耳

或問醫和診晉侯之脉而知其良臣將死有
是理邪曰有之不聞僧智緣乎智緣診父之
脉而能道其子之吉凶罔不奇中王珪蓋嘗
疑之荆公曉之以爲實有是理夫診子既可
以知父則診君亦可以知臣非洞達陰陽造
化之妙者其孰能與于斯

史記二人

扁鵲傳

扁鵲者渤海郡鄭人也姓秦氏名越人少時爲人舍

長舍客長秦君過扁鵲獨許之常謹遇之長桑君亦
知扁鵲非常人也出入十餘年乃呼扁鵲私坐間與
語曰我有禁方年老欲傳與公公毋泄扁鵲曰敬諾
乃出其懷中藥予扁鵲飲是以上池之水三十日當
知物矣乃悉取其禁方書盡與扁鵲忽然不見殆非
人也扁鵲以其言飲藥三十日視見垣一方人以此
視病盡見五藏癥結特以診脉爲名耳爲醫或在齊
或在趙在趙者名扁鵲當晉昭公時諸大夫彊而公
族弱趙簡子爲大夫專國事簡子疾五日不知人大
夫皆懼於是召扁鵲扁鵲入視病出董安子問扁鵲

醫史

卷一

三

扁鵲曰血脈治也而何怪昔秦繆公嘗如此七日而
寤寤之日告公孫支與子輿曰我之帝所甚樂吾所
以父老適有所學也帝告我晉國且大亂五世不安
其後將霸未老而死霸者之子且令而國男女無別
公孫支書而藏之秦策於是出夫獻公之亂文公之
霸而襄公敗秦師於殽而歸縱淫此子之所聞今主
君之病與之同不出三日必間間必有言也居三日
半簡子寤語諸大夫曰我之帝所甚樂與有神遊於
鈞天廣樂九奏萬舞不類三代之樂其聲動心有一
熊欲援我帝命我射之中能熊死有龍來我又射之

中寵羅死帝甚喜賜我二笥皆有副吾見兒在帝側
帝屬我一翟犬曰及而子之壯也以賜之帝告我晉
國且世衰七世而亡羸姓將大敗周人於范魁之西
而亦不能有也董安于受言書而藏之以扁鵲言告
簡子簡子賜扁鵲田四萬畝其後扁鵲過虢虢太子
死扁鵲至虢宮門下問中庶子喜方者曰太子何病
國中治穰過於衆事中庶子曰太子病血氣不時交
錯而不得泄暴發於外則爲中害精神不能止邪氣
邪氣畜積而不得泄是以陽緩而陰急故暴蹙而死
扁鵲曰其死何如時曰雞鳴至今日收乎曰未也其

醫史

一卷

四

死未能半日也言臣齊勃海秦越人也家在於鄭未
嘗得望精光侍謁於前也聞太子不幸而死臣能生
之中庶子曰先生得無誕之乎何以言太子可生也
臣聞上古之時醫有俞跗治病不以湯液醴灑鑱石
撝引案抗毒熨一撥見病之應因五藏之輸乃割皮
解肌訣脉結筋擗髓腦揲荒爪幕湔浣腸胃漱滌五
藏練精益形先生之方能若是則太子可生也不能
若是而欲生之會不可以告咳嬰之兒終日扁鵲仰
天歎曰夫子之爲方也若以管窺天以邾視文越人
之爲方也不待切脉望色聽聲寫形言病之所在聞

病之陽論得其陰聞病之陰論得其陽病應見於大
表不出千里決者至衆不可曲止也子以吾言爲不
誠試入診太子當聞其耳鳴而鼻張循其兩股以至
於陰當尚溫也中庶子聞扁鵲言目眩然而不瞋舌
橋然而不下乃以扁鵲言入報虢君虢君聞之大驚
出見扁鵲於中闕曰竊聞高義之日久矣然未嘗得
拜謁於前也先生過小國幸而舉之偏國寡臣幸甚
有先生則活無先生則棄捐填溝壑長終而不得反
言未卒因噓唏服臆魂驚精泄橫流涕長潛忽忽承映
悲不能自止容貌變更扁鵲曰若太子病所謂尸蹩

醫史

一卷

五

者也夫以陽入陰中動胃纏絡中經維絡別下於三
焦膀胱是以陽脉下遂陰脉上爭會氣閉而不通陰
上而陽內行下內鼓而不起上外絕而不爲使上有
絕陽之絡下有破陰之紐破陰絕陽之色已廢脉亂
故形靜如死狀太子未死也夫以陽入陰之蘭藏者
生以陰入陽之蘭藏者死凡此數事皆五藏聲中之
時暴作也良工取之拙者疑殆扁鵲乃使弟子子陽
厲鍼砥石以取外三陽五會之有間太子蘇乃使子豹
爲五分之熨以八減之齊和煮之以更熨兩臍下太
子起坐更適陰陽但服湯二旬而復故故天下盡以

扁鵲爲能生死人扁鵲曰越人非能生死人也此自當生者越人能使之起耳扁鵲過齊齊桓侯客之入朝見曰君有疾在腠理不治將深桓侯曰寡人無疾扁鵲出桓侯謂左右曰醫之好利也欲以不疾者爲功後五日扁鵲復見曰君有疾在血脉不治恐深桓侯曰寡人無疾扁鵲出桓侯不悅後五日扁鵲復見曰君有疾在腸胃間不治將深桓侯不應扁鵲出桓侯不悅後五日扁鵲復見望見桓侯而退走桓侯使人問其故扁鵲曰疾之居腠理也湯熨之所及也在血脉鍼石之所及也其在腸胃酒醪之所及也其在骨髓雖司命無柰之何今在骨髓臣是以無請也後五日桓侯體病使人召扁鵲扁鵲已逃去桓侯遂死使聖人預知微能使良醫得蚤從事則疾可已身可活也人之所病病疾多而醫之所治病道少故病有六不治驕恣不論於理一不治也輕身重財二不治也衣食不能適三不治也陰陽并藏氣不定四不治也形羸不能服藥五不治也信巫不信醫六不治也有此一者則重難治也扁鵲名聞天下過邯鄲聞貴婦人即爲帶下醫過雒陽聞周人愛老人則爲耳目痼醫來入咸陽聞秦人愛小兒即爲小兒醫隨俗爲

變奉太醫令李醢自知伎不如扁鵲也使人刺殺之至今天下言脉者由扁鵲也

秦越人醫術之神如此其於明哲保身之道宜無不悉矣而乃爲醢所害夫醢之媚嫉不仁固弗俟言亦不足責矣越人懼其毒而莫炳其幾先得無於大智之道亦有所未周乎噫秦法甚嚴而使良醫者擅殺一神醫未聞罪之則秦之紀綱律令抑又可知已悲夫

太倉公傳

太倉公者齊太倉長臨菑人也姓淳于氏名意少而喜醫方術高后八年更受師同郡元里公乘陽慶慶年七十餘無子使意盡去其故方更悉以禁方子之傳黃帝扁鵲之脉書五色診病知人死生決嫌疑定可治及藥論甚精受之三年爲人治病決死生多驗然左右行游諸侯不以家爲家或不爲人治病病家多怨之者文帝四年中人上書言意以刑罪當傳西之長安意有五女隨而泣意怒罵曰生子不生男緩急無可使者於是少女緹縈傷父之言乃隨父西上書曰妾父爲吏齊中稱其廉平今坐法當刑妾切痛死者不可復生而刑者不可復續雖欲改過自新其

道黃甫終不可得妾願入身為官婢以贖父刑罪使
得改行自新也書聞上悲其意此歲中亦除肉刑法
意家居詔召問所為治病死生驗者幾何人主名為
誰詔問故太倉長臣意方伎所長及所能治病者有
其書無有皆安受學受學幾何歲嘗有所驗何縣里
人也何病醫藥已其病之狀皆何如具悉而對臣意
對曰自意少時喜醫藥醫藥方試之多不驗者至高
后八年得見師臨苗元里公乘陽慶慶年七十餘意
得見事之謂意曰盡去而方書非是也慶有古先道
遺傳黃帝扁鵲之脉書五色診病知人生死決嫌疑
定可治及藥論書甚精我家給富心愛公欲盡以我
禁方書悉教公臣意即曰幸甚非意之所敢望也臣
意即避席再拜謁受其脉書上下經五色診奇咳術
揆度陰陽外變藥論石神接陰陽禁書受讀解驗之
可一年所明歲即驗之有驗然尚未精也要事之三
年所即嘗已為人治診病決死生有驗精良今慶已
死十年所臣意年盡三年年三十九歲也
齊侍御史成自言病頭痛臣意診其脉告曰君之病
惡不可言也即出獨告成弟昌曰此病疽也內發於
腸胃之間後五日當臍腫後八日嘔膿死成之病得

之飲酒且內成即如期死所以知成之病者臣意切
其脉得肝氣肝氣濁而靜此內關之病也脉法曰脉
長而弦不得代四時者其病主在於肝和即經主病
也代則絡脉有過經主病和者其病得之筋髓裏其
代絕而脉貴者病得之酒且內所以知其後五日而
臍腫八日嘔膿死者切其脉時少陽初代代者經病
病去過入人則去絡脉主病當其時少陽初關一分
故中熱而膿未發也及五分則至少陽之界及八日
則嘔膿死故上二分而膿發至界而臍腫盡泄而死
執上則熏陽明爛流絡流絡動則脉結發脉結發則
爛解故絡交執氣已上行至頭而動故頭痛
齊王中子諸嬰兒小子病召臣意診切其脉告曰氣
滿病病使人煩懣食不下時嘔沫病得之少憂故
食飲臣意即為之作下氣湯以飲之一日氣下二日
能食三日即病愈所以知小子之病者診其脉心氣
也濁躁而經也此絡陽病也脉法曰脉來數病去難
而不一者病主在心周身熱脉盛者為重陽重陽者
過心主故煩懣食不下則絡脉有過絡脉有過則血
上出血上出者死此悲心所生也病得之憂也
齊郎中令循病衆醫皆以為臍人中之刺之臣意診

之曰湯而也令人不得前後溲循曰不得前後溲三日矣臣意欲以火齊湯一飲則前溲再飲大溲三飲而疾愈病得之內所以知循病者切其脉時右口氣急脉無五藏氣右口脉大而數數者中下熱而溲左為下有為上皆無五藏應故曰湯而中熱故溲赤也齊中御府長信病臣意入診其脉告曰熱病氣也然暑汗脉少衰不死曰此病得之當浴流水而寒甚已則熱信曰唯然往冬時為王使於楚至吾縣陽周水而莒橋梁頗壞信則擊車轅未欲渡也馬驚即墮信身入水中幾死吏即來救信出之水中衣盡濡有間而身寒已熱如火至今不可以見寒臣意即為之液湯火齊逐熱一飲汗盡再飲熱去三飲病已即使服藥出入二十日身無病者所以知信之病者切其脉時并陰脉法曰熱病陰陽交者死切之不交并陰并陰者脉順清而愈其熱雖未盡猶活也腎氣有時間濁在大陰脉口而希是水氣也腎固主水故以此知之失治一時即轉為寒熱

知齊王太后病者臣意診其脉切其太陰之口溼然風氣也脉法曰沈之而大堅浮之而大緊者病主在腎腎切之而相反也脉大而躁大者膀胱氣也躁者中有熱而溲赤齊章武里曹山跗病臣意診其脉曰肺消瘵也加以寒熱即告其人曰死不治適其共養此不當醫治法曰後三日而當狂妄起行欲走後五日死即如期死山跗病得之盛怒而以接內所以知山跗之病者臣意切其脉肺氣熱也脉法曰不平不鼓形弊此五藏高之遠數以經病也故切之時不平而代不平者血不居其處代者時參擊並至乍躁乍大也此兩絡脉絕故死不治所以加寒熱者言其人已奪其奪者形弊形弊者不當關灸鑱石及飲藥也臣意未往診時齊太醫先診山跗病灸其足少陽脉口而飲之半夏丸病者即泄注腹中虛又灸其少陰脉是壞肝剛絕深如是重損病者氣以故加寒熱所以後三日而當狂者肝一絡連屬結絕乳下陽明故絡絕開陽明脉陽明脉傷即當狂走後五日死者肝與心相去五分故曰五日盡盡即死矣齊中尉潘滿如病小腹痛臣意診其脉也遺積瘕也

臣意即謂齊大僕臣饒內史臣繇曰中尉不復自止於內則三十日死後二十餘日溲血死病得之酒且內所以知潘滿如病者臣意切其脉深小弱其空然合合也是脾氣也右脉口氣至緊小見瘕氣也以次相乘故三十日死三陰俱搏者如法不俱搏者決在急期一搏一代者近也故其三陰搏溲血如前止陽虛侯相趙章病召臣意眾醫皆以爲寒中臣意診其脉曰迴風迴風者飲食下噎而輒出不留法曰五日死而後十日乃死病得之酒所以知趙章之病者臣意切其脉脉來滑是內風氣也飲食下噎而輒出不留者法五日死皆爲前分界法後十日乃死所以過期者其人嗜粥故中藏實中藏實故過期師言曰安穀者過期不安穀者不及期

濟北王病召臣意診其脉曰風蹶胃滿即爲藥酒盡三石病已得之汗出伏地所以知濟北王病者臣意切其脉時風氣也心脉濁病法過入其陽陽氣盡而陰氣入陰氣入張則寒氣上而熱氣下故胃滿汗出伏地者切其脉氣陰陰氣者病必入中出及澆水也

齊北宮司空命婦出於病衆醫皆以爲風入中病主在肺刺其足少陽脉臣意診其脉曰病氣邪客於膀

胱難於前後溲而溺赤病見寒氣則遺溺使人腹腫出於病得之欲溺不得因以接內所以知出於病者切其脉大而實其來難是蹶陰之動也脉來難者疝氣之客於膀胱也腹之所以腫者言蹶陰之絡結小腹也蹶陰有過則脉結動動則腹腫臣意即灸其足蹶陰之脉左右各一所即不遺溺而溲清小腹痛止即更爲火齊湯以飲之三日而疝氣散即愈

故濟北王阿母自言足熱而懣臣意告曰執蹶也則刺其足心各三所案之無出血病旋已病得之飲酒大醉濟北王召臣意診脉諸女子侍者至女子賢賢無病臣意告永巷長曰賢傷脾不可勞法當春嘔血死臣意告王曰才人女子賢何能王曰是好爲方多伎能爲所是案法新往年市之民所四百七十萬曹偶四人王曰得母有病乎臣意對曰賢病重在死法中王召視之其顏色不變以爲不然不責諸侯所至春賢奉劔從王之側王去賢後王令人召之即仆於廁嘔血死病得之流汗流汗者同法病內重毛髮而色澤脉不衰此亦關內之病也

齊中大夫病齒齕臣意灸其左太陽脉迎其湯日嗽三升出入五六日病已得之風及臥開口

而不嗽

苗川王美人懷子而不乳來召臣意臣意往飲以葠
蕡藥一撮以酒飲之旋乳臣意復診其脉而脉躁躁
者有餘病即飲以消石一齊出血血如豆比五六枚

齊丞相舍人奴從朝入宮臣意見之食閭門外望其
色有病氣臣意即告宦者平平好為脉學臣意所臣
意即示之舍人奴病告之曰此傷脾氣也當至春南
塞不通不能食飲法至夏泄血死官者平即往告相
曰君之舍人奴有病病重死期有日相君曰卿何以
知之曰君朝時入宮君之舍人奴盡食閭門外平與

醫史

卷一

論

倉公立即視平曰病如是者死相即召舍人奴而謂
之曰公奴有病不舍人曰奴無病身無痛者至春果
病至四月泄血死所以知奴病者脾氣周乘五藏傷
部而交故傷脾之色也望之絞然黃察之如死青之
茲眾醫不知以為大蟲不知傷脾所以至春死病者
胃氣黃黃者土氣也土不勝木故至春死所以至夏
死者脉法曰病重而脉順清者曰內關內關之病人
不知其所痛心息然無苦若加以一病死中春一愈
順及一時其所以四月死者診其人時愈順愈順者
人尚肥也奴之病得之流汗數出多於火而出見

大風也

苗川王病召臣意診脉曰蹶上為重頭痛身熱使人
煩憊臣意即以寒水紓其頭刺足陽明脉左右各三
所病旋已病得之沐髮未乾而臥診如前所以蹶頭
熱至肩

齊王黃姬兄黃長卿家有酒召客召臣意諸客坐未
上食臣意望見王后弟宋建告曰君有病往四五日
君要脅痛不可俛仰又不得小溲不亟治病即入濡
腎及其未合五藏急治之病方今客腎濡此所謂腎
痺也宋建曰然建故有要脅痛往四五日天雨黃氏

醫史

卷一

論

諸情見建家京下方石即弄之建亦欲効之効之不
能起即復置之暮要脅痛不得溺至今不愈建病得
之好持重所以知建病者臣意見其色太陽色乾肝
部上及界要以下者枯四分所故以往四五日知其
發也臣意即為柔湯使服之十八日所而病愈
齊北王侍者婦女病要脅痛寒熱眾醫皆以為寒熱
也臣意診脉曰內寒月事不下也即寬以藥旋下病
已病得之欲男子而不可得也所以知韓女之病者
診其脉時切之腎脉也當而不屬當而不屬者其來
難堅故曰月不下肝脉弦出左口故曰欲男子不可

得也

臨苗紀里女子薄吾病甚衆醫皆以爲寒熱驚當死
不治臣意診其脉曰蛻瘕蛻瘕爲病腹大上膚黃瘦
循之戚戚然臣意飲以芫華一撮即出蛻可數升病
已三十日如故病蛻得之於寒濕寒濕氣死爲不發
化爲蟲臣意所以知寒薄吾病者切其脉循其尺其
尺索刺癰而毛寒髮是蟲氣也其色澤者中藏無
邪氣及重病

齊淳于司馬病臣意切其脉告曰當病迴風迴風之
狀飲食下噎輒後之病得之飽食而疾走淳于司馬

醫史

卷一

十六

曰我之王家食馬肝食飽甚見酒來即走去驅疾至
舍即泄數十出臣意告曰爲火齊米汁飲之七八日
而當愈時醫秦信在旁臣意去信謂左右閹都尉曰
意以淳于司馬病爲何曰以爲迴風可治信即笑曰
是不知也淳于司馬病法當後九日死即後九日不
死其家復召臣意臣意往問之盡如意診臣即爲一
火齊米汁使服之七八日病已所以知之者診其脉
時切之盡如法其病順故不死

齊中即破石病臣意診其脉告曰肺傷不治當後十
日丁亥溲血死即後十一日溲血而死破石之病得

之墮馬僵石上所以知破石之病者切其脉得肺陰
氣其來散數道至而不一也色又乘之所以知其墮
馬者切之得番陰脉番陰脉入虛裏乘肺脉肺脉散
者固色變也乘之所以不中期死者師言曰病者安
穀即過期不安穀則不及期其人嗜黍黍主肺故過
期所以溲血者診脉法曰病養喜陰處者順死喜養
陽處者逆死其人喜自靜不躁又久安坐伏几而寐
故血下泄

齊王侍醫遂病自練五石服之臣意往告之遂謂意
曰不肖有病幸診遂也臣意即診之告曰公病中熱

醫史

卷一

十七

論曰中熱不溲者不可服五石石之爲藥精悍公服
之不得數溲亟勿服色將發臃遂曰扁鵲曰陰石以
治陰病陽石以治陽病夫藥石者有陰陽水火之齊
故中熱即爲陰石柔齊治之中寒即爲陽石剛齊治
之臣意曰公所論遠矣扁鵲雖言若是然必審診起
度量立規矩稱權衡合色脉表裏有餘不足順逆之
法參其人動靜與息相應乃可以論論曰陽疾處內
陰形應外者不加悍藥及鑱石夫悍藥入中則邪氣
辟矣而宛氣愈深診法曰二陰應外一陽接內者不
可以剛藥剛藥入則動陽陰病益衰陽病益著邪氣

流行為重困於命愈發為疽意告之後百餘日果為疽發乳上入缺盆死此謂論之大體也必有經紀拙工有一不習文理陰陽失矣

齊王故為陽虛侯時病甚眾醫皆以為蹙臣意診脉以為痺根在右脅下大如覆杯令人喘逆氣不能食臣意即以火齊粥且飲六日氣下即令更服丸藥出入六日病已病得之內診之時不能識其經解大識其病所在臣意常診安陽武都里成開方開方自言以為不病臣意謂之病苦省風三歲四支不能自用使人瘡瘡即死今聞其四支不能用瘡而未死也病得之數飲酒以見大風氣所以知成開方病者診之其脉法奇咳言曰藏氣相反者死切之得腎反肺法曰三歲死也

安陵阪里公乘項處病臣意診脉曰牡疝牡疝在鬲下上連肺病得之內臣意謂之慎毋為勞力事為勞力事則必嘔血死處後蹶踰要蹙寒汗出多即嘔血臣意復診之曰當旦日日夕死即死病得之內所以知項處病者切其脉得省陽省陽入虛裏處旦日死一番一絡者牡疝也臣意曰他所脉期决死生及所治已病眾多又煩忘之不能盡識不敢以對

問臣意所診治病病名多同而診異或死或不死何也對曰病名多相類不可知故古聖人為之脉法以起度量立規矩縣權衡案繩墨調陰陽別人之脉各名之與天地相應參合於人故乃別百病以異之有數者皆異之無數者同之妖脉法不可勝驗診疾人以度異之乃可別同名命病主在所居今臣意所診者皆有診籍所以別之者臣意所受師方適成師死以故表籍所診期决死生觀所失所得者合脉法以故至今知之

問臣意曰所期病决死生或不應期何故對曰此皆飲食喜怒不節或不當飲藥或不當鍼灸以故不中期死也

問臣意意方能知病死生論藥用所宜諸侯王大臣有嘗問意者不及文王病時不求意診治何故對曰趙主膠西王濟南王共王皆使人來召臣意臣意不敢往文王病時臣意家貧欲為人治病誠恐吏以除拘臣意也故移名數左右不脩家生出行游國中問善為方數者事之矣矣見事數師悉受其要事盡其方書意及解論之身居陽虛侯國因事侯侯入朝臣意從之長安以故得診安陵項處等病也

問臣意知文王所以得病不起之狀臣意對曰不見文王病然竊聞文王病喘頭痛目不明臣意心論之以爲非病也以爲肥而蓄精身體不得搖骨肉不相任故喘不當醫治脉法曰年二十脉氣當趨年三十當疾步年四十當安坐年五十當安臥年六十已上氣當大重文王年未滿二十方脉氣之趨也而徐之不應天道四時後聞醫灸之即篤此論病之過也臣意論之以爲神氣爭而邪氣入非年少所能復之以故死所謂氣者當調飲食擇晏日車步廣志以適筋骨肉血脉以瀉氣故年二十是謂易骨法不當砭

灸砭灸至氣逐

卷之八

七

問臣意師慶安受之聞於齊諸侯不對曰不知慶所師受慶家富善爲醫不肯爲人治病當以此故不聞慶又告臣意曰慎毋令我子孫知若學我方也

問臣意師慶何見於意而愛意欲悉教意方對曰臣意不聞師慶爲方善也意所以知慶者意少時好諸方事臣意試其方皆多驗精良臣意聞留川唐里公孫光善爲古傳方臣意即往謁之得見事之受方化陰陽及傳諸法臣意悉受書之臣意欲盡受他精方公孫光曰吾方盡矣不爲愛公所吾身已衰無所復

事之是吾年少所受妙方也悉與公毋以教人臣意曰得見事侍公前悉得禁方幸甚意死不敢妄傳人居有間公孫光問處臣意深論方見言百世爲之精也師光喜曰公必爲國工吾有所善者皆疏同產處臨菑善爲方吾不若其方甚奇非世之所聞也吾年中時嘗欲受其方楊中倩不肯曰若非其人也胥與公往見之當知公喜方也其人亦老矣其家給富時者未往會慶子男殷來獻馬因師光奏馬王所意以故得與殷善光又屬意於殷曰意好數公必謹遇之其人聖儒卽爲書以意屬陽慶以故知慶臣意事慶謹以故愛意也

卷之八

八

三

問臣意曰吏民嘗有事學意方及畢盡得意方不何縣里人對曰臨菑人宋邑邑學臣意教以五診歲餘濟北王遣太醫高期王禹學臣意教以經脉高下及奇終結當論俞所居及氣當上下出入邪逆順以宜鑱石定砭灸處歲餘留川王時遣太倉馬長馮信正方臣意教以案法逆順論藥法定五味及和齊湯法高永侯家丞杜信喜脉來學臣意教以上下經脉五診二歲餘臨菑召里唐安來學臣意教以五診上下經脉奇咳四時應陰陽重未成除爲齊王侍醫

問臣意診病決死生能全無失乎臣意對曰意治病
人必先切其脉乃治之敗逆者不可治其順者乃治
之心不精脉所期死生視可治時時失之臣意不能
全也

太史公曰女無美惡居宮見妬士無賢不肖入朝見
疑故扁鵲以其伎見殃倉公乃匿迹自隱而當刑綆
繫通尺牘父得以後寧故老子曰美好者不祥之器
豈謂扁鵲等邪若倉公者可謂近之矣

太倉公神醫也其治療之奇遷吏備載之矣
無容贅贊然生五女而不生男茲可見子之

多寡有無皆天也而世之人乃有以種子術
授人者多見其妄也已太倉公師公乘陽慶
亦年七十餘無子讀書察理之士固不爲是
惑竊附此於太倉公傳後以示戒云

醫史卷之一

醫史卷之二

浚儀李漁輯

後漢書四人

郭玉傳

郭玉者廣漢雒人也初有老父不知何出常漁釣於
涪水因號涪翁乞食人間見有疾者時下鍼石輒應
時而效乃著鍼經診脉法傳於世弟子程高尋求積
年翁乃授之高亦隱迹不仕玉少師事高學方診六
徵之技陰陽不測之術和帝時爲太醫丞多有效應
帝奇之仍試令嬖臣美手腕者與女子雜處帷中使
王各診一手問所疾苦玉曰左陰右陽脉有男女狀
若異人臣疑其故帝歎息稱善玉仁愛不矜雖貧賤
厮養必盡其心力而醫療貴人時或不愈帝乃令貴
人羸服變處一鍼即差召玉詰問其狀對曰醫之爲
言意也腠理至微隨氣用巧鍼石之間毫芒即乖神
存於心手之際可得解而不可得言也夫貴者處尊
高以臨臣臣懷怖懾以承之其爲療也有四難焉自
用意而不任臣一難也將身不謹二難也骨節不彊
不能使藥三難也好逸惡勞四難也鍼有分寸時有
破漏重以恐懼之心加以裁慎之志臣意且猶不盡

何有於病哉此其所以爲不愈也帝善其對年老卒于官

嗟乎病一也人有貴賤而療之有難易焉郭玉自謂重以恐懼之心加以裁慎之志已意且猶不盡何有於病哉此千古不易之論知之者鮮矣

華佗傳 弟子吳普 樊阿

華佗字元化沛國譙人也一名專遊學徐士兼通數經曉養性之術年且百歲而猶有壯容時人以爲僊沛相陳珪舉孝廉太尉黃琬辟爲不就精於方藥處

醫史

卷三

三

齊不過數種心識分銖不假稱量鍼灸不過數處若疾發結於內鍼藥所不能及者乃令先以酒服麻沸散既醉無所覺因剝破腹背抽割積聚若在腸胃則斷截前洗除去疾穢既而縫合傳以神膏四五日創愈一月之間皆平復矣佗嘗行道見有病咽塞者因語之曰向來道隅有青餅人游藝甚酸可取三升飲之病自當去即如佗言立吐一蛇乃懸於車而候佗時佗小兒戲於門中逆見自相謂曰客車邊有物必是逢我翁也及客進顧視壁北懸蛇以十數乃知其竒又有一郡守篤病久佗以爲盛怒則差乃多受其

貨而不加功無何棄去又留書罵之郡守果大怒令人追殺佗不及因瞋恚吐血數升而愈又有疾者詣佗求療佗曰君病根深應當剖破腹然君壽亦不過十年病不能相殺也病者不堪其苦必欲除之佗遂下療應時愈十年竟死廣陵太守陳登忽患胃中煩懣面赤不食佗脉之曰府君胃中有蟲欲成內疽臃物所爲也即作湯二升再服須臾吐出三升許蟲頭赤而動半身猶是生魚膽所苦便愈佗曰此病後三暮當發遇良醫乃可救登至期疾動時佗不在遂死曹操聞而召佗常在左右操積苦頭風眩佗鍼隨手而差有李將軍者妻病呼佗視脉佗曰傷身而胎不去將軍言間日實傷身胎已去矣佗曰按脉胎未去也將軍以爲不然妻稍差百餘日復動更呼佗佗曰脉理如前當是兩胎先生者去血多故後兒不得出也胎既已死血脉不復歸必燥著母脊乃爲下鍼并令進湯婦因欲產而不通佗曰死胎枯燥勢不自生使人探之果得死胎人形可識但其色已黑佗之絕技皆此類也爲人性惡難得意且耻以醫見業又去家思歸乃就操求還取方因託妻疾數期不反操累書呼之又勅郡縣發遣佗恃能厭事猶不肯至操

醫史

卷三

三

大怒使人薦之知妻詐疾乃收付獄訊考驗有服苟或請曰佗方術實工人命所懸宜加全宥操不從竟殺之佗臨死出一卷書與獄吏曰此可以活人吏畏法不敢受佗亦不強索火燒之初軍吏李成苦欬晝夜不寐佗以爲腸癰與散兩錢服之即吐二升膿血於此漸愈乃戒之曰後十八歲疾當發動若不得此藥不可差也復分散與之後五六歲有里人如成先病請藥甚急成怒而與之乃故往譙更從佗求適值見收意不忍言後十八年成病發無藥而死廣陵吳普彭城樊阿皆從佗學普依準佗療多所全濟佗語普曰人體欲得勞動但不當使極耳動搖則穀氣得銷血脈流通病不得生譬如戶樞終不朽也是以古之僂者爲導引之事能經絡引挽腰體動諸關節以求難老吾有一術名五禽之戲一曰虎二曰鹿三曰熊四曰猿五曰鳥亦以除疾兼利蹠足以當導引體有不快起作一禽之戲怡而汗出因以著粉身體輕便而欲食普施行之年九十餘耳目聰明齒牙完堅阿善鍼術凡醫咸言背及胃藏之間不可妄鍼鍼之不可過四分而阿鍼背入一二寸巨闕胃藏乃五六寸而病皆瘳阿從佗求方可服食益於人者佗授

以漆葉青蘘散漆葉屑一斗青蘘十四兩以是爲率言又服去三蟲利五藏輕體使人頭不白阿從其言壽百餘歲漆葉處所而有青蘘生於豐沛彭城及朝歌間

按三國志魏方技傳載佗事多有瞞書所不載者今撮其切要可施諸用者數條列于左方

故甘陵相夫人有娠六月腹痛不安佗視脉曰胎已死矣使人手摸知所在在左則男在右則女人云在左於是爲湯下之果下男形

即愈

縣吏尹世苦四支煩口中乾不欲聞人聲小便不利佗曰試作熱食得汗則愈不汗後三日死即作熱食而汗不出佗曰藏氣已絕於內當啼泣而死果如佗言

府吏兒尋李延共止俱頭痛身熱所苦正同佗曰尋當下之延當發汗或難其異佗曰尋外實延內實故治之宜殊即各與藥明日並起

鹽漬嚴昕與數人共候佗適至佗謂昕曰君

身中佳否。昨曰自如常。佗曰君有急病見於面。莫多飲酒。坐車歸行數里。所卒頭眩。隨車人扶將還。載歸家中宿死。

故督郵頓子獻得病已差。詣佗視脉曰尚虛。未得復。勿爲勞事。御內即死。臨死當吐舌數寸。其妻聞其病除。從百餘里來省之。止宿交。接中間三日發病一如佗言。

督郵徐毅得病。佗往省之。毅謂佗曰。昨使醫曹吏劉祖臧。胃管訖便苦欬。欲臥不安。佗刺不得。胃管誤中肝也。食當日減五日不。

救遂如佗言。

東陽陳叔山小男二歲。得疾下利。常先啼。日以羸困。問佗。佗曰。其母懷軀。陽氣內養。乳中虛冷。兒得母寒。故令不時愈。佗與四物女宛。九十日即除。

彭城夫人夜之廁。驚覺。其手呻呼。無賴。佗令溫湯近熱。漬手其中。卒可得寐。但旁人數爲易湯。湯令煖之。其旦即愈。

軍吏梅平得病。除名還家。家居廣陵。未至二百里。止親人舍。有頃。佗偶至。主人令佗視平。

佗謂平曰。君早見我。可不至此。今疾已結。促去。可得與家相見五日。卒應時歸。如佗所刻。佗死後。太祖頭風未除。太祖曰。佗能愈此小。人養吾病。欲以自重。然吾不殺此子。亦終當不爲我斷此根原耳。及後愛子倉舒病困。太祖嘆曰。吾悔殺華佗。令此兒殭死也。凡此皆。曄書所不載。故附于此。

晉書一人

葛洪傳

葛洪字稚川。丹陽句容人也。少好學。家貧。躬自伐薪。以貿紙筆。夜輒寫書誦習。遂以儒學知名。性寡欲。無所愛玩。閉門却掃。未嘗交游。時輩時或尋書問義。不遠數千里。崎嶇冒涉。期於必得。遂究覽典籍。尤好神仙導養之術。從祖玄號葛仙翁。以其鍊丹秘術授弟。子鄭隱。洪就隱學。悉得其法。洪兼綜醫術。凡所著撰。皆精覈是非。元帝爲丞相。辟爲掾。以平賊功。賜爵關內侯。干寶薦洪才堪國史。遷爲散騎常侍。領大著作。洪固辭不就。以年老欲鍊丹。以祈遐壽。聞交趾出丹。求爲句漏令。元帝以洪資高。不許。洪曰。非欲求榮。以有丹耳。帝從之。洪遂將子姪俱至廣州。刺史鄧嶽留。

不聽去洪乃上羅浮山鍊丹積年優游閒養著述不
輟其自序曰洪體乏超逸之才偶好無爲之業假令
奮翅則能凌厲玄霄駢足則能追風躡景猶欲戰勁
翮於鷦鷯之羣藏逸跡於跛驢之伍況大塊稟我以
尋常之短羽造化假我以至駑之蹇足自卜者審不
能者止豈敢力蒼蠅而慕冲天之舉策跛鼃而追飛
兔之軌哉夫以僬僥之步而企及夸父之蹤近才所
以躓礙也以要離之羸而彊赴扛鼎之勢素人所以
絕筋也是以望絕於榮華之塗而志安乎窮否之域
藟藟有八珍之甘蓬華有藻梲之樂故權貴之家雖
咫尺弗從知道之士雖艱遠必造也考覽奇書既不
少矣罕多隱語難可卒解自非至精不能尋究自非
篤勤不能悉見也道士弘博洽聞者寡而臆斷妄說
者衆時有好事者欲有所脩爲倉卒不知所從而意
之所疑又無足諮今爲此書粗舉長生之理其至妙
者不得宣之於翰墨蓋粗言較畧以示一隅冀憤悱
之徒省之可以思過半矣世儒徒知服膺周孔莫信
神僊之書不但大笑之又將毀謗真正故今所著悉
言黃白之事名曰內篇其餘駁難通釋名曰外篇凡
內外一百一十六篇雖不足藏諸名山且欲緘之金

匱以示知者自號抱朴子因以爲名其餘所著金匱
藥方一百卷肘後要急方四卷又抄五經史漢百家
之言方技雜事三百一十卷洪博聞深洽江左絕倫
又精辯玄曠析理入微後忽與嶽疏云當遠行尋師
尅期便發嶽得疏狼狽徃別洪坐至日中兀然若睡
而卒嶽至不及見時年八十一視其顏色如生體亦
柔軟舉尸入棺甚輕如空衣世以爲尸解得僊云
宋書八人

徐文伯	曾祖熙	祖秋夫	父道度
叔父叔卿	子維		

徐文伯字德秀東海人濮陽太守熙之曾孫也熙好
黃老隱於秦望山有道士過求飲留一瓢獻與之曰
君子孫宜以道術名世當得二千石熙聞之乃扁鵲
鏡經一卷因精心學之遂名震海內生子秋夫彌工
其術仕至射陽令嘗夜有鬼呻吟聲甚悽愴秋夫問
何須答言姓某家在東陽患腰痛死雖爲鬼痛猶難
忍請療之秋夫曰云何厝法鬼請爲芻人按孔穴鍼
之秋夫如其言爲灸四處又鍼肩井三處設祭埋之
明日見一人來謝忽然不見當世服其通靈秋夫生
道度叔卿皆能術其業道度有脚疾不能行文帝令
乘小輿入殿爲諸皇子療疾無不絕驗仕至蘭陵太

守文帝常云天下有五絕而皆出錢唐謂杜道鞠彈

基范悅時褚欣遠模書褚胤圖甚徐道度瘵疾也道

度生文伯叔嚮生嗣伯並精其業文伯兼有學行性

倜儻不屈意於公卿不以醫術自業吳郡張融謂文

伯嗣伯曰昔王微稽叔夜並學而不能殷仲堪之徒

故所不論得之者由神明洞徹然後可至故非吾徒

所及且褚侍中澄雖富貴亦能救瘵人疾即此便成

不達答曰惟達者知此可崇不達者多以爲深累既

鄙之何能不耻之文伯爲効與嗣伯相埒孝武路太

后病衆醫不識文伯診之曰此石博水腸耳乃爲水

劑消石湯病即愈除鄱陽王常侍遺以千金旬日恩

遇隆重明帝宮人患腰痛牽心每至發輒氣欲絕衆

醫以爲肉癥文伯曰此髮癥也以油投之即吐得一

物如髮稍引之長三尺頭已成蛇能動遂掛門上滴

盡乃一髮而已病即瘳後廢帝出樂遊苑門逢一婦

人有娠帝亦善醫診之曰此腹是女也問文伯文伯

曰腹有兩子一男一女男左邊青黑形小於女帝性

急便欲使剖文伯惻然曰若以刀斧恐其變易請鍼

之胎自落便瀉足大陰補手陽明胎便應鍼而落兩

兒用廣出果如其言子雄亦傳家業尤工診察位奉

朝請

按梁書范雲傳初武帝九錫之出而尚書右

僕射范雲忽中疾居三日半召醫徐文伯視

之文伯曰緩之一月乃復欲速即時愈政恐

二年不復可救雲曰朝聞夕死而况二年文

伯乃下火而牀焉重衣以覆之有頃流汗即

起二年果卒此可以補文伯本傳之闕故附

錄之

徐嗣伯 薛伯宗

徐嗣伯字叔紹乃叔嚮之子文伯之從弟也亦有孝

行善清言位正負郎諸府佐彌爲臨川王映所重時

直閣將軍房伯玉服五石散十許劑無益更患冷夏

日常複衣嗣伯爲診之曰卿伏熱應須以水發之非

冬月不可至十一月水雪大盛令二人夾捉伯玉解

衣坐於石上取冷水從頭澆之盡三十斛伯玉口噤

氣絕家人啼哭請止嗣伯遣人執校防閑敢有諫者

撻之又盡水百斛伯玉始能動而見背上彭彭有氣

俄而起坐曰熱不可忍乞冷飲嗣伯以水與之一飲

一升病即瘳自爾恒發熱冬月猶著單褌衫體更肥

壯常有姬患滯冷積年不瘳嗣伯爲診之曰此尸注

也當以死人枕煮服之乃愈於是往古冢中取枕枕已一邊腐缺服之即瘥後秣陵人張景年十五患腹脹面黃衆醫不能療以問嗣伯嗣伯曰此石魃耳極難療當取死人枕煮服之依語煮枕以湯投下得大利有魃蟲頭堅如石者五六升病即瘥後沈僧翼患眼痛又多見鬼物以問嗣伯嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煮服竟可埋枕於故處如其言又愈王晏知而問之曰三病不同皆用死人枕而俱瘥何也荅曰尸注鬼氣也伏而未起故令人沈滯得死人枕投之鬼氣飛越不得復附體故尸注可差石魃者久魃也醫療既僻魃蟲轉堅世間藥不能遣所以須鬼物驅之然後可散故令煮死人枕服之夫邪氣入肝故使眼痛而見魃魃應須邪物以鈎之故用死人枕也氣因枕而去故令埋于冢間也又春二月出南籬間戲聞簷屋有呻吟聲嗣伯曰此病甚重一二日不瘥必死乃往視之見一老姥稱體痛而處處黢黑無數嗣伯還煮斗餘湯送令服之服訖痛勢愈甚跳投牀者無數須臾所黢處皆拔出釘長寸許以膏塗瘡口三日而復云此名釘疽也時又有薛伯宗善徙癰疽有公孫恭者患背癰伯宗爲氣封之徙置齋前柳樹上

明旦癰消樹便起一瘤如拳大稍稍長二十餘日瘡大膿爛出黃赤汁斗餘樹爲之瘻損

南齊書一人

褚澄傳

褚澄字彥通河南陽翟人也祖秀之宋太常父湛之尚書左僕射兄淵司空驃騎將軍錄尚書事澄尚宋文帝女廬江公主拜駙馬都尉歷官清顯善醫術齊高祖建元中爲吳郡太守百姓李道念以公事到郡澄見謂曰汝有重疾荅曰舊有冷疾至今五年衆醫不差澄爲診脉謂曰汝病非冷非熱當是食白淪雞子過多所致令取蒜一升煮服之一本蘇作始一眼乃吐出一物如升涎暴之能動開看乃是雞雛羽翅爪距具足能行走澄曰此未盡更服所餘藥又吐得如向者雞十三頭而病都差當時稱妙豫章王感病高帝召澄爲療立愈尋遷左戶尚書澄凡療病無貴賤皆先審其苦樂榮悴鄉壤風俗水土所宜氣血強弱然後裁方用藥至於寡婦僧尼必有異乎妻妾之療永元元年卒贈金紫光祿大夫所著醫論十篇世稱褚氏遺書是也

按褚氏遺書十篇總二千六百二十言簡切

幽眇多前人所未發蓋深有會于素問靈樞之旨者也唐末黃巢之亂盜發澄墓得石十有八片形制如檠上有刻字即是書云維揚蕭廣叔常得之深加寶重亦以此殉葬宋靖康時金人犯順盜窺蕭氏塚意有厚藏欲發之其子孫因會鄉人啓視得石十有九片其一乃廣之子淵所撰序繇是十篇遂傳于世嗚呼物之顯晦著述之傳世與否固亦有數哉余夙嗜是書漫綴數語于傳後聊亦識珍重之意云爾

北齊書一人

馬嗣明傳

馬嗣明河內人少明醫術博綜經方甲乙素問明堂本草莫不咸誦爲人診候一年前知其生死邢邵惟一子大寶甚聰慧年十七八患傷寒嗣明爲其診脉退告楊愔云邢公子傷寒不療自差脉候不出一年便死覺之少晚不可復療數日後楊邢竝待讌內殿文宣云邢子才兒大不惡我欲乞其隨近一郡楊以子年少未合剖符讌罷奏云馬嗣明稱大寶脉惡一年內恐死若其出郡醫藥難求遂寢大寶未甚而

卒楊愔患背腫嗣明以練石塗之便差作練石法以麝黃色石如鴉卵大猛火燒令赤內醇醋中自有石屑落醋裏煩燒至石盡取石屑曝乾擣下從和醋以塗腫上無不愈武平中爲通直散騎常侍鍼灸孔穴往往與明堂不同嘗有一家二奴俱患身體遍青漸虛羸不能食訪諸醫無識者嗣明爲灸兩足趺上各三七壯便愈武平末從駕往晉陽至遼陽山中數處見榜云有人家女病若有能治差者購錢十萬諸名醫多尋勝至問病狀俱不下手惟嗣明爲之療問其病由云曾以手持一麥穗即見一赤物長二尺似蛇入其手指中因驚怖倒地即覺手臂疼腫漸及半身俱腫痛不可忍呻吟晝夜不絕嗣明即爲處方令馳馬往都市藥示其節度前後服十劑湯一劑散比嗣明明年從駕還此女平復如故嗣明藝術精妙多如是隋開皇中卒於太子藥藏監狀性自矜太輕諸醫人自徐之才崔叔鸞以還俱爲其所輕

醫史卷之二

浚儀李濂輯

後魏書六人

李脩傳

李脩字思祖本陽平館陶人父亮少學醫術未能精究太武時奔劉義隆於彭城又就沙門僧垣研習衆方畧盡其術鍼灸授藥莫不有效徐交間多所救恤四方疾苦不遠千里竟往從之亮大爲廳事以舍病人停車輿於下時有死者則就而棺殯親往弔視其仁厚若此累遷府參軍督護本郡士門宿宦咸相交

醫史

一

二

昵車馬金帛酬賚無貲脩兄元孫隨衆赴平城亦遵父業而不及以功賜爵義平子拜奉朝請脩畧與兄同晚入代京歷位中散令以功賜爵下蔡子遷給事中太和中常在禁內文明太后時有不豫脩侍鍼藥有效賞賜累加車服第宅號爲鮮麗集諸學士及工書者百餘人在東宮撰諸藥方百餘卷皆行於世先是咸陽公高允雖年且百歲而氣力尚康文明太后時令脩診視之一旦奏言允脉竭氣微大命無遠未幾果亡遷洛爲前軍將軍領太醫令後數年卒贈威遠將軍青州刺史

徐謩傳

徐謩字成伯丹陽人家本東莞與兄文伯等皆善醫藥謩因至青州慕容白曜平東陽獲之表送京師獻文欲驗其所能乃置諸病人於幕中使謩隔而脉之深得病形兼知色候遂被寵遇爲中散稍遷內侍長文明太后時問治方而不及李脩之見任用也謩合和藥劑攻療之驗精妙於脩而性甚祕忌承奉不得其意者雖貴爲王公不爲措療也孝文後知其能及遷洛稍加眷幸體小不平及所寵馮昭儀有疾皆令處療及除中散大夫轉右軍將軍侍御師謩欲爲上

醫史

一

二

令金丹致延年之法乃入居松高採營其物歷歲無所成遂罷二十二年上幸懸瓠有疾大漸乃馳驛召謩令水路赴行所一日一夜行數百里至診省下治果有大驗高祖體少廖內外稱慶九月車駕發豫州次于汝濱乃大爲謩設太官珍膳因集百官特坐謩于上席遍陳饋觴于前命左右宣謩救攝危篤振濟之功宜加酬賚乃下詔曰夫神出無方形稟有礙憂喜乖適理必傷生朕覽萬機長鍾革運思芒芒而無怠身忽忽以興勞仲秋動痾心容頓竭氣體羸瘠王凡在慮侍御師右軍將軍徐成伯馳輪太室進療汝

著方窮丹英藥盡之石誠術而輸忠妙俱至乃令沈
勞勝愈篤瘵克痊論勤語效實宜褒錄可進鴻臚卿
金鄉縣開國伯食邑五百戶賜錢一萬貫又詔曰錢
府未充須以雜物絹二千匹雜物一百匹四匹出
御府較二千斛奴婢十口馬十匹一匹出驢牛十
頭所賜雜物奴婢牛馬皆經內呈諸親王咸陽王禧
等各有別資並至千匹從行至鄴上猶自發動寒自
夕左右明年從詣馬圈上疾勢遂甚戚戚不怡每加
切誚又欲加之鞭捶幸而獲免高祖崩嘗隨梓宮還
洛嘗常有藥餌及吞服道符年垂八十而鬚髮不白

醫史

一全

三

力未多衰正始元年以老為光祿大夫加平北將軍
卒延昌初贈安東將軍齊州刺史謚曰靖

徐之才傳

徐之才嘗之從孫也父雄貧外散騎侍郎醫術為江
左所稱事見南史之才幼而傳發長精于醫藥石多
效皇建二年除西兗州刺史未之官武明皇太后不
豫之才療之應手便愈孝昭賜絲帛千段錦四百疋
之才既善醫術雖有外授頃即徵還既博識多聞由
是於方術尤妙有人患脚跟痛諸醫莫能識之才曰
給精疾也由乘船入海垂脚水中疾者曰實曾如此

之才為剖得蛤子二大如榆莢又有以骨為刀把者
五色斑斕之才曰此人瘤也問得處云於古塚見髑
髏額骨長數寸試剖視有文理故用之其明悟多通
如此天統四年累遷尚書左僕射俄除兗州刺史特
給饒吹一部之才醫術最高偏被命召武成酒色過
度恍惚不恒曾病發自云初見空中有五色物稍近
變成一美婦人去地數丈亭亭而立食頃變為觀世
音之才曰此色欲多太虛所致即虔湯藥方服一劑
便覺稍遠又服還變成五色物數劑疾竟愈帝每發
動暫遣騎追之鍼藥所加應時必效之才歷事諸帝

醫史

一全

四

以戲狎得寵齊帝武成生顯牙問諸醫尚藥典御鄧
宣文以實對武成怒而撻之後以問之才拜賀曰此
是智牙生智牙者聰明長壽武成悅而賞之為僕射
年八十卒贈司徒公錄尚書事謚曰文明弟之範亦
以醫術見知位太常卿

王顯傳

王顯字世榮陽平樂天人也自言本東海郟人王朗
之後也父安上少與李亮同師俱受醫術而不及亮
安上還家樂平頗叅士流顯少歷本州從事雖以醫
術自通而明敏有決斷才用初文昭皇太后之懷世

宗也。夢爲日所逐，化而爲龍，統后后寤而驚悸，遂成心疾。文明太后勅召徐審及顯等爲后診脉，審云：是微風入藏，宜進湯加鍼。顯云：按三部脉，非有心疾，將是懷孕生男之象。果如顯言。久之，召補侍御師。尚書儀曹郎號稱幹事，世宗自幼有微疾，久未差愈。顯攝療有効，因稍蒙眴識。又罷六輔之初，顯爲領軍，于烈間通規策，頗有密功。累遷游擊將軍，拜廷尉少卿。仍在侍御營，進御藥出入禁內，乞臨本州。世宗曾許之，積年未授。因是聲問傳于遠近。顯每語人言時旨已決，必爲刺史。遂除北平將軍、相州刺史，尋詔馳驛還京。復掌藥，又遣還州。元愉作逆，顯討之，不利。入除太府卿。御史中尉顯前後歷職所在，著稱糾折，廢獄究其姦，回出內，惜愼憂國如家。及領憲臺，多所彈劾，百寮肅然。又以中尉屬官不悉稱職，諷求更換，詔委政選務。盡才能而顯所舉，或有請屬未得，人於是衆口喧譁，聲望致損。後世宗詔顯撰藥方三十五卷，班布天下，以療諸疾。東宮既建，以爲太子詹事，委任甚厚。世宗每幸東宮，顯常近侍出入禁中，仍奉醫藥，賞賜累加。爲立館宇，寵擬當時。延昌二年秋，以營療之功，封衛南伯。四年正月，世宗夜崩，肅宗踐祚，顯參奉

賈策，隨從臨哭，微爲憂懼。顯既蒙任遇，兼爲法官，恃勢使威，爲時所疾。朝宰託以侍療無效，執之禁中，詔削爵位，歸執呼寃直閣，以刀鐶撞其腋下，傷中吐血。至右衛府一宿，死。始顯布衣爲諸生，有沙門相顯後，當富貴，戒其勿爲吏部。若爲吏部，必敗。由是世宗時或欲令其遂攝吏部，每殷勤辭避。及世宗崩，肅宗夜即位，受璽冊於儀須，兼太尉及吏部倉卒百官不具，以顯兼吏部行事矣。

崔或傳

崔或，字文若，清河東武城人。父勲，之大司馬外兵郎。贈通直郎或與兄相如俱自宋入魏，相如以才學知名，早卒。或少嘗詣青州逢隱逸沙門教以素問甲乙遂善醫術。中山王英子畧嘗病，王顯等不能療，或鍼之，抽鍼即愈。後位冀州別駕，累遷寧遠將軍，性仁恕，見疾苦喜與療之，廣教門生，令多救療其弟子。清河趙約，渤海郝文法之徒，咸亦有名。或子景哲豪率，亦以醫術知名，仕魏爲太中大夫，司徒長史。景哲子岡，齊天保初，爲尚藥典御，歷高陽太守。太子家令終鴻臚卿，臨終戒其子曰：夫恭儉福之興，傲侈禍之機。乘福輿者，漫以康寧蹈禍機者，忽而傾覆。汝其戒哉。吾

沒後欵以時服祭無牢餼棺足周屍瘞不泄露而已
及卒長子脩遵父命景哲弟景鳳字繼叔位尚藥典
御

周澹傳

周澹京兆鄠人也多方術尤善醫藥遂為大醫令明
元嘗苦風疾頭眩澹療得愈由此位特進賜爵成德
侯神瑞二年京師饑朝議遷都於鄴澹與博士祭酒
崔浩進計言不可明元曰惟此二人與朕意同詔賜
澹浩妾各一人御衣一襲絹五十疋綿五十斤時有
河南人陰貞家世業醫與澹並受封爵清河李渾亦

以善鍼見知

後周書二人

姚僧垣傳

姚僧垣字法衛吳興武康人吳太常信之八世孫也
曾祖郢宋貞外散騎常侍五城侯父菩提梁高平令
嘗嬰疾歷年乃留心醫藥梁武帝性又好之每召菩
提討論方術言多會意由是頗禮之僧垣幼通洽居
喪盡禮年二十四即傳家業梁武帝召入禁中面加
討試僧垣酬對無滯梁武帝甚奇之大通六年解褐
臨川嗣王國左常侍大同五年除驃騎廬陵王府法

曹參軍九年追領殿中醫師時武陵王所生葛脩華
宿患積時方術莫効梁武帝乃令僧垣視之還具說
其狀并記增損時侯梁武帝歎曰卿用意綿密乃至
於此以此候疾何疾可逃朕常以前代名人多好此
術是以每恒留憤頗識治體今聞卿說益開人意十
一年轉領大醫正加文德主帥直閣將軍梁武帝嘗
因發熱欲服大黃僧垣曰大黃乃是快藥然至尊年
高不宜輕用帝弗從遂至危篤梁簡文帝在東宮甚
禮之四時伏臘每有賞賜大清元年轉鎮西湘東王
府中記室參軍僧垣好文史不留意於章句時商
畧今古則為學者所稱及侯景圍建業僧垣乃棄妻
子赴難梁武帝嘉之授戎昭將軍湘東王府記室參
軍及宮城陷百官逃散僧垣假道歸至吳興謁郡守
張嶸嶸見僧垣流涕曰吾過荷朝恩今報之以死君
是此邦大族又朝廷舊臣今日得君吾事辦矣俄而
景兵大至攻戰累日郡城遂陷僧垣竄避父之乃被
拘繫尋將侯子鑒素聞其名深相器遇因此獲免及
梁簡文嗣位僧垣還建業以本官兼中書舍人子鑒
尋鎮廣陵僧垣又隨至江北梁元帝平侯景召僧垣
赴荊州改授晉安王府諮議其時雖尅平大亂而任

用非才朝政混淆無復綱紀僧垣每深憂之謂故人曰吾觀此形勢禍敗不久今時上策莫若近關聞者皆掩口竊笑梁元帝嘗有心腹疾乃召諸醫議治療之方咸謂至尊至貴不可輕脫宜用平藥可漸宣通僧垣曰脉洪而實比有宿食非用大黃必無差理梁元帝從之進湯訖果下宿食因而疾愈梁元帝大喜時初鑄錢一當十乃賜錢十萬實百萬也及大軍剋荊州僧垣猶侍梁元帝不離左右爲軍人所止方泣涕而去尋而中山公護使人求僧垣僧垣至其營復爲燕公干謹所召大相禮接文帝又遣使馳驛徵僧垣謹固留不遣謂使人曰吾年衰暮疾病嬰沉今得此人望與之借老文帝以謹勳德隆重乃止明年隨謹至長安武成元年授小畿伯下大夫金州刺史伊婁穆以疾還京請僧垣省疾乃云自腰至臍似有三縛兩脚緩縱不復自持僧垣爲診脉處湯三劑穆初服一劑上縛即解次服一劑中縛復解又服一劑三縛悉除而兩脚疼痛猶自攣弱更爲合散一劑稍得屈伸僧垣曰終待霜降此患當愈及至九月遂能起行大將軍襄樂公賀蘭隆先有氣疾加以水腫喘息奔急坐臥不安或有勸其服決命大散者其家疑未

能決乃問僧垣僧垣曰意謂此患不與大散相當若欲自服不煩賜問因而委去其子殷勤拜請曰多時抑屈今日始來竟不可治意實未盡僧垣知其可差即爲處方勸使急服便即氣通更服一劑諸患悉愈天和元年加授車騎大將軍儀同三司大將軍樂平公竇集暴感風疾精神矻亂無所覺知諸醫先視者皆云已不可救僧垣後至曰困則困矣終當不死若專以見付相爲治之其家忻然請受方術僧垣爲合湯散所患即瘳大將軍永世公叱伏列椿苦痢積時而不廢朝謁燕公謹嘗問僧垣曰樂平永世俱有痼疾若如僕意永世差輕對曰夫患有深淺時有刻殺樂平雖困終當保全永世雖輕必不免死謹曰君言必死當在何時對曰不出四月果如其言謹歎異之天和六年遷遂伯中大夫建德三年文宣太后寢疾醫巫雜說各有異同高祖御內殿引僧垣同坐曰太后患勢不輕諸醫並云無慮朕入子之情可以意得君臣之義言在無隱公爲何如對曰臣無隱聲視色之妙特以經事已多准之常人竊以憂懼帝泣曰公既決之矣知復何言尋而太后崩其後復因召見帝問僧垣曰姚公爲儀同幾年對曰臣忝荷朝恩於茲

九歲帝曰勤勞有日朝命宜隆乃授驃騎大將軍開
府儀同三司又勅曰公年過縣車可停朝謁若非別
勅不勞入見四年高祖親戎東討至河陰遇疾口不
能言臉垂覆目不復瞻視一足短縮又不得行僧坦
以爲諸藏俱病不可並治軍中之要莫先於語乃處
方進藥帝遂得言次又治目目疾便愈未乃治足足
疾亦瘳比至華州帝已痊復即除華州刺史仍詔隨
駕入京不令在鎮宣政元年表請致仕優詔許之是
歲帝幸雲陽遂寢疾乃召僧坦赴行在所內史柳昇
私問曰至尊貶膳日久脉候何如對曰天子上應天
心或當非愚所及若凡庶如此萬無一金乎而帝崩
宣帝初在東宮常苦心痛乃令僧坦治之其疾即愈
帝甚悅及即位恩禮彌隆常從容謂僧坦曰常聞先
帝呼公爲姚公有之乎對曰臣曲荷殊私實如聖旨
帝曰此是尚齒之辭非爲貴爵之號朕當爲公建國
開家爲子孫永業乃封長壽縣公邑一千戶冊命之
日又賜以金帶及衣服等大象二年除太醫下大夫
帝尋有疾至于大漸僧坦宿直侍帝謂隋公曰今日
性命惟委此人僧坦知帝診候危殆必不全濟乃對
曰臣荷恩既重思在効力但恐庸短不逮敢不盡心

帝頷之及靜帝嗣位遷上開府儀同大將軍隋開皇
初進爵北絳郡公三年卒時年八十五遺戒衣白帟
入棺朝服勿斂靈上惟置香奩每日設清水而已贈
本官加荆湖二州刺史僧坦醫術高妙爲當世所推
前後効驗不可勝紀聲譽既盛遠聞近服至於諸蕃
外域咸請託之僧坦乃搜採奇異參校徵効者爲集
驗方十二卷行于世

褚該傳

褚該字孝通河南陽翟人也父義昌梁鄱陽王中記
室該幼而謹厚尤善醫術仕梁歷武陵王府參軍隨
府西上後與蕭撫同歸周自許與死後該稍爲時人
所重賓客迎候亞於姚僧坦天和初位縣伯下大夫
進授車騎大將軍儀同三司該性淹和不自矜尚但
有請之者皆爲盡其藝術時論稱其長者後以疾卒
子則亦傳其家業

隋書二人

許智藏傳 許澄

許智藏高陽人也祖道幼嘗以母疾遂覽醫方因而究極世號名醫戒其諸子曰為人子者嘗膳之藥不知方術豈謂孝乎由是世相傳授仕梁官至負外散騎侍郎父景武陵王諮議參軍智藏少以醫術自達仕陳為散騎侍郎及陳滅高祖以為負外散騎侍郎使謁揚州會素孝王俊有疾上馳召之後夜中夢其

醫史

一卷

二

亡妃崔氏泣曰本來相迎如聞許智藏將至其人若到當必相苦為之奈何明夜俊又夢崔氏曰妾得計矣當入靈府中以避之及智藏至為俊診脉曰疾已入心即當發癰不可救也果如言俊數日而薨上奇其妙賚物百段煬帝即位智藏時致仕于家帝每有所苦輒令中使就詢訪或以輦迎入殿扶登御牀智藏為方奏之用無不效年八十卒於家宗人許澄亦以醫術顯父大仕梁太常丞中軍長史隨柳仲禮入長安與姚僧垣齊名拜上儀同三司澄有學識傳父業尤盡其妙歷尚藥典御諫議大夫封賀州縣伯父

子俱以藝術名重於周隋二代史失事故附見云

舊唐書九人

孫思邈傳

孫思邈京兆華原人也七歲就學日誦千餘言弱冠善談莊老及百家之說兼好釋典洛州總管獨孤信見而歎曰此聖童也但恨其器大適小難為用也周宣帝時思邈以王室多故乃隱居太白山隋文帝輔政徵為國子博士稱疾不起嘗謂所親曰過五十年當有聖人出吾方助之以濟人及太宗即位召詣京師嗟其容色甚少謂曰故知有道者誠可重美門

醫史

一卷

二

廣成豈虛言哉將授以爵位固辭不受顯慶四年高宗召見拜諫議大夫又固辭不受上元元年辭疾請歸特賜良馬及鄱陽公主邑司以居焉當時知名之士宋令文王孟詵盧照鄰等執師資之禮以事之思邈嘗從幸九成宮照鄰留在其宅時庭前有病梨樹照鄰為賦其序曰癸酉之歲余臥疾長安北德坊之官舍父老云是鄱陽公主邑司昔公主未嫁而卒故其邑廢時有孫思邈處士居之邈道合古今學殫數術高談正一則古之蒙莊子深入不二則今之維摩詰耳其推步甲乙度量乾坤則洛下閎安期先生之傳

也。照鄰有惡疾，醫所不能愈。乃問思邈名，思邈疾其
道何如。思邈曰：吾聞善言天者，必質之於人。善言人
者，亦本之於天。天有四時，五行，寒暑迭代，其轉運也
和而為雨，怒而為風，凝而為霜，雪張而為虹蜺。此天
地之常數也。人有四支五藏，一覺一寢，呼吸吐納，精
氣往來，流而為榮衛，彰而為氣色，發而為音聲。此人
之常數也。陽用其形，陰用其精，天人之所同也。及其
失也，蒸則生熱，否則生寒，結而為瘤贅，陷而為癰疽，
奔而為喘乏，竭而為焦枯。診發乎面，變動乎形，推此
以及天地，亦如之故。五緯盈縮，星辰錯行，日月薄蝕，

醫史

卷四

三

幸彗飛流，此天地之危診也。寒暑不時，天地之蒸否
也。石立土踊，天地之瘤贅也。山崩土陷，天地之癰疽
也。奔風暴雨，天地之喘乏也。川瀆竭涸，天地之焦枯
也。良醫導之以藥，石救之以鍼，劑聖人和之以至德，
輔之以人事，故形體有可愈之疾，天地有可消之災。
又曰：膽欲大而心欲小，智欲圓而行欲方。詩曰：如臨
深淵，如履薄冰，謂小心也。赴武夫公侯于城，謂大
膽也。不為利回，不為義政行之方也。見機而作，不俟
終日。智之圓也。思邈自云：開皇辛酉歲生，至今年九
十三矣。詢之鄉里，咸云數百歲人。話周齊間事，歷歷

如眼見。以此參之，不啻百歲人矣。然猶視聽不衰，神
采甚茂，可謂古之聰明博達不死者也。初魏徵等受
詔脩齊梁陳周隋五代史，恐有遺漏，屢訪之。思邈口
以傳授，有如目覩。東臺侍郎孫處約將其五子，佺儼
俊佑，佺以謁思邈。思邈曰：俊當先貴，佺當晚達。佺最
名重，禍在執兵。後皆如其言。太子詹事盧齊卿童幼
時，請問人倫之事。思邈曰：汝後五十年位登方伯。吾
孫當為屬使，可自保也。後齊卿為徐州刺史，思邈孫
渾果為徐州蕭縣丞。思邈初謂齊卿之時，渾果猶未生
而預知其事，凡諸異迹多此類也。永淳元年卒，遺令

醫史

卷四

四

薄葬，不藏寘器，祭祀無牲牢，經月餘，顏貌不改。舉屍
就木，猶若空衣。時人異之。自注：老子莊子撰千金方
三十卷，行於代。又撰福祿論三卷，攝生真錄及枕中
素書會三教論各一卷。子行天授中為鳳閣侍郎。
按新唐書：思邈乃在隱逸傳，蓋重其人不以
方技目之也。中間紀盧照隣問養性之要，答
曰：天有盈虛，人有屯危，不自慎，不能濟也。故
養性必先知自慎也。慎以畏為本。故士無畏
則簡仁義，農無畏則墮稼穡，工無畏則慢規
矩，商無畏則貨不殖，子無畏則忘孝父，無畏

則廢慈臣無畏則勳不立君無畏則亂不治
是以太上畏道其次畏天其次畏物其次畏
人其次畏身憂於身者不拘於人畏於己者
不制於彼慎於小者不懼於大戒於近者不
侮於遠知此則人事畢矣此皆舊唐書所遺
者故附錄于傳後寔養性脩身之要延年却
病之方也

許胤宗傳

許胤宗常州義興人也初事陳爲新蔡王外兵參軍
時柳太后病風不言名醫治皆不愈脉益沉而喘胤
宗曰口不可下藥宜以湯氣薰之令藥入腠理周洽
即差乃造黃耆防風湯數十斛置於牀下氣如煙霧
其夜便得語由是超拜義興太守陳亡入隋歷尚藥
奉御武德初累授散騎侍郎時關中多骨蒸病得之
必死遞相傳染諸醫無能療者胤宗每療無不愈或
謂曰公醫術若神何不著書以貽將來胤宗曰醫者
意也在人思慮又脉候幽微苦其難別意之所解口
莫能宣且古之名手惟是別脉脉既精別然後識病
夫病之於藥有正相當者惟須單用一味直攻彼病
藥力既純病即立愈今人不能別脉莫識病源以情

甄權傳

第立言

甄權許州扶溝人也嘗以母病與弟立言專醫方得
其旨趣隋開皇初爲秘書省正字後稱疾免隋魯州刺
史庫狄欽苦風患手不得引弓諸醫莫能療權謂曰
但將弓箭向瘰一鍼可以射矣鍼其有隅一穴應時
即射權之療疾多此類也貞觀十七年權年一百三
歲太宗幸其家視其飲食訪以藥性因授朝散大夫
賜几杖衣服其年卒撰脉經鍼方明堂人形圖各一
卷第立言武德中累遷太常丞御史大夫杜淹患風
毒發腫太宗令立言視之既而奏曰從今更十一日
午時必死果如其言時有尼明律年六十餘患心腹
鼓脹身體羸瘦已經二年立言診脉曰其腹內有蟲
當是誤食髮爲之耳因令服雄黃須臾吐一蛇如人
手小指惟無眼燒之猶有髮氣其疾乃愈立言尋卒
撰本草音義七卷古今錄驗方五十卷

張文仲傳 李度續 蘇慈藏

張文仲洛州洛陽人也少與鄉人李度縱京兆人常
慈藏並以醫術知名文仲則天初爲侍御醫時特進
蘇良嗣於殿庭因拜跪便絕倒則天令文仲慈藏隨
至宅候之文仲曰此因憂憤邪氣激也若痛衝脇則
劇難救自朝候之未及食時即苦衝脇絞痛文仲曰
若入心即不可療俄頃心痛不復下藥日旰而卒文
仲尤善療風疾其後則天令文仲集當時名醫共撰
療風氣諸方仍令麟臺監王方慶監其脩撰文仲奏
白風有一百二十四種氣有八十種大體醫藥雖同
人性各異庸醫不達藥之性使冬夏失節因此殺人
惟脚氣頭風上氣常須服藥不絕自餘則隨其發動
臨時消息之但有風氣之人春末夏初及秋暮要得
通洩即不困劇於是撰四時常服及輕重大小諸方
十八首表上之文仲又視年終於尚藥奉御撰隨身
備急方三卷行於代度縱官至侍御醫慈藏景龍中
光祿卿自則天中宗已後諸醫咸推文仲等三人爲
首

孟詵傳 宋俠

孟詵汝州梁人也舉進士垂拱初累遷鳳閣舍人詵

少好方術嘗於鳳閣侍郎劉祐之家見其勅賜金謂
補之曰此藥金也若燒火其上當有五色氣試之果
然則天聞而不悅因事出爲台州司馬後累遷春官
侍郎睿宗在藩召充侍讀長安中爲同州刺史加銀
青光祿大夫神龍初致仕歸伊陽之山第以藥餌爲
事詵年雖晚暮志力如壯嘗謂所親曰若能保身養
性者常須善言其難口良藥莫離手睿宗即位召赴
京師將加任用固辭衰老景雲三年優詔賜物一百
段又令每歲春秋二時特給羊酒糜粥開元初河南
尹畢構以詵有古人之風改其所居爲子平里尋卒
年九十三詵所居官好勾剝爲政雖繁而理撰家祭
禮各一卷喪服要二卷補養方必効方各三卷時則
有宋俠者洛州清漳人北齊東平王文學孝王之子
也亦以醫術著名官至朝散大夫藥藏監撰經心錄
十卷行于代

醫史卷之四

醫史卷之五

宋史六人

浚儀 李瀛 輯

龐安時傳

龐安時字安常，廬州蘄水人。兒時能讀書，過目輒記。父世醫也，授以脉訣。安時曰：「是不足爲也。」獨取黃帝扁鵲之脉書治之。未久，已能通其說。時出新意，辯詰不可屈。父大驚，時年猶未冠，已而病瞶，乃益讀靈樞太素甲乙諸秘書。凡經傳百家之涉其道者，靡不通貫。嘗曰：「世所謂醫書者，皆見之惟扁鵲之言深矣。」蓋所謂難經者，扁鵲寓術於其書而言之不詳，意者使後人自求之歟？予之術蓋出於此，以之視淺深決死生，若合符節。且察脉之要，莫急於人迎寸口，是二脉陰陽相應，如兩引繩，陰陽均則繩之大小等，故定陰陽於喉手配覆，溢於尺寸，寓九候於浮沉，分四溫於傷寒。此皆扁鵲畧開其端，而予參以內經諸書考究而得其說，審而用之，順而治之，病不得逃矣。又欲以術告後世，故著難經辨數萬言，觀草木之性與五藏之宜，秩其職任，官其寒熱，班其奇偶，以療百疾。著主對集一卷，古今異宜，方術脫遺，備陰陽之變，補仲景

之論，導有後出，古所未知，今不能辨，嘗試有功不可遺也。作本草補遺，爲人治病，率十愈八九。踵門求診者爲辟邸舍居之，親視釵粥藥物，必愈而後遣。其不可爲者，必實告之，不復爲治。活人無數。病家持金帛來謝，不盡取也。嘗詣舒之桐城，有民家婦孕，將產七日而子不下，百術無所効。安時之弟子李百全適在傍，舍邀安時往視之。纔見，即連呼不死，令其家人以湯溫其腰腹，自爲上下拊摩。孕者覺腸胃微痛，呻吟間生一男子。其家驚喜而不知所以。然安時曰：「兒已出胞而一手誤執母腸，不復能脫，故非符藥所能爲。」吾隔腹捫兒手所在，鍼其虎口，既痛即縮手，所以遂生。無他術也。取兒視之，右手虎口鍼痕存焉。其妙如此。有問以華佗之事者，曰：「術若是，非人所能爲也。其史之妄乎？年五十八而疾作，門人請自視脉，笑曰：『吾察之審矣。』且出入息亦脉也。今胃氣已絕死矣。遂辟卻藥餌，後數日與客坐語而卒。」

余嘗閱黃山谷撰龐安常傷寒論後序，言其少時豪縱，闖難走狗，蹴鞠擊毬，無所不爲。博奕音技，一工所難，而兼能之，蓋其天資英邁，故從事于醫，而精妙絕人如此。山谷又稱其

輕財如糞土而樂義耐事如慈母而有常似秦漢間遊俠而不害人似戰國四公子而不爭利凡此皆傳之所未備故附錄于後云

許希傳

許希開封人以醫爲業補翰林醫學景祐元年仁宗不豫侍醫數進藥未效人心憂恐冀國大長公主薦希希診曰鍼心下包絡之間可亟愈左右爭以爲不可諸黃門祈以身試試之無所害遂以鍼進而帝疾愈命爲翰林醫官賜緋衣銀魚及器幣希拜謝已又西嚮拜帝問其故對曰扁鵲臣師也今者非臣之功

本傳

志

殆臣師之賜安敢忘師乎乃請以所得金與扁鵲廟帝爲築廟于城西隅封靈應侯其後廟益完學醫者歸趨之因立太醫局于其旁希至殿中省尚藥奉御卒著神應鍼經要訣行于世錄其子宗道至內殿崇

班

僧智緣傳

僧智緣隨州人善醫嘉祐末召至京師舍于相國寺每察脉知人貴賤禍福休咎診父之脉而能道其子吉凶所言若神士大夫爭造之王珪與王安石在翰林珪疑古無此安石曰昔醫和診晉侯而知其良臣

將死夫良臣之命乃見于其君之脉則視父知子亦何足怪哉熙寧中主韶謀取青唐上言蕃族重僧而僧結吳叱臘主部帳甚衆請智緣與俱至邊神宗召見賜白金遣乘傳而西遂稱經略大師智緣有辯口徑入蕃中說結吳叱臘歸化而他族俞龍珂禹藏訥令支等皆因以輸款韶頗忌之言其撓邊事召還以爲右街首座卒

王克明傳

王克明字彥昭其始饒州樂平人後徙湖州烏程縣紹興乾道間名醫也初生時母乏乳賴以乳母得脾

醫史

一書

史

胃疾長益甚醫以爲不可治克明自讀難經素問以求其法刻意處藥其病乃愈始以術行江淮入蘇湖鍼灸尤精診脉有難療者必沈思得其要然後予之藥病雖數證或用一藥以除其本本除而餘病自去亦有不子藥者期以某日自安有以爲非藥之過過在其事當隨其事治之言無不驗士大夫皆自屈與游魏安行妻風痿千年不起克明施鍼而步履如初胡策妻病內秘腹脹號呼踰旬克明視之時秉家方會食克明謂秉曰吾愈恭人病使預會可乎以半碗圓碾生薑調乳香下之俄起對食如平常廬州守王

安道風寒不語旬日他醫莫知所為克明令熾炭燒地灑藥置安道于上須臾而蘇金使黑鹿谷過姑蘇病傷寒垂死克明治之明日愈及從徐度聘金黑鹿谷適為先排使待克明厚甚克明訝之谷乃道其故由是名聞北方後再從呂正已使金金接伴使忽被危疾克明立起之却其謝張子蓋救海州戰士大疫克明時在軍中金活者幾萬人子蓋上其功克明力辭之克明頗知書好俠尚義常數千里赴人之急初試禮部中選累任醫官王炎宣撫四川辟克明不就炎怒劾克明避事坐貶秩後遷至額內翰林醫痊局

大鑑

三

賜金紫紹興五年卒年六十七

皇甫坦傳

皇甫坦蜀之夾江人善醫術顯仁太后苦目疾國醫不能瘡詔募他醫臨安守臣張備以坦聞高宗召見問何以治身坦曰心無為則身安人主無為則天下治引至慈寧殿治太后目疾立愈帝喜厚賜之一無所受令持香禱青城山還復召問以長生久視之術坦曰先禁諸欲勿令放逸丹經萬卷不如守一帝歎服書清靜二字以名其菴且繪其像禁中荆南帥李道雅敬坦坦歲謁道隆興初道入朝高宗孝宗問之

皆稱皇甫先生而不名坦又善相人嘗相道中女必為天下母後果為光宗后

錢乙傳

宋劉歧

錢乙字仲陽上世錢塘人與吳越王有屬王俶納土曾祖贊隨以北因家於鄆父顯善鍼醫然嗜酒喜游一旦匿姓名東游海上不復反乙時三歲母前亡父同產姊嫁醫呂氏哀其孤收養為子稍長讀書從呂君問醫姑將沒乃告以家世乙號泣請往迹父凡五六往乃得父所在又積數歲迎以歸是時乙年三十餘鄉人感聚為泣下多賦詩詠其事後七年父以壽終喪葬如禮其事呂君如事其父呂君沒無嗣為之收葬行服嫁其孤女歲時祭享皆與親等乙始以顯頗方著名山東元豐中長公主女有疾召使視之有功奏授翰林醫學賜緋明年皇子儀國公病瘳擬國醫未能治長公主朝因言錢乙起草野有異能立召入進黃土湯而愈神宗召見褒諭因問黃土所以愈疾狀乙對曰以土勝水水得其平則風自止且諸醫所治垂愈小臣適其愈惟陛下加察天子悅其對擢太醫丞賜紫衣金魚自是戚里貴室選士庶之家願致之無虛日其論醫諸老宿莫能難俄以病免哲宗

復召入宿直禁中久之復辭疾賜告遂不復起乙本有羸疾性簡易嗜酒疾屢攻自以意治之輒愈最後得疾憊甚乃嘆曰此所謂周痺也周痺入藏者死吾其已夫已而曰吾能移之使病在末因自製藥日夜飲之人莫見其方居亡何左手足攣不能用乃喜曰可矣又使所親登東山視菟絲所生篝火燭其下火滅處剷之果得伏靈其大踰斗因以法噉之閱月而盡由此雖偏廢而氣骨堅悍如無疾者退居里舍杜門不冠履坐臥一榻上時時閱史書雜說客至酌酒劇談意欲之適則使二僕夫輿之出沒間巷人或邀致不肯往也病者日造門或扶携強召必滿前近自鄰井遠或百數十里皆授之藥致謝而去初長公主女病泄利將殆乙方醉曰當發疹而愈耐馬都尉以爲不然怒責之不對而退明日疹果出都尉喜以詩謝之廣親宗子病診之曰此可母藥而愈顧其幼曰此且暴病驚入後三日過午無恙其家患曰幼何疾醫貪利動人如此明果發痢甚急復召乙治之居三日愈問何以無疾而知曰火色直視心與肝俱受邪過午者心與肝所用時當更也宗室王子病嘔泄醫以藥溫之加喘乙曰病本中熱奈何以剛齊燥之

將不得前後洩予石膏湯王與醫皆不信謝罷乙曰毋庸復召我後二日果來召適有故不時往王疑且怒使人數十輩趣之至曰固石膏湯證也竟如言而效有士人病欬面青而光其氣哽哽乙曰肝乘肺此逆候也若秋得之可治今春不可治其家祈哀疆之予藥明日曰吾藥再瀉肝而不少却三補肺而益虛又加膺曰法當三日死然安穀者過期不安穀者不及期今尚能粥居五日而絕有娠婦得病醫言胎且墮乙曰娠者五藏傳養率六旬乃更誠能候其月偏補之何必墮已而子母俱得全又乳婦因大恐而病病雖愈目張不能瞋人不能曉以問乙乙曰耆郁李酒飲之使醉則愈所以然者目系內連肝膽恐則氣結膽衛不下惟郁李去結隨酒入膽結去膽下目則能瞋矣如言而效一日過所善翁聞兒啼憐曰何等兒聲翁曰吾家孿生二男子乙曰謹視之過百日乃可保翁不憚居月餘皆斃乙爲方博達不名一所治種種皆通非但小兒醫也於書無不窺他人新舊守古法乙獨度越縱舍卒與法合尤邃本草多識物理辨正闕誤人得異藥或持疑事問之必爲言出生本末物色名貌退考之皆中末年癯瘠劇其嗜酒喜

寒食不自禁自診知不可爲召親戚訣別易衣待
盡享年八十二終于家所著有傷寒論指微五卷嬰
孺論百篇傳于世

河間劉跂曰乙非獨醫可稱也其篤行似儒其奇節
似俠術行而身隱約又類有道者數謂余言襲學六
氣五運夜宿東平王家嶺觀氣象逾月不寐今老矣
事誠有不在書者肯以三十日暇從我當相授余笑
謝弗能其後遂不復言嗚呼斯人也可能復得之哉
沒後余聞其所治驗尤衆東州人人能言劉其章章
者著之篇異時史家叙方術之士其將有考焉

醫史

一卷

九

按宋史有乙傳然不知跂所撰之詳諦觀宋
史乙傳寔本跂所撰裁削成之頗有不可裁
削者故余止錄跂所撰傳而宋史在其中矣
又按宋潛溪文集謂乙深造仲景間而擷
其精華建爲五藏之方各隨所宜肝有相火
則有瀉而無補腎爲真水則有補而無瀉皆
啓內經之秘世藥以嬰孺醫目之何知乙之
淺哉其遺書散亡出於閭孝忠之所輯者非
乙之本意也斯論可謂知言者

遼史二人

直魯古傳

直魯古吐谷渾人初太祖破吐谷渾一騎士棄囊反
射不中而去及追兵開囊視之中得一嬰兒即直魯
古也因所俘者問其故乃知射囊者嬰之父也世善
醫雖馬上視疾亦知標本意不欲子爲人所得欲殺
之耳由是進於太祖淳欽皇后收養之長亦能醫事
事鍼灸太宗時以太醫給侍嘗撰脉訣鍼灸書行于
世年九十卒

耶律敵魯傳

耶律敵魯字撒不撻其先本五院之族始置官分隸

醫史

一卷

十

焉敵魯精于醫察形色即知病原雖不診候有十全
功統和初爲大丞相韓德讓所薦官至節度使初樞
密使耶律斜軫妻有沈痾易數醫不能治敵魯視之
曰心有畜熱非藥石所及當以意療因其贖聒之使
狂用泄其毒則可於是令大擊鉦鼓於前翌日果狂
叫呼怒罵力極而止遂愈治法多類此人莫能測年
八十卒

金史五人

劉完素傳

劉完素字守真河間人嘗遇異人陳先生以酒飲守

真大醉及寤洞達醫術若有授之者乃撰運氣要旨論精要宣明論庸醫或出妄說又著素問玄機原病式特舉二百八十八字注二萬餘言然好用涼劑以降心火益腎水為主自號通元處士云

河間劉守真先生醫術精妙發古人所未發著宣明論原病式傷寒直格方三書蓋已盛行于時晚年又著素問病機氣宜保命集凡三卷分三十二門首原道原脉攝生以及于處方用藥君臣佐使之法無所不備而秘藏篋笥不以示人自序之曰余年二十有五志

醫史

一卷五

十三

在內經日夜不輟殆至六旬遇異人授以美酒橡斗許飲之面赤若醉醒後大有開悟攻療諸病左右逢原百發百中今著此書寔軒岐要妙之旨不遇當人未易授爾時大定丙午閏七月也

張從正傳

張從正字子和睢州考城人精於醫貫穿難素之學其法宗劉守真用藥多寒涼然起疾救死多取效古醫書有汗下吐法亦有不當汗者汗之則死不當下者下之則死不當吐者吐之則死各有經絡脉理世

傳黃帝岐伯所為書也從正用之最精號張子和汗下吐法妄庸淺術習其方劑不知察脉原病往往殺人此庸醫所以失其傳之過也其所著有六門二法之目存於世云

河間探內經之秘大揚其道于大定明昌間而宛丘張子和益發揮而衍繹之子和有神醫名自稱曰戴人興定中召補太醫居無何辭去蓋非其好也於是退而與麻知幾常仲明輩日遊灑水之上講明奧義辯析玄理遂以平日聞見及嘗試之効輯為一書名之曰

醫史

一卷五

十三

儒門事親以為惟儒者能明辨之而事親者不可以不知也是書凡十四卷蓋子和草創之知幾潤色之而仲明又捃其遺為治法心要兵塵瀕洞藏諸查牙空穴中幸而復出入間謂非鬼神訶護之力可乎其中妙論精義不可縷述善讀者當自得之

張元素傳

張元素字潔古易州人八歲試童子舉二十七試經義進士犯廟諱下第乃去學醫無所知名夜夢有人用大斧長鑿鑿心開竅納書數卷於其中自是洞徹

其術河間劉完素病傷寒八日頭痛脉緊嘔逆不食不知所爲元素往候完素面壁不顧元素曰何見待之卑如此哉既爲診脉謂之曰脉病云云曰然初服其藥用其味乎曰然元素曰子誤矣其味性寒下降走太陰陽亡汗不能出今脉如此當服其藥則效矣完素大服如其言遂愈元素自此顯名元素治病不用古方其說曰運氣不齊古今異軌古方新病不相能也自爲家法云

醫史

十卷五

主

元素以古方新病不能相值治疾一切不以方故其書不傳今存于世者皆後人之所傳會非元素之真書也其學則東垣李杲深得之

李慶嗣傳

李慶嗣洛人少舉進士不第棄而學醫讀素問諸書洞曉其義天德間歲大疫廣平尤甚貧者往往闔門臥病慶嗣携藥與米分遺之全活者衆慶嗣年八十餘無疾而終所著傷寒纂類四卷改證活人書二卷傷寒論三卷鍼經一卷傳於世

紀天錫傳

紀天錫字齊卿泰安人早棄進士業學醫精於其技

遂以醫名世集註難經五卷大定十五年上其書授醫學博士

元史一人

李杲傳

李杲字明之真定人也世以貧雄鄉里杲幼歲好醫藥時易人張元素以醫名燕趙間杲捐千金從之學不數年盡傳其業家既富厚無事於技操有餘以自重人不敢以醫名之大夫士或病其資性高寒少所降屈非危急之疾不敢託也其學於傷寒癰疽眼目病爲尤長北京公主王薨甫爲京兆酒宦病小便不利目睛凸出腹脹如鼓膝以上堅硬欲裂飲食且不下甘淡滲泄之藥皆不效杲謂衆醫曰疾深矣內經有之膀胱者津液之府必氣化乃出焉今用滲泄之劑而病益甚者是氣不化也啓玄子云無陽者陰無以生無陰者陽無以化甘淡滲泄皆陽藥獨陽無陰其欲化得乎明日以羣陰之劑投之不再服而愈西臺掾蕭君瑞二月中病傷寒發熱醫以白虎湯投之病者面黑如墨本證不復見脉沉細小便不禁杲初不知用何藥及診之曰此立夏前誤用白虎湯之過白虎湯大寒非行經之藥止能寒腑藏不善用之則傷

寒本病隱曲於經絡之間或更以大熱之藥揉之以苦陰邪則他證必起非所以揉白虎也有溫藥之升陽行經者吾用之有難者曰白虎大寒非大熱何以救君之治柰何果曰病隱於經絡間陽不升則經不行經行而本證見矣本證又何難焉果如其言而愈魏邦彥之妻自腎暴生從下而上其色綠腫痛不可忍果云腎從下而上病從陽明來也綠非五色之正殆肺與腎合而為病邪乃瀉肺腎之邪而以入陽明之藥為之使既効矣而他日病復作者三其所從來之經與腎色各異乃曰諸脉皆屬於目脉病則目從

醫史

一卷五

十五

之此必經絡不調經不調則目病未已也問之果然因如所論而治之疾遂不作馮叔獻之姪櫟年十五六病傷寒目赤而頓渴脉七八至醫欲以承氣湯下之已煮藥而果適從外來馮告之故果切脉大駭曰幾殺此兒內經有言在脉諸數為熱諸遲為寒今脉八九至是熱極也而會要大論云病有脉從而病反者何也脉之而從按之不鼓諸陽皆然此傳而為陰證矣令持薑附來吾當以熱因寒用法處之藥未就而病者爪甲變頰服者八兩汗尋出而愈陝帥郭巨濟病偏枯二指著足底不能伸果以長鍼刺骹中深

至骨而不知痛出血一二升其色如墨又且膠刺之如此者六七服藥三月病良已裴擇之妻病寒熱月事不至者數年已喘嗽矣醫者率以蛤蚧桂附之藥投之果曰不然夫病陰為陽所搏溫劑太過故無益而反害投以寒血之藥則經行矣已而果然果之設施多類此當時之人皆以神醫目之所著書今多傳於世云

東垣老人傳

元硯堅

東垣老人李君諱果字明之其先世居真定富於金財大定初校籍真定河間戶冠兩路君之幼也異於

醫史

一卷五

十五

群兒及長忠信篤敬慎交游與人相接無戲言衢間衆人以爲懼洽處足跡未嘗到蓋天性然也朋儕頗疾之密議一席使妓戲狎或引其衣即怒罵解衣焚之由鄉豪接待國使府尹聞其妙齡有守也諷妓強之酒不得辭稍飲遂大吐而出其自愛如此受論語孟子於王內翰從之受春秋于馮內翰叔獻宅有隙地建書院延待儒士或不給者盡周之泰和中歲饑民多流亡君極力賑拯全活者甚衆母王氏寢疾命里中數醫拯之溫涼寒熱其說異同百藥備嘗以水濟水竟莫知爲何證而斃君痛悼不知醫而失其親

有願曰若遇良醫當力學以志吾過聞易水黎古老人張君元素醫名天下捐金帛詣之學數年盡得其法進納得官監濟源稅彼中民感時行疫厲俗呼爲大頭天行醫工徧閱方書無與對證者出已見妄下之不効復下之比比至死醫不以爲過病家不以爲非君獨惻然于心廢寢食循流討源察標求本製一方與服之乃効特壽之于木刻揭於耳目藂集之地用之者無不効時以爲僊人所傳而鑒之于石碣君初不以醫爲名人亦不知君之深於醫也君避兵汴梁遂以醫游公卿間其明效大驗具載別書壬辰北

醫史

卷五

十一

付汝非爲李明之羅謙父蓋爲天下後世慎勿湮沒推而行之得年七十有二實辛亥二月二十五日也君歿迨今十有七年謙父言猶在耳念之益新噫嘻君之學知所託矣

醫史

卷五


十一

余閱元史李杲傳頗病其不詳而復採真定路儒學教授邳城硯堅所爲東垣老人傳以益之然猶病其不盡載著述甚矣叙事之難也蓋東垣所著有醫學發明脾胃論內外傷辨惑論蘭室秘藏此事難知藥象論總若干卷而試效方乃其門人羅天益所輯者也曾

齋許先生曰東垣之醫醫之王道也有志于學醫者必盡讀東垣之書而後可以言醫

醫史卷之五

醫史卷之六



浚儀李瀛

張仲景補傳

國朝李瀛

張機字仲景南陽人也學醫術於同郡張伯祖盡得其傳工於治療尤精經方遂大有時譽漢靈帝時舉孝廉官至長沙太守少時與同郡何顒客游洛陽顒探知其學謂人曰仲景之術精于伯祖起病之驗雖鬼神莫能知之真一世之神醫也嘗見侍中王仲宣

醫史

卷六

二

仲景曰君年至四十當有疾鬚眉脫落脫落後半年必死宜豫服五石湯庶幾可免仲宣時年二十餘聞其言惡之雖受方而不飲居數月復見仲景乃佯曰五石湯已飲之矣仲景曰觀君氣色非飲藥之診何輕命欺人如此邪仲宣益深惡之後二十年果有疾鬚眉皆脫落越一百八十七日卒時人以為扁鵲倉公無以加之也仲景宗族二百餘口自建武以來未及十稔死者三之一維時大疫流行而傷寒死者居其七乃著傷寒卒病論十卷行于世蓋推本素問熱論之旨兼演伊尹湯液而為之探賸鈎玄功俾造化華佗讀而善之曰此真活人書也仲景又著金匱王

函要畧方三卷上卷論傷寒中卷論雜病下卷載其方并療婦人寔為千古醫方之祖自漢魏以迄于今海內學者家肆戶習誦讀不暇如士子之於六經然論者推為醫中亞聖而范曄後漢書乃不為仲景立傳是故君子有遺憾焉

嵩渚子曰皇甫士安有言伊尹以元聖之才本神農之經為湯液論仲景本黃帝之書述伊尹之法廣湯液論為書十數卷後醫咸遵用之弗敢變宋翰林學士王洙在館閣日偶於蠹簡中得仲景所著金匱要畧三卷乃錄而傳之秘閣校理林億等又校定為二

醫史

卷六

二

十五篇刪芟重複合二百六十二方誠為百世不刊之書或謂有大人之病而無嬰孺之患有北方之藥而無南方之瘵此則長沙之所闕者善學者觸類而長之可也余又聞仲景有脉經五藏論評病要方諸編藝文志咸載其目余皆未之見其真贋不可知云

王叔和補傳

李瀛

王叔和高平人也仕西晉為大醫令性度沉靖潛心方脉精意診切洞識攝養之道平生雅好著述乃本黃帝素問泰越人八十一難經暨張仲景華元化之

書撰脉經十卷凡九十七篇叙陰陽表裏辨三部九候分人迎氣口神門條十二經二十四氣奇經八脉五藏六腑三焦四時之病察如指掌其文約其旨遠其理奧使人占外以知內視死而別生按其法而用之厥驗如神毫髮不爽自難經之後闡明脉旨殆無餘蘊觀其自叙有曰脉理精微其體難辨弦緊浮芤展轉相類在心易了入指難明謂沈為伏則方治永乖以緩為遲則危殆立至况有數候俱見異病同脉者乎夫醫藥為用性命所繫和鵠至妙猶或加思仲景明審亦候形證一毫有疑則考校以求驗故傷寒醫史
卷六
有承氣之戒嘔噦發下焦之問而遺文遠旨代寒能川舊經秘述奧而不售遂令末學昧於原本互滋偏見各逞己能致微痾成膏盲之變帶固絕振起之望良有以也今撰集岐伯以來逮于華陀經論要訣合為十卷百病根源各以類例相從聲色證候靡不該備誠能篤志研窮究其微蹟則可以比蹤古賢代無天橫矣夫自王氏脉經出而海內學醫之士咸知所宗論者以為經絡之龜鏡攻療之梯航廣仁術而利天下厥功甚溥叔和又有脉訣四卷脉賦一卷纂次張仲景傷寒論為三十六卷行于世云

嵩渚子曰宋熙寧初光祿卿直秘閣林億校諸醫經方書而王氏脉經始鏤板于廣西漕司序之者長樂陳孔碩也元泰定間醫學教授謝綱又刊于龍興儒學而東陽柳道傳寔序之其曰脉訣出而脉經隱正如俗儒知誦時文而不知誦經史切中後世徇末忘本之弊然晦菴朱子則謂脉訣辭雖鄙淺而直指高骨為闢之說合于難經本旨蓋亦取之抑脉訣雖非叔和書其亦嘗讀脉經而有得者邪但其自立七表八裏九道之目與脉經所載二十四種之名義弗合是故世之國手遂以為廢書而輕之恐亦終不可廢也知醫君子其尚審察之哉
卷六
李瀛
王冰一作冰自號啓玄子唐寶應中為太僕令篤好醫術得黃帝內經素問靈樞經隋人全元起訓解乃大為次註且自為之序曰夫釋縛脫艱金真道氣拯黎元於仁壽濟羸劣以獲安者非三聖道則不能致之矣孔安國序尚書曰伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也班固漢書藝文志曰黃帝內經十八卷素問即其經之九卷也兼靈樞九卷乃其數焉雖復年

移代革而授學猶存懼非其人而時有所隱故第七一卷師氏藏之今之奉行惟八卷爾然而其文簡其意博其理奧其趣深天地之象分陰陽之候列變化之由表死生之光彰不謀而遐邇自同勿約而幽明斯契稽其言有徵驗之事不忒誠可謂至道之宗奉生之始矣假若天機迅發妙識玄通藏雖屬平生知標格亦資於詰訓未嘗有行不由徑出不由戶者也然刻意研精探微索隱或識契真要則目牛無全故動則有成猶鬼神幽贊而命世奇傑時時間出焉則周有和緩漢有淳于公魏有張公華公皆得斯妙

醫史

六卷

五

道者也咸日新其用大濟蒸人華葉並榮實相副蓋教之著矣亦天之假也水弱齡慕道夙好養生幸遇真經式爲龜鏡而世本紕繆篇目重疊前後不倫文義懸隔施行不易披會亦難歲月既淹襲以成弊或一篇重出而別立二名或兩論併吞而都爲一目或問答未已別樹篇題或脫簡不書而云世闕重合經而冠鍼服併方宜而爲欬篇隔虛實而爲逆從合經絡而爲論要節皮部爲經絡退至道以先鍼諸如此流不可勝數且將升岱嶽非逕奚爲欲詣扶桑無舟莫適乃精勤博訪而并有其人歷十二年方臻理

要詢謀得失深遂夙心時於先生郭子齋堂夢得先師張公秘本文字昭晰義理環周一以參詳群疑冰釋恐散於末學絕彼師資因而撰註用傳不朽兼舊藏之卷合八十一篇二十四卷勒成一部纂究尾明首尋註會經開發童蒙宣揚至理而已其中簡脫文斷義不相接者搜求經論所有遷移以補其處篇目墜缺指事不明者量其意趣加字以昭其義篇論吞併義不相涉闕漏名目者區分事類別目以冠篇首君臣請問禮儀乖失者考校專卑增益以光其意錯簡碎文前後重疊者詳其旨趣削去繁雜以存其

醫史

六卷

六

要辭理秘密難粗論述者別撰玄珠以陳其道凡所加字皆朱書其文使今古必分字不雜糅庶厥昭彰聖旨敷暢玄言有如列宿高懸奎張不亂深泉淨瑩鱗介咸分君臣無天枉之期夷夏有延齡之望俾工徒勿誤學者惟明至道流行微音累屬千載之後方知大聖之慈惠無窮永年八十餘以壽終
嵩者子曰啓玄子所撰玄珠世無傳者今有玄珠十卷昭明隱旨三卷皆後人依託爲之雖非啓玄子真書然於素問間奧頗有發明其隱旨三卷寔與世所傳天元玉冊相表裏蓋亦不可廢云抑又聞啓玄子

註素問二十四卷書成獻之唐令列之醫學遂使上古聖人精微幽眇之書頓付之方技之流於是搢紳先生咸罕言之而是道益衰矣嗚呼惜哉

張擴傳

宋羅願

張擴字子充歙縣人少好醫從蘄水龐安時游時同學六十人安時獨喜擴後聞蜀有王朴善脉又能以太素知人貴賤禍福從之暮年得衣領中所藏素書盡其訣乃辭去南陵有富人子傷寒不知人氣息僅屬擴視之曰此嗜臥證也後三日當蘇蘇則欲飲飲與此藥必熟睡覺當得汗也已而果然當塗郭祥正子患嗽肌骨如削醫多以為勞擴曰是不足憂就坐飲以藥忽大吐使視涎沫中常有物視之得魚骨宿疾皆愈在建業有婦人叩門求醫者擴不在其第揮為診之及歸揮具言其狀擴曰弟與藥如是且瘳矣此其脉當發居三年左乳下有誌也驗之信然嘗有調官都下者擴診之謂曰蝦遊脉見不出七日當死後五日得通判齊州喜曰張擴妄言耳我適得官何謂死哉又二日晨起進盥仆地即死建中靖國初范忠宣公方召而疾作問曰吾此去幾何擴曰公脉氣不出半年公曰使某得生至京師則子之賜也遂

與偕行至京師奏補擴承務郎未幾公以不起聞董正封知歙州擴以太素切其脉曰承議今歲當奏子正封自以官不應格又非郊歲以為疑適宛陵有幕官至者與語及之客曰是不可信彼亦以此語許吾州守矣會徽宗登極守臣子弟例以捧表得官崇寧中黃誥得准西提刑擴謂曰大夫食祿不在淮西行且還朝矣然非今日宰相所謂宰相猶未起則有詔命不滿歲當三遷又曰大夫不病而細君病憂在九月及蔡京當國誥被召還歲中自戶部吏部遷左司郎中而妻劉亦適以九月卒尚書蹇序辰知應天府擴謂曰尚書無官脉旦夕當有謫俄被旨放歸田里復見之曰當得州果得杭州汪丞相微時相門宰陳孺使徧視在學諸生次至公曰君位至宰相然南人得北脉名宦當繇北方起未幾登第調北京大名主簿不出北京積官至中大夫中興遂為上相謂胡殿院曰君當登第然脉未圓歲在辛卯見之曰不出此歲矣明年果登第擴後以罪謫永州至洪州晨起見帥曰擴今日時加午當死後事以累公帥曰何至是擴曰吾察之血已入心矣退使入伺之及期卒擴字子終傳兄業為人純孝有常士大夫多愛重

之

吳源傳

洪熾祖

吳源字德信休寧人號神醫自其上世有名諱者本嗜學遇異人於郊授以異書忽不見視之乃金匱王函之秘遂造活人之妙再傳至豫號松蘿居士長於詩亦得是秘豫子源以樞密汪公勣保奏引試醫之七經百人中獨冠其首授入內宿稍遷至翰林醫官療勞瘵疾奇中邑宰黃法頤妻病劇禱於北斗以祈應夢一少年衣紫長裾戴道巾一人指曰此神醫也能起汝疾黃遂遍召諸醫獨源衣冠與夢符一見謂仇中伏著三日而愈診一姪婦曰是兒左手多一指又診一姪婦曰是當生三男已而皆驗嘗遇一人仆地診之謂為虫證鍼其腹曰已中其頭矣病者果吐痰中有虫如蛭蜥頭有細竅其人即起謝去神效不可數紀每曰醫雖十全不過一藝官至和安不過一醫遂棄官隱于儒號南黃老人有南黃集詩詞千篇與竹洲二吳先生游作詩訓諸子教句云五世活人功已積一經教子意難忘爾曹好展摩雲翮伴我黃花晚節香嘗謂功名非必身享當任子孫也乾道癸巳冬建康留守洪樞密抱病招中都旁郡醫

皆搏手相視時漕程公叔達以同鄉之好強致之診視即曰由驚氣入心而得洪驚悟曰何其神也因言採焚而得疾服藥即瘳留以待春源曰吾無春脉歸甫旬攝衣而逝

醫史

卷六

十一

醫史卷六

醫史卷之七

丹溪翁傳

浚儀 李瀛 輯

國朝戴良

丹溪翁者婺之義烏人也姓朱氏諱震亨字彥脩學者尊之曰丹谿翁翁自幼好學日記千言稍長從鄉先生治經爲舉子業後聞許文懿公得朱子四傳之學講道八華山復往拜焉益聞道德性命之說宏深粹密遂爲專門一日文懿謂曰吾以病久非精於醫者不能以起之子聰明異常人其肯游藝於醫乎翁以母病脾於醫亦粗習及聞文懿之言即慨然曰士苟精一藝以推及物之仁雖不仕於時猶仕也乃悉焚棄向所習舉子業一於醫致力焉時方盛行陳師文張宗元所定大觀二百九十七方翁窮晝夜是習既而悟曰操古方以治今病其勢不能以盡合苟將起度量立規矩稱權衡必也素難諸經乎然吾鄉諸醫鮮克知之者遂治裝出游求他師而叩之乃渡浙河走吳中出宛陵抵南徐達建業皆無所遇及還武林忽有以其郡羅氏告者羅名知師字子敬世稱太無先生宋理宗朝寺人學精於醫得金劉完素之再

傳而旁通張從正李杲二家之說然性補其特能厭事難得意翁往謁焉凡數往返不與接已而求見愈篤羅乃進之曰子非朱彥脩乎時翁已有醫名羅故知之翁既得見遂北面再拜以謁受其所教羅遇翁亦甚懼即授以劉張李諸書爲之敷揚三家之旨而一斷於經且曰盡去而舊學非是也翁聞其言渙焉無少疑滯於胃臆居無何盡得其學以歸鄉之諸醫泥陳裴之學者聞翁言即大驚而笑且排擯文懿喜曰吾疾其遂瘳矣乎文懿得未疾醫不能療者餘十年翁以其法治之良驗於是諸醫之笑且排者始皆心服口譽數年之間聲聞頗著翁不自滿足益以三家之說推廣之謂劉張之學其論臟腑氣化有六而於濕熱相火三氣致病爲最多遂以推陳致新瀉火之法療之此固高出前代矣然有陰虛火動或陰陽兩虛濕熱自盛者又當消息而用之謂李之論飲食勞倦內傷脾胃則胃腕之陽不能以升舉乎及心肺之氣陷入中焦而用補中益氣之劑治之此亦前人之所無也然天不足於西北地不滿於東南天陽也地陰也西北之人陽氣易於降東南之人陰火易於升苟不知此而徒守其法則氣之降者固可愈而於

其升者亦從而用之吾恐反增其病矣乃以三家之論去其短而用其長又復參之以太極之理易禮記通書正蒙諸書之義貫穿內經之言以尋其指歸而謂內經之言火蓋與太極動而生陽五性感動之說有合其言陰道虛則又與禮記之養陰意同因作相火及陽有餘陰不足二論以發揮之其論相火有曰陽動而變陰靜而合而生水火木金土然火有二焉曰君火曰相火君火者人火也相火者天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形質相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守

一卷七

三

以指爲元氣之賊又謂火與元氣不兩立一勝則一負然則如之何而可使之無勝負乎曰周子曰神發知矣五性感動而萬事出五者之性爲物所感不能不動謂之動者即內經五火也相火易動五性厥陽之火又從而扇之則妄動矣火既妄動則煎熬真陰陰虛則病陰絕則死君火之氣經以暑與熱言之而相火之氣則以火言蓋表其暴悍酷烈有甚於君火也故曰相火元氣之賊周子曰聖人定之以中正仁義而主靜朱子亦曰必使道心常爲之主而人心每聽命焉此善處乎火者也人心聽命於道心而又能主之以靜彼五火將寂然不動而相火者惟有扶助造化而爲生生不息之運用爾夫何元氣之賊哉或曰內經相火注言少陰少陽矣未嘗言及厥陰太陽而吾子言之何也曰足太陽少陰東垣嘗言之治以炒栢取其味辛能瀉水中之火戴人亦言膽與三焦肝與胞絡皆從火治此歷指龍雷之火也余以天人之火皆生於地如上文所云者實廣二公之意耳或曰內經言火者非一徃徃於六氣中見之而言臟腑者未之有也二公豈他有所據邪曰經以百病皆生於風寒暑濕燥火之動而爲變者岐伯歷指病機一

一卷七

四

十九條而屬火者五此非相火爲病之出於臟腑者乎考之內經諸熱皆應則屬之火諸狂躁越則屬之火諸病肘腫痛酸驚駭則屬之火又原病式曰諸風掉眩屬於肝火之動也諸氣膈鬱病痿屬於肺火之升也諸濕腫滿屬於脾火之勝也諸痛痒瘡瘍屬於心火之用也是皆火之爲病出於臟腑者然也噫以陳無擇之通達猶以暖識論君火日用之火論相火是宜後人之龍章哉其論陽有餘陰不足有曰人受天地之氣以生天之陽氣爲氣地之陰氣爲血然氣常有餘而血常不足何爲其然也天大也爲陽而運於地之外地居天之中爲陰而天之大氣舉之日實也屬陽而運於月之外月缺也屬陰而稟日之光以爲明者也則是地之陰已不勝夫天之陽月之陰亦不敵於日之陽天地日月尚然而況於人乎故人之生男子十六歲而精通女子十四歲而經行是有形之後猶有待於乳哺水穀之養而後陰可與陽配成乎人而爲人之父母古人必近三十二而後嫁娶者可見陰氣之難於成而古人之善於保養也錢仲陽於腎有補而無瀉其知此意者乎又按禮記注曰人惟五十然後養陰者有以加內經年至四十陰氣

自半而起居衰矣男子六十四歲而精絕女子四十九歲而經斷夫以陰氣之成止爲三十年之運用而竟已先虧可不知所保養也經曰陽者天也主外陰者地也主內故陽道實陰道虛斯言豈欺我哉或曰遠取諸天地日月近取諸男子之身曰有餘曰不足吾已知之矣人在氣交之中今欲順陰陽之理而爲攝養之法如之何則可曰主閉藏者腎也司竅泄者肝也二藏皆有相火而其系上屬於心必君火也爲物所感則易於動心動則相火翕然而隨聖賢教人收心養心其旨深矣天地以五行更迭衰旺而成四時人之五臟六腑亦應之而衰旺四月屬巳五月屬午爲火火旺火爲肺金之夫火旺則金衰六月屬未爲土大旺土爲水之夫土旺則水衰况腎水嘗藉肺金爲母以補助其不足古人於夏月必獨宿而淡味兢兢業業保養金水二藏正嫌火土之旺爾內經又曰冬藏精者春不病溫十月屬亥十一月屬子正大氣潛伏閉藏以養其本然之真而爲來春升動發生之本若於此時不恣欲以自戕至春升之際根本壯實氣不輕浮尚何病之可言哉於是翁之醫蓋聞四方以病來迎者遂輻湊於道翁咸往赴之其所治病

凡幾病之狀何如施何良方飲何藥而愈自前至今
驗者何人何縣里主名得諸見聞班班可紀浦江鄭
義士病滯下一夕忽昏仆目上視洩注而汗瀉翁診
之脉大無倫即告曰此陰虛陽暴絕也蓋得之病後
酒且內然吾能愈之急命治人參膏而且促灸其氣
海頃之手動又頃而唇動及參膏成三飲之甦矣其
後服參膏盡數斤病已天台周進士病惡寒雖暑亦
必以綿蒙其首服附子數百增劇翁診之脉滑而數
即告曰此熱甚而反寒也乃以辛涼之劑吐痰一升
許而蒙首之綿減半仍用防風通聖飲之愈周固喜
醫史 卷七 十一
甚翁曰病愈後須淡食以養胃內觀以養神則水可
生火可降否則附毒必發殆不可救彼不能然後告
疽發背死浙省平章南征閩粵還病反胃醫以爲可
治翁診其脉告曰公之病不可言也即出獨告其左
右曰此病得之驚後而使內火木之邪相挾氣傷液
亡腸胃枯損食雖入而不化食既不化五臟皆無所
稟去此十日死果如言鄭義士家一少年秋初病熱
胃渴而妄語兩額火赤醫作大熱治翁診之脉弱而
緊告曰此作勞後病溫惟當服補劑自已今六脉皆
搏手必涼藥所致竟以附子湯啜之應手而瘥浙東

憲幕傅氏子病妄語時若有所見其家妖之翁切其
脉告曰此病痰也然脉虛弦而沉數蓋得之當暑飲
水又大驚傳曰然嘗夏因勞而甚渴恣飲梅水一二
碗又連得驚數次遂病翁以治痰補虛之劑處之旬
日愈單人陳時叔病脹腹如斗醫用利藥轉如翁診
之脉數而瀉告曰此得之嗜酒嗜酒則血傷血傷則
脾土之陰亦傷胃雖受穀不能以轉輸故陽升陰降
而否矣陳曰某以嗜酒前後洩見血者有年翁用補
血之劑投之驗權貴人以微疾來召見翁至坐堂中
自如翁診其脉不與言而出使詰之則曰公病在死
法中不出三月且入鬼錄顧猶有驕氣邪後果如期
死一老人病目無見使來求治翁診其脉微甚爲製
人參膏飲之目明如常時後數日翁復至忽見一醫
在庭煉礞石問之則已服之矣翁愕曰此病得之氣
太虛今不救其虛而反用礞石不出此夜必死至夜
參半氣奄奄不相屬而死一男子病小便不通醫治
以利藥益甚翁診之右寸頗弦滑曰此積痰病也積
痰在肺肺爲上焦而膀胱爲下焦上焦閉則下焦塞
譬如滴水之器必上竅通而後下竅之水出焉乃以
法大吐之吐已病如失一婦人病不知人稍蘇即號

叫數四而復昏翁診之肝脉弦數而且滑曰此怒心
所爲蓋得之怒而強酒也詰之則不得於夫每遇夜
引滿自酌解其懷翁治以流痰降火之劑而加香附
以散肝分之鬱立愈一女子病不食面比敗者且半
載醫告術窮翁診之肝脉弦出左口曰此思男子不
得氣結於脾故耳叩之則許嫁夫之廣且五年翁謂
其父曰是病惟怒可解蓋怒之氣擊而屬木故能衝
其土之結今第觸之使怒耳父以爲不然翁入而掌
其面者三責以不當有外思女子號泣大怒怒已進
食翁復潛謂其父曰怒氣雖解然必得喜則庶不再
結乃詐以夫有書旦夕且歸後三月夫果歸而病不
作一婦人產後有物不上如衣裾醫不能喻翁曰此
子宮也氣血虛故隨子而下即與黃芪當歸之劑而
加升麻舉之仍用皮工之法以五倍子作湯洗濯皺
其皮少選子宮上翁慰之曰三年後可再生兒無憂
也如之一貧婦寡居病癩翁見之惻然乃曰是疾世
號難治者不守禁忌耳是婦貧而無厚味寡而無欲
庶幾可療也即自具藥療之病愈後復投四物湯數
百遂不發動翁之爲醫皆此類也蓋其遇病施治不
膠於古方而所療皆中然於諸家方論則靡所不通

他人斬斬守古翁則操縱取舍而卒與古合一時學
者咸聲隨影附翁教之輩忘疲一日門人趙良仁
問太極之旨翁以陰陽造化之精微與醫道相出入
者論之且曰吾於諸生中未嘗論至於此今以吾子
所問故偶及之是蓋以道相告非徒以醫言也趙出
語人曰翁之醫其殆素驚於此乎羅成之自金陵來
見自以爲精仲景學翁曰仲景之書收拾於殘篇斷
簡之餘然其間或文有不備或意有未盡或編次之
脫落或義例之乖舛吾每觀之不能以無疑因畧摘
疑義數條以示羅尚未悟及遇治一疾翁以陰虛發
熱而用益陰補血之劑療之不三日而愈羅乃歎曰
以某之所見未免作傷寒治今翁治此猶以子歸之
性辛溫而非陰虛者所宜服又况汗下之誤乎翁春
秋既高乃徇張翼等所請而著格致餘論局方發揮
傷寒辨疑本草衍義補遺外科精要新論諸書學者
多誦習而取則焉翁簡傲貞良剛嚴介特執心以正
立身以誠而孝友之行實本乎天質奉時祀也訂其
禮文而敬蒞之事母夫人也時其節宣以忠養之寧
歎於已而必致豐於兄弟寧薄於已子而必施厚於
兄弟之子非其友不友非其道不道好論古今得失

慨然有天下之憂世之名公卿多折節下之翁為直陳治道無所顧忌然但語及榮利事則拂衣而起與人交一以三綱五紀為去就嘗曰天下有道則行有技葉天下無道則辭有枝葉夫行本也辭從而生者也苟見枝葉之辭去本而末是務輒怒溢顏面若將晚焉翁之卓卓如是則醫又特一事而已然翁講學行事之大方已具吾友宋太史瀛所為翁墓誌故不錄而竊錄其醫之可傳者為翁傳庶使後之君子得以互考焉

醫史

卷四

十一

非正之問則依著龜為陳其利害與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠史稱其風聲氣節足以激貪而厲俗翁在發得道學之源委而混迹於醫或以醫來見者未嘗不以葆精神開其心至於一語一默一出處凡有關於倫理者尤諄諄訓誨使人奮迅感慨激厲之不暇左丘明有云仁人之言其利博哉信矣若翁者殆古所謂直諒多聞之益友又可以醫師少之哉

九靈山人戴良為丹溪翁作傳紀載詳悉固

無遺憾矣而潛溪宋先生為翁作墓表則曰

先生之學一以躬行為本以一心同天地之大以耳目為禮樂之原積養之久內外一致夜寐即平晝之為暗室即康衢之見汲汲孜孜老而彌篤斯數言者可以補傳之未備故錄之

王履補傳

李瀛

王履字安道崑山人學醫於丹溪朱彥修盡得其傳嘗謂張仲景傷寒為諸家祖後世雖多立論率不出其藩籬且素問云天傷於寒為病熱言常而不言變

醫史

卷四

十一

仲景推寒熱之故履乃備常與變作傷寒立法考又謂諸病陽明篇無目痛少陽篇言胃脇滿而不言痛太陰篇無噎乾厥陰篇無囊縮凡此必有脫簡乃以三百九十七法去其重複者僅二百三十八條乃合作傷寒三百九十七法極論內外傷經旨異同并中風中暑辨議名曰源流集一卷標題原病式一卷百病鈎玄二十卷醫韻統一百卷履愈志苦學博搜群書為文若詩皆精詣有法畫師夏圭行筆秀勁布置茂密評者謂作家士氣咸備云履元季嘗遊華山作四十餘圖書紀遊詩于其上今江南好事家藏之

嵩渚子曰余讀王安道源洄集三十一篇未嘗不深歎其察理之精云首篇謂神農嘗百草為淮南子之妄嗣論四氣所傷五鬱三陽病中暑中熱之辨咸有至理非苟作者近時王文恪公整有曰始余讀源洄集知安道之深於醫不知其能詩也及脩蘇州志知其能詩又工於文與畫也嗚呼畫未技耳詩文姑舍是余於安道之醫深有取焉爾

戴原禮補傳

李瀛

戴惠恭字原禮以字行婺州浦江人也家世儒業究心醫術而志在澤物少隨父疋徒步至烏傷從朱丹溪先生游先生見其穎悟絕倫乃盡授其術原禮以之治療諸病達達奇驗其從叔仲章六月患大熱面赤口謔語膚發紅斑它醫投以大承氣湯而熱愈極原禮診之曰左右手脉皆浮虛而無力非真熱也張子和云當解表而勿攻裏此證似之法當汗遂用附子乾薑入參白朮為劑烹液以飲之大汗而愈方氏子婦瘡後多汗呼腰人易衣不至怒形于色遂密厥若死狀灌以蘇合香圓而活自是聞人足音及雞大聲輒厥逆如初原禮曰脉虛甚重則散是謂汗多

亡陽乃以黃芪人參日補之其驚漸減至決旬而安松江諸仲文盛夏畏寒身常御重纊食飲必令極熱始下咽微溫則嘔它醫授以胡椒煮伏雌之法日啖雞者三病愈亟原禮曰脉數而大且不弱劉守真云火極似水此之謂也椒發陰經之火雖能助痰祇益其病爾乃以大承氣湯下之晝夜行二十餘度頓減續之半復以黃連導痰湯加竹瀝飲之竟瘳姑蘇朱子明之婦病長號數十聲暫止復如前人以為厲所憑莫能療原禮曰此鬱病也痰閉于上火鬱于下故長號則氣少舒經云火鬱則發之是已遂用重刺涌之吐痰如膠者數升乃復初樂原忠妻亦蘇人因免乳後病驚身翻翻然如升浮雲之上舉目則室廬旋運持身弗定它醫飲以補虛治驚皆不驗原禮曰左脉扎且溢神色不動是因驚致心包絡積汚血爾法宜下之下積血如漆者一斗即愈留守衛吏陸仲容之婦病熱時見神鬼手足瞋動它醫用黃連清心湯不中原禮視之曰形瘦而色不澤乃虛熱耳法當用東垣甘溫除大熱之法為治即經所謂損者溫之也服人參黃芪而安它若此者甚眾當時游川溪之門者弟子頗多惟原禮父子最得其傳父蚤卒原禮盛

行于浙之東西晚年遭際 聖明以名醫被徵為御
醫精官至太醫院使宋學士景瀛有文贈之亟稱其
醫術之妙非一時諸人可及平生著述不多見僅有
訂正丹溪先生金匱鈎玄三卷間以已意附著其後
又有證治要訣證治類方類證用藥總若干卷皆隸
括丹溪之書而為之君子以為無愧師門云

嵩渚子曰學貴淵源道須傳授是故師心自是者術
必疎宗非其人者業斯謬矧醫之為道也以人命死
生為寄而可以苟簡草率為哉原禮之學得諸朱震
亨彥脩而彥脩之學得諸武林羅大無羅大無得諸

醫史

卷七

七

荆山浮圖氏而浮圖氏則劉河間守真之門人也守
真之學實得之於內經寥寥千百年而錢仲陽氏首
發其秘金元之劉張李三子益闡其說丹溪崛起大
江之南又統會而斟酌之原禮乃其高第弟子也篤
志精思百發百中是故聲聞四馳大顯其術于

本朝衰狀為名醫稱首余竊惜其著述鮮少恐無聞
于後世輒採摭遺事以為傳俾方來有攷焉

太醫院使戴公墓誌銘

附錄

王汝王

永樂乙酉冬十一月二十一日奉政大夫太醫院使
戴公卒於浦江故第其孫紹以丙戌年十二月十七

日卜其鄉獨秀山之岡奉襄事焉持前春官大宗伯
鄭公沂狀不遠千里來京師謁余請曰近世以來大
夫之沒咸得乞銘於文章君子述其潛德善行鐫之
貞石或揭諸墓阡或瘞諸幽宅以貽永久先祖考不
幸大故而封塋之石未有其辭不肖之愆何以自遣
願先生哀而銘之余辭不獲乃按狀叙次為銘公諱
思恭出唐平南節度使銀青光祿大夫檢校太子尚
書令諱昭後至公歷廿有一世曾祖諱濤祖諱暄父
諱森皆隱居不仕素以詩禮相承稱浦江望族公資
篤敏讀書必求聖賢微言奧義為文若詩不尚浮藻

醫史

卷七

七

務底有用於時暇日於星象堪輿風鑑之術靡不旁
推曲究尤精心軒岐書烏傷之丹溪朱彥脩氏得許
文懿公道學正傳學醫于武林羅大無盡得其秘公
先府君蚤從之游繼遣公往執弟子禮受業其間丹
溪一見奇之悉語公瀛洛授受之懿及醫學諸家要
旨故以醫道鳴浙東西洪武丙寅三月 皇上龍
潛北京嘗患瘕聚遣使 召公治療刻日奏功 晉
王遘末疾亦迎致公隨獲愈驗厥後 晉府訃聞
高皇帝怒王國臣僚乘遠赴京時公侍左右從容進
曰昔者臣嘗受知於王飲臣之藥數矣然竊慮其常

梁之毒復作也今乃果然 上於是釋然諸臣咸
得不坐壬申七月 高皇帝徵公入朝將屬領太
醫院事公以老病辭授階迪功郎職御醫值風雨免
朝戊寅夏五月 高皇帝大漸公同列進藥不稱
者皆麗于辟獨指公謂侍臣曰戴元禮仁義人也慎
毋恐名卿鉅儒播之篇翰充牣卷帙 皇上正天
位超陞今官既就職以耄不任事為請至數四乃許
之仍賜 誥命致仕歸田里甲申冬十月復命使者
乘輅召公伏枕不起乙酉夏四月以安車入因公衰
病免行拜禮優賤官舍惟 特召乃進見是冬十月
復請乞骸骨 勅十五日吉治行俾禮部選官護送
瀕行諭公曰朕復召汝汝其來也公既抵家出賜金
脩祀事遍召親故宴飲為樂置穀羞拜丹溪墓載酒
造邑中從所知叙平生歡用昭 恩賜之隆甫旬餘
疾作公自知不治將易簀召諸子姓訓之積善守法
且告以不能補報 聖恩為身後愧言已而逝享
年八十有二卒之明年春二月 勅命行人翁綬諭
祭于家 御製祭文褒獎至備具載 國史公歷事
兩朝藥餌所施奇効不可殫述金繒楮幣上尊珍饈
駢蕃之賜殆無虛月公平生誠慎寅畏未嘗少有過

差是以遭逢眷知終始一致蓋公之學出於丹溪丹
溪之學源深而本固非近世醫家者流所可比擬得
其書讀之爰自易水張氏河間劉氏東垣李氏曠百
載沂而上焉極於素問靈樞推天人交合之理辯陰
陽偏勝之氣其識卓以明其說詳以密以故起死回
生動若神助一洗拘方泥法之陋誠儒者格物致知
之學也公以所得於丹溪者觸而伸之類而長之研
精覃思明體適用宜其遇病施治若矢發機必中正
鵠彼不善為射徒袖手操弓莫知攸措焉公今已矣
後之人能知丹溪之學者皆公有以倡啓之也公娶
諸暨楊氏生子二曰儒曰儼皆先公卒孫男四其請
銘者長孫也銘曰
二氣流轉天清地寧人於其間稟茲粹精苟或滯焉
災疾以成學養千載彼昏孰醒匪有先覺疇探其情
金元之際群賢迭興貫通三才窮玄洞冥後丹溪氏
遺緒是承載闡微言大宏厥聲公遊其門擢華寒英
皇皇聖世以賢自鳴際遇 兩朝玉膺寵榮公雖已
矣不死猶生垂範後學識是夷行濟危扶殆有則有
程獨山之原闢是泉宿過者必式視此刻
醫史卷之七

醫史卷之八

樓寧生傳

浚儀李廉輯

國朝朱右

樓寧生出滑伯後名壽字伯仁世為許襄城大家元初祖父官江南自許徙儀真而壽生焉性警敏習儒書於韓說先生日記千餘言操筆為文辭有思致尤長於樂府京口王居中客醫儀真治方脉術有時名壽數往叩之居中曰醫祖黃帝岐伯其言佚不傳世傳者惟素問難經子其習之乎壽遂受之既終卷乃

卷八

一

進請其師曰素問為說備矣篇次無緒錯簡不無愚將分藏象經度脉候病能攝生論治色診鍼刺陰陽標本運氣彙萃凡十二類鈔而讀之難經又本素問靈樞之旨設難釋義其間榮衛部位藏府脉法與夫經絡腧穴辨之博矣而闕誤或多愚將本其旨義註而讀之何如居中曰甚矣子之善學也善哉子學之得其道也子守師說者子識卓理融契悞前訓子過我矣他日以醫名世其子也邪自是壽學日進益參考張仲景劉守真李明之三家而大同之據其所得授之所向莫不中肯綮既又傳鍼法於東平高洞陽

得其開闢流注方圓補瀉之道又究夫十二經走會屬絡流輸交別之要至若陰陽維繫衝帶六脉雖皆有繫屬而惟督任二經則苞乎腹背而有專穴諸經滿而溢者此則受之宜與十二經並論乃取內經骨空諸論及靈樞本輸篇所述經脉著十四經發揮三卷疏其本旨釋其名義通考隧穴六百四十有七而施治功以盡醫之神秘他如讀傷寒論鈔診家樞要痺痿篇及聚諸書本草為醫韻皆有功後學故其行有治驗所至人爭延致以得樓寧生診視一決生死為無憾生無間貧富皆往治報不報弗較也遂知名

醫史

卷八

一

吳楚間在淮南曰滑壽在吳曰伯仁氏在鄞越曰樓寧生云生年七十餘顏容如童行步輕捷飲酒無筭人有請雖祁寒暑雨弗憚世多德之其治法往往奇中人間能言之故記者頗多其徒日采表著者成編以傳其在儀真御史中丞八臣亦家焉其內人病艱於小溲中滿喘渴門僧寶頌知醫授以瞿麥梔茶諸滑利藥而闕益甚召壽候其脉三部皆弦而滿壽曰經云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣所謂水出高原者也臆中之氣不化則水液不行病因於氣徒行水無益也法當治上焦乃製朱雀湯倍以

枳桔煎用長流水一飲而溲再飲氣平數服病已端
君寶母六十餘亦病小溲澀若淋狀小腹脹口吻渴
邀壽診其脉沉且澀曰此病在下焦血分陰火盛而
水不足法當治血血與水同血有形而氣無形有形
之疾當以有形法治之即以東垣家滋腎丸服之而
瘡三寶廉使仲子之妻泰不花尚書妹也病滯下晝
夜五七十起後重下追且娠九月衆醫率爲清暑散
滯痛苦尤甚壽至診視曰須下去滯衆以娠不肯壽
曰素問有云有故無損亦無損也動即正產乃以消
滯導氣丸藥進之得順利再進滯去繼以清暑利溲
苦堅之劑病瘳而孕果不動足月乃產童氏婦年三
十每經水將來三五日前臍下疔痛如刀刺狀寒熱
交作下如黑豆汁既而經行因之無娠招壽診視之
兩尺脉沉澀欲絕餘部皆弦急曰此由下焦寒濕邪
氣搏於衝任衝爲血海任主胞胎爲婦人血室故經
事將來邪與血爭作疔痛寒氣生濁下如豆汁宜治
下焦遂以辛散苦溫理血藥爲劑令先經期十日服
之凡三次而邪去經調是年有孕丘仲山女纔八歲
病傷食煎燂內悶口乾唇舌燥黑腹痛不可忍或
以剛燥丸藥利之而痛益甚壽遂以牽牛大黃清

快藥爲丸以伏其燥利而瘳天寧寺僧病發狂譫妄
視人皆爲鬼壽診其脉壅滯如蔥子且喘且搏曰
此得之陽明胃實素問云陽明主肉其經血氣並盛
甚則棄衣升高踰垣妄罵壽以三化湯三四下復進以
火劑乃脫然如故馬萬戶妻體肥而氣盛自以無子
嘗多服煖子宮藥積久火甚迫血上行爲衄必數
升餘面赤脉躁疾神恍惚如癡醫者猶以治上盛下
虛丹劑鎮墜之壽曰經云上者下之今血氣俱盛溢
而上行法當下導赤荷實實邪即與桃仁承氣湯三
四下積瘀既去繼服既濟湯二十劑而瘳揚子縣吏
陳某當臘月鼻衄至正月凡十三日始定其脉實而
數治法與前證同蓋馬婦過服剛劑陳過食煎炙飲
醇酒皆積熱所致也鄧千戶二婢子七八月間同患
滯下壽至診視一婢脉鼓急大熱喘悶曰此必死一
婢脉洪大而虛軟微熱而小便利曰此可治即下之
已而調以苦溫苦堅之劑果一死一瘳張佛兒暑月
患中滿泄瀉小便赤四肢疲困不欲舉自汗微熱口
渴且素羸瘠衆醫以虛勞將峻補之邀壽至診視六
脉虛微曰此東垣所謂夏月中暑飲食勞倦法宜服
清暑益氣湯投三劑而病如失記其在儀真時所治

若是什無一二焉至正間趙璉守杭州以同里知壽
且邀之與俱過嘉興汪澤民病怔忡善忘口澹舌燥
多汗四肢疲軟發熱小便白而濁衆醫以內傷不足
擬進茸附趙彥博爭之未決固招伯仁至視其脉虛
大而數曰是由思慮過度厥陽之火爲患耳夫君火
以名相火以位相火代君火行事者也相火一擾能
爲百病况厥陽乎百端之起皆自心生越人云憂愁
思慮則傷心汪君平生志大心高所謀不遂抑鬱積
久致內傷也然抱新救火望安奚能遂命服東垣補
中益氣湯朱砂安神丸空心則進小坎離丸月餘彥
博抵書云汪之疾瘳矣尹安卿妻妊五月病咳痰氣
逆惡寒咽膈不利不嗜食者浹旬招伯仁診視其脉
浮弦形體清羸伯仁曰此上受風寒也越人云形寒
飲冷則傷肺投以辛溫劑與之致津液開腠理散風
寒而嗽自安矣既之錢唐館郡守第時出治病即喻
屬縣有不能治之證皆來就伯仁臨安沈君彰者病
自汗如雨不少止面赤身熱口燥心煩與來杭城會
客樓盛暑中帷幙周密自云至虛亡陽服木附藥已
數劑伯仁診其脉虛而洪數視其舌上胎黃曰前藥
誤矣輕病重治醫者死之素問云必先歲氣無伐天

和木附之熱其可輕用以犯時令邪又云脉虛身熱
得之傷暑暑家太多汗加以剛劑脉洪數則汗益甚
悉令撤幙開窓初亦難之少頃漸覺清爽爲製黃連
人參白虎等湯三進而汗止大半諸證亦稍解既而
兼以既濟湯渴則用水水調天水散服七日而病悉
去後遍身發癢疹更服防風通聖散乃已其同縣陳
元善病氣發則臍下築築漸上至心下嘔涌痛滿手
足青喉中淫淫而痒眉本痛疼目不欲視頭不欲舉
神昏昏欲睡而不寐惡食氣壅九控引小便數而欠
年未三十廼瘡若瘰癧人後防不自持伯仁視其脉
沉弦而濡曰是得之憂鬱憤怒寒濕風雨乘之爲肝
疝也屬在厥陰故當脉所過處皆病焉厥陰肝也張
從正云諸疝皆屬肝素問云肝欲散亟以辛散之遂
取吳茱萸佐以薑桂及治氣引經藥煎製茵陳等丸
每十日一溫利之三月而病瘳俞彥良亦臨安人病
嘔血或滿痞或盈盆蓋且二三年其人平昔嗜市利
不憚作勞中氣因之侵損伯仁視之且先與八寶散
一二日服黃芩芍藥湯少有動作急即進犀角地黃
湯加桃仁大黃稍間服抑氣寧神散有痰用礞石丸
其始脉洪大後脉漸平三月而瘳彥良遂以此法治

它人皆驗宋可與姜晷身冷自汗口乾煩燥欲臥泥水中伯仁診其脉浮而數沉之豁然虛散曰素問云脉至而從按之不鼓諸陽皆然此爲陰盛陽陽得之飲食生冷坐臥風露前真武湯冷飲之一進汗止再進煩燥去三進平復如初抗妓有患心疾狂歌痛哭裸裎妄罵問之則瞪視默默其父母固邀伯仁診視脉沉堅而結曰得之憂憤沉鬱食與痰交積胃中滯之皆積痰暴血復與痰劑清土隔數日如故既而左丞楊完者統苗兵守江浙民頗不安居會故舊陳性中王叔雨招召粵家渡浙江往來鄞越居虞姚間最久人皆稱之曰櫻寧生初叔雨寓錢唐病傷寒他醫至皆以爲瘥證當進附子持論未決其弟熙陽謁櫻寧生曰舍兄病亟惟幾生忍坐視不抹乎至切其脉兩手俱沉實而滑四末覺微青以燈燭之徧體皆赤斑舌上胎黑而燥如芒刺身大熱神恍惚多譫妄語櫻寧生曰此始以表不得解邪氣入裏裏熱極甚若投附必死乃以小柴胡劑益以知母石膏飲之終夕三進次日以大承氣湯下之調治旬乃安比來上虞熙陽謁于魏氏一日乘盛暑肩輿入邑塗中吐血數口亟還則吐甚背拒痛體熱頭眩病且殆或以

爲勞心焦思所致與茯苓補心湯生至診其脉洪而滑曰是大醉飽胃血壅遏爲暑迫上行先與犀角地黃湯繼以桃仁承氣湯去瘀血宿積後治暑即安陸用和病惡寒發熱頭體微痛苦嘔下泄五日矣其親亦知醫以小柴胡湯治之不解招櫻寧生診視脉弦而遲曰是在陰當溫之爲製真武湯其親爭之強與人參竹葉湯進即泄甚脉且陷弱始亟以前劑服之連進四五劑乃效入始服櫻寧生之賢於人遠矣余子元病惡寒戰慄持捉不定兩手背冷汗浸淫鉅厚衣熾火不能解櫻寧生即與真武湯凡用附六枚一日病者忽出人恠之病者曰吾不惡寒即無事矣或以問櫻寧生曰其脉兩手皆沉微餘無表裏證此蓋體虛受寒亡陽之極也初皮表氣隱爲寒邪壅遏陽不得伸而然也是故血隱熱壅須用硝黃氣隱寒壅須用桂附陰陽之用不同者無形有形之異也魏士圭妻徐病寒爲疝自臍下上至心背脹滿攻痛而脇痛尤甚嘔吐煩懣不進飲食櫻寧生視之脉兩手沉結不調曰此由寒在下焦宜亟攻其下無攻其上爲灸章門氣海中脘服玄胡桂枝佐以藥水諸香茯苓青皮等十日一服溫利九藥聚而散之也士圭守

其法治之果效王宗祥之父年老病臍腹疔痛其里醫爲溫中散寒卒無驗宗祥因邀櫻寧生往視脉兩尺搏堅而沉曰此大寒由外入也寒喜中下因爲疔治宜在下加沉降之劑引入下焦數服尋瘡陳伯英病肺氣焦滿櫻寧生視之曰病得之多欲善飲且殫營慮中積痰涎外受風邪發即喘渴痰咳不能自安爲製清肺泄滿降火潤燥苦辛等劑服之既安衆詰之曰是出何方書名何散飲生應之曰是爲混沌湯聞者皆大笑曰混沌湯有用也潘子庸得感冒證已汗而愈數日復大發熱惡寒頭痛眩暈嘔吐卻食煩滿欬而多汗櫻寧生診之脉兩手三部皆浮而緊曰在仲景法勞復證浮以汗解沉以下解今脉浮緊且證在表當汗衆以虛僊難之且圖溫補生曰法當如是爲作麻黃葛根湯三進更汗旋調數日乃瘳時淮南丞相方公分省四明聞櫻寧生名禮致見之館穀留城中一日公壻戴穎仲以使事往奉化雪中且進冷食病內外傷惡寒頭疼腹心痛而嘔診之脉沉且緊時伏而不見曰在法下利清穀當急救裏清便自調當急救表今所患內傷冷飲食外受寒冷清便自調救表以桂枝湯力微遂爲變法與四逆湯服之瘳

時服附子一兩明日則脉在肌肉惟緊自若外證已去內傷猶存乃以九藥下去宿食後調中氣數日即安方惟益患清渴衆醫以爲腎虛水竭津不能上升合附子大九服之既服渴甚舊有目疾兼作其人素豐肥因是頓瘦損倉皇中召櫻寧生視之生曰陰陽之道相爲損益水不足則濟以水火不足則濟以火未聞水不足而以火濟之不焦則枯乃令屏去前藥更寒劑下之湯去火毒繼以苦寒清潤之製竟月乃平復適方明禮寵姬新產受寒四肢逆冷脉沉弱亟令取向所製附子大九三四粒餌之立效生曰不得於彼而得於此蓋用有不同耳在彥材平居苦胃中痞滿憤懣若怔忡狀頭目昏痛欲吐不吐忽忽善忘時一臂偏痺召櫻寧生視之當關以上脉溜而滑按之沉而有力櫻寧生曰積飲滯痰橫於胃膈蓋得之厚味醇酒肥膩煎炙蓄熱而生濕濕聚而痰涎宿飲皆上甚也王冰云上甚不已吐而奪之法當吐候春日開明如法治之以物撿咽中須更大吐異色頑痰在膠飴者三四升一二日更吐之三四次則胃中洞爽平復矣龍君澤分院餘姚其室張暑月中病經事沉滯身熱自汗咳嗽有痰體瘦悻腹臍刺痛招櫻

軍生至診視脉弦數六至有餘生曰此二陽病也素問三二陽之病發心脾女子得之則不月二陽陽明也陽明爲金爲燥化今其所以不月者因其所遭也陽明本爲燥金適遭於暑暑火也以火爇金則愈燥矣血者水類金爲化源宜月事沉滯不來也他醫方爲製歸茸桂附丸以溫經而未進生曰夫血得寒則止得溫則行得熱則搏搏則燥復加燥劑血益乾則病必甚亟令卻之更以當歸柴胡飲子爲之清陽瀉火流濕潤燥三五進而經事通餘病悉除龍君曰微生幾爲人所誤矣宋無逸餘姚大儒也病瘡瘳損饘粥難下咽六十餘日殆甚櫻寧生聞而往視之脉數兩關上尤弦疾父體瘠而神完生曰是積熱居脾且滯於飲食法當下衆醫疑而難之藥再進而疾去其半後製甘露飲柴胡白虎等劑旬而起如故後四歲無逸客昌國病頭面腫赤妨於飲食或進以薑附櫻寧生爲製劑清上散火而瘡無逸曰嚮得清涼藥以濟危急否則誤於剛劑矣德之不忘嘗以語人云夏思慮病胃腸脹痛心怔忡嘔逆煩懣不食情思惛惛不暫安目眊眊無所睹櫻寧生視之六脉皆結澁不周無復參伍甚恠之既徐而察之其人機深憂思

大過加之脾胃內傷積爲痰涎鬱于膈上然也素問云思則氣結又云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷甚之謂乎爲製祛順丸服之旋復平和思忠曰吾疾諸治罔效始以爲天下無藥茲服生祛順丸乃知天下有藥矣金丙病韓自行邀櫻寧生往視之脉數而散體寒熱咳血痰生曰此二陽病也在法不治當以夏月死至立夏果死自行愀然曰櫻寧生能知死必能知人生矣乎方德明七月內病發熱或令其服小柴胡湯必二十大劑乃瘳如其言服之未盡三劑則升發太過多汗亡陽惡寒甚肉閏筋惕乃固請櫻寧生視脉微欲無即以真武湯進七八服稍有緒更服附子七八枚然後瘳夏子韶妻始病瘡常六七月他醫以爲脾寒胃弱父服桂附後瘳雖退而積火熾熾致消穀善飢日數十飯猶不足終日端坐如常人第目昏不能視足弱不能履腰膝困軟肌肉虛肥至初冬子韶謁櫻寧生往候脉洪大而虛濡曰此痿證也長夏過服熱藥所致蓋夏令濕當權剛劑太過火濕俱甚肺熱葉焦故兩足痿易而不爲用也東垣有長夏濕熱成痿之法當以此治之歲日益減目漸能視至冬末忽自起下榻行步如故其

姪夏仲儒因拘留赴海積恐怖心常惕惕如畏人捕之狀櫻寧生視之脉豁豁然大而浮體熱多汗曰凡病得之從高墜下驚仆擊搏留滯惡血皆從中風論終歸厥陰此海藏之說也蓋厥陰多血其化風木然也有形當從血論無形當從風論今仲儒之疾是走無形也從風家治之兼為化痰散結佐以鐵粉朱砂丸良瘡鄭高卿母倪病瘡寒熱嘔涌中滿而痛下利不食年五十餘殊困頓他醫為清脾氣理中脘不效邀櫻寧生視脉沉而遲生曰是積暑與食伏痰在中當下之或曰人疲倦若是且下痢不食烏可下方

寒其脉沉而遲朝食莫吐莫食朝吐小溲利大便秘為下焦吐也法當通其秘溫其寒氣復以中焦藥和之生得此說而喜起嘆曰其合於王母之證歟但王母大便不秘遂再往視專治下焦散寒以葉萸茴香為君丁桂半夏為佐服至二三十劑而飲食晏然生曰經不云乎寒淫所勝平以辛熱其是之謂歟俞德明嘗病寒經汗下病既去而人虛背獨惡寒脉微細如線湯耐不應櫻寧生乃以理中湯劑加薑桂藿附大作服外以草撥良薑吳檉桂椒諸品大辛熱為末和薑糊為膏厚傅滿背以紙覆之稍乾即易如是半月竟平復不寒矣此尤治法之變者也顧機仲病傷寒後勞復發熱自汗經七日或以為病後虛勞將復補之櫻寧生曰不然勞復為病脉浮以汗解奚補為以小柴胡湯三進再汗而瘳胡茂林子婦魏仲彬妹也新產二日惡露不行臍腹痛頭疼身寒熱當隆冬時眾醫皆以為感寒溫以薑附益大熱手足搐搦語謔目攢仲彬固邀生往診脉弦而洪數面赤目閉語喃喃不可辨舌黑如烙燥無津潤胃腹按之不勝手蓋燥劑搏激血內熱而風生血蓄而為痛也生曰此產後熱入血室因而生風即先為清熱降火治風

涼血兩服頗爽繼以琥珀牛黃等稍解人事後以張從正三和散行血破瘀三四服惡露天下如初時產已十日矣於是諸證悉平方明體內人盛暑病洞泄厥逆惡寒胃脘當心而痛自腹引脇轉爲滯下嘔噦不食人以中暑霍亂療之益劇搜寧生診其脉三部俱微短沉弱不應呼吸曰此陰寒極矣不亟溫之則無瘥理內經雖曰用熱遠熱又曰有假其氣則無禁也於是以前薑附溫劑三四進間以丹藥脉稍有力厥逆漸退更服薑附七日衆證悉去遂以九藥除其滯下而臟腑自安矣生之活人率類此然頗有不盡述

醫史 一 卷八 七

若生嘗語其徒曰予在儀真時聞友人王德全言江西有醫士曰黃子厚爲術精詣其治往往出入意表有富家子年十七八病徧體肌肉坼裂召子厚治子厚偕門生四五輩往診視各以所見陳論皆未當子厚乃屏人詰病者曰童幼時曾近女色犯天真乎曰當十三四曾近之已子厚曰得其說矣褚澄云精未通而御女則四體有不滿之虞後日有難狀之疾在法爲不可療後果惡汁淋瀝痛楚而死又鄰郡一富翁病泄瀉彌年禮致子厚診療決旬莫効子厚曰子未得其說求歸一日讀易至乾卦天行健朱子有曰

天之氣運轉不息故閣得地在中間如人弄碗珠只運動不住故在空中不墜少息則墜矣因悟向者富翁之病乃氣不能舉爲下脫也又作字持水滴吸水初以大指按滴上竅則水滿筒放其按則水下溜無餘乃豁然悟曰吾可治翁證矣即治裝往翁家醫喜至即爲治灸灸百會穴未三四十壯泄瀉止矣生自少識之後在鄞胡元望女生始六月亦病泄瀉不已因教以前灸即瘳子厚在至治天曆間術甚行虞文靖公嘗有贈醫士黃子厚詩云

史石曰予幼喜業醫遇醫士輒近之觀其治往往誤藥死若以試其術然子懼陰殺人而莫之罪必不運於天刑遂棄不復習襄城搜寧生壽能活人反掌間而奇驗若此時人爲之語曰世以人試術生以術活人其相去奚啻千萬子聞盧扁曰聞病之陽論得其陰聞病之陰論得其陽翁意曰吾以脉法治之而瘳生其有得於二子者歟

朱天台爲搜寧作傳可謂詳盡矣故史官東陽朱公廉謂後之爲醫者觀之警諸觀作室之巧而可推其規矩斧斤之法見破的之工而可原其發率審固之意按其書而擬其迹

庚辰有矣其知言哉

敕山老人傳

朱右

敕山老人者三吳名醫也姓倪氏名維德仲賢其字也敕山在胥門之西二十餘里盤紆鬱秀有巖壑弄竹之美老人之居里在焉老人宋和州防禦使昌嗣之後當前代盛時讀經史世其家業墳典立索而外若神僊方伎之書吐納導引能經鳥伸之術無不獵涉而於軒岐之學尤精到絕倫常自誦曰吾以通靈之姿窺靈籙之奧究火策之候啓玄命之秘以御風而遺世宜無難者而獨念夫大化之生人也以其有益於世也使其生而無益於世猶無生也然而功彰山河名登府常此則有命最而在下克施其惠者其惟醫道乎乃校訂金季東垣明之所著醫說凡若干卷表章以行於世復演靈樞素問運氣本草之說約為治目精要曰原機啓微等論示人以分門列證之法老人居敕山有草堂數間可以免震凌有松栢田數十畝可以備伏臘裕然不求于人遨遊湖山樂以自適嘗一適城市愛過從之相與而不去也人則從而質焉非其人亦不告也以故於老人他伎無知者而惟醫則老人以急濟為務獨著譽焉老人今年踰

七十矣而顏色如四五十歲人康強步踰精彩矍鑠言笑引接與少壯無異其所以自養者如此至其為人也廣博神速效績不可勝紀今姑據數事以傳之淮南周萬戶子始八歲忽得惡瘧疾數日方甦厥熱如木偶人寒暑饑飽皆不知節適率嘗食土炭至口不得出音老人視之曰此脾風也脾智意府也而以風故不知人事也宜投之疏風助脾之劑數服而愈同郡顧顯卿妻年五十餘患瘵始生如塊近三年如益一首痛楚不可忍群醫視之投藥且厭而卒不效老人曰是少陽經為邪氣所攻耳即劑以其藥服之逾月而愈是陵盛架閣內子左右肩背上下患瘰癧至兩臂頭面皆然屢以艾灼瘰癧漸止且復作如是數年老人切其脉曰左關浮盛右口沉實此酒食滋味所致也投以某劑其瘰癧遂止陳上林仲實以勞役得熱疾日出氣暄則熱夜及涼雨則否暄盛則熱增劇稍晦則熱如是者二年老人曰此七情內傷脾胃陰熾而陽鬱耳以東垣飲食勞倦法治之其熱旋已此其尤彰彰者若其他固不得悉附焉嗚呼賢哉越人倉公見錄於史遷至今望之若神人然老人之術足以繼之矣予生也後不得從事老人之教姑援述者

之次第而為文之其於老人之造詣如刻足之度
山蝦目之望洋未能得其萬一也

倪府君墓碣銘

附錄

宋濂

吳郡有名世之醫曰倪府君諱維德字仲賢其家
于汴梁曾大父曰嗣宋和州防禦使生秀文值宋錄
既訖乃挾醫術游大江之南遂擇郡之具縣居焉秀
文生見其能紹家學有聞於時則府君之父也府君
嗜學不厭受尚書於碧山湯公焚膏繼晷探索精微
發於辭章皆燦燦有奇氣湯公器其才勸之仕府君
曰爵祿乃資之以澤物者然有命焉不可以倖致焉

醫史

卷八

九

若紹承醫學以濟吾事乎於是取黃帝內經日研其
奧旨見其疏陳治法推究本原欣然曰醫之道盡在
是矣間有疑難質于父師之間心緒益開明煩病大
觀以來粗工多遵用裴宗元陳師文和劑局方故方
新病多不相值泰定中得金季劉完素張從正李杲
三家之書讀之知其與內經合自以所見不謬積
力久出而用藥往往如神奇證異疾一經診視有如
辨白黑無少爽者周萬戶子八歲患昏憤數日而醒
不識有饑飽暑寒欲語則不能出聲時以土炭自
其口府君切其脉曰此慢脾風證也脾藏智脾慢則

智不足其不知人事也宜投以某劑而瘳顧顧卿妻
六耳下生癭大與首同其疾不可忍更數士醫弗效
府君診已告于衆曰此手足少陽經受邪故也甚易
治耳製其藥令啖之逾月而愈劉子正內子病氣厥
或哭或笑人以爲鬼所附府君察其故且脉之謂劉
曰左右手脉俱沉胃腕中必有所積有所積必痰問
之果然以生熟水導之吐痰涎數升病遂除盛架閣
妻左右肩病癰蔓延至兩臂上及頰面不可禁或於
病處灼艾勢暫止已而如初府君曰右脉沉左脉浮
且盛此滋味傷厚之所致也投以某藥疾旋已林仲

醫史

卷八

十

實因勞發熱執隨日出入爲進退食飲漸減府君切
之曰此得之內傷故陽氣不升陰火漸熾溫則進涼
則退是其徵也投以治內傷之劑其疾如失府君治
難療之疾多類此文繁弗載府君每有言曰劉張二
氏治多攻李氏惟在調補中氣蓋隨世推移不得不
爾也於是府君之治疾既察天時地理又參之以人
事所以十不失一然攝心仁厚但來謁者即赴之不
知有富貧一旦有孺人抱疾求治府君既授藥兼昇
以膏藥之器客恠而問曰藥可常備充是亦素具乎
府君指室北隅示之其積者蓋百數云府君病眼科

雜出方論竟無全書著原機微苦千卷又校訂李
杲試效方若干卷錄梓傳世君子多之性尤嗜文籍
預置金於書肆有新刻者輒購入之積至五千餘卷
構重屋以藏晚年建別墅救山之下每乘扁舟具酒
般與二三賓客放浪於水光山色之間脩然高舉如
在世外因自號曰救山老人壽七十五卒於洪武十
年六月二十日其年七月二十一日葬於縣之至德
鄉上沙村兩重山之下娶章氏先府君而卒至是同
穴生一子曰衡通儒書亦以醫鳴于時三女曰淨真
曰媛真曰孝貞各適主族三孫男曰謹曰識曰讓二
孫女曰婉寧曰婉柔尚幼予嘗患內經之學晦而弗
章無豪傑之士以洗滌之浙河之東有朱君彥脩以
斯學爲已任而三家之說益明浙河之西則府君奮
然而起蓋與彥脩不約而同使沉疴方者逡巡退縮
不敢鼓吻相是非而生民免夭閼之患者二公之功
爲多彥脩之歿予已銘其墓今府君之子亦復慨
爲請予安得固辭邪因歷序其行事而銘之銘曰
醫者之學素問爲宗猶儒治經專門是攻寒暑溫涼
升降浮沉或逆或順制治最深隨時立方始與疾同
正氣既勝邪沴乃融粗工蚩蚩守一不移執中無權

罔契厥機群昏方酣苟不力扶寒暑夜行適填索塗
三家者興上窺本源如揭日月照耀天門伊誰承之
作世範模東則有朱西則有倪視彼沉痾目牛無全
肯綮既中萬理皆指幹連元化陶冶樞機人謂其功
與良相齊救山之陽一葉可航載翔載翔與世若忘
明鑑之失孰不歔歔視其故篋幸有遺書發而讀之
相繼繩繩何以徵之墓門有銘

醫史

卷八

朱

醫史卷之八

凌儀 李瀛 輯

滄洲翁傳

國朝戴良

滄洲翁者姓呂氏名復字元膺晚號滄洲翁其先河東人也東萊先生成公與其季忠公自河東徙移吏部郎知台州事諸賢之者復自婺徙鄭家焉大父克德父居敬比三世皆早喪翁幼孤且甚貧獨依母氏居既長從鄉先生受尚書周易父之棄去習詞賦後以母病復喜攻岐扁術而恨無其師一日遇三衢鄭禮之逆旅中即知為醫中毛遂也每語事之鄭亦見翁醇謹無他煩心愛翁因呼翁語曰我有古先禁方及色脉藥論諸書知人生死定可治其精我年老欲具以授公翁即避席受之書受讀可一年所輒試之有驗然尚未精也鄭復教翁日記診藉攷方藥驗否悉為參訂不使毫釐失理又若干年所積為人治診病效無不神自是鄭之病家及凡寓公過客以病留鄭者必歸翁翁皆樂應之浙省平章左蒼納失理在帥閣時病無睡則心悻悻如處孤壘而四面受敵兵連旦目眇眇無所見耳聾聾無所聞雖

堅臥密室未嘗交也即選醫之良者處劑累月弗瘳後召翁診翁切其脉左關之陽浮而虛察其色少陽之支外溢於目背即告之曰此得之膽虛而風諸公獨治其心而不祛其膽之風非法也因投禁方烏梅湯抱膽丸日再服遂熟睡比瘳病如脫郡人蘇伯友病旬決不止時天暑脉弱衆醫以氣虛不統血日進著歸甘附彌甚則告術窮家人皆容貌變更蘇亦流涕長清泣命其子強翁診翁至未食頃其所衄血已三覆器矣及切其脉兩手皆虛乳右上部滑浮數而躁且其鼻赤而色澤即告之曰此得之酒酒毒暴悍而風暑乘之熱蓄於上焦故血妄行而汗溢蘇曰某嘗饑走赤日已而醉酒向風以公診當是翁為製地黃汁三升許兼用防風湯半劑飲之立驗童芳仲幼女華病嗜臥頰赤而身不熱命小兒醫四三人療之皆以為慢驚風屢進攻風之劑旬不愈翁切其脉右關獨滑而數他部大小等而和因告童曰女無病關滑為有宿食意乳母致之乳母必嗜酒酒後輒乳故令女醉非風也及詰其內子李李白乳母近常酒庫餉苟竊飲必任意潛使人視臥內有數空罇榻下翼日拘其鑰飲以枳椇葛花日二三服女

起如常時童良輔子年十二患內癰腹脹臍凸而煩
銳醫欲刺臍出膿其母靳不許抱子獨泣童馳告翁
邀與俱及造臥內見一野僧擁爐熾炭燃銅筋一二
枚烈火中瞪目視翁曰此兒病癰發小腸苟舍刺臍
無他法翁喻之曰臍神關也鍼刺所當禁矧離會子
內惟當以湯丸攻之苟如若言必殺是子矣僧怒趨
而出翁投透膿散一七明日膿自氣合潰繼以十奇
湯下善應膏九旬浹瘕趙氏子病傷寒餘十日身熱
而人靜兩手脉盡伏但醫以為死也弗與藥翁診之
三部脈皆無其舌胎滑而兩額赤如火語言不亂
因告之曰此子必太發赤斑周身如錦文夫脉血之
波瀾也今血為邪熱所搏淖而為斑外見於皮膚呼
吸之氣無形可依猶溝隧之無水雖有風不能成波
瀾斑消則脉出矣及揭其衾而赤斑爛然即用白虎
加人參湯化其斑脉乃復常繼投承氣下之瘡發斑
無脉長沙所未論翁蓋以意消息耳普濟寺主僧體
無為病瘳已三日不知人翁切其脉右口之陽弦而
遲少陰之脉堅而勁不滿四十動而止此寒邪乘於
腎肝所致法當以辛甘復其陽為作湯三升頓服遂
起對客如不病然一截已絕去此若干日當復病病

即死果死如其日臨川蕭雲泉羽客也偶游鄞造翁
告曰某病兩目視物皆倒植屢謁名醫弗喻翁曰視
一物為二視直為曲古人嘗言之視物倒植誠所未
喻也願聞其因雲泉曰某嘗大醉盡吐所飲酒熟睡
達曙遂病翁切其脉左關浮促餘部皆無恙即告之
曰當傷酒大吐時上焦反覆致倒其膽腑故視物皆
倒植此不內外因而致內傷者也法當復吐以正其
膽腑遂授黎蘆瓜蒂俾平旦湧之湧畢視物不倒植
東皋寺僧述無作族姓孫氏一女子病厲風為夫所
出家貧不能就醫無作過翁約曰吾女姪病可念早
昇致就翁診顧備舍不宜能速為我治療乎翁曰語
他日匿患者於密室召翁診其脉翁曰脉來疾而去
遲上虛而下實蓋得之醉酒接內而風毒乘之入雖
髮禿眉隆狀鼻根幸未陷肌肉幸未死遂以防風通
聖而益以下藥下瘀血數升及虫穢青黑物并進漸
蛇長松等湯丸復佐以雄黃楓油作膏摩之逾月瘳
餘姚州守郭文煜病噦十餘日州之以醫名者畢至
悉以附子丁香等劑療之益甚翁切其脉陽明大而
長右口之陽數而躁因告之曰公之噦即古之咳逆
由胃熱而致或者失察而反助其熱誤矣飲以竹茹

湯未終劑噦止帥府經歷哈散侍人病喘不得臥老
醫製麻黃之劑以散其肺邪翁後至診之脉口盛人
迎一倍厥陰弦動而疾兩尺俱短而離經因告之曰
病蓋得之毒藥動血以致胎死不下奔迫而上衝非
風寒作喘也乃用催生湯倍芎歸煮二三升服之夜
半果下一死兒喘止哈散密囑曰病妾誠有懷以室
人見嫉故藥去之衆人所不知也老醫聞之慚而去
樞密董孟起在帥閫時命翁臨診俾審新故病翁切
其脉兩寸俱浮弦脉法浮為風弦為痛兩寸屬上部
即告之曰明公他無所苦首風乃故病也蓋得之沐
而中風當發先一日則劇劇則大吐而後已董笑曰
然余少時喜沐每迎風以晞髮因致頭作痛痛一如
公所言公善診幸余療也為製龍腦膏犀角四分二
之一遂愈帥府從事帖穆失爾病下痢完穀衆醫咸
謂洞泄寒中日服四逆理中輩彌劇翁診其脉兩尺
寸俱弦長右關浮於左關一倍其目外眦如草滋蓋
知肝風傳脾因成殘泄非藏寒所致飲以小續命湯
損麻黃加朮三五升痢止續命非止痢藥飲不終劑
而痢止者以從本治故也純孝廟祝楊天成女壽在
室病不月命婦入醫療之不得其名狀及五閏月其

腹如有姙求其色脉即因詰之曰汝病非有異夢
則鬼靈所憑耳女不答趨入臥內密語其侍嫗曰我
去夏追涼廟廡下薄暮過黃耒神心動是多夢一男
子如暮間所見者即我寢親狎由是感疾我慚報不
敢以告人醫言誠是也嫗以告翁翁曰女面色乍赤
乍白者鬼也脉乍大乍小者祟也病因與脉色符雖
劇無苦乃以桃仁煎下血類脉肝者六七枚俱有竅
如魚目病已延慶寺僧珂瑩中病翁診其脉獨右關
浮滑餘部皆無恙曰右關屬脾胃絡胃挾舌本蓋風中
廉泉得之醉臥當風而成瘡珂舞手索筆書凡上白
酒吾先佛所戒自視髮來未嘗飲露坐當風誠所不
免其師天紀在座即怒訶曰汝處別業時每飲輒醉
尚謫疾自誤邪翁取荆蘆化至寶丹飲之翼日遂解
語湖心寺僧履師者一日偶撥胸中疥忽自出血汨
汨如涌泉竟日不止瘍醫治療弗驗邀翁往視履時
已困極無氣可語及持其脉惟尺部如蛛絲他部皆
無即告之曰夫脉血氣之先也今血妄溢故氣暴
衰然兩尺尚可按惟當益營以瀉其陰火乃作四神
湯加荆穗防風不問晨夜併進明日脉漸出更服十
全大補一劑遂痊全本然病傷寒旬日邪入於陽明

俚醫以津液外出為脉虛自汗進玄武湯以實之遂致神昏如熟睡其家邀翁問死期翁切其脉皆伏不見而肌熱灼指即告其季曰此必榮血致斑而脉伏非陽病見陰脉比也見斑則應候否則蓄血爾乃去衾視其隱處及小腹果見赤斑臍下石堅且拒痛為作化斑湯半劑繼進韓氏生地黃湯遂其血是夕下黑矢若干枚即斑消脉出後三日又腹痛遂用桃核承氣以攻之所下復如前乃愈丙子主病傷寒乃陰隔陽面赤足蹇而下痢躁擾不得眠論者有主寒主溫之不一余不能決翁以紫雪置理中丸進徐冰清甘草乾薑湯飲之愈且告之曰下痢足蹇四逆證也苟用常法則上焦之熱彌甚今以紫雪折之徐引辛甘以溫裏此熱因寒用也聞者皆歎服集賢脩誤南宏遠奉旨往闕論士猾余蠻子余嘗戮人尊知之間以恐之遂驚氣入心疾作如心風比卿使命來鄞疾屢作逐逐奔走不避水與火與人語則自賢自貴且或泣或笑翁切其脉上部皆弦滑左倍勁於右蓋痰溢腫中灌心胞因驚而風經五臟耳即投以湧劑湧痰涎一類器徐以驚氣丸服之盡一劑病瘳郡吏虞東村丙子壬午感嗜酒且善食忽疾作肌肉頓消

骨立翁診其脉則兩手三部皆洪數而左口尤躁疾遂語虞曰此三陽病由一水不能勝五火乃移熱於小腸不癢則淋王曰前洩如脂者已數日語未竟趨入臥內凝及需其溺器以視則如鉶釜置烈火湧沸不少休翁以虎杖滑石石膏黃柏之劑清之痛稍却而湧沸猶爾也繼以龍腦辰砂末之劑以押柿食方匕沸輒止餘姚余慎言子孟仁病寓湖心僧舍以求治翁至其處而孟仁方飯坐定即搏爐中灰雜飯猛噬且喃喃詈人翁命左右按之其脉三部皆弦直上下行而左右尤浮滑蓋風痰留心胞證也法當湧其痰而凝其神既湧出痰沫四五升即熟睡竟日乃寤醫則病盡去徐以治神之劑調治之神宛如初御史王彥芳丙子病殮泄瀉年眾醫皆謂休息痢瘳以苦堅辛燥之劑弗效翁診其脉當秋半雙弦而浮即告之曰夫人之病蓋病驚風非飲食勞倦所致也以肝主驚故驚風自甚因乘脾而成泄當金氣正隆尚爾至明春則病將益加法當平木太過扶土之不及其泄自止夫人曰儂寓南閩時平章燕公以銅符密授御史俾出入自如吾兒開關玩弄久之遂失去平章一日追符甚急儂心懼焉由是疾作公指為驚

風信然乃用黃犢牛肝和以攻風健脾之劑服之踰月泄止郡守李孝文妻母龐病小腹脹醫皆以爲癥聚藥之浹月弗愈繼命翁診翁循其少陰脉如刀刃之切手胞門扎而數知其陰中痛癥結小腸也即告之曰太夫人病在幽隱不敢以聞幸出侍人密語之乃出老嫗翁曰患者苦小腸癰以故臍下如癥聚今臍已成腫迫於玉泉當不得前後洩洩則痛甚嫗拜曰公神人也所苦一如公所言遂用國老將軍爲向導挾麒麟竭虎魄之類以攻之臍目小便潰應手愈浙東運使曲出道過郵病臥函虛驛召翁往視翁察色切脉則面戴陽氣口甘長而弦蓋傷寒三陽合病也以方涉海爲風溽所驚遂血凝而神憤爲熱所搏遂吐血一升許且脇痛煩渴謔語適是年歲運左尺當不應其輔行京醫以爲腎已絕泣告其左右曰監司脉病皆逆不祿在旦夕家人皆惶惑無措翁曰此天和脉無憂也爲投小柴胡湯減饒加生地黃半劑後俟其胃實以承氣下之得利愈劇樞張息軒病傷寒踰月既下而內熱不已脇及小腹偏左滿肌肉色不變復醫以爲風矢所中膏其手摩之浹旬所其毒循宗筋流入於臬丸赤腫若瓠子楊醫刺潰之

而左脇腫痛如故既選醫之尤良者在門更召翁診翁以關及尺中皆數滑而且扎因告之曰脉數不時則生惡瘡關內逢扎則內癰作李脇之腫癰作膿也經曰癰疽不得頃時而下之慎勿晚乃用保生膏作丸衣之以乳香而用硝黃作湯以下之下膿如糜可五升許明日再圍下餘膿立瘥樞府陳斷事內人病召翁視翁切其脉左口弦而扎餘部皆和翁即起密告陳曰夫人病當陰中痛而出血且少陰對化在玉泉心或失寧則玉泉應心痛痛則動血而與經水不相關蓋得之因內大驚神憚而血凝陳曰公醫誠良也治病一如公所言翁乃爲製益榮之劑且納藥幽隱再劑即無苦翁之治病雖若不甚擘思然其鈞取古法動中肯綮多類此其於醫門群經及古今方論無不攷索其要歸他若諸醫爲術之精粗施治之工拙亦皆品彙區別無一義之或遺所致群經及古方論語多不錄有曰內經素問世稱黃帝岐伯問答之書及觀其旨意殆非一時之言其所譏述亦非一人之手劉向指爲諸韓公子所著程子謂出於戰國之末而其大畧正如禮記之萃於漢儒而與孔子子思之言並傳也蓋靈蘭秘典五常政六元正紀等篇無

非闡明陰陽五行生制之理配象合德實功於人身其諸色脉病名鍼則治要皆推是理以廣之而皇甫謐之甲乙楊上善之太素亦皆本之於此而微有異同醫家之大綱要法無越是書矣然按西漢藝文志有內經十八卷及扁鵲白氏二內經凡三家而素問之目乃不列至隋經籍志始有素問之名而不指為內經唐王冰乃以九靈九卷牽合漢志之數而為之註釋復以陰陽大論託其為師張公所藏以補其亡逸而其用心亦勤矣惜乎朱墨混殺玉石相亂訓詁失之於迂疎引援或至於未切至宋林億高若訥等醫史正其誤文而增其缺義頗於冰為有功今於各篇之內註意與經相類者仍斷章摘句而釋以已意攷與同志商確非敢妄議前脩也內經靈樞漢隋唐藝文志皆不錄隋有鍼經九卷唐有靈寶註及黃帝九靈經十二卷而已或謂王冰以九靈更名為靈樞又謂九靈尤詳於鍼故皇甫謐名之為鍼經即隋志鍼經九卷荀一書而二名不應唐志別出鍼經十二卷也所謂靈寶註者乃扁鵲太玄君所錄世所罕傳宋李有靈樞客一卷今亦湮沒紹興初史松楸是書為十二卷而復其舊較之他本頗善學者當以素問並觀

蓋其旨意互相發明故也本草三卷舊稱神經漢藝文志宋嘗錄至梁陶隱居始尊信而表章之謂此書應與素問同類但後人多更脩飾之耳秦皇所焚醫方卜術不與故猶得全錄及遭漢獻之遷徙晉懷之奔迸文籍焚廢卒不遺一今之所存有此三卷是其本經然所出郡縣乃多後漢時制疑張仲景華元化所記舊經之藥止三百六十五種陶氏進名醫別錄亦三百六十五種因而註釋分為七卷唐李英公世勳與蘇恭參攷得失又增一百一十四種分為二十卷世謂之唐本草宋劉翰等又附益醫家常用醫史者一百二十種偽蜀孟昶亦命其臣韓保昇等以唐本圖經參比增廣世謂之蜀本草至宋掌禹錫等補註新舊藥合一千八十二種定以白字為神農所說黑字為名醫所傳草石之品可謂大備他若雷公以下蔡邕徐大山秦承祖王季璞鄭廣諸公所撰名本草者凡三十九部三百五十卷雖顯晦不齊無非輔翼舊經焉耳近代陳衍作本草折衷王好古作湯液本草亦刪繁之遺意也竊意舊記郡縣古今沿革不同及一物而根苗異名或同名異質而主療互見者尚須考定俾歸于一可也難經十三卷乃秦越人祖

述黃帝內經設爲問答之辭以示學者所引經言多非靈素本文蓋古有其書而今亡之耳隋時有呂博望註本不傳宋王惟一集五家之說而醇疵或相亂惟虞氏粗爲可觀紀齊卿註稍密乃附辨揚玄操呂廣王宗正三子之非周仲立頗加訂易而考証未明李子楚亦爲句解而無所啓發近代張潔古註後附藥殊非經意王少卿演繹其說目曰重玄亦未足以發人之蘊余嘗輯諸家之長先訓詁而後辭意竊附鄙說其間以便後學未敢以爲是也傷寒論十卷乃後漢張機仲景用素問執論之說廣伊尹湯液而爲之至晉王叔和始因舊說重爲譌次而宋成無己復爲之註釋其後龐安常朱肱許叔微韓祇和王寔之流固亦互有開發而大綱大要無越乎吐汗下溫四法而已蓋一證一藥萬選萬中千載之下如合符節前脩指爲群方之祖信矣所可憾者審脉時汨王氏之言三陰率多斷簡况張經王傳亦往往反覆後先亥豕相雜自非字字句句熟玩而精思之未有能造其間奧者陳無擇嘗補三陰證藥於三因論其意蓋可見矣近人徐止善作傷寒補亡恐與先哲之意不合余因竊舉大要以補成氏之未備知醫君子或有

所取也脉經十卷乃西晉太醫令王叔和本諸內經素問九靈及扁鵲仲景元化之說衷次而成實醫門之龜鏡診切之指的自與近代倣託鈐訣者不同歷歲既深傳授不一各秘所藏互有得失至宋秘閣林億等始考証謬妄頗加改易意其新譌四時經之類皆林氏所增入陳孔碩何大任毛升王宗卿輩皆嘗審訂刊傳今不多見近人謝堅白以其所藏舊本刻于豫章傳者始廣余嘗據其精語并引內經之辭作診切樞要二卷非敢翦其冗複間亦補其缺漏且附私說各條之下以與同志研究爾脉訣一卷乃六朝高陽生所譌託以叔和之名謬立七表八裏九道之目以惑學者通真子劉元賓爲之註且續歌括附其後辭既鄙俚意亦滋晦今代王光國刪其舊辭而益以新語既不出其畦徑安能得手本原餘如清溪徐喬範權李上交輩皆自譌著凡十餘家亦每蹈襲前說在叔和之所不取讀者止記入式歌以馴至于脉經可也病源論五十卷乃隋大業太醫博士巢元方等奉勅撰集原諸病候而附以養生導引諸法聚成一家之書醇疵相混蓋可見矣宋之監署乃用爲課試元復循襲列醫門之七經然附會雜揉非復當時

之舊具眼者當自見之景賢亦作病源一書近代
不傳太始天元玉冊元誥十卷不知何人所作歷漢
至唐諸藝文志俱不載錄其文自與內經不類非戰
國時書其間有天皇真人昔書其文若道正無為先
天有之太易無名先於道生等語皆老氏遺意意必
老氏之徒所著大要推原五運六氣上下臨御主客
勝復政化治正及三元九宮太乙司政之類殊為詳
明深足以羽翼內經六微旨五常政等篇太玄君扁
鵲為之註猶郭象之於南華非新學之所易曉觀其
經註一律似出一人之手謂扁鵲為黃帝時人則其
書不古謂扁鵲為秦越人則傳中無太玄君之號醫
門倣託率多類此玄珠密語十卷乃啓玄子所述其
自序謂得遇玄珠子而師事之與我啓蒙故自號啓
玄子蓋啓問於玄珠也目曰玄珠密語乃玄珠子密
而口授之言也及考王氏素問序乃云辭理秘密難
粗論述者別撰玄珠以陳其道二序政自相戾意者
玄珠之名取諸蒙莊子所謂黃帝遺玄珠使罔象得
之之語則師事玄珠子而號啓玄者皆妄也宋高保
衡等校正內經乃云詳王氏玄珠世無傳者今之玄
珠乃後人附託之文耳雖非王氏之書亦於素問十

九卷二十四卷頗有發明余嘗合素問觀之而審語
所述乃六氣之說與高氏所排諸卷全不侔疑必刊
傳者所誤也原其所從蓋攬據內經六微旨及至真
要等五篇洎天元玉冊要言而附會雜說其諸紀運
休祥之應未必可徵實偽書也荷啓玄別撰果見于
世又豈止迷氣運一端而已覽者取其長而去其短
可也中藏經八卷少室山鄧處中云華先生佗游公
宜山古洞值二老人授以療病之法得石牀上書一
函用以施試甚驗余乃先生外孫因弔先生寢室夢
有所授獲是經於石函中其託為荒誕如此竟不考
傳獄吏焚書之實其偽不攻自破按唐志有吳普集
華氏藥方別無中藏之名普其弟子宜有所集竊意
諸論非普輩不能作鄧氏特附別方而更今名耳蓋
其方有用太平錢并山藥者蓋太平乃宋熙陵初年
號肇新以避厚陵偏諱而始名山藥其餘可以類推
然脉要及察聲色形證等說必出元化遺意覽者細
為審諦當自知之聖濟經十卷宋徽宗所作大要祖
述內素而引援六經旁及老氏之言以闡軒岐遺旨
政和間班是經于兩學辟雍生吳裊為之解義若達
道正紀等篇皆足以裨益治道者也余工餘如孕元

立本制字命物二三章釋諸字義失於穿鑿良由不
攷六書之過瑕瑜具有固無害於美玉也其論諸醫
有曰扁鵲醫如秦鑑燭物妍媸不隱又如奕秋遇敵
着着可法觀者不能測其神機倉公醫如輪扁斲輪
得心應手自不能以巧思語人張長沙如湯武之師
無非王道其攻守奇正不以敵之大小皆可制勝華
元化醫如庖丁解牛揮刀而肯綮無礙其造謂自當
有神雖欲師之而不可得孫思邈醫如康成註書詳
於制度訓詁其自得之妙未易以示人味其膏腴可
以無饑矣龐安常醫能療諸病之所秘法元化之可
法使天假其年其所就當不在古人下錢仲陽醫如
李靖用兵度越縱舍卒與法會其始以顧頤方著名
于時蓋因扁鵲之因時所重而為之變爾陳無擇醫
如老吏斷按深於鞠職未免移情就法自當其任則
有餘使之代治則繁劇許叔微醫如顧愷寫神神氣
有餘特不出形似之外可模而不可及張易水醫如
瀛溪之圖太極分陰分陽而包括理氣其要以古方
新病自為家法或者失察剛欲指圖為極則近乎畫
蛇添足矣劉河間醫如橐駝種樹所在全活但假水
雷以為春利於松栢而不利於蒲柳張子和醫如老

將對敵或陳兵背水或濟河焚舟置之死地而後生
不善效之非潰則北矣其六門三法蓋長沙之緒餘
也李東垣醫如獅弦新絃一鼓而卒領並應膠柱和
之七均由是而不諧矣無他希聲之妙非開指所能
知也嚴子禮醫如歐陽詢寫字善守法度而不尚飄
逸學者易於摹倣終乏漢晉風度張公度醫專法仲
景如簡齋賦詩每有少陵氣韻王德信醫如虞人張
羅廣絡原野而脫免殊多詭遇獲禽無足算者翁之
學問該博非獨醫門為然他如經史傳記諸子雜家
以及天文地志曆算兵刑食貨不無釋老之書亦靡
不精求熟玩故其見之言語文字皆有考據可徵不
為浮葩以炫世至於為詩尤雄健蒼古有古作者之
遺風嘗以晦迹丘園薦為台州僊居縣儒學教諭後
調臨海及陞本郡教授俱不上善著書有內經或問
靈樞經脉箋五色診奇咳切脉樞要運氣圖說養生
雜言脉緒脉系圖難經附說四時燮理方長沙論傷
寒十釋運氣常變釋松風齋雜著彙各若干卷傳學
者為人恭勤詳緩與人交款款常若不自足狀貌不
踰中人語言如不出諸口卒然遇之不知其學之富
也年老無子而有女四人生女不生男以太倉公

方之

論曰自古有疾醫參之以九藏九竅之變通之以五味五穀之資五色五氣五聲以視其生死五毒五藥以攻其疾痼其為術博矣故非聰明洽達知夫天地神祇之次明乎性命吉凶之數處虛實之分定逆順之節以與神聖為徒者未易以臻此若滄洲翁豈近是乎翁之為醫一遵古昔神聖之格言而且博攷載籍參取化原著之於方冊余論次翁事頗采其意云使翁自援醫術之中一意儒學著書以垂世可謂稽古之士矣

醫史

大卷

九

葛應雷補傳

子乾孫

李瀛

葛應雷字震父姑蘇人也攻于醫嘗著醫學會同二十卷推五運六氣之標本察陰陽升降之左右以定五臟六腑之虛實合經絡氣血之流注而知疾病之候死生之期處方制劑砭石率與宅醫異時按察判官李基中州名醫也因診父疾復咨於應雷聞其各論父子相顧駭愕曰南方亦有此人邪乃盡出所藏劉守真張潔古書與之討論無不脗合而劉張之學行於江南是真是始應雷由平江醫學教授擢江浙

醫史

大卷

十

醫學提舉子乾孫字可久生有奇氣體貌碩偉膂力絕人好擊刺戰陳之法以至陰陽律歷星數靡不精究長乃折節治經屢試不第遂棄去肆力古學為文章有盛名于時父應雷取醫書授之乾孫稍治輒精而不屑施行或施之輒取異效其名與丹溪朱彥修並稱云一日嘗炒大黃過焦悉棄之不用其慎如此人來迎致不問貧富皆從貧人以楮鏹來買藥準病輕重乾孫貯善藥藏以與之仍歸其直或楮鏹有不佳者顧為之易佳者以還使供饘粥人皆稱其仁一書生傷寒不汗發狂循河走乾孫就摔置水中良久出之裹以重繭乃汗而解同郡富家女年可十七八病四支痿痺目眩不能食眾醫莫能治迎乾孫乾孫視之笑曰此不難治命悉去其房中香奩流蘇之屬發藉地版掘土為坎昇女置其中扇其扉戒家人伺其手足動而作聲當報我久之女果舉手足而呼投藥一丸明日自坎中出矣蓋此女平日嗜香而脾胃為香氣所蝕故也壬辰徽寇轉掠蘇人震恐願訪金事李仲善請乾孫圖之乾孫勸城之以守然後請自往討賊仲善從之卒城之而濟又善以生辰推禍福嘗語光福徐顯曰聞中原豪傑方興而吾不得與命也

今六氣淫厲吾犯咸池殆將死矣一日見武士開弓
取挽之而穀歸而下血亟命其子煎大黃四兩飲之
子惡其多害減其半飲之不下問其故子以實對曰
少耳亦無傷也我命來年當死今則未也再服二兩
愈明年果卒

嵩渚子曰吳門故多醫最知名者曰葛可久其後乃
有劉觀士賓盛賓啓東沈玄以潛王敏時勉皆有時
名而以顛顛著者又有錢瑛良王云聞唐開元中有
周廣者亦吳人每觀人顏色即知抱疾深淺言之神
驗無事診候也流風相承議論指授是故吳中多善
醫之今猶然因傳可久父子行事併著之

醫史卷之九

醫史卷之十

浚儀李漁輯

抱一翁傳

國朝戴良

抱一翁者東嘉人也今居越江上姓項氏名昕字彥
章晚更自號抱一翁曾大父某大父某父某比三世
俱以和義維其家翁自幼聰敏好方數外大父杜曉
村世業醫常奉父命謁受其書讀之年未成童已暗
誦岐扁素難王叔和脉經稍長學易趙穆仲葉見山
所後以母病醫誤投藥死痛之乃益厲志醫術欲盡
受他禁方聞越大儒韓明善先生方善也遂往拜
之盡得所藏方論甚富後更...
歷試其說皆精良會金華朱彥修來越出金源劉河
間張戴人李東垣諸書示之翁獨疑古方不宜治今
病之論亟往錢塘見陸簡靜叩之始悟古今方同一
矩度也後又往剡右見葛可久論劉張之學又往建
業見戴公父全父亦是郡儒者為譏五運六氣撰要
若干篇授翁太醫院使張廷玉善橋引案杭甚奇非
世之所聞也翁亦得見事之盡其技於是為人治診
南决死生無不立驗里鍾姓者一男子病脇痛衆醫

以爲難也投諸香薑桂之屬蓋其翁診其脉告曰此
腎邪病法當先溫利而後竭之投神保九下黑溲痛
止即令更服神芩九或疑其太過翁曰向用神保九
以腎邪透膜非全竭不能引道然色豆性熱非得芒
硝大黃蕩滌之後遇熱必再作乃大泄數出病已翁
所以知男子之病者以陽脉弦陰脉微澁弦者痛也
澁者腎邪有餘也腎邪上薄於脇不能下且腎方惡
燥今以燥執發之非得利不愈經曰痛隨利減殆謂
此也鍾女病腹脹如鼓四體骨立眾醫或以爲娠爲
蟲爲瘵也翁診其脉告曰此氣薄血室鍾曰服芩歸
輩積歲月非血藥乎翁曰失於順氣也夫氣迫也血
水也氣有一息之不連則血有一息之不行經曰氣
血同出而異名故治血必先順其氣俾經隧得通而
後血可行乃以蘇合九投之三日而腰作痛翁曰血
欲行矣急治芒硝大黃峻逐之下汗血嚔嚔如瓜者
可十數枚應手愈翁所以知鍾女之病者以六脉弦
滑而且數弦者氣結滑者血聚實邪也故氣行而大
下之鍾有從女病名同而診異翁曰此不治法當數
月死回者鍾女脉滑爲實邪今脉虛元氣奪矣又一
女子病亦同而六脉獨弦翁曰真藏脉見法當踰月

死後皆如之越幕富費姓者有子病甚眾醫皆以爲
瘵盡愕束手一日費客獨泣客以翁薦翁診之曰
此病暑邪非瘵也家問死期翁曰何得死何得死爲
作白虎湯飲之即瘥翁所以知費子之病者切其脉
細數而且實細數者暑也暑傷氣宜虛今不虛而反
實乃熱傷血藥爲之也費病胸膈壅滿甚篤昏不知
人醫者人人異見翁以杏仁薤苳之劑灌之立蘇繼
以升麻黃芩梔梗消其膜脹之踰月瘳翁所以知費
之病者以陽脉浮滑陰脉不足也浮爲風而滑爲血
聚始由風傷肺故結聚客於肺陰脉之不足則過於
宣逐也諸氣本乎肺肺氣治則出入易死陳除故行
其肺氣而病當自已建康萬夫長庶君病醫投丹附
薑桂逾甚翁診其脉告曰此得之酒病當噉作聲食
入即出而後溲不利廬曰然乎平生所嗜獨燒酒翁
進葛花解醒加黃芩飲二升所勢減眾醫以藥性過
寒交還之翁既論不協辭去即歎曰實實而虛虛過
二月當入鬼錄矣果如翁言翁所以知廬之病者切
其脉細數而且滑諸數爲熱滑爲嘔爲胃有物酒性
大毒大熱而反以熱劑加之是火其火也且溲秘爲
陽結今皆反治故二月死也茶商李事人也啖馬肉

過多腹脹醫以大黃巴豆治之轉劇翁後至診之寸口脉促而兩尺將絕翁曰胸有新邪故脉促宜引之上達今反奪之誤矣急飲以湧劑且置李中座使人環旋頃吐宿肉仍進神芎九大下之病去衆醫咸曰予所不及也浙東俞憲史君素苦足病發則兩足如桂潰黃水踰月乃已已輒復發翁診其脉告曰六脉皆沉緩沉爲裏有濕緩爲厥爲風此病風濕毒俗名濕脚氣是也乃以神芎九竭之繼進舟車神祐九下濁水數十出遂不發動南臺治書郭公久患泄瀉惡寒見風輒仆日臥密室以毯蒙其首熾炭助之出語

醫史

卷十

四

甚曰肝藏血而心主之今寸口脉微知心虛也心虛則不能司其血故逆而妄行法當養心仍補脾胃其子子實則心不虛矣服琥珀諸補心之劑愈祈帥胡公病發熱惡風而自汗氣奄奄弗屬諸醫作傷寒治發表退熱而益增翁診其脉陰陽俱沉細且微數虛以補中益氣之劑醫止之曰表有邪而以參芪補之邪得補而愈盛必死此藥矣翁曰脉沉裏病也微數者五性之火內崩也氣不屬者中氣虛也是名內傷經曰損者溫之飲以前藥而即驗南臺掾梁彥思使閨而足不能履醫以風論或以脚氣治經年不瘳翁

醫史

卷十

五

呻吟如嬰兒諸醫皆作沉寒痼冷治屢進肝附不時驗翁診其脉告曰此脾伏火邪濕熱下流非寒也法當升陽散火以逐其濕熱乃煮升麻柴胡澤瀉羌活等劑而繼以神芎九郭曰予苦久泄今復利之恐非治也翁曰公之六脉浮濡而弱且微數濡者濕也數者脾有伏火也病由濕熱而且加之熱劑非苦寒逐之不可法曰通因通用吾有所試矣頃之利如木屑者三四出即蒙首之瓊去次去熾炭病旋已郭重允謙妻患痢三年許醫以血得熱則溇溢服瀉心涼血之劑益困痢纔數點輒昏翁診之六脉微弱寸爲

診之六脉僅微數而他無所病即探患處乃骨出不入肯綮耳施以按摩即愈南臺治書迭里迷失公足失履而傷腕骨掌反於後者六閱月矣衆醫不能治公知翁精按摩曰幸予治也翁令壯士更相摩從辰至申而筋肉盡腐遂引其掌以揉之嗟嘆然有聲藥以兩月其足如常時金參政子年方稚嘗嬉戲臥於階側忽驚焉踐其足胠骨斷碎即死父乃蘇翁以其法治之卒完其足步履無所苦聞萬夫長陳君臨陣爲刀斫其面瘡已愈而眉與鼻不能循甚惡時時仰泣曰吾面無完膚生何以見妻子死何以見父母

乎乃拜翁求治翁命壯士按其面膚肉盡執腐施之以法即面赤如頰盤左右賀曰復故矣左丞王公畏瘡毒晨必命醫診省醫鄭生切其脉愕曰平日兩尺無虞今忽不應指可怪也公即驚曰人無尺脉猶樹之無根其能久生乎命他醫診之其論亦同乃命翁診翁曰此天和脉勿妄治也因陳氣運交反之道以曉之公叱衆醫曰若等誤人多矣奪提舉俸者二人翁之於醫多類此於是門人學子懼其老且衰也力請著書以貽後乃作脾胃後論以補東垣之未備其畧曰或問脾胃之有虛寒信乎曰脾胃為百病之源然每惡寒而喜熱寒者陰氣盛陽氣微也熱者陽氣盛陰氣微也而所以致夫陰陽之微盛者脾胃之虛故也甚則陰陽孤立而死矣經曰有者為實無者為虛故氣併則無血血併則無氣氣血俱失故為虛又曰陰盛生內寒厥氣上逆寒氣積於胸不得瀉瀉則溫氣散寒氣獨留故中寒也又曰邪氣盛則實精氣奪則虛故陰勝而為實靈樞曰風雨寒熱不能獨傷人有猝然逢疾風暴寒而不能病者蓋無虛不能獨傷其人此必因虛邪之風與身形兩虛相感乃客其形矣此脾胃虛寒之說也又問河間謂惡寒戰慄皆

屬於熱然脾胃虛寒亦有惡寒而戰慄者何邪曰風寒之邪始居於表表有寒邪則外惡寒因其入裏與邪氣相搏故戰慄也邪氣勝則熱發於外故戰慄愈不惡寒而反惡熱脉必洪滑數盛此蓋以實熱而致惡寒戰慄者也至於脾胃虛弱傳化失常榮衛俱虛不任風寒內外之邪易以傷之經曰因身之虛逢天之虛兩虛相感其氣至骨又曰陽虛生外寒又曰陰盛生內寒又曰陽受氣於上焦以溫皮膚分肉之間今寒在外則上焦不通上焦不通則寒氣獨留於外脉必沉遲而弱此虛寒而致戰慄者也熱淫於內治以甘寒河間所論是也寒淫於內治以辛熱上文所論是也二者所因各不同又可執一而言哉又問戰慄鼓頷及諸禁鼓頷如喪神守皆屬於熱河間謂熱之極反有水化制之故其治法專主甘寒以發其鬱資水以制火也然與治瘧之戰慄鼓頷可得同其法歟曰戰慄鼓頷皆屬於熱此經首章之言言熱之一端也比及後章言瘧之始發陽氣併於陰陽虛陰盛而外無氣故先寒慄陰氣逆極則陽復出陽與陰復併於外則陰虛陽實故先熱又曰溫瘧者先傷於風而後傷於寒夫寒者陰氣也風者陽氣也瘧之寒熱

戰慄鼓領者以上下文虛實交作陰陽相移也逆
調論曰人非常熱常溫而為煩熱者何也岐伯曰以
陰氣少陽氣勝也人身非常寒而寒從中生者何也
岐伯曰陽氣少而陰氣多也此皆不可專主於熱矣
明理論則分戰慄於內外之診戰者身為戰搖慄者
心戰又曰陰中於邪必內慄也表氣虛微內氣不守
故使邪中於陰正氣虛弱故成戰慄者正氣勝慄者
邪氣勝鼓領者邪入陽明故鼓領為戰之輕者其有
森然而寒從然而振是名曰振而振亦戰之輕者由
是而觀發熱而戰慄者陰虛而陽盛也法當補陰而
抑陽不熱而戰慄鼓領者陰盛而陽虛也法當助陽
而抑陰至若寒熱交爭陰陽相移又當從之逆之其
始則同其終則異資取化源追之迎之調之而為之
治可也豈可專以其寒言之舉一而遺十哉又問胃
膈堅滿痞痛腹墮謂之不足而中氣內傷法當補其
中而益其氣河間戴人則以為諸逆上衝諸濕腫滿
諸氣鬱鬱皆胃濕少為病法當瀉火在上則瀉之在
下則瀉之張長沙又以為邪氣所留而以辛溫之劑
開發蕩散之何三者治法之不同邪曰治有從本者
有從標者有不從標本而從中治者証有虛實脈有

逆從其始雖殊其歸一理也經曰天之四令無形風
寒暑濕也地之四令有形饑飽勞逸也東垣以胸腹
堅滿等証皆為飲食七情所致而謂之內傷蓋以中
氣不足諸邪得以留之經曰邪之所湊其氣必虛是
已其脉必弦澁虛遲故治以補中益氣使中氣既盛
則邪氣可不戰而屈矣此按本塞源之論蓋治其本
者也河間戴人以為可湧可竭者是治其有形之邪
其脉必洪實沉滑必當去其有形之物而中氣可復
又必資水以制火而陰陽自和蓋治其標者也至若
長沙直以邪氣留之於中焦必以辛溫之劑散其無
形之邪經曰寒則氣聚熱則氣散舉痛論曰諸痛為
寒是也其脉必虛浮遲滿故以發鬱開結之劑上之
蓋從中治者也知乎此則三者之法斷不可以偏廢
而近世宗三家者往往自相詆毀而有南醫北醫之
不同決不肯以寒涼施之於南方辛熱施之於北方
何其自蔽之若是歟經曰病當問其起居因言北方
之不同矣然治寒以熱治熱以寒微者逆之甚者從
之要在臨時變通消息以為治安可限以南北之分
而有寒熱之實異哉又問脹病或以濕熱留飲而滿
而傳化失常甚則霍亂吐下又以為諸痛乃熱鬱於

內故爲堅痛不可以言寒文以爲急痛者因寒之極而乃凝澁而爲痛如是則所謂霍亂吐下而心腹絞痛者當作熱論乎抑作寒治乎曰吐下之作罕有不由脾胃感之蓋胃爲水穀之海受天之氣地之味精悍薰蒸而成氣血以營養四旁往往因其燮理失宜風寒燥濕之邪得以乘伏錯亂於其間風爲百病之始而春爲溫風夏爲陽風秋爲涼風冬爲寒風風也者天地之氣也寒風即天地之寒氣經曰歲土不及風乃大行化氣不令草木茂榮飄搖而甚民病飢泄霍亂斯固陰陽錯亂之所致矣其有食飲過制七情內鬱則濕飲否隔遂使陰陽不得升降塞而不通陽併于陰陰併于陽揮霍變亂水穀沸騰而爲吐下霍亂此則濕熱留飲致之然也若夫堅痛爲熱本指瘡瘍皆屬心火心主熱化故痛屬熱即不以寒言至於急痛因寒乃舉痛論諸痛爲寒之說經曰寒淫於內以辛熱散之佐以苦寒長沙以辛熱之劑散其錯亂風寒之氣良以此耳凡所臨証固當察物之陰陽驗人之虛實不可專以爲有熱而無寒不可專以爲有寒而無熱斯蓋折衷之道也翁他所言病及所論証治衆多今頗失之不能以盡錄而錄其大槩如此其

醫史

卷一

十一

醫史

卷一

二

於爲醫或在杭或在鄞或在閩在拉爲府史爲肅政府書吏在鄞爲帥府令史在閩掾行中書掾行臺一皆以醫見辟諸貴人而非所尚也然庶謹練達之風雖素業吏事卓卓當時者亦皆自謂不能及翁儀儀觀美鬚髯目爛爛如電光天性純孝父母有疾扶持保抱不解帶者旬朔沒則一遵儀禮治其喪平居樂易寬厚務揚人善而恥言其過臧獲有失亦不忍加以色辭與人交盡其義其於恩意尤至也喜辭章善音律工繪畫而獨以醫顯所著書有竹齋小藥及脾胃後論別誤醫原若干卷議論宏贍未及成子一

曰恕能世其業云

論曰仲尼有言人而無恒不可以作巫醫豈不信然歟抱一翁爲醫四十年所其已入病生人之死甚衆人以厚利報翁輒却而不受與之藥即富徒手亦與藥不責其償而濟物一心孜孜然終始弗少衰則所謂有恒者豈近之與傳曰醫非仁愛不可託非廉潔不可信若翁者殆可託而可信者歟至於立言以垂世則取諸先覺之說折衷之而一本於經貫徹達幽不失細小備矣豈非宣暢曲解古之良醫也歟

蔣用文傳

陳繼

蔣用文名武生以字行其先居魏州五世祖安中金國子助教以直諫不納棄官攻醫曾祖應茂徙揚之儀真祖夢雷元揚州路醫學教授父伯錕舉進士崇明州判洪武初召為史官以疾辭出為蘭陽丞用文少穎悟讀書過目成誦六歲事學從里中師有贈師萬年松者命賦詩即就曰使者來西嶽採松云萬年佳名雖自好何不長參天師驚喜曰是兒已見才器既而隨父宦寓日俟公暇持所業質之聞說無疑問父大奇之曰吾有嗣矣父歿歸儀真舊業廢於兵燹渡江占籍宛容採薪構室居之數肆力於經籍父之

醫史

卷十

十一

得聖人深意乃習醫家言會同黜異約其要而綜之取正於術之精善者而受其秘於是決死生定緩速治效無一不中者由是用文之名驅四方矣孝事母魏夫人情依依不去左右食飲非躬治弗進夫人病被衣而不交睫者數月夫人老郡縣交辟不就曰吾不能舍一日養以趨祿利也夫人歿當洪武中始受薦入太醫院時朱彥脩弟子戴原禮為院使擅其術人無有當其意者見用文喜曰君儒而為醫昌吾道必矣遂言於上授御醫永樂八年陞院判典幹成勞僚類所歸仁宗皇帝在青宮用文日侍左

右承顧問隨事獻規益其見親禮嘗問保和之要對曰在養正氣正氣完邪氣無自而入又問卿醫效率緩何也對曰善治者必固本急之恐傷其本聖人所戒欲速也仁宗稱善及課績特命光祿置宴於院宴之旌其忠勤又嘗命工部為營第用文入叩顙謝曰臣荷恩德萬不一報又敢靡公費以益愧悚也再謝乃止其就故人居之一室蕭然晏如也用文病且革手自為啓附進有曰臣老病死不足言惟恨不能有報大恩伏願清心寡欲慎加保養以輔聖治以安萬姓仁宗得啓驚嘆親御寶

醫史

卷十

十一

翰遣使慰問及卒命兵部給驛舟還其喪督治祠墳於中官仁宗即位詔贈奉議大夫太醫院使特謚恭靖遺官諭祭官其長子主善為院判用文醇厚恭謹知當世之要務其忠諫愛君之心惓惓於語言故能受知於上所以慰問誥祭之辭皆懷念忠誠揄揚學術以明上之不忘也居兩京三十年王公貴人下逮賤隸細氓愈其疾而著神效者歲不少貧者報之曰吾非為報為爾醫也卒皆不受善交友始終不渝宗戚尤洽恩義獎勸後進汲及人遇耻出其口志嗜學雖老不厭治一室於公署之傍

者顏曰緝熙於家居幽屏之所者顏曰靜學皆盛貯群籍暇輒觀其中時忘食寢或謂曰子老矣何勤益至是邪用文曰昔衛武公年數九十五猶箴儆於國俾臣下朝夕交相告戒乃作抑詩以自儆卒謚康聖武公吾雖老幸未就木而敢以怠荒棄厥躬哉或又曰緝熙靜學意有說乎用文曰學有緝熙于光明成王之言也非靜無以成學諸葛武侯之言也吾志在是其爲詩文有靜學齋集若干卷治效方論若干卷萃之曰無貴賤疏戚咸咨嗟悼傷曰善人亡矣子四人無善主敬主孝主忠皆立行有父風

醫史

卷一

十四

橘泉翁傳

程敏政

橘泉翁祝仲寧者四明人世爲醫家至翁當永樂初被召來京師及見故太醫院使戴原禮原禮蓋丹溪朱氏高第弟子翁未及卒業而原禮去乃自肆力于丹溪諸遺書及太素脉訣又上沂于張劉李三氏以達素難大有所悟入遂專主濕熱相火之說而內外傷辨尤精確守不變嘗曰世不推病于脉而索病于方此大誤也然世醫信局方已久故凡致翁者始聽其言心非之至終驗乃大信惟一二動舊及武官市人有疾一遇翁輒效而稍名讀書者謂其用三黃之

補方惡見翁家君尚書南征還病脚膝痺痛

上命醫來視且合四方之醫皆以爲寒濕率用烏附蛇酒之藥盛暑猶請服綿蓋如是者三歲一日家君夢有神人書祝字以示者時孫太傅亦臥病走往候之大傅瞿然謂走曰子非祝翁殆矣走聞翁姓惕于蓋爲之愕然急與俱來翁診視良久又檢諸醫案無然曰幸哉公之免于患也此濕熱相搏而成經所謂諸痿生于肺熱者也即日禡其綿盡謝諸醫者取清燥湯飲之曰此疾已深又爲熱藥所誤非百貼不驗蓋服三月餘病良已自是家人有疾非翁藥不敢嘗

醫史

卷一

十五

而士夫間亦始有延致之者然翁愈人之疾已即置之不復挂口或扣之然不應曰吾厭世之奴奴者故走所目擊翁事多不讓古人而不得其診視之詳獨志其繫云孫太傅病頭面項喉俱腫大惡寒醫疑有異瘡翁曰非也此所謂時毒似傷寒者丹溪曰五日不治殺人急和敗毒散加連翹牛旁子大黃下之三日愈又嘗右脇大痛腫起如覆盂手不可近醫以爲滯冷投香桂薑黃推氣之劑小腹急脹痛益甚翁曰此內有伏熱瘀血在脾中爾經所謂有形之腫也疾痛從利消與承氣湯加當歸芍藥柴胡黃連黃

蘇下之得黑痰血二升立愈又嘗有瘍發左耳後鼻
熱間作晝夜呼不可忍瘍醫欲與十宣散補托之翁
曰此有餘之火無事于補與防風通聖散加柴胡白
芷下之腫消痛止時大傳年八十餘翁凡三下之皆
奇英國公病左癱不語氣上壅醫以為中風用順氣
祛風之劑弗效翁曰此痰火濕熱所致與之清燥化
痰前後飲竹瀝數升愈國子監丞彭英義翁術無
王隆亦病此翁皆以是起之新寧伯母夫人病癆喘
遍身腫痛進諸流氣之劑弗止魏國公子年八歲病
哮喘夜不得寢喉中作拽鋸聲醫日用抱龍丸轉加
失音公皆與瀉火清氣之劑愈或者疑請其說翁曰
人雖有老穉而諸氣皆鬱肺火之發則同第脉候有
衰脆藥味因之有小增損爾忻城伯素有痰疾嘗出
墜馬昇歸不復省事醫用理傷斷續之藥翁笑曰此
雖墜馬寔痰發之故與之降火消痰已而愈武靖侯
夫人病周身百節痛又胃腹脹目閉逆冷手指甲青
黑色醫以傷寒主之七日而昏沉皆以為弗救翁曰
此得之大怒火起於肝肝主筋氣盛則為火矣又有
痰相搏故指甲青黑色與柴胡枳殼芍藥苓連瀉三
焦火明日而省父之愈故太平侯病腫中痛喘嘔吞

酸自云臍上一點氣上至咽喉如水每子後申時輒
發醫以為大寒翁曰此得之大醉及厚味過多子後
申時此際相火自下騰上故作痛與二陳湯加全連
山梔蒼朮數服愈戶部主事吳潤病頭眩兩耳鳴如
屯萬蜂中甚痛心撓亂不自持醫以為虛寒下天雄
矣翁曰此相火也而脉帶結是必眼峻劑以劫之急
與降火升陽補陰之劑脉復病愈姚光祿女年十七
病潮熱醫以為瘧治之加寒戰血崩又以為虛將補
之翁曰此熱入血室所致先與小柴胡湯再與承氣
湯微下之去紫黑瘀血數塊愈具檢討子年十八病
眩暈狂亂醫以為中寒已而四肢厥冷欲自投火中
醫曰是必用烏附庶足以回陽翁曰此心脾火盛陽
明內實用熱藥則不治強以瀉火解毒之劑三服愈
取茶酒病頭暈翁發熱浙浙惡寒醫以為感冒用
甘草發汗之劑汗出不止腹滿作渴譫語發斑醫又
以為中暑翁曰此非一時寒暑所致乃積濕熱在足
陽明太陰經中故疹見與除濕熱補脾胃瀉陰火之
劑愈南昌知府王詔病筋疾給事中徐恪病氣痿皆
為醫所誤翁一以清燥湯起之至於飲食勞倦之疾
世醫率以為外感而得翁起之者尤眾不能悉記也

翁年下孫太傳一歲精健亦畧相等活人之心日甚一日每乘欸既從一童子走東西應都人之請雖雨雪早暮不自恤都人日輦金輿幣以謝門下而翁亦未始以此介意焉初楊文貞公家有孫病豆寒戰嘔泄將院使用文以爲不治或薦翁翁時尚少診視之曰無傷也與藥一粒而效文貞素重蔣者終閱其事不以告人御史錢昕夫人病惡寒日夜以重裘覆其首起躍入沸湯中不覺醫以爲寒甚翁持之曰此痰火上騰所謂陽極似陰者非下之火不殺下經宿而撤裘呼水飲之旬日氣平乃愈給事中毛弘病傷寒

醫史

卷十

七

汗已不解醫與之補劑補旬日病大作盜汗唇裂將邀他醫而誤召翁翁曰傷寒無補法此餘熱不解與參連山梔石膏之劑一服即愈此三事非目擊然人有誦之者故附載之

論曰近世有儒名者立說斥東垣丹溪之書爲不足觀曰二家動引素難猶儒者動引唐虞三代何益于事噫爲此言者亦悖之甚矣唐虞三代之治術豈誤人家國者邪患人不能爲爾然人雖莫能爲而猶幸其在口也若禁之不言則豈復人理也哉宜乎橘泉翁之不獲遇也蹟此觀之世之抱古道而不獲遇者

豈特翁邪

張養正傳

王鏊

張順字養正醫名擅吳下中年以贅廢而氣岸峭直不衰周文襄公巡撫吳中賓禮之議論侃侃不屈也其醫大概以保護元氣爲主處劑多用參朮而每著奇效能預刻年月日決人生死徃徃奇中子昔館其家尚及見焉故得傳其事崔御史某按吳病痰氣短不能息養正曰此之謂支飲法當汗汗之愈知長洲王汝器病傷寒衆醫以爲熱症養正曰是極寒當用附子用附子果愈高都御史尚達久患咳或以爲

醫史

卷十

七

外感或以爲癰結於肺養正曰胃氣傷正氣損似外感而非也卒用補劑而差王孟南母節婦患足疾不能轉動內外醫莫知其証養正曰此風也用祛風湯差李百戶慶患嘔血吳下醫皆在養正後至曰諸公以爲何如咸曰未死也養正曰吾去矣諸君治之去數十步慶死謝揮使病謂其家曰亟來與訣頃之不能言矣其家未頃之果然北客有計姓者患痰火自訖善飯養正曰是不可爲也計大怒曰我何病哉半月計卒無錫華氏數延養正昆仲三人縱言及年壽養正曰第思濟當先逝曰幾何時曰一年許其家

特未信明年思濟疽發于背養正曰是矣不可治也乃謁他醫治之少間華使人詒曰君言不可治今愈矣養正曰有是乎歸語汝主視便中當有若紫者至某日死矣視之果然及某日死葉文莊有悖疾養正治之輒愈問之曰吾醫無過人者但病有淺深治有緩急扶持元氣取自然之效耳文莊大以爲然

太史公曰近世言醫者率祖東垣丹溪謂醫中王道信然然病者每遲之及養正用之數著奇效可謂善用其術者矣吳父老爲予言教論間恭肅羸疾吳醫治之率用三白湯不效謂養正亦用三白湯家人曰前用之矣養正曰子勿言投之果愈衆莫知其故豈別有巧妙乎蓋吳下言醫之良者必曰養正云

明李濂撰濂有祥符人物志已著錄是編採錄古來名醫自左傳醫和以下迄元李杲見於史傳者五十五人又采諸家文集所載自宋張擴以下迄於張養正凡十人其張機王叔和王冰王履巽原禮葛應雷六人則濂爲之補傳每傳之後濂亦各附論斷然如醫和診晉侯而知趙孟之死據和所稱主不能禦吾是以云蓋以人事天道斷之而濂以爲太素脈之祖扁鵲傳中趙簡子齊桓公號君各不同時自爲史記好奇之誤而濂不訂正葛洪自屬道家但偶集方書不聞治驗乃一概收入則陶宏景之撰名醫別錄有功本草何以見遺褚澄遺書偽托顯然乃不能辨別反證爲真本至於宋僧智緣本傳但有善醫二字別無治驗特以太素脈知名與張擴之具有醫案者迥別載之醫家尤爲隘及遼濟魯古案齊魯古原作直古魯今改正亦更無一事可述但以長亦能醫專事鍼灸二語遽爲立傳則當立傳者又何限乎濂他書頗可觀而此書乃冗濫特甚殊不可解惟其論倉公神醫乃生五女而不生男其師公乘陽慶亦年七十餘無子以証醫家無種子之術其理爲千古所未發有足取焉

藥鏡四卷

〔明〕蔣儀撰

中國中醫研究院圖書館藏明崇禎十四年

蔣儀刻本

附《四庫全書總目·藥鏡四卷》

提要

藥鏡凡例

一足縮大義。悉遵古人。間有刪補。則屬金沙秘法。俾收精採。余蓋留心數年。至協韻諸聲。務文約義全。易於已。醫家之鏡。性仍以鏡。

乃種類浩繁。今特簡治療。

聚寶翻舊加詳而後已。

採藥期在春秋二仲。春初始萌。枝不

散。淳濃在內。至秋風飄。枝葉乾。

體大抵春採。採先秋採。採末。花實。草葉。各欲得其

嫩熟之候。孫思邈云。古人自解採。取陰乾。曝乾。如

法。遠方來者。必求地道。是以十療九壞。今人採取。

氣候。茫然。至于南北地宜。新陳真偽。悉憑市販。服

無真識。所以十不五効也。

一凡藥之在土者。中半以上為根。其氣上行。病在上。中半以下為梢。其氣下行。病在下。焦者用之。藥之出土者。中半以上為苗。其氣味上升。中半以下為身為幹。其氣味中守下達。咸宜貴乎因病酌用。弗恃陰陽而已。

一藥宜預備。時當淳晏。城市安居。且暮亟需。求之必得。萬一村居風雨。或窺處遐荒。卒有奇病。命無延。吸三年之艾。用在一朝。仁人君子。能不思有備。患料理在先乎。更有說焉。狼狽枳實。橘皮。半夏。紫

黃。吳茱萸。此則隱居所謂六陳也。他如大黃。木賊。荆芥。芫花。槐花。香薷之類。亦須陳者。

一藥味有酸苦酸辛甘澆。氣有寒熱溫涼。及入臟入腑。血分氣分。宜九宜散。宜水宜煎。宜炒。宜麵。宜生咀。宜火煨。宜酥炙。宜漬酒。宜熬膏。煎製老嫩。磨少水而多取。補藥欲熟。多水而少取。古公立方。種種有法。名公新製。各有奇中。大約草木根苗。九月以前採宜。曝乾。十月以後採宜。陰乾。質硬而頑者。

宜熬膏。性柔而潤者。宜末服。

一傷寒用藥。嚴如定律。非同雜病。畧可員通。蓋表症不可用裏藥。裏症不可用表藥。半表半裏症。不可用表藥裏藥。故良醫之治傷寒。如隆萬以前。傷寒中主師定元。一字六句。不入殺者。決不孟選。而難病治法。便如經。應亞。應。偏。鋒。正。鋒。無所不宜。要得題之背案而已。

一藥有君臣佐使。共成宣攝合和之妙。宜一君二臣三佐五使。又可一君二臣九佐使。宜者。君行意也。

攝者。臣行令而統攝佐使。無不奉行君意。乃始成其合和。其間陰陽配。子母相生。兄弟協和。有一物而根莖花葉。諸寶貴骨。可單行者。可相須而行者。又有異物。而相劑相需。相使。相畏。相惡。相反。相殺之不同科者。凡此七情合和之。當用相須相使。而相惡相反者。所宜忌用。然又不盡爾也。若有毒宜制。有堅宜攻。有隔宜通。不妨經用相畏相殺之藥。如星家所謂。剋我者為用。神其效。倍捷。不爾則必殺人。點布。彭越。為我部曲。非高帝。膽識未便。

輕用。

一毒藥療病。用如粟許。病去即止。不去倍之。不去十之。去病爲度。至如胎骨胞衣及炮炙生命。我固欲生。彼寧甘死。縱弭救一時。嗣後必遭奇禍。醫道至仁。所宜亟戒。

一病在胸膈以上。先食而後服藥。病在心腹以下。先服藥而後食。病在脾胃。服藥宜空腹。而藥之平日。病在骨髓。宜飽滿。藥之半夜。胃脫食脹者。服藥之後。宜熨熱物。肺經咳嗽者。宜乘熱睡。喚醒睡。

東垣

東垣服藥活法。病在上。不厭煩而少。病在下。不厭煩而多少。服則滋藥。手上下服。則峻補。于平藥之具有宜酒。宜飲。宜水。宜冷。宜熱。宜溫。之。如解毒之藥。服宜微冷。熱則使毒氣反盛。凡分載服三服者。要視人稟氣強弱。病勢輕重。以爲進退。加減。期藥之力。與病相及而已。

一修合丸散。宜在五月上辰。端午。臘日。并臘月晦日。前三兩日。久而不賜也。若仙方救急之藥。須是甲子日陽時合之方靈。如天冬地黃滋潤之品。宜判

曝獨搗令細。若逢陰雨。以微火烘之。既燥。候冷。乃搗。凡烘濕藥。使燥。皆大耗。當先增分兩。待歸末後。作乃爲得法。投湯酒中者。不須如此。又曝濕藥。置盆水上。反易乾。

一論藥諸書。無慮充棟。但能述其功效。而不究其所。以奏功之故。是編甘例。備載經絡之歸。炮製之法。選辦之正。名謂異同之義。及有毒無毒。微毒大毒。相使相反。相畏相惡。一二分疏。于本文。要緊。明其治病。因絲針。鋒相對。不與鋪錄而已。學人。披覽。

其能

如說金膏

嘉善。將儀用述

藥鏡總目									
溫部									
人參	北沙參	黃耆	白朮	熟地黃					
當歸	五味子	百部	遠志	石菖蒲					
藿香	香附	縮砂香	木香	肉豆蔻					
白豆蔻	小茴香	草菓	蓬莖茂	辣蓼					
使君子	穀精草	生薑	高良薑	鬱金					
姜黃	麻黃	紫蘇	川芎	防風					
荆芥	薄荷	蒿本	細辛	白芷					
蒼耳子	蒼耳子	紫苑	香薷	旋覆花					
羌花	半夏	天南星	蒼朮	白芥子					
前胡	白附子	藜蘆	萊菔	藜蘆					
稀莖	胡首烏	覆盆子	骨碎補	肉蓯蓉					
僂茅	巴戟天	刺蒺藜	胡蘆巴	續斷					
延胡索	澤蘭	益母草	艾葉	韭菜					
紅花	山漆	白頭翁	百草霜	劉寄奴					
鼠粘子	胡荽	芝麻	甘松	土木香					
蔓荆子	延仁	辛夷	欬冬花	杏仁					

烏梅									
益智仁									
丁香									
沉香									
烏藥									
陳皮									
青皮									
厚朴									
檳榔									
大腹皮									
阿膠									
五加皮									
山茱萸									
杜仲									
宣木瓜									
龍腦香									
牙皂									
肥皂核									
赤檉木									
荔枝子									
胡桃									
松香									
乾漆									
燕菜									
紅麴									
糯米									
餡餅									
大麥芽									
神麴									
白蘘菔									
蜜砂									
雄黃									
赤石脂									
花蕊石									
礞砂									
紫石英									
髮灰									
雀卵									
阿膠									
麝香									
霞天膏									
白馬溺									
海螵蛸									
五靈脂									
白殭蠶									
全蠍									
蜈蚣									
熱部									
黑附子									
乾薑									
草薢									
佛耳草									
破故紙									
牽牛									
大蒜									
肉桂									
桂枝									
吳茱萸									
川椒									
巴豆									
酒									
硫黃									
硃砂									
紫河車									
勝帶									
人牙齒									
鹿茸									
鹿角膠									
虎骨									
麝香									
平部									

甘草	麥門冬	百合	桔梗	紫苑
山藥	蓮實	芡實	黃精	
丹參	鉤藤	牡丹皮	大小薊	鱧腸
王不留行	麝香	天麻	甘菊	木賊草
決明子	獨活	羌活	葛根	白沙糖
蒲黃	別三稜	牛膝	菟絲子	石解
委蛇	石龍芮	草薢	白及	通草
不通	茵陳蒿	防己	土茯苓	金銀花
燕脂	蓖麻子	商麻子	茯苓	茯苓
琥珀	栝子仁	酸棗仁	龍眼	枸杞子
女貞實	楮實	枇杷葉	楓香脂	桑寄生
密蒙花	山槿	蘇木	桃仁	竹瀝
竹蛭屑	猪苓	郁李仁	櫻皮灰	柞樹皮
血竭	梗米	黑豆	赤小豆	胡麻
黃麻仁	金銀箔	銅青	礞石	人乳
烏骨毛鷄	龜板	鱉甲	蜂蜜	露蜂房
黃明膠	龜板	鱉甲	蜂蜜	露蜂房
五倍子	白龍骨	蛇蛻		

大黃	車前子	澤瀉	苧麻	甘遂
瞿麥	瓜蒂	升麻	小此胡	貝母
天花粉	栝樓仁	常山	蘆根	藜蘆
連翹	黃連	胡黃連	黃芩	知母
玄參	盧會	燈檠	青蒿	地膚子
天名精	山豆根	青黛	蘭草	紫葳
茵陳	白欬	茅根	馬鞭草	地榆
芍藥	生地黃	天門冬	白鮮皮	馬兜鈴
草龍膽	夏枯草	大青	蚤休	馬齒莧
烏芋	漏蘆	蒲公英	苦參	貫衆
紫背浮萍	白冬瓜	天竺黃	山巵	薯蓣
柿蒂	梨	孩兒茶	八角茶	竹茹
竹葉	桑白皮	地骨皮	黃蘗	枳實
枳殼	側柏葉	槐實	椿根白皮	棟實
綠豆	浮麥	薏苡仁	黃丹	鐵鑄
粉錫	丹砂	石膏	滑石	芒硝
玄明粉	白礬	綠礬	青礬	食鹽

鹿茸	天雄	烏梢蛇	熟	羊肉	煙膠	蠶豆	青葙子	桑鏡	茄干	水龍骨	梁上塵	溫	真珠	穿山甲	熊膽	重便
大楓子	草烏	鯽魚		羊角	羊頭骨	刀豆	烏柏樹皮	日五	松節	訶子	東壁土		田螺汁	蛤粉	牛乳	人中白
樟腦	川烏	鯽魚		羊腎	羊脰骨	銀蒜	杉木老節		乳香	栗殼	石鍾乳		斑蝥	牡蠣	象牙末	夜明砂
	側子	蚰肉		羊肝	頭垢	白前	堵藤根		沒藥	黑白丑	伏龍肝		蜣螂	蟬蛻	鴉膽	犀角
	胡椒	蚰殼		羊血	百毒霜	石礪	月季花		金櫻子	銀絲	龜龍骨		白頭蚯蚓	蟾蜍	蛇鼠糞	羚羊角

鯉鱗皮	麻井苔	苦苣	黃葵花	血見愁	商陸	芒硝	海藻	寒	經衣	蛤蚧	玳瑁	兔腦	蜜陀僧	豌豆	桑螵蛸	無名異
蟹爪	廢井藍	苜蓿菜	充蔚子	螻蛄	雷丸	膽礬	大戟		雄婦爪甲	鰻鱧	蛻皮	兔肝	半枝蓮	豇豆	梓木皮	自然銅
蟬蛇膽	鮫底苔青	芥菜油	紫參	蛤蚧	澹竹	水銀	澹豆豉			白鯊	熊掌	兔血	紫地丁	剪刀草	紫荊木	石韋
黑嘴白鴨	鯉魚膽	屎坑底泥	苧根	土茯苓	葛花	萱草根	甘蔗根			腦石	文蛤	兔屎	屎蛆	竹頭糠	木芙蓉	大棗
		大蚌水	陳醋	山慈藜	石打寒	水銀粉	朴硝			神藥	鱧魚	白鶴	蟾肺	古文錢	山茶花	蛇床子

梔子	山柑	金汁	黃蘗	蛎蛤
蝸牛	蜚蠊	鹿蟲	青魚膽	麒麟竭
滋生賦				
春雨水	朝露水	冰雪水	地漿水	乳穴水
屋漏水	夏水	溫泉	米泔	梅雨水
長流水	急流水	池沼水	逆流水	井底泥
井華水	甘瀾水	懸壺氣水	龍下炊湯	生熟湯
洗兒湯	洗盤水	磨刀水	石下清泉	野火氣
補遺				
目錄				
麴酒	白酒	狗肉	鯢骨	母猪肉
鰕	鰕	水牯湯	澹菜	烏鴉
水鷄	蜆肉	蟹殼	諸生血	猪腦肝湯
鴛掌黃	貓肉	精	菱苗	白菜
麻腐	苡粉	菜心	芋頭	白果
甜菜	西瓜	榛子	石榴	瓜子
櫻桃	鮮瓜	鮮棗	醬	栗模
葡萄酒				
藥鏡總目終				

藥鏡卷一				
溫部				
人參				
<p>甘而微苦溫而不微寒氣味輕升功力浩大助 群藥於力不足之處回元氣於無何有之鄉氣虛 者大劑補裨血虛者量為加減破堅積解鬱癰托 不起之癰疽活灰白之痘疹難產之虛胎墮下內 傷之勞熱頓涼虛熱虛寒無分表裏生津止力不</p>				
<p>將除陽浸蜂窠用酒腸枯漬人乳還榮血旺在木 是領導虛閉之淋瀝辨麻以君引開伏之陽氣少 服反滯多服乃通脾胃虛寒腹而不食斯為要藥 肺肝熱脹嗽而作喘用則逆條仲景云汗後身熱 亡血而脈沉遲下痢身涼血虛而脈微弱者藥宜 投也</p>				
<p>北沙參 生心而能止悸驚養肝氣更除肺癰消痰 嗽而痰最清滋肺氣而肺熱尤宜治血風痿癭 之瘡酒焙多効攻丹田痛結之便臨妙通神豈非</p>				
<p>蔣 儀纂定 常 醴泰訂</p>				

補脾之聖藥。養陰之樞要也。補人參而補脾胃。

元氣。因而益脾與腎。故內傷元氣者。宜之。沙參。

補肺氣。因之益脾與腎。故全受大魁。以救久嗽。

宜之一。補陽而生陰。一補陰而制陽。不可不辨。

黃耆。三托。養氣。補脾。止瀉。助脾胃。理濕。潤中。消痰。

醫則瀉火。退熱。養氣。潤肺。助肝。去積。壯氣。補。

暑毒之侵。梓表。養氣。潤肺。助肝。去積。壯氣。補。

我良朋。風而口。燥。肺。助。肝。去。積。壯。氣。補。

宜。實。養。氣。補。脾。止。瀉。助。胃。理。濕。潤。中。消。痰。

忌服。忌升。氣。于。表。而。裏。食。虛。表。邪。者。勿。施。惡。益。邪。

干皮。而。表。不。發。古。云。防。風。能。制。黃。耆。黃。耆。得。防。風。

其功愈大。蓋相畏而相使也。

白木。之為性也。惟其納食。所以止吐。胃脾之助。

惟其行痰。所以飲汗。濕熱之邪。利小便。而。

腫退。實大腑而瀉。安。姪。佐。以。黃。耆。治。疔。之。聖。

實。氣。實。喘。促。脾。虛。而。無。濕。邪。者。宜。勿。用。也。血。滯。注。

枯。風。寒。兼。濕。而。成。痺。者。可。任。投。之。痘。家。毒。盛。尿。多。

切。須。禁。忌。若。見。水。泡。之。症。用。麻。黃。根。汁。浸。透。焙。乾。

取其達表以利水道也。

熟地黃。五。補損傷之血。填作耗之精。傷寒後。歷。股。發。

寒。新。產。後。臍。腹。最。痛。欲。令。五。藏。充。實。是。為。良。劑。也。

溫寒小異。於生地。滋補弗殊。於奏功。古方。避。銀。器。

同。梓。白。髮。因。蘿。蔔。合。食。又。其。性。賦。開。沙。仁。之。香。則。

宜。矣。能。潤。五。臟。冲。和。之。氣。歸。宿。丹。州。故。又。脈。微。者。

桂。附。宜。低。天。麻。旺。者。藥。如。同。劑。

當。歸。身。守。中。養。血。頭。止。血。上。行。足。破。血。下。流。全。活。

血。不。走。氣。溫。而。味。帶。辛。甘。隨。所。引。而。各。至。焉。血。實。

血。虛。大。用。氣。壅。腸。滑。少。加。抑。又。聞。之。歸。芍。合。則。養。

中。帶。飲。歸。芍。合。則。養。中。帶。行。歸。耆。並。則。養。中。兼。補。

歸。木。並。則。養。中。兼。生。配。以。生。地。冬。連。而。血。涼。配。以。

稜。木。姜。桂。而。血。破。佐。以。地。榆。烏。梅。而。血。止。佐。以。黃。

黃。山。梔。而。血。清。痘。家。內。熱。煎。熬。以。致。血。枯。便。結。者。

玄。明。粉。內。加。大。把。之。當。歸。則。血。生。血。生。則。大。腸。自。

潤。

五味子。七。救。肺。金。手。總。夏。為。腎。水。一。畏。酸。久。嗽。肺。嘶。

虛。咽。口。渴。是。功。首。也。降。火。盛。而。能。下。所。以。瀉。而。火。

而補庚金。續氣短而令長。所以足元神而禪五臟。
宜兼用于虛痰盜汗。勿單施于肺熱血病多服之。
反成虛熱者。豈非收補之功或驟也哉。火嗽忌用。
寒涼須藉其酸以飲。止霍亂與瀉痢。消水腫之。
腹脹。冬月咳嗽。蓋為肺寒。肉桂乾薑是其良友。夏
時神力困乏。氣不足也。參耆黃藥麥門冬者。作後
同謀。另有一種色黃。精重辛甘。能散肺邪。消酒毒。
百部。人散肺熱而降氣逆。定欬嗽而殺諸蟲。傳尸骨
蒸。餌之霍然。蓋百部。天冬並治肺病。但百部溫而

不寒。寒嗽相宜。天冬寒而不熱。熱嗽應投。此為異
耳。

遠志。消痰利氣。寧心鎮驚。益腎水。又利膀胱。上通
心志而善忘。以治養心血。因生智慧。下與腎交。而
強志以全其苗。葉名小草。僅治遺精。蓋利小便者
爾。

石菖蒲。開心孔。九竅引通。聲音清亮。聰耳辟鬼。寒
宜。賜。鬆節頭風。寬女子之鬱懷。長男人之志思。腹
疼或走者見效。胎產欲產者即安。遭鬼擊而神情。

生調之汁。急灌。因痢下而嘔。日晡和米飲之湯。手
足濕痺而不仁者。可使屈伸。癰疽諸腫之驟發者。
能令消散。燥烈或于目赤有妨。芬芳能使精神枯尤
耗。辟山嵐之瘴氣。腎寒濕之發疔。

霍香。開胃以助脾。理肺以快氣。止嗅暑穢之痛嘔。
療感山嵐而寒熱。芬芳堪敵口臭。燥熱以致結腸。
得砂仁與炒鹽。手中毒之霍亂。加丁香與滑石。止
吐瀉於炎天。

香附。理氣而鬱痰開。溫胃而宿食化。緩膀胱之冷
氣。則汁炒。宜薑散。胸內之熱氣。則酸炒。宜醋。濕氣

滯于腰腎。則寒炒。宜便。滯氣滯於血中。則熱炒。宜
酒。消堅積之痞氣者。則鹹炒。宜鹽也。老人多溺。益
智同攻。婦人鼻塞耳聾。芍歸互劑。妙黑者直透子
宮。止崩漏而凝滯以決。生用者引之血分。兼調氣

而新血以生。氣鬱吐紅。童便調下。癰疽脹痛。海藻
酒煎。同烏藥。同甘草。鹽湯和服。治心腹之刺疼。夾
半夏與白礬。薑汁麴。先治停痰之宿飲。

縮砂密。溫脾胃而寒氣散。磨食積而瀉痢平安。胎

氣而嘔吐止。祛穢氣而霍亂寧。血虛多服助火添
痰氣虛多服開成脹發。問所與偕。理肺氣者白豆
蔻。補脾者益智人參。清腎者茯苓黃柏。行人腸行
小腸者赤石脂白石脂。佐以食鹽。泡湯冷飲。乾霍
亂可平也。蘿蔔汁浸焙乾。飯服。因痰氣而作脹者
可療也。連皮炒黑。熱酒調下。此又子痢昏冒之方
也。

木香四十苦入心辛入肺芬芳入脾氣逆痰壅皆屬于
肺故上焦氣滯當用中氣停積皆屬于脾故中焦

集

氣

卷一

氣滯應投大腸氣結則後重。膀胱氣阻則澀淋。肝
氣拂鬱則作痛。散下焦氣滯相宜。戒投于心。痛屬
火用夾黃連防其走泄。禁用于脾虛有熱。生磨入
藥奏功尤易。總之是降氣定痛。散寒勝濕之劑。補
遺以爲行肝氣者。蓋謂心乃一身之上。惟心能帥
氣則肺氣調。肺氣調則金能制木。而肝火自伏。實
心之行乎肝氣非肝氣之自行也。

肉豆蔻十五積寒久瀉以攻傷食吐逆能治。專消肉積
亦安脾家。脾得溫而運化則瀉下除。脾得辛而氣

展則淡滲。施五疳効及止霍亂不難。八痢功全。蓋
積滯甚易。獨磨爲末。棗肉丸。糖湯下。立時開胃。進
餐。佐以木香。棗肉丸。米飲下。頃刻挽回久瀉。

白豆蔻六益元陽冷痛胃家亟去。消脹赤氣凝肺管
能開療反胃而祛痰。進飲食而下積。故惡心吐食
者胃寒也。溫酒下。嚼三枚。小兒吐乳者亦胃寒也。
甘草砂仁末子。

小茴香十開胃口寒痰之噎膈。散膀胱冷痛之噤心。
調中而霍亂以平。止嘔而諸痰立起。破臭氣入兩

集

氣

卷一

七

少陰利小便。止諸腹痛。蓋辛溫而快脾。宜多防其
耗氣。另有一種八角茴香。氣味稍厚。功用畧同。
草藥十寒脹能消。定氣滯之霍亂。脾積可導。攻痰瘕
之濕寒。散濕最神。大傷元氣與知母同用。治瘧瘥
寒熱。蓋草藥治太陰獨勝之寒。知母治陽明獨勝
之火。陰陽相濟和平無欲矣。

蓬莪茂七破氣中之血而導結。魚脰經。療心腹之疼
而定奔弛霍亂。先入血而隨於先入氣。以火炮性
溫活像三稜補藥同行兩便。

陳夢二味極辛性極陽辛則發胃進食陽則聰耳明

眸氣歸鼻舌從腎走肝至足透入骨髓三冬足冷

陽回發冬藏之閉密為甲屬之運用水滯四肢自

能甲已合化木強二月反令肝助胃移另有一種

名水夢者汁療蛇傷將脚能消氣腫水紅箕子也

單治瘰癧

使君子二十使脾而化乳停胃而散濕熱故瘰癧

消而使濁者能清瀉諸毒總除却也未飲調成

治兒科癰痛之流涎蜜多為末治嬰孺面浮而黃

藥鏡

卷一 八

腫

殺精草二十散心火相火之交扇而喉痺寬和胃家

風火之上衝而尚痛愈鼻不止下以熟麴之屬

翳膜目中副以防風之劑調和羅匡之白麴難貼

偏正之頭風包紫獨殺之原肝藥藥獨育之孩子

痘後日衣隱瀝淚出同蛤粉等分融食猪肝嬰兒

中著吐瀉渴煩須存性散灰米湯冷下

生薑二十止嘔吐不分平熱定喘嗽獨效乎風痰

通鼻塞于發熱發寒療頭疼于中寒中暑製半夏

而解毒佐大棗以厚腸去皮則守中而熟存留皮

則行表而熱散然薑本治寒而又能治火何也蓋

製妙者連每拌薑汁以薑性辛熱使熱從而受之

所以苦寒之劑因其從而殺其熱也

高良薑四十散寒氣吐逆之病下心痛攻中之氣轉

筋霍亂酒毒兼銘是薑亦結子人稱紅豆蔻味辛

性熱其氣芬芳溫肺醒脾且疏噎膈散寒燥濕更

裨腸虛

鬱金五十調逆氣而止心痛行瘀血而林金瘡血溺

藥鏡

卷一 九

血淋并舒鬱結臣以明鑒頑痰能化故同末服而

醒癰痛也

薑黃六十壯熱以其苦也散結以其辛也故王血分

之堅積下氣能兼又王氣結之臂疼散癰尤善

麻黃七十去榮內之寒邪洩衛中之風熱發表去節

欬汗連根節在寒邪鬱于肺經而致逆者宜咀春

深夏月秋初寒或傳于腠表者藥用厚朴為使表

實能瀉氣閉以疏花粉相和雞乳能消乳汁頓下

佐獨活以療脚氣臣甘菊以亮目昏倍常之雜疽

行涼藥內用此即消冰冷之寒而疎風散中投之
即止痘家紅紫稠密皮厚不快者內托解毒之劑
量人加入自然稀朗。

紫蘇 藥可疎風專治四時感冒梗偏下氣尤除
五內虛膨化食消痰安胎開胃欲溫中止痛則養
香烏藥以先鋒散濕散暑清則厚朴木瓜為行伍
得獨活與蒼朮而脾氣兼除同白芷與石膏而口
臭并息發表則麻黃可比而氣虛弱症宜避用也
其子潤肺滋心故能寧靜致逆疏利痰痰

藥鏡 卷一 十

川芎 助清陽以止頭疼行血海以疏經滯排風
以燥濕安姪又催生理帶氣以定諸疾故曰血中
氣藥散暴寒以助火邪故云久服暴亡杏仁汁製
以痘家血不活者能使之活蓋芎以行表各以潤
燥痘之黑陷爛者切勿誤投形小者撫芎力專開
鬱更有說焉諸經頭痛不同引藥各宜分別太陽
羌活陽明白芷少陽此胡太陰各木厥陰吳茱萸
少陰細辛是也

防風 瀉肺邪而升胃氣療風濕而理目疾同甘草

麻黃治風寒未曾發汗伴黃者芍藥能實表而止
汗流潤大腸也更定眩運之頭顱開鬱結也亦瘥
酸疼之肢節續命湯用除口眼歪斜通聖散用去
周身濕熱若夫風在血分則與當歸或在水分則
與白朮

荆芥 辛香而邪解溫苦而散癰行胸膈積血之
藥清腸胃瘀血之脈散乎風邪而頭痛止疎平血
熱而目暗除婦人血風血暈小兒風疹癰瘡陽明
熱病與白頭煩則搗汁酒吞口眼喎斜等分

藥鏡 卷一 十一

荷葉 清熱服酒調德末產後中風而口噤立匙
便煎服產後迷悶而鼻齕並醒蓋皮裏膜外之風
荆芥主之非若防風之入骨與肉也

薄荷 發汗于頭腦清腫于目喉丈夫虛熱無干
小兒風涎有益失音痰塞中風之病肺熱咳嗽陰
虛之症所兼治也

蒿木 上行治風理太陽顛頂之寒痛下行治濕
療婦人陰內之腫疼

細辛 解少陰合病之首痛在裏溫中散三陽數

變之風邪上部得力。商因胃火而痛。石膏並清目。
 因肝熱而疼。安明借效。肺氣賴以宣吸。味以辛而
 入肺也。滲下不失其官。利水道而下行也。通耳震
 疏便瀉。且潤腎燥。去內寒。散浮熱。更補脾虛。療肢
 掌之與喉痺。腎口臭之與血閉。祇宜寒。病火症則
 非所該也。若或單服其末。恐有補肝閉氣之虞。
 白芷^{三十} 治頭風之抹目淚出消癰腫而止痛排膿。
 陽明分之頭疼。燥癢皮膚並愈。漏下色之赤白。陰
 腫血閉。齊攻勝濕者。風泄風者。汗得天麻與獨活。
 也。頭面之風痰以逐得本連與蒼朮也。表裏之濕
 熱以驅。去腐爛以生肌。用之為內托之散。發垂針
 于口眼。咀之為續命之湯。
 蒼耳^{三十} 上達頂腦。兼能發汗。子焙香而酒浸。頭風
 腦漏。風寒濕痺。云平。末陰乾。其嫩苗。血風攻腦。頭
 旋悶絕頓甦。
 葱白^{三十} 發表通中。傷風頭痛。濃為汁而淪。以川
 芩能安下血胎。並及病痛。拾心危。貼諸臍而烘
 以熨斗。能救陰毒腹痛。與風逆卵縮。唇青。熨熱。

金瘡撲傷出血立止。炒熱。髮少腹小便閉。服旋通。
 搗爛配鹽。解蛇蟲之傷。毒研勻。椒和。含濕熱之腫。
 風。葱實^{三十} 口明。葱汁^{三十} 王血崩。
 秦艽^{三十} 王骨蒸。及養血而榮筋也。攻黃疸。兼勝風。
 而瀉血也。祛風熱。而不牙根之腫痛。并口內瘡毒。
 引小水而去風寒之濕痺。及肢節痛疼。正口眼之
 歪斜。資脫肛之痔漏。
 香薷^{三十} 口得之。則辟火散而臭息。肺得之。則清化
 行而熱消。同參朮茯苓木。捷驅水腫。同厚朴黃
 連。欖豆。頓解暑煩。霍亂吐瀉之靈苗。調胃和中之
 仙草。血萃舌上。一試。早煎。鼻鼻不鼻。獨汁。水。驅寒。
 惟乘涼飲。冷陰邪。閉遏清陽。而患頭痛惡寒。發熱
 等症者。此能發越。陽氣散水。和脾。至若飲食不節。
 勞役過度。之人。病由內傷。必須清暑。益氣。人參。白
 虎。等劑。以瀉火。益元。則庶幾可耳。
 旋覆花^{三十} 專理風氣水濕。而解胸膈之結痰。亦治心
 下痞堅。而愈日中之眩暈。
 羌活^{三十} 辛苦。脹盛。能消利水。瀉濕。化瘰。飲。

半夏四十 和胃瀉惡心令人進食起四肢沉重去彼

痰并慣掃脾胃寒濕之痰亦助心腎血虛之火痰

厥頭寒之利器自汗煩渴之毒媒勿施于肺熱陰

虛略歸諸血忌用于胃氣虛弱脾陰不周火痰黑

老痰膠須加芥連瓜蒌海粉寒痰清濕痰白須加

薑附蒼木陳皮風痰芥中昏迷要入皂莢天南星

痰核延生腫突要入竹瀝白芥子俗兼半夏性燥

易以貝母殊不思貝母入肺半夏乃走脾胃何可

代也

藥鏡

卷一 十四

天南星四十 主風痰辛而不守半夏治濕痰辛而能

降下氣利膈而消癰腫散瘀墮胎而破堅積可施

于真中風牙關緊閉并敷刀箭金瘡亦可療破傷

風口噤身癱兼抹蛇蟲毒瘡黃柏引以下行牛膝

製其剛燥且牛膝者益肝鎮驚之藥也兒科良藥

有餘之痰南星治之不足之痰膽星能療

蒼木四十 燥脾土以去濕補中焦以進食辟瘴氣于

山嵐功甚發汗逐濕痰與痰癰助自消痰

白芥子四十 除皮裏膜外之寒痰疏胸膈膈下之冷

氣肝醪酒解妙似葛花嗽止濕行效何薑汁下走

則直卻腎邪上行則速開鼻竅

前胡四十 蕩風痰之病結清熱嗽之失音咳嗽喘逆

火盛咽疼益風傷于肺經也惟此甘辛可解頭痛

惡寒身熱骨疼益寒賊乎膀胱也辛溫惟爾能驅

小兒疳熱大人發熱脾經之濕也清聖推茲胎前

寒熱瘧癰發熱邪之鬱于肌表也是能疎散瀉家

用之者取其氣寒以平胸次無形之熱毒風其味

苦以泄膈中有形之實痰並胡入少陽厥陰前胡

藥鏡

卷一 十五

入太陽太陰假如傷寒初起常用前胡以散表邪

若誤用此胡則苦寒之性必引邪入少陽矣惟是

邪在半表半裏當用此胡以清肌熱而或誤用前

胡則汗多表虛亡陽可立而待矣

白附子四十 入肺以治風痰而小兒急驚自止入脾

以治皮膚而汗斑疥癬精光風寒痰壅心經則作

痛寒濕邪傷血分則血痺辛勝濕溫勝寒故主兩

上百病而上行藥勢也

蘇鐵仙四十 去胸膈涎痰而宜通五臟治腰膝風濕

而管攝諸風脚氣入腹而脹悶喘急者溫酒調而
劑之。飛絲纏陰而腫痛欲斷者汁可搗而浸洗。出
下皮膚內木化之風痛更可滌膀胱中濕積之宿
膿者也。

萊菔四十九 辛冷在生搗汁磨墨吐血堪醫甘溫在熟。
下氣利膈消痰化殺生用則升升則發瘡疹熟用
則降降則鬆後重。天葵汚血搽洗亡痕。并爛爾爾。
會瘡滅毒研勻頻搽。抹湯火而生涼。子散風痲定
喘嗽而消癰。去膨脹除蠱毒散積疔。

藥鏡四十九 善理熱痰于肺內。故與陳年芥菜同。同奏肺癰
之功。兼清濕熱于大腸。故與新薑葉洗薑。立止痔
瘡之痛。

豬苓五十一 補元祛濕。明目烏鬚。展風神麻木之仁。
助脚膝痠疼之無力。熱濕煩滿。偏枯不遂。皆最効
也。單用一味。蒸爛如法。蜜九酒下。神妙無雙。本經
云。脾腎兩虛。陰血不足。病不因于外來者。不可縱
何。

胡首烏五十一 豁頭面之風氣。及皮膚燥癢。消濕散毒。

扶腰膝之軟弱。并筋骨酸疼。長吼明眼。生精補血。
而烏髮烏鬚。暖胃溫脾。而除崩止漏。截瘵瘧醫所
不知。止腎泄。書猶未載。佐白芷。能止發瘡痘瘡。君
寄生驅風疾之作痛。製用溫腎補肝。欽收精氣。生
服潤推燥。可代大黃。風疥疥癬。作瘰癧。莖煎湯
洗効。

覆盆子五十一 益腎添精。中年無子之神藥。補肝明目。
女人求嗣之要方。小便數頻。服之寡前。

骨碎補五十一 添精堅骨。去風毒之發。疥癩。行傷。癰
毒。

下寒而上熱。青鹽槐角。并擦牙根。能令齒固。火炮
乘熱。耳聾塞治耳閉。兼開包猪腎而煨酥。治腎虛
之久瀉。屑虎骨而酒下。起痢後之痠疲。蓋腎王二
便久瀉。腎虛不可。前從脾胃也。

肉蓯蓉五十一 壯陽益精。男子陽衰復舉。強陰養血。女
人陰絕重胎。補助過降。反能動火。大便脾泄。不可
誤投。

仙茅五十一 人命門而扶衰火。則虛損勞傷。陽道痿弱
之仙方也。補相火以助君火。則通神強記。長精明。

月之聖藥也。脾虛腹冷不能食者。得其氣之溫而
運化自健。腰足舉痺不能行者。得其味之辛而步
履如常。

巴戟天五十 添精補髓。強筋骨。散邪而五藏安。五藏
之勞腎爲之主也。下氣則火降。火降則水升。故腎
氣滋長。而諸虛自退。社陰病以平小腹之引痛。并
及白濁夢遺。補血海以除頭面之遊風。更使志增
氣益。

刺蒺藜五十 散惡血。破癥結也。痰痺乳癰。頭瘡。瘰
癧。

青之妙藥也。藥治風癢。可煮湯而沐浴也。至如沙
苑蒺藜則又味甘微腥。以其入腎益精。故至長風
明日而兼遺泄。以其止煩下氣。故治欬逆傷肺而
及肺痿。

胡蘆巴五十 達膀胱而冷逐。攻疝氣而痛消。若夫面
色白而如餅。溺之凝樣者。腎虛寒也。從剋剋而
改容。視膨脹而名脾。桂之吹氣者。陰氣下喧也。併
齒佳而息驚。

續斷六十 治勞傷精竭于陽道之痿。扶胎產血漏于子

宮之寒。治腰疼。能去風寒痺濕。續筋骨。何愁跌撲
損傷。血尿血崩。止之既勝。滯血死血。行之又良。乳
癰瘰癧。殊功。腸風痔瘻。立效。與女貞同。縮小便之
頻數。與山藥並。因精滑與夢遺。

延胡索六十 破癥瘕之結聚。止心腹之刺疼。調月水
于胎前。清血運于產後。醋炒血止。酒炒血行。和血
用炒。破血用生。蓄血癰滯。因而小便尿血者。椿膏
爲佐。水炙晨吞。鹽酒車馬。致使筋骨疼痛者。豈酒
和調。每日二服。

藥集五十 卷一 十九

澤蘭六十 芬芳而辟氣。舒三焦通利。辛溫而肝氣
榮衛流行。產後虛勞。賴之養血。胎前怯弱。用以調
經。行血而不排推。養血而無膩滯。所以爲產科聖
藥。解頭風之目痛。疏肢體之浮腫。所以爲血家良
劑。

益母草六十 行血而新不傷。養血而終不滯。煎湯浴
癰瘡。發癰自停。熟地黃。歸仁。涼藥。清用。草便。集
同煎。臨產用之。必佳。子名克。附。明日益精。下腹中
死孕。及止痛安胎。理產後血壅。并熱入血室。能清

凉其肝火。故血逆者下行。雖辛散而潤滋。故木氣為除去。

艾葉六十能溫中。開鬱氣。治帶下。兼濕除。而又安肝。

脾。止久痢。能使子宮虛寒者受胎。和氣血。除漏崩。

且令月事寒愈者漸准。用其寒。則生取搗汁而理。

吐衄與血傷。用其熱。則熟艾醋炒。而髮風寒于懷。

振。

韭菜六十清濕火。利小便。生則導瘀散積。熟則和中。

益肝。故能去五藏之結膠。降胃脫之痰熱。其根搗。

汁下。膈中血脈之瘀。其子壯陽。腎白濁夢洩之症。

素問曰。足厥陰病。則遺尿。思無窮。房勞太甚。發。

為筋痿。或為男濁。女帶。韭子能入厥陰。補肝及命。

門之不足。命門者。藏精之府。故同治云。

紅花六十通行滯血于周身。必須多服。資養寸心之。

斷血。在乎少宮。下胎死于腹中。產前聖藥。療口燥。

而血運。既產仙丹。搗苗梗敷。遊赤珠功。夾臍脂滴。

痔耳皆效。

山漆六十跌撲杖傷。搗敷即愈。痢崩吐衄。末服旋搽。

臨杖預吞血。不衝上。產後血逆。下白疰。瘀。

白頭翁六十散熱而血涼。行瘀而泄下。既治熱毒之。

血痢也。又醫陰疝并鼻衄焉。

百草霜六十消積下食。止血散瘀。伏龍肝與樓灰。胎。

動下血者。服此無危。童便醋并白芷。產後崩帶者。

吞之即止。

劉寄奴七十治心腹之刺痛。而下氣固速。破經產之瘀。

血。而金瘡最神。骨碎補延胡索同煎。治折傷血瘀。

空心時。木二錢茶下。治大小便紅。瘡腫因于進風。

葉鏡七十消痘疹之毒。而胎中淫火能降。利咽喉。

之喉。而膈上風痰可去。宜腰膝凝滯之血。有達表。

潤肌之助。桔梗麻黃取汁煮服。天花進發。眉髮奏。

功。

胡荽七十味辛悅肺。故使少腹氣通。溫性快脾。故能。

散疹。疥癩。止頭疼。而除肢熱。消穀食。而利二便。

食同茶。則痰通毒解。漬酒配酒。則血散神傳。其子。

煎油。禿瘡。可傳。酒煎噴痘。紅潤堪誇。

芝麻^{七十} 行風氣而通血脈滑腸胃而潤肌膚。能
解瘡疥。蟲自死。時餐乳母兒熱能涼。

甘松^{七十} 醒脾開胃。善降惡氣。浴肌香體。能已心疼。

土木鱉^{七十} 除腫毒。療乳上之癰疽。散血熱。止濕熱。

之腰痛如泥。搗碎入湯。薰洗肛門之痔痛。合拌

大黃赤小豆。油塗熱腫之雙荷。釋典稱兩香木鱉

形小色白。味苦氣寒。主傷寒熱病。與喉痺。瘡瘻者

也。

夏荊子^{七十} 散風寒。太陽分之頭疼立止。去翳膜。風

藥鏡

卷一 二十一

腫眼之眦。味生光。消陽明風熱。牙齦間之動搖。腫

痛。仍復堅固。

蕤仁^{七十} 散風邪。以清熱。調肝氣而血和。故目腫赤

疼。淚出皆爛。俱治上焦痰結。下焦氣痞。咸腎。

辛夷^{七十} 能通鼻塞。以辛溫外解肌表之風濕也。能

定頭眩。以芳香上逐陽分之風邪也。

款冬花^{七十} 辛散而心肺潤。甘緩而咳嗽和。肺痿瘵

丹痰喘上刺兼明雙目。更治心驚。識者稱其得腎

之體。先肝之用。出肺之邪。蓋取水氣之精靈而造

木。天于未發。善英于木。火必盛。木則助肝。火能

赴肺。縱非肺家之藥。而開肺最切。是以咳必因

寒。寒為冬氣。而肺受之為咳逆者。惟款冬為能治

之。

杏仁^{八十} 散肺家風寒之痰嗽。潤大腸氣閉之便難。香

肺與大腸相為表裏。臟通則腑通。腑順則臟順也。

研細如泥。陰戶蟲蛆可殺。勻調輕粉。傷毒結毒。瘰

癧。至如發熱口乾。狗肉之停服也。成升煎服有神

功矣。然杏仁太陰以下喘。主大腸氣分之燥。病發

藥鏡

卷一 二十三

于書者。桃入厥陰以養氣。至大腸血分之燥。患成

于夜者。故晝便難。而脈浮者。杏仁陳皮為要。夜便

難。而脈沉者。桃仁。薤白。宜先。又虛人便難。不可過

泄。可不知所以審處。

烏梅^{八十} 煖胃調中。安蛇飲。肺收攝。浮熱故生津液。

而解心躁。心煩。吸氣歸元。故止吐逆。而除久。若久

病。煎湯代茶。火炎頭上之疼。立效。燒灰去核。黑瘰

之與。此肌漸消。白梅味鹹。功力少。火消痰。霍亂兼

止。醒睡酒毒亦消。

溫胃仁八十 溫脾胃而攝涎唾。緩膀胱而瀉多尿。腹

痛。沖用之。調氣。腸鳴。腎泄。藉此補虛。能滾反胃

之痰。偏補命門之火。固辛香以宣發。且潤下而飲

收。

丁香八十 攻胃口之寒痰。止心下之冷痛。啞脂翻胃。

用為劫劑。奔豚。疝氣。藉此引經。同白蔻。藿香。厚朴。

治霍亂之因寒。加陳皮。半夏。生薑。治嘔吐。餘傷冷。

冬月痘瘡寒阻。則入異攻散。子溫其寒。以起發。後

去白。鬚留孔。則與薑汁調塗。重生。長而再黑。畢末

藥鏡八十 傳孔裂。服療。癰傷。果犯寒料。投醫罔應。倘因火

症。召隔匪輕。

沉香八十 補腎暖腰。散腫導滯。治中惡。悶絕。而調中

氣。定轉筋吐瀉。而止腹疼。開豁食氣于膈胸。功猶

鹹竹。導決痰水于腸胃。妙擬通津。下焦虛寒。用宜

相火炎盛忌服。

烏藥八十 辛能快氣。氣順則風自散。血自調。故王履

內脹。膨疼。痛溫能散寒。寒去則濕自除。雖自開故

子。腎間冷氣。攻衝止。翻胃而縮小便。辟疫瘴。而解

盛毒。平胃同能消。嬰。痘。瘡。磨水服。亦療。疳。大百

病。陰虛內熱服之。反令真氣虧損。

陳皮八十 留白和胃。補脾。去白消痰。泄氣。利水。設以

寬。膚。肺。逆。寒。邪。以去。腹。疼。青。鹽。製。則。痰。下。嗽。寧。白

木。同。則。嘔。除。吐。止。佐。甘。草。而。補。肺。倍。桑。皮。而。瀉。金。

携。杏。仁。以。疏。大。腸。之。氣。滯。拉。桃。仁。以。通。太。陽。之。血。

闕。亡。液。自。汗。諸。症。畏。其。辛。散。不。守。核。治。腰。痛。痛。痛。

葉。主。乳。癰。肺。癰。須。知。血。症。勿。用。氣。藥。恐。迫。血。妄。行。

也。氣。症。勿。用。血。藥。恐。滯。氣。不。行。也。

藥鏡八十 行血積。散氣滯。鬆小腹之疼。推痰癖之塊。

引諸藥至厥陰之分。下飲食入太陰之倉。而後肝

邪能損真氣。消癰瘰。熱其結。毋須同煎。甲人參。止

左脇。鬱。怒。作。疼。佐。以。川。芎。肉。桂。臣。芫。胡。能。平。兩。脇。

刺痛。醋。炒。為。佳。若。芍。藥。又。伏。火。動。膽。經。亦。須。膽。製。

助。土。平。木。劫。痛。明。眸。要。治。諸。驚。暑。加。更。妙。嬰。孩。消

積。宜。投。汗。多。汗。過。勿。施。

厚朴八十 苦能下氣。實滿去腹。腹消。溫能平氣。濕滿

清。結。滯。散。和。胃。而。山。嵐。之。瘴。屬。以。平。溫。中。而。甘。肥。

之積聚以錄。定痛。于骨。止吐瀉。于濕。或療水
土不服之時。災。為老弱。三焦之元氣。逐陽分之風
邪。而除寒。退熱。驅腠理之寒濕。而氣順血和。若夫
氣血。渾而肌肉死。最能開發。風火。鬱而三蟲生。更
能宣散。

檳榔八十走後重。殺三蟲。化宿食。而墜痰。破滯氣。而
逐水。絕山嵐瘴癘之氣。汗杜濕熱脚氣之冲心。

大腹皮九十疎胎氣。之有餘。定霍亂之吐瀉。能下氣。氣

下則脹自寬。善行水。水行則腫自退。致中土舒暢。

藥錄卷一 二十六

故云開胃健脾。消痰飲喘嗽。不讓葶藶蘇子。然其
性品非屬循良。涉虛者亦忌用也。

阿魏九十破癥積。而辟惡氣。却見殺蟲。傳尸可滅。

五加皮九十祛肝腎之風濕。而瘦痛脚疼。補氣痺弱。

俱治補中焦之虛羸。而堅筋止瀝。益精耐老尤功。

山茱萸九十治頭目昏花。起腰膝委軟。滋精氣之遺

滑。補腎氣之虛寒。陽不興。齒不固。塞在鼻。聾在耳。

竟請試之。

杜仲九十聯絡筋骨之離。復生精髓之竭。脚膝痠疼。

不能踐地。煎入黃耆。蒼朮。而見功。腰腎虛弱。難下
床。關丸。用棗肉。大實。而更妙。與牡蠣等分。湯調。卧
下。治病後虛汗。及目中流淚。炒一味。去絲。酒漬。朝
服。治風冷傷腎。致腰背虛疼。

宣木瓜九十行肝氣。主霍亂轉筋。和胃氣。止吐瀉。腹

痛。腰腎酸軟。脚膝無力。宜施。治風水腫。清暑濕。痺

須用。從胃滲入膀胱。日久成淋。故曰氣脫能收。扶

土。以瀉肝木。脾胃肺健。故云氣滯能調。

龍腦香九十芳香走心腹之實邪。而積聚。驚癇。在腦

痰氣可解。辛。無。燥。骨。節。之風濕。而目翳耳聾。喉癢

鼻癢。俱除。若肉分風熱。勿施。鴻後。慢脾。最忌。凡熱

瘴氣。閉諸症。皆火鬱也。火鬱則發之。從治之。法。惟

辛溫能發散耳。

牙皂九十辛散利竅。主風痺死肌。而咳嗽。停。勝木者

金。主頭風淚出。而囊結。解。搐鼻。噴。嚏。立。至。敷。腫。瘡

痛。即除。和生。禁。可吐風痰。并熱。寒。程。為。導。前。皂。角

之刺。亦能利竅。通關。直達。滯。所。更。會。消。膿。消。腫。錄

一。盡。毒。肌。然。醋。成。膏。塗。毒。最。效。

九
十
八
傷胃之垢膩則心腹痠痛

久之穢汚則腸風血痢。削本獨核肥皂配藥與巴

豆燉同蠟梨頭瘡湯洗以油調抹好。

善走血分使火毒透發心經總運胃脾

令癰瘰頭高肌裏宜瘰癧之首尾功十倍牙核取

櫻桃。倘熱甚。毒多。舌生芒刺。大渴謔語。癰色紫黑。

者。三黃石膏湯內加入大效。亦治年遠新近諸風。

更療驢馬熱血噴毒。

能益血養榮。然助火發熱。其核入腎肝。乘

卷二十一

滯氣。主心痛。辟寒邪。熱痛以黃柏。同寒痛以肉桂。

配。

通血脉。潤肌膚。食積刊。命門補。同胡粉可。

納髮孔而黑重同松脂可敷瘰癧以散結生髮搗

與破故紙同能益精延壽帶青採而全假酒服治

魚口便瘡須知胡桃故紙合幫腎命蓋十二經之

恨本全在命門兩腎育精血而惡燥若腎命不燥

精氣內充則飲食自健肌膚光澤臟腑潤而血脈

陽矣夫命門既通則三焦利故上達于肺而虛寒

喘嗽寧下冷乎腎而腰脚虛痛乎內而心腹諸痛

外而瘡腫諸毒俱安耳

除伏熱風濕而痺燥療癰疽惡瘡而殺蟲

松子益氣補虛松花心清煩解松葉生毛髮去濕

風凍瘡灸晉松節可釀酒嚼脾痺骨節久風

消年深之堅積而殺三蟲散鬱血之久終

而清濕痺。

蟲殺其三兼治風寒濕痺救瘡與積且醫

冷滑大腸取仁推入蚯蚓牙蟲作漏直已。

酒 卷二十九

開胃氣酒後細嚼相宜化鯁喉抓破汁塗

痕滅能解河豚之毒青心膠傍核醫凍瘡之瘡爛

灰油傳

能健脾使食自消而氣自下能和胃使中

自煖而熱自除

酸飲壅熱逆血溫行故主胃脘氣疼癥瘕積

聚產後血運去瘀生新血虛藉以收神疼咽痰涎

能逐和蚯蚓屎可傅驟腫于周身磨青木香可止

猝爾之心痛鼻中血治同胡粉蛇蝎咬治伴雄黃

席南星以全蠍。漬黃藥以療口瘡。飛麴調劑。是
建腫也。石灰和法。非狐腋哉。酸能助肝。賦脾。脾病
筋病均忌。

紅麴一百 養榮清血病。相求在同氣之倫。消積健胃。

脾活血。奏和傷之驗。妙入六一散。日下三服。濕熱

泄痢者。盜去而邪寧。同香附乳香等分酒過。心腹

作疼者。氣調而痛致。

糯米一百 溫補脾胃而瀉痢止。煖益肺氣而自汗。數

要之。梗去濕而健脾。糯滯氣而生濕。多食梗則腹

脹而噯氣多。食糯則胸悶而吞酸。功過各異者也。

飴糖一百 少用能補脾潤肺。多食則動火生痰。如誤

食稻芒。藥過悶亂相宜。凡中滿吐逆。酒病牙疳均

忌。

大麥芽一百 萌蘖機生。育長元氣。代脾化食。助胃消

痰。挾半夏耗上焦之血。隨澤瀉。清下腎之陰。一味

妙服湯下。能令產婦乳開氣暢。甘以補之也。乾漆

同煨酒服。更令產婦腫退。療消腫以軟之也。

神麴一百 脾胃健。穀食消。蒼朮相均。治痞滿水泄。燒

紅萍酒治食積心寒。作糊丸。痰藥氣和痰化。作糊
丸。嗽藥。咳止嗽停。蓋痰與嗽俱因氣動。上逆所致。
神麴。花。順氣而使脾寧。則脾胃之津液。四布而榮
筋脈。何嗽之有。

白菖蒲一百 專清暑。故和中解毒而吐霍亂。極補脾。

故治痢除濕而調血。腹藥。王蛇咬蟲傷。花。主赤白

帶下。栽莖花。蒸。揉。藥。全。敷。

靈砂一百 鎮神寬之。發越。而邪惡。諸消。墮陽氣之暴

塞。而血脈循絡。反胃。經年。頓定。小兒驚吐。或疑。

藥鏡一百 溫。卷一 三

礞砂一百 辛散苦泄。解肺分火毒。喻化燥津。治喉中

腫痛。兼消目翳。障睛。更除燈翳。糊胃。

甘石一百 通血脈。散熱風。煮以黃連。佐以龍腦。點

目而赤翳消。孩兒茶佐。醋先淬煨。油調而下。疳抹。

慈石一百 養腎氣。聾耳可通。填精髓。日皆可亮。蓋以

性能攝鐵。善引肺金之氣。走入腎宮。使子母相生。

則相火不攻。自去。故。治。如。右。也。

雄黃一百 稟太陽之精。佩孕婦轉女成男。辟陰崇之

擾。解百毒。中人腫痛。散肺經之氣結。而鼻通。道去。

積滯于大腸而癰氣閉。通行氣血。接骨續筋。燥濕。
殺蟲。瘡家要藥。

赤石脂一百九降火益血。則陰能養心。而目明。心氣攝。

收。則與腎下交。而精補。甘溫能通血脈。而癰疽可。

平。然酸澁又能固崩漏之虛脫。達下能除濕熱。而。

瘡痔易瘳。然體重又能下不落之胞胎。蓋降而能。

收者也。仲景桃花湯。治下痢膿血。佐以乾薑。粳米。

取其入下焦血分。而溫補腸胃。白石脂色雖不。

同性。情功效實無不一。

藥鏡卷一 三十二

花蓋石一百二十能下胞衣。亦落死胎。枯末傳金瘡之出。

血者。使不作膿。火煎治產婦之血運者。使不上泛。

瘀血停留。宜服虛火妄行忌之。服後令人火虛。急。

以補劑培助。

礞石一百二十鹹苦入血。軟堅。潰癰爛肉。辛溫散結除冷。

瘕破毒消。目翳努肉。其誰掃。杏仁淨汁。面上疣痣。

同誰點。鐵錫礞砂。

紫石英一百二十散氣結。而補心神。溫子宮。不令嗣絕。醋。

泔可敷癰腫。水煎亦治瘕瘕。

髮灰一百二十入心。除熱。而小水淋瀝入腎。益陰。而膀胱。

通利。和血結之痛。散氣閉之腫。立止。漏崩鼻衄。煎。

膏拔毒生肌。

雀卵一百二十四補緩兩腎。則精足。而陰痿強。通行下焦。則。

氣降。而帶溺利。耳聾。主以雀腦。頭血。即主雀盲。雄。

雀善散消。宜外用。頑癰難決。入藥。搗頂。可以代。

鍼。速效。豎眠。櫛并綿包。待其驗。驗者生男。乳調點。

琴肉。攀睛。頓除。

阿膠一百二十五安血。虛胎動。止血熱吐衄。定痿弱之喘。止。

藥鏡卷一 三十三

休息之痢。筋帶。宜投。痔漏可入。同葱白生蜜。滋潤。

老人之燥秘。同天冬生地。培扶肺腎之枯虛。治肺。

痿。同桑根白皮。入痢藥。並積。即枳殼。

辟香一百一十六殺三蟲。去而驅。癰疽疔瘡。如神。骨髓透。

經絡。開翳膜。淚眵多效。水研服。可消口內肉。甚清。

油。調可灌中風不省。催逆生難產。而易落。療鼠瘻。

蠶咬之成瘡。同生桂末。以飯丸。那怕食諸菜。而成。

積者。作脹傷脾。得天竺黃。與金箔。何憂。夢鬼交。與。

鬼症者。急驚中惡。風侵骨髓。用此。即消邪。邪在肉肌。

服之反入

霞天膏百二 滲透肌肉而皮膚流注之痰結消搜剔

竅毛而中風偏廢之痰迷醒

白馬溺百二 攻癥瘕伏梁平絞腸急痛收疝毒尿浸

三朝炒末研點牙印落

海螵蛸百二 入肝養血而除崩帶入腎益精而消陰

腫加片腦點去赤白目衣加麝香吹止耳瘡膜出

妙蒲黃同末已舌腫之血流乾腦脂油調停臍瘡

之痰血

藥鏡

卷一 三十四

五靈脂一百 破血矣臨產生用少腹氣能行止血

矣吐衄炒加崩漏血痢可止胡連蘆薈疳積之眼

同功沒藥乳香心痛之病混用痰血凝結血氣刺

痛木香半夏同煎眼白混黑血潰怪病單末二錢

湯服然不但能治血兼能去風衝任經虛風襲榮

血以致崩中暴下與荊芥防已治崩義同

白蠟一百三 治中風失音喉中痰若錫響王膚瘡

瘰癧身上瘰似蟲行搗搗定點黑漆小兒驚癇夜

啼女子崩中赤白助肺氣除風濕有功平相火拔

疔毒極效痘家用之干解毒藥中喉痺用之干則

桔湯裡生熟白礬同吹急喉風痺炒研入蜜調敷

通白口瘡晚蠶蛾岡熬滑而能壯陽驚交不倦兼

敷玉枕生瘡三熱沙去風濕而起頑痺癰疽可立

亦治血崩瘰癧紙上種微血熱生風順和磨入聖

灰牙疳羅喉俱效老蠶皮蛇痘瘡目翳並施存性

末吞掛腹穿毒最速

全蝎一百三 治小兒驚癇驚癇酒炙入磨磨風口瘡

皆醫療大人中風癱瘓最效薄荷風痰耳聾俱效

藥鏡

卷一 三十一

蜈蚣一百三 治腫毒癰瘡並退祛寒熱而溫瘧自

平去惡血腫婦人未產之胎搜邪風療小兒急驚

之怪炙研水下解蛇毒於蝨南猪膽末調全天蛇

於手拈

藥鏡卷之一終

將儀蔡定

常體參訂

熱部

黑附子一理六腑沉寒。浮而不降。療三陽厥逆。走而不
 停。合氣藥以暖胸家。而吐瀉立止。同血藥以逐
 陰分。而肌骨能堅。祛止焦之風寒。則致逆嘔。厥
 也。祛中焦之寒邪。則腹痛霍亂治也。祛下焦之風
 濕。則發瘧拘攣治也。祛血分之虛寒。則藏癰瘰癧

藥鏡

卷二

治也。四逆湯用炮同陽矣。理中湯用以扶脾矣。八
 味丸用之助命門火衰。以生脾土矣。金匱丸用之
 平水泛膨脹。以定痰喘矣。理龍丸取其直入少陰
 補諸虛損。隨竭精枯矣。真武湯取治太陽多汗。水
 反陵心。肌肉跳動矣。若傷寒直中陰經。陽虛氣弱
 之病。奏捷無雙。倘陰虛內熱。血少溫疫厥逆諸科。
 殺人匪細。有如湯劑。冷飲其說何若。蓋以陰寒在
 下。虛陽上浮。治以寒則陰甚。而病增。治以熱則陽
 抗而不納。熱藥冷吞下。噬之後。冷氣既消。熱性於

發不違病情。而曲盡藥力。經所謂熱因寒用。反治
 之妙也。

乾薑二脾胃之寒結開。心肺之冷嗽散。熱為血虛能
 止。血因冷滯能行。擔痛嘔之結陰。扶脈絕之陽痿。
 生逐寒而散表。炙溫胃以守中。若黃連瀉陰火。配
 歸黃疏痞氣。痘家灰白。用以更容。至若吐衄崩淋
 諸般妄行之血。反佐黑薑以止之者。何也。蓋物極
 則反。血去多而陰不復。則陽無所附。得妙薑之溫
 助。陽之生。則陰復而歸于陽矣。奚不吐乎。

藥鏡

卷二

草荳蔻三。瀉腹痛而嘔吐息。散脾寒而脹滿消。寒飲
 藉以導疏。冷氣仗為溫解。消中焦之積滯。解人入
 參養胃之湯。治寒瘧因氣虛。同彼棗薑與熟附子。
 白菴清高。草蔻燥急。端主風寒客邪之在胃者。
 佛耳草。下痰作喘。能祛肺脹。止哮喘嗽。大救金寒
 破故紙。起陽衰。燥陰濕。利婦人之血氣。益男子之
 髓精。止腎冷之精流。補腎虛之腰痛。腸鳴泄瀉。應
 用下虛上實須遵。氣燥浸蒸。理宜久風。津枯火盛。
 誰敢少投。加肉菴木香。宜虛寒泄瀉。胡桃剝肉皮。

褪泥研煉蜜爲丸數錢酒下明眸益腎功補岐黃
牽牛功尚水氣化生屬火退腫滿追蟲追積通二
便胞胎會墮除壅滯氣急破痰癖癰瘰若氣中有
濕熱暫泄肺邪倘濕熱在血家誤投金損欲入氣
分枳殼引而須藉木苓芍藥以固氣之真元則牽
牛僅瀉其氣分之邪也欲入血分大黃引而須使
芍歸芍藥以養血之原本則牽牛僅瀉其血分之
邪也許考其效則又達右腎命門直走精隧李東
垣用治下焦陽虛以鹽水炒黑佐沉香杜仲故紙

卷二 三

官桂諸藥深得備瀉兼施之妙

大蒜止霍亂轉筋除吐瀉脫痛溫中消食解毒散
癰生用則破熱用則補多食則血耗目昏且肺傷
脾損燒熟獨頭蒜綿裹納下部兩便氣閉立通割
皮生搗爛餅貼足心鼻血流紅自任
肉桂入腎經以驅下焦之寒滋行肝氣以解一切
之筋學破癰瘰可消瘀血通月水可墮鬼胎治心
腹痛之錄犯寒主腰膝災之因胃冷得朴硝歸地
捷下腹中之死胎得牛膝當歸用開冬月之交骨

蓋肉桂桂心治寒邪客裏諸症也

桂枝九辛散投肺甘溫悅脾煖榮衛發傷寒之風邪
邪祛表密而汗自止開腠理散皮膚之風濕濕去
頭清而痛自除輕浮上焦以泄奔豚橫行手臂以
止麻木又追痛風于肩背更逐痛氣于膀胱痘家
活血藥中少加薄桂一二分則血行而痘自通噎
蓋桂枝治邪客表分之藥也氣薄者桂枝上行而
能發表氣厚者肉桂下達而補腎虛總之桂爲陽
中之陽壯年火旺并體熱姪婦忌服惟命門火衰

卷二 四

不能生土完穀不化及產後虛弱是聖藥也

吳茱萸通寒寒之咽喉開胸中之冷閉厥陰頭痛
用以引經權用下濁氣之亂於心胸少用攻勝脫
腫疼之寒疝吞酸嘔吐是火非宜腹痛腸鳴屬寒
堪劑單煎熱服發汗于冬月之感寒少許加鹽錄
分于脾泄之清濁寸白三蟲作惡煎服頓服快療
二便格闕口舌立解雖云治痛最捷然痛在中脘
者生薑治之痛在脾腹者乾薑治之惟小腹少腹
痛者須此陰經至陰之藥也若痛久而火動于中

少添黃連為妙

川椒十散風邪除六腑之寒濕脾胃煖補相火于命

門烏鬚烏髮聰耳明眸君以補陰涼血之藥心腹

冷疼脚氣寒濕用彼布包火熨之方單服於空心

收輕粉水銀之毒同煎於葱白浴囊疥癬之蟲

虻動吐嘔炒加則頭伏腎氣上逆引用則歸經消

傷飽停食之成痞下感觸楊梅之流禍食物拌鹽

毒除辟穢椒目下行滲道不行殺道故能瀉水燥

濕定喘消蠱炒研酒下腎虛耳鳴崩帶腫滿均可

治也

巴豆十稟火性之急速兼辛溫之散賦削堅積而瀉

臟腑之沉寒利閉塞而通水穀之道路單炒使黑

烟將盡癰疽腐肉之不落者傅之燒燬與白糝共

灰天絲入咽而生瘡者吹入熱毒之性對待陰寒

太過堅凝閉塞而陽火潛消死灰不活者何也下

順水性熱助火氣一用而兩得之其功獨也若夫

水土金水之不及縱有可下之條服之則木抑而

脹土陷而廢金燥而炎水涸而結矣

卷二 五

酒十三領百藥之長血脉通行潤衆體之膚和氣辟易

醇酒吹兩鼻治鬼擊如刺諸疾任量飲至酣解馬

氣入瘡腫痛瘴癘驅穢結解榮養功高煩懣散藥

力幫悍怡情妙過飲則熾相火濕中之熱叢生肝

因火而喘痰脾因火而困倦胃因火而嘔吐心因

火而昏狂肝因火而怒加驚因火而忘懼膀胱因

火而精枯甚者癆嗽吐衄流瀉靡涯要之嗜酒者

頻醉而生濕熱宜寒藥以散之量淺者偶飲而解

受濕宜溫藥以行之

藥鏡

卷二 六

硫黃十掃疥癬禿頭除腹脇疥癬脚冷衰痿是命門

之火弱也惟酸補之餘蝕疽痔為下焦之濕氣也

惟熱能散

硫霜五風痰可吐截癰除哮喘更善落胎殺蟲枯痔

毫或用多必毒入磨萊豆而水飲之庶幾堪解

紫河車六先天稟氣諸虛百損勞五傷七之仙丹後

天成形益精補血陽助陰生之上藥搗末并骨俱

可蒸養火候須知甘草升麻納瓶同壅年久化作

清泉丹滲狂言髮墜虛病諸熱飲來宜真

初生胎帶十乃真氣目聚故補元益腎胎毒胎熱燒
灰與膏久瘡虛寒般末昇飲

人牙齒入痘瘡為風寒外襲紫黑倒陷者用之可使

熱令復行若昏沉而伏毒在心氣虛白弱者誤投

反致鬱悶聲啞酥調煨米作膿易消于乳癰山甲

同研陰疽疔起其沉點

鹿茸十振下元之真陽而小便不數通周身之血脈

而腰脊止痛熱蒸骨蒸服之自平血去弱崩殺之

即應髓腎虛寒同煨以壯陽生地同煨以實骨去

藥集 卷二 七

鹿角解于夏至是以補陽而鹿角解于冬至于陰

有裨故鹿角而入左腎而鹿茸力更勝之

鹿角十水磨服治脫精尿血醋磨汁塗瘡癰腫蒸

成白膠不惟補中益氣且療吐血勞傷不惟止痛

安胎亦調血崩淋帶同川芎上補面部之血同歸

芎中補脾胃之血同熟地能固下腎之元同槐花

兼止大腸之紅痘家熱炎熾盛以致真陰灼燥加

之於涼血解毒藥中則養陰而陽自退矣

虎骨壯筋骨而見驅風之力強腰膝以奏補陰

之功治驚悸及犬咬逐寒濕于經絡若血不足以

養筋以致筋骨疼痛者宜少用之

蟾酥二十疏九竅發臭汗清積殺蟲力主溫緩通行

拔疔散毒義取以毒攻毒入藥依方外治殊有神

効煨製如法內服勿過三釐

藥集 卷二 八

藥鏡卷三

嘉善蔣 儀纂定

男詮泰訂

平部

甘草 健胃調中助氣補血和腹中之急痛緩諸藥之燥寒火毒之瀉飲資癰腫瘡瘍取其節消嗽之醫是賴胸熱莖痛取其稍附子理中湯用防僭上調胃承氣湯用虞速下膈上痰癖何以泄之十棗飲中大黃同使項下結核何以消之潰堅湯內海

藥鏡

卷三

藥並加雖云中滿忌泄下焦勿攻然不滿而多用大甘爲之補也兼散表寒中滿而生用細甘爲之瀉也且除大熱經云以甘補之以甘瀉之以甘緩之蓋甘位乎中可上可下可內可外權變合宜方能盡其升降浮沉之妙耳

麥門冬 清心火之有餘克停血熱補肺金之不足氣短能長佐人參爲生脈之方祛暑蒸之熱嗽君五味爲滋化之本理水泛之寒痰蘇厥性之微寒去肺家之伏火夫火去則肺金凝凝而生水水盛

則心清而神靜矣蓋陽明經濕熱昌熾蒸于肺發爲痿癰治痿獨取陽明是究其本經言麥冬治痿抑亦尋原之論乎

百合 潤肺咳血以停散癰諸熱得解退腹內之熱則服消蘇心內之煩則煎散腎王二便熱去則便水津淫甘能補中執清則氣海充盈洋後血狂可鎮顛邪膽惑能澄香隆子夜夜服之而功多畫茹之効或也

桔梗 載諸藥以上浮引諸藥而入肺理濁氣風清

藥鏡

卷三

以寬膈服散風邪痰嗽以止喉疼鼻塞能通音啞可亮合童便燒痰嗽喘急夾甘草治肺癰吐膿婦腹疼煎生薑而同服小兒客忤研燒末與麝香欲中緩而上行亦須甘草欲寬中而下氣無如枳殼肺氣鬱在大腸則痢疾而腹痛用苦梗以開提傷寒寒實結胸同貝母與巴霜以溫中而破積總

是苦以泄之辛以散之紫苑 苦入心而泄痰火辛入肺而散滯氣所以肺痿立瘳膿血不從口出也同馬牙硝以噙嚥開經

風之閉喉。同天麥冬以卧嘗劫久年之血。改色白
味辛者。謂之女菟。治女人小便辛不得出。赤王腸
中積病以致面黑者。蓋面屬陽明經脉所榮。逐腸
中之陳積。面色自開。此亦治肺鬱之一證也。乃若
驚癩寒熱。當用青菟。膀胱久寒而支滿。當用黑菟。
臥酒夜食而發病。當用黃菟。各以其色相從焉。

藥鏡

平

卷三

三

蓮實。清心醒脾而止瀉痢。補中益氣而療瘦精候。
過經霜。破房鹽水。是白石蓮。尤治心虛赤濁。噤口
久痢。蓮鬚清心而吐血平。益腎而精氣固。蓮房通
達血脉。勞怯吐血者。煨灰與服。荷葉生發陽機。痘
瘡倒靨者。配藥同吞。又葉象為震。所以能愈雷頭
風。也能散血。能消渴。其煮飯也能升提胃氣。葉蒂
偏能守中。安胎行血。藕汁去胃家之熱。渴則飲之。
藕節瀉血中之火。鯽則搗之。生禾有耗血之譚。燕
食有肥膜之語。

大實。入善補。脾胃使土得其宜。則水不受尅而火無
盜食之虞。非安心腎。使精氣有歸。則白濁自止。而
夢無遺泄之患。同杜仲理腰膝之酸疼。又醫脾濕。
同甘菊。絡聰明于耳目。更使志强。

黃精。甘入脾而補中。潤入肺而益氣。惟其中氣強。
脾胃實。故能除風濕而壯筋骨。填精髓而耐寒暑。
實勝葉根。花更勝實。尤膏堪釀酒。散並宜。至若美
容加壽。輕身隨穀。必俟久服。修鍊斯獲。茲勸。

藥鏡

平

卷三

四

丹參。養心神而煩悶解。扶肝氣而風熱除。補腎之
虛。使志定而骨壯。行氣與血。醫眼赤而消癰。熱酒
調吞。寒痛頓乎。并少腹及陰。相引痛者。酒煮溫服。
墮胎立穩。且調經破瘀。兼補新焉。
釣藤。直走心肝。則風靜火息。清理藥熱。則惺痴定。
驚。
牡丹皮。清腸胃之宿血。行積聚之瘀紅。止腎蒸無
汗。除血中伏火。調胎前經脉。下產後胞衣。癰疽用
之。消腫止痛。痘家用之。涼血排膿。清胃湯中止牙
疼。快癰湯內散血熱。何也。為其養新血而攻陳血。

固真氣而行結氣耳

大小前三涼血且行下氣兼補故女子赤白沃血熱
及吐衄者皆可療也根葉生搗其汁童便并入酒
中膠離臍毒如水救火跌撲血運亦可治者大前
功多小前功遜

能涼血濕熱之赤痢腎能補精腎虛之齒痛
漆汁塗眉髮生速而繁膏點鼻中停疼益腦灸針
發疾傳之立平脾胃虛糜誤吞成痼青嫩車前等
分杵汁煎溫候餓時而頻呷小便紅弱徐收單令

藥鏡

卷三五

瓦上焙研酒液米湯和微末而使吞持漏腸風兼
治

王不留行五逐痛出刺除風散寒偕止血之藥以療
金傷紅放離毒兼消同涼血之藥以治鼻衄心煩
難產并救古人命名之意謂彼能王一身之氣血
留行惟命無異于王王不留則氣血之留者行矣
王不行則氣血之行者留矣若夫血出不止與難
產無乳者不既反乎彼此咸宜義益取此

射干十降欬逆散老血于心脾化熱痰消咽喉之結

核佐利劑以平便毒伴驚甲以除瘧

天麻七至頭風痰氣之眩火症非宜豁風癰痰氣之
迷又該驚悸蓋肝主筋位居下辛暖入肝逐風散
濕故能利腰膝而強筋骨活血脈而療癰疽

甘菊八補水以降火火降則熱除益金以平木木平
則風息故能利一身氣血逐四散遊風止淚淋而
鎮平煩熱頭眩祛目翳而散平膚濕風痒地黃同
釀變老人皓首成溜湯其葛根解醉漢昏迷易醒
木賊草九伐肝邪則血生而目翳自退益血藏則木

藥鏡

卷三六

平而崩痢是醫去其節而烘過發汗至易治火鬱
及風濕升散不難

決明子二除肝熱目疼療翳膜淚出研糜塗腫毒貼
腦止鼻紅穀精草與猪肝同蒸痘餘目翳無憂菊
黃花與甘草並煎怕熱羞明收炤

獨活一善行血分能飲能舒治頭項腰疼奔豚瘕
疝散癰瘰運眩牽痠濕痺君荆翹解下身之癰毒
王蒼朮治兩足之濕腫佐黃蘗血崩之止如神君
查根痘毒之祛極效獨活氣濁而入少陰助表而

榮衛古方羗獨聖用厥旨深哉

能入氣分可散可升。驅肌表之濕風手足

太陽並入和周身之痺痛。巨陽疽腐兼廖足太陽少陰經頭痛乎。當與川芎並駕。足陽明少陽經口斜者。泰元可與偕焉。目症用之而治羞明癢流。腫痛難開。風疾用之而治痿痺癱瘓。厥逆強仆並蒼木理風濕甚捷。佐麻黃開腠理堪誇。

十 清暑而除熱解肌而散邪。腠理之通。功居

卷三七

第一痘瘡之起。效實無雙。酒毒消于熱蒸。熱渴解。應搗汁。其汁之寒涼也。專理天行時疫。熱毒與吐。餌焉。其粉之甘冷也。善解酒後煩熱。二便之燥結。惡葛葉療金瘡。葛穀主下痢。葛蔓煨灰。喉痺單方。如傷風溫熱二症。既經發汗。而表邪不解。必須乾葛之甘寒清肌。以退熱。假令悞用辛溫。必致多汗。亡陽若邪在太陽。未入陽明。棄辛溫而用甘寒。反能引寇入裏。倘斑疹已呈紅點。湯名禁用葛升。恐表虛反增虛爛耳。

主腹心熱脹能止渴生津甘蔗除熱和

中消痰解渴助脾氣而清酒毒治噎隔而潤燥便
黑沙糖功遜于石蜜而甘溫過之助熱且濕多食
齒傷其鱈魚疳蟲孕育吞同鮮笋療積成
風腫癰瘡佐黃蘗君故紙崩漏殊功作槐花使條
芩腸風立效襄非汁墮鬼氣虛胎協五靈解兒枕
骨痛吐衄唾咯者血熱妄行也妙用旋疹凝積癥
瘕者血瘀亂聚也生投卽破

卷三八

荆三稜二十破血中之氣年深堅積以除具斬關之
 能麴煨醋炒可用小兒驚癇疳癖人參同煮蒸美
 呷之婦人瘀血作疼胡索靈脂地歸君式
 牛膝二十一引血藥行于腰膝痰上盛而益下虛引補
 藥入于腎肝填髓虧而通經閉益滿肝則筋舒血
 活而痿痺之體屈伸益腎則膀胱氣清而化中之
 痛和緩得杜確歸地立下胞衣得加皮碎補風除
 鶴膝竹木刺肉嚼爛多堆老瘡久纏單煎連服辛
 中不識惡毒搗生根敷上卽瘡尿管澀痛幾厄真

濃酒飲之立愈。婦人血瘀血凝。遲留月事。並有血
動。產母血運血虛。兒枕痛。疼。咸能奏效。他如痰封
喉閉之症。同明蘇少許。搗爛取汁。仰卧滴鼻。男左
女右。須臾痰涎湧出。更有一法。雄土牛膝一兩。同
真麝一錢。搗勻。鎔蠟。搓成長條。插入陰戶。曉時墜
胎所不宜者。彈虛氣陷。腿膝痠腫。并能屈而不能
伸。立諸症也。

菟絲子二 入腎少陰。至和至美。虛可以補。實可以
瀉。寒可以溫。熱可以涼。濕可以燥。燥可以潤。能煖

藥鑑

卷三 九

子宮久冷。兼救陰痿淋瀝。續傷養肌。虛腎寒精正。
治強陰。堅骨。膝腰冷痛。兼攻。君以蓮實。著黃人參。
實脾止泄。借以甘菊。殺精草。肝養脾明。生碎其

苗。面斑可滌。

石解二 上平。胃氣虛熱。而吐噦。兼致。下補腎經。勞

弱。而崩帶交更。溫子宮。多生孕育。強腰膝。免致偃
僕。定志卻驚。善散冷閉。夏月酒蒸一味。代茶泡飲。
多功。

姜藟三 質性醇良。氣味和緩。虛寒勞瘵。最效。風溫自

汗見長。故其于陰精。則滋益。能使虛損之火息。而
目痛皆爛。上盛下虛者。適平于陽氣。則加增。更令
室中之寒祛。而濕注腰疼。風淫四肢者。盡解。若夫
為養氣為駐顏。為益血。數效全功。必須同黃精。同
桑椹。同首烏。諸般製藥。

石龍芮三 主腎冷。而遺精難禁。祛濕痺。而痛癢不
知。通關節。為拘攣之用。平胃氣。為吐逆之施。

草薢二 苦以燥濕。則風熱不生。而膀胱宿冰自去。
甘以益血。則榮衛相和。而遍體頑麻可醫。若下部

藥鑑

卷三 十

風濕。因而腎虛。以致腰疼者。宜服。倘陰虛火熾。因
而溺瀝。以遺莖痛者。勿咀。去濁分清。可療白濁。
白及三 辛為金味。收為金氣。故損肺之吐血。能醫。
洩熱者。苦散結者。辛。故癰疽與鼻。能療。

通草四 引氣上達。瀉肺明目。故能喚乳汁。引熱下

降。行經散結。故能消癰腫。善排小腸之火。鬱。兼導
膀胱之水。閉。解煩噦。開耳聾。打起脾氣。嗜卧。出聲。
音通鼻塞。催生難產。鬼胎。

木通三 利諸經之氣。氣滯心疼者。大把加煎。並定

驚悸瀉小便之實。火寒濕腫者。斟酌量用。兼導開
淋君火為邪。宜用木通相火為邪。宜用澤瀉。水
雖一用各有差。蓋木通能瀉丙丁之火。則肺不受
邪。上流開導。惟水源既涸。則津液自化。而諸經之
濕與熱皆由小便去矣。

茵陳蒿三十專理漫便。膀胱對劑。蓋疸因脾濕而脾
惡濕。乘水瀉則濕消。濕消則土厚。而疸自愈矣。山
茵陳亦能除濕。結熱尤清。蓄血發黃非其所宜。
防己三十消腰脚之風濕。喜于下部多功。治手足之

藥錄

卷三十一

禁聲虞其亡血遺害。去下焦腫痛。膀胱中之邪火
必須如熱鬱肺經。津液有不行者最忌。

土茯苓三十去風濕。健脾胃。風濕去則筋骨利。脾胃

健則榮衛從是以去濁分清。能解輕粉銀硃等毒。

與陽釋痺。兼瘰癧。瘰癧結諸瘡。

金銀花三十解肌膚之疔瘡。消毒排膿。王血痢之熱

煩。頻嘗益壽。藤有忍冬之號。益血和中。膏發稀痘

之丹。內癰兼理。

燕脂門浸汁滴耳。耳聾。解痘毒。咽喉眼背痘。乘肝

殺。尚兩易位。乳拌勻塗。嬰孩驚口。自轉清寧。破裂
見乎乳頭。同蛤粉而傳愈。腫痛并乎漏瘡。勻猪脂
而搽平。

蓖麻子四十性善吸而能收。力能通而走竅。無名腫
毒。刷可立消。口眼喎斜。敷之便止。塗脚心。胞胎立
下。塗顛頂。腸產提收。惡沫滿中。水研服吐。而水盡
愈矣。瘡瘍遍體。榨取油塗。而風熱除矣。同紫背天
葵等分水煮。嚼吞。看消瘰癧。同羊脂。麝香。山藥。麝
膏。貼。亦治偏風。

藥錄

卷三十二

商麻子四十妙未審。調單服。統治冷熱病之赤白痢。
肝蕪炙。磨吞。兼醫翳膜。眼與倒睛。謂羊毛。麝。日

久無頭。咽下一尖透發。

茯苓四十赤入血。分滲濕止泄。白入氣。分下氣化痰。

畏防土陷土實。而痰消。疏通水溢。水消而腫退。單

用有伐腎之虞。兼用有益腎之妙。唐為末。調服。火

湯。能療血虛。心肝合黃蠟。細咀。茶下。卒然聾耳。能

腎。同椒目等分煎吞。水腫溺數。可治。倍生地。以炙

膏。趁空心而鹽飲。則入封心。腎氣虛。夢遺白濁。痘

將灌漿者禁用。恐利水而漿不能灌也。若見水白
泡以升麻汁製用。取其散表以利水也。若見紅紫
泡以茜草根製用。取其行血以利水也。蓋脾惡濕
小便快利。自然除濕。脾然濕既祛。津宜少。何以
止煩解渴。良繇白爲金色。脾部能培得補肺金。自
能生水。且膀胱藏津液。土連于肺。得肺氣化之。
津液自從茲出耳。

茯神四十 滋化源。有養元陽。鎮靈臺。攝收魂。退虛
熱。而水道暢。消虛痰。而夢寐寧。固遺泄之不樂。症

健忘之恍惚。

琥珀四十 安魂魄。殺鬼祟。利淋瀝。速產胎。散血暈。而

日翳摩破。癥結而心痛息。與防風丹砂是佐。胎驚
者。猪乳調吞。同菴白煮汁清芬。轉胞者。二錢溫服。

倘金瘡悶絕。童便調服。細研。若傳藥其傷。使血立

停。新肌驟起。血少便難用之。反燥。古人有云。茯苓
生于陰。而成于陽。琥珀生于陽。而成于陰。茯苓稟
淺。可治氣而安心。利水。琥珀年深。能治血而鎮心。

化氣也。

柏子仁四十 入心養神。入腎定志。芬芳則脾胃所欣。

聰明。長益潤澤。則肺肝所悅。滋養枯腸。葉苦澀而

帶微寒。主諸血泊。夫崩帶去濕。痺生新肌。尤所擅

長。白皮主火灼。滄涼血。長毛修髮。枝則氣倍于葉。

而入肢節。幹則氣烈于枝。而治全身。至如肝木受

制。怒而乘其所勝。則青白之色。見于大便。驚從膽

發。法當用實。又若憂悲。嘔血。乃金情勝木所致。電

傷血脈。則葉爲恰好矣。

酸棗仁四十 補心血。益肝氣。解虛煩。于驚悸。安魂魄。

藥鏡

于怔忡。却人健忘。治人多睡。多睡因乎。瘧熱以竹

葉爲引。經不得眠。者。膳寒以薑汁爲行導。同人參

白茯苓。米飲服其一錢。止睡中之盜汗。取核煨存性。

研細水調量下。出肉內之刺芒。心若虛寒。妙研纔

妙。心有質熱。生末爲良。

龍眼四十 補心主君神。旺脾胃子榮休。故榮衛充。又能

益血。心家血滿。肝母納福。故神鬼安。

枸杞子四十 補陰血。退虛勞。除熱身涼。益腎水。清肝

火。目明。煇爛。因腎虛而眼花者。麥冬生地入青菉

緣房勞而腰疼者。杜仲芡實加牛膝。此效惟什產者爲然。至夫土產。但能除脚濕。利大小腸。清心退熱而已。

女貞實^五益中氣而安五臟。強筋力而祛風濕。伴淮生首烏能補腎虛。同益智金櫻能固精滑。蒸熟作丸。丹至老無白頭之數。化灰點髮。孔更生有絲髮之權。從甘菊蒺藜。地黃枸杞。使精彩增入。難久佐。五月早蓮。四月桑椹。返童顏。還上髦。老葉長而子黑。是曰女貞。葉微圓而子紅。俗號凍青者。但能治風虛。肌膚裨益而已。

楮實^五消水補脾。明眸聰耳。其倒汁塗癬。其樹皮利小便。葉王身熱之嬰兒。根王癆瘵之癰瘡。俱可煎湯洗浴。令瘡長肉生肌。

枇杷葉^五暑喉能和大消燥渴。兼清肺熱。喘嗽立寧。痰火與麥冬並施。反胃與蘆根同用。借以涼血。保肺之劑。定噦聲惡濁而長。佐以補陰清火之湯。調經事先期發熱。

楓香脂^五走肺燥脾而惡氣辟活血涼血而癰瘡。

平稍入輕粉麝香。摻便難之膿血。量與香灰勻和。擦年久之牙疼。

桑寄生^五善益血。能令腎氣足而腰痛除。牙齒堅而鬚髮長。兼祛濕。能令風痺散而頑麻止。筋骨健而內傷復。同當歸續斷。治血虛骨痛。并背強之兒。同阿膠艾葉。治胎動腹痛。及產後餘疾。密蒙花^五潤肝燥熱。攻目因疳。氣而翳淚俱除。花狹小密蒙。差大小花治效。大花治肝。宜詳厥用。惟眼因熱傷血分者。用之輒効。倘因氣分。及凡

藥鏡
所致非其宜矣。

卷三 十六

山槿^五行氣血而不傷。產婦洩瘀通滯。故兒枕和平。消肉積而不刻。小兒理胃健脾。故瘡瘡起發。症家不得已而用參。以此監之爲穩。至若神速消殺。食麥芽化麵。停生冷傷脾。法宜溫中。須以二陳吳茱萸配。油膩傷脾。法宜燥濕。須以乾薑半夏平胃散裏。

蘇木^五活血于內傷發熱。調血于經阻作疼。破產後欲死之血。奔散損壞難行之血。聚皂刺並用。則

聖藥腫之血死四物並用則滋骨蒸之血枯同川

芎以疎血熱而頭目清涼同紅花以行血瘀而真

陰復長

桃仁^{五十}治血熱之皮膚燥癢調血滯之月水後先

至于大腸血秘便難搗加輒利小腹血凝作痛劑

此頓平多用則苦勝破氣滯也少加則甘奪緩肝

急也若夫桃泉之爲物疎中惡腹癢殺精魅五癰

蓋其通滯散血功有同于桃仁者矣惟葉王客忤

陰尸蟲癢花性美駐顏色膠性流通淋瀝

藥

卷三十七

竹瀝^{五十}寒而經火能緩陰虛之大熱清火養血兼

宜產後與胎前血虛不食者宜加痰涎最下三陽

閉結者始服脾胃易傷小兒天吊能平妊婦頭旋

扶起解傷寒而挾痰見崇之病醒中風而失音不

語之人凡手足四肢皮裏膜外之痰加以薑汁無

微不達自汗煩熱消渴爲良若夫鉤者雖有利氣

止渴之功實不宜於舍餘毒後也

竹蛭屑^{六十}甘能解毒平則兼散火漏管蝕膿長肉

麝香膩粉同吹瘡子耳膿消加黃藥細研調搽膿

瘡濕毒無虞

猪苓^{六十}行水退腫脹清暑疏胎水蓋脾家濕熱流

入膀胱少用爲佐能止遺精然澹滲而燥大損腎

水症非濕實久服喪明

郁李仁^{六十}利小水之通而潤身之腫退亦潤大腸

之燥而氣血之結融齒痛齩疼根皮並用

瘦皮灰^{六十}苦苦能瀉熱苦又帶澀諸可固脫故

劇中帶下而兼療腸風赤痢亦治鼻衄吐衄又能

破癥消痰

藥

卷三十八

柞樹皮^{六十}能燥濕而熱除退濕熱之黃疸者也技

善下走而竅利開難產之夜骨者也

血竭^{六十}久瘡不冷敷此即收蜜陀僧與同研此藥

生肌更捷光彩透紅方爲道地引膿不任幸勿多

加

梗米^{六十}長五穀以獨尊繼先天而益氣血脈稍脆

充溢因之筋骨肉肌強健錄此小兒胎出赤肉無

皮粉蛋白梗撲敷皮慢白者粉蛋之伴粉發皮慢

生而包肉如雞慢之障物也

黑豆^{六十} 活血散^七 瓜解毒偏頭風痛宜投下氣利水

熱除產後血昏可用

赤小豆^{六十} 止瀉而水利行乳而渴消逆氣欬于甘

酸故王吐逆而排難且消水脹辛平散夫濕熱故

王卒游而健胃又助上脾

胡麻^{六十} 有益干虛羸濕痺中風更宜于大腸鬱失

燥結初生嬰孺噤以綿包而胎毒輒解殺芒刺

湯下炒研而響喉快利與蜂蜜同煎溫服孕婦服

枯難產順生與滑油生灌使吐病人諸毒臨危立

藥鏡

卷三 十九

解發膏入藥止痛排膿更有烏脂麻油甘寒滑利

夾醋煎吞疽毒便不致于其內

黃麻仁^{七十} 清胃熱而榮衛調去風熱而汗出止瘰癧

枯之經閉下乳還宜潤血燥于胎前催生更善研

汁煮粥諸如產後老人汗多便秘俱治飲汁數升

更以油浸肛門截腸怪病能瘳合沐禿頭戴生毛

髮

金銀箔^{七十} 剛鉅制木實重鎮心肝木平則風熱退

而精血自長心神定則驚邪去而五臟疏滯

銅青^{七十} 海眼暗吐風痰飲金瘡去腐肉

礞石^{七十} 壓食積墜宿痰用藥稠痰痰根實熱搥鼓

應桴概施血痰痰屬陰虛抱薪救火

人乳^{七十} 灌既陰陽元氣漸成其發育充和五臟勝

理永特為榮華點眼增明補血生彩妊婦病熱嬰

兒禁食食則生疳少女清涼老髦宜吮吮則延壽

隔湯以煉凝作乳毬則痘危虛熱之仙方也

烏骨毛雞^{七十} 五行具備故能和五臟而崩帶兼調

養血益陰故能補勞弱而津液自長老雄雞冠血

藥鏡

卷三 二十

塗頰上藥正口斜和酒吞善能發痘諸蟲入耳宜

滴中毒舌脹須含雞肝去肝熱目赤雞矢利濕熱

微脹雞子黃敷腫毒易破易潰兼能溫中緩胃益

陰壯陽雞子清治傷寒少陰疹咽并塗湯火灼傷

熱毒紅腫雞內金療鴉口卵蝕牙疼亦除便溺澀

痛健脾胃消積抱出卵殼取其蛻脫之義研末而障

翳堪磨卵內薄皮和以紫苑麻黃久飲而氣結可

服然其用各有不同丹雄雞起陽治男子陽虛精

冷女人經閉淋瀝烏雄雞起陰治男子陰虛不足

女人血虛勞熱有識者須辨之爾

牛黃^{七十}鎮狂言亂語于傷寒火熾醒口噤失音于

中風痰迷保大人之諸瀾安魂攝魄攻小兒之百

病定志清心

黃明膠^{七十}療跌撲損傷活血最效散背疽初起鮮

毒能神

龜板^{七十}上補心血有虧因而降火下補腎元不足

所以滋陰攻痔漏膿乾肉長治腸風痛止血消令

健忘之多記使不睡之安寢續筋骨而顛門自合

藥鏡

卷三 二十一

逐瘀血而難產催生亦止血痢兼治骨蒸

鱉甲^{七十}益陰虛而去骨蒸之熱治溫瘧而消腹內

之瘕陰脫在分稅須之無代女勞兼復病在所必

資

蜂蜜^{八十}甘歸脾除煩熱潤肺悅容顏煉熟水調產

後渴煩可止離生翎刷褪落痘後抓癩煎滾入升

麻治天行瘡瘡遍體細末加牙皂導陽明大腸燥

結夫蜜性緩質柔故主潤臟腑經絡而燥性瀉質

堅故又能療久痢洩瀉焉同阿膠與黃連治痢後

之腹痛同阿膠兼歸連者產後下痢乃多功也

露蜂房^{八十}辛散苦泄固主驚癇瘕癰癰疔蝨毒而

味鹹又能軟堅故牙疼蟲腫瘰癧腸癰亦可治也

五倍子^{八十}躁急殺蟲收斂肺氣從外治風熱則療

疳瘰菌宣痔瘡鼻瘡燥老痰頑濕又主生津明目

止瀉滋精

白龍骨^{八十}安魂定魄多夢之施固精瀉腸脫肛之

用灸飲肌生稱聖盜汗崩帶通神龍齒單入心肝

鎮驚而安魂魄

藥鏡

卷三 二十二

蛇蛻^{八十}蛇性上竄消風殺蟲蛻灰入肺散邪驚定

天粉羊肝同炙食痘餘障翳疑神蛇蟬髮髮酒同

餐逆產橫生最效耳中痛瘡流血鷄毛管斜盛少

許吹之瘡瘡出水浮漿鷄蛋白濕調微末傳與

藥鏡卷之三

終

藥鏡卷四

嘉善蔣 儀纂定

男誠恭訂

寒部

大黃一伐積食積痰走結血結屎燥墮胎催產之力
解暴痢實脹之危攻實立生攻虛立殆生用則通
腸胃氣壅結熱熱用則治瘡瘍久不收口。醋磨
抹凍瘡死血散消夫濁陰不降則清陽不升瘀血
不決則新血不長蒸熱久而血熱經絡惟大黃可

藥鏡

寒

卷四

一

以治之仲景用治勞傷吐衄百勞尤意最深妙今
人治癆多用滋陰數服不效坐而待斃惜哉傷寒
者風邪未解投之孟浪多致殺人世人但知大苦
大寒効止推陳于脾胃殊不解五行之體以尅為
用功雖潤下却疏炎上于心君蓋火有用而震力
尚生土火無用而實法當瀉土本經名曰黃艮是
土得其天也吳普又名火參是心得其所也

車前子 清肝風熱而眼痛難禁決水淋癰而元氣
不走蓋濕去則脾以健食之力下達而淋瀝自停

水利則胃無濕熱之氣上薰而肺得所養矣至若
陰莖腫痛并及催生最佳大藥不宜過多畏其腎
洩目損

澤瀉三作向導于腎府而慾火退走濕熱于膀胱而
尿血停蓋臟腑有濕熱則頭重而目昏耳鳴病滿
而支飲留垢種種病至惟濕去熱隨散則去舊水
而土氣升養新源而消化行諸効全收餌之過多
損妨明目用之失劑濕滯真元古方每與猪苓並
用而功實不同夫猪苓性燥澤瀉性潤猪苓治水
有損元氣澤瀉治水能生腎氣所以本經云行水
正別錄云走陰氣職此故耳

藥鏡

寒

卷四

二

澤瀉四 辛苦而瀉肺氣凝結上竅云開滲泄而走膀胱
伏熱下流易沮所以水濕泛溢不能為殃喘滿
脹虛無煩別疎苦者行水迅速甘者行水遲緩
甘遂五 破癥消痰而浮腫脹水氣向胸膈而結陷胸
湯用之即除小便轉利袋而疼茯苓湯調服立愈
外未甘遂調塗內煎甘草濃飲水腫癰腫腹時平
散

瞿麥^六利熱水力擅墮胎。決難腫。功祛翳眼。

瓜蒂^七引涎追淚。使水濕外散。則浮腫黃疸自平。官

發湧泄。使胸邪吐出。則痰氣欬逆自順。鼻中瘰肉。

白礬同以塞之。倒仆中風。賦粉借而灌只。

升麻^八奉令之使。不能益人。惟元氣有餘。而其陽下

陷。方堪服此以升。若太陽初病。不可使用之。以發

陽明之汗。能扶內傷。能扶脾胃。兼口瘡肺痿多功。

能清濕滯。能清瀉痢。并火毒濕熱。有並陰陽熱結。

賴此提通。然亦能助虛火。喉毒難腫。從此救治。而

藥集

卷四 三

又易妨痰促。引慈白。散手陽明之風邪。領石膏止

足陽明之齒痛。消瘰疹。止崩帶。補中益氣湯用之。

提元氣從者而上。升麻葛根湯用之。舉邪熱從痰

而散。

小茈胡^九平肝火。去兩脇之脹疼。少陽可引。散膽熱。

退日晡之潮壯。外感宜投。在臟調經。在肌理氣。瘰

瘰虛癆莫缺。傷寒熱病宜加。氣升能提下元清氣。

以上行故氣急嘔逆禁用。味寒。能瀉三焦鬱火。而

四散。故傷寒初起忌之。蓋膽經在半表半裏之間。

汗吐下俱不可用。大法宜從和解。小茈胡湯是也。

貝母^十滌傷寒之熱煩。解心患之鬱結。胸膈悶鬱氣

挾痰而成毒。茲能行氣而疏散。咽喉腫痺痰隨火

而上壅。茲能降火而清和。所以兼滋補而為托裏。

兼和解而為收斂。煎湯添母乳汁。搗粉傳人面瘡。

味屬微寒。厥功在肺。肺癰既治。肺痿兼醫。蓋陰虛

火動而咳嗽煩渴。及痰中見血。必需貝母以潤肺

消痰。若脾胃之津液。不能運行。因而生痰者。非半

夏何以燥之。

藥集

卷四 四

天花粉^{十一}解酒殺之熱毒。而瀉胃清腸。潰瘡疽之厚

膿。而氣滋血潤。降氣解煩渴。故止嗽。潤肺生津液。

故導痰。大抵性寒者水能清火。故陰得其養以生

肌。消痰者燥止渴消。非另有奇功。以益物。從補藥

而治虛渴。從涼藥而治火渴。從氣藥而治鬱渴。從

寒藥而治煩渴。然用治之法。更須詳辨。花粉苦寒。

善治裏渴。乾葛甘寒。獨治表渴。至若汗下之後。亡

陽作渴。必用人參之甘溫。以生津。陰虛火動。津液

不能上乘而作渴。必用知母之甘辛。以滋陰。又有

五味子酸欬生津麥門冬潤燥生津茯苓利水以活津烏梅止水以奪津已上數條皆止渴之樞要也倘症宜人參而反與花粉必亡陽而脫陰症宜乾葛而誤用花粉必引邪而入裏室釐千里禍福隨之

枯樓仁十滌膈上積聚垢膩渴發飲多推胸前鬱結氣痰吼聲作喘乳癰妙用潤肺祛油上痰減食胃寒忌投發吐下應滑腸作瀉通結彌靈懷和明礬粉並王痰喘咳嗽薑汁糊丸立應子入此胡湯總

藥鏡

寒

卷四 五

能潤肺止渴消痰降火須臾懷賴陰乾斯為快意子須油去乃免惡心

常山三絕痰瘧之不已須仗檳榔以夾攻顧元氣之受傷必用人參以協濟此乃下痰氣之劫藥非退寒熱之良材

盧根

十

下噎隔之痰清吐逆之火三陽秘結遂作靈

丹三消湯病特為神品勞復食復單煮汁濃霍亂悶煩麥冬同飲至于蘆荷之為用也除熱而利小便極其所長兼解狗馬河鮑毒矣

藜蘆五吐上膈風痼之痰而咽喉快殺遍身瘡疥之毒而瘰癧云平防風煎伴中風痰癰探吐功高少入麝香頭疼風癰吹鼻立應

連翹十辛散苦泄輕揚上行解六經腫毒寒熱治百種瘡瘍痛疼通月事療五淋消痘毒殺白蟲利小便而降心經之火退諸熱而清脾胃之熱從山梔則引熱內降從麻黃則引熱外散

藥鏡

寒

卷四 六

黃連十治火毒中于心肝目障目疼之聖藥驅熱化干脾胃便膿便血之靈根平腸胃之嘔吐而安

虻蟲消胸腹之痞滿而解煩渴療瘡瘍攻毒辟婦人陰腫立麥杜食火散胎毒小兒疳積速愈佐蘇蜜而交心腎入蘆辛而療心肺醇酒炒以清頭目猪膽蒸以瀉肝膽桔梗麻黃汁炒達表以解痘毒蓋心與小腸相為表裏心火瀉則便水自通小便通而腸胃自厚

胡黃連十除濕熱所以去陰汗清風熱所以定驚癇久痢成疳并腰腎伏熱同治骨蒸溫瘧與傷寒咳嗽俱遷

黃芩

九、枯者上升。故瀉肺而除寒濕堅者下行。清大

一、而涼膀胱。滋肺胃之津。滌膿血之稠。調血淋經

閉。安胎動腹疼。止嗽消痰。以退陽新久弗論。泄火

行熱而陰養。表裏母拘猪膽汁炒。能瀉肝膽之火。

麥冬汁浸。能潤肺家之燥。酒炒則清頭目。鹽炒則

利腎邪。瘍科以之解毒生肌。目病以之清熱退翳。

鷄子清調。驢馬負重破傷。茲品可傳為末酒服。灸

瘡血出不止。是藥能醫。此蓋諸科半表半裏之藥。

也。然須知黃芩退熱。乃寒以勝之。折火之本也。此

藥

事

卷四

七

胡退熱乃苦以發之。散火之標也。

知母。滋腎水以制心肺之火。所以止喘嗽于陰虛。

養陰血而潤腸胃之枯。所以通陽旺之閉。結初痛

臍下痛者。能却肺煩腎燥。其者堪除。上解瘟疫之

渴。而生煩。惟寒嗽肺家不受。下令小便之長而不

濁。若腎虛氣脫。非宜。故致脾寒作瀉者。久用所錄

也。退有汗骨蒸者。專功所奏也。

玄參

一、強陰益精。補腎明目。利咽膈。療骨蒸。清空

中。氤氲之諸氣。氣理則痰自化。滿上下無根之客

火。火平則氣自順。血滯小腸不利。并傷。此瘟瘧並

為要劑。心神顛倒欲絕。及中風熱毒。此泰仙功方

云。酒下消鼠疫。生鴛傳瘰癧。皆散火降痰之驗也。

二、亦肝故明目。除煩故鎮心。五疳何自而生。

總緣脾胃內熱。惟寒能退熱。兼療驚癇。三蟲何自

而發。皆因脾胃濕蒸。惟苦能殺蟲。并腎痿痔。

燈薪。一、吳事乎清心定驚者。療小兒之夜哭。請養

其灰點喉痺與墜眼。則封以煅生煑根苗。或敗膚

總治五淋。爛嚼和唾點破傷。封糊流血。治療木通

藥

事

卷四

八

相似輕浮少遜其功。

青蒿

二十。入心以泄丙丁。故主骨蒸勞熱。瘟疫濃痰。

入脾以去伏熱。故主陰虛盜汗。酒痔便血。得補陰

諸藥。產後虛熱清寧。得童溺烏梅。勞快。倦疼爽快。

嚼傳金瘡蜂螫。止痛消紅。樣塞鼻衄耳膿。血停流

止。

地膚子

二十。上治頭面之濕腫。而洗眼則除熱暗澹。

疼下疏膀胱之疝氣。而利水則消四肢浮腫。浴皮

膚今散熱癢。癢云平。搗葉汁而絞飲。諸瘡毒解。

天名精二十 辛能散結且去濕焉寒能除熱兼涼血

焉瘀紅賴解便水旋通止煩渴也胸次開指癰瘡也癢癢止消痔瘡推為聖藥平喉蛾信有神功

山豆根二十 專瀉心火則金肺無然兼清諸毒則熱

痛可緩治乳岩解中蠱該五般急黃可以量治殺

蟲癰副蛇傷獨喉風牙痛尤屬擅長

青黛二十 澀火除熱毒化而傷寒赤斑并唇口焦渴

俱蘇止下痢殺諸蟲而瘡毒消癢與驚癇痰氣皆

理乃入肝平木入脾散火之藥也

藥鏡

寒

卷四 九

蘭草二十 和血也兼利水道止痛也且殺蠱毒解消

病之渴掃脂瘰之熱與天胸滿痰癖陳積鬱氣無

不結者使開滯者使散也

紫草三十 涼血最勝清心更佳濕熱之侵脾胃者祛五

疸除九感利邪熱之盤心腹者解中氣補腫滿消

川芎二十 入青柏醫眼目之赤障連翹荆防兼角

刺散癰疽之紅腫大力子同用催痘瘡于未發淫

羊替借春起痘瘡于將現攻血泡佐以紅化消水

泡並以代冬其在痘瘡也深紅紫黑枯陷便閉者

宜咀若氣虛脾瀉少食便利者禁用瀉痢也濕投

之必須糯米監制古方惟用草茸取其初得陽氣

觸發痘疹

黃根三十 涼血行血故青血之黃疸服此功高味苦

性寒故熱泄與內崩并醫衄鼻室女經滯不行產

後血運虛熱用于活血藥中甚妙痘家紅紫乾枯

外症乳結成癰用于解毒藥中立效

白欬二十 血分之熱可泄榮衛之逆能入紫蘆而

酒調傳疔瘡而痛止同半夏而酒服去硬刺而咽

藥鏡

寒

卷四 十

通熱附子佐之解風痺之筋急杏仁白石脂為伴

消面鼻之酒皴

茅根三十 稟土氣之中和感春陽而萌葉內熱則血

於瘀則氣滯滯則津枯惟寒以涼血故補中而止

吐衄熱去則血和和則痰消消則閉通惟甘能益

血故扶脾而利淋便為根同黃而溫病熱嗽白寧

蘆根並煎而反胃上氣亦止苗芽號曰茅針以酒

煮服頑癰速潰芽花傳灸瘡不合毫刀箭金傷久

能止衄除衄瓦上敗茅擇洗焙乾為末可慘癰疽

赤之潰爛取其解毒燥濕也。

馬鞭草

三十

能通血脈透入子宮。驅瘀而理月事。搗

碎以塗陰腫核痛。兼痢而治白紅。主下部墮蟲。并

金瘡積血。研末是敷。殺一切疳蟲。及血氣癥瘕。搗

生煎用利小便之卒痛。禁瘕久之熱。蒸絞腸沙痛。

用以除疼。經喉風痺。資之立效。

地榆

三十

清下焦之濕熱。理大腑之流紅。痔漏有功。

崩漏尤驗。止婦人帶下。并療腸風。却小兒熱疳。兼

清瘀積。同金銀花穿山甲水酒濃煎。熱服。治橫痃。

藥錄

卷四

十一

魚口最神。去山甲。加牛膝。木瓜。蠶蠶黃藥。治下疳。

陰蝕極效。

芍藥

三十

調濕益津。令水自行。抑肝補腎。令血自生。

清胃安胎。腹中虛痛。春夏大加。生陰欬汗。血分虛

寒。秋冬少下。當分白補。而赤瀉。俱可逐。舊以生新。

痛。用妙。後重用。生血。虛用煨。產婦用忌。生用則

降。酒浸可升。白芍屬金。而入脾經。血分土實。則金

肅。而木氣自飲。故風熱除。欬逆止。赤芍屬木。專入

肝家。血分木平。則土安。而金氣自疏。故脹理通。閉

腫消。赤芍瀉肝火。投暴赤眼。而浸洗。與煎服同功。

白芍治腹痛。佐以炙甘。而夏冬桂。酌配。痘家血

熱。及血不歸根者。用此酸寒。方能收斂。但血寒痘

不發者。勿用。

生地黃

三十

安胎。損下血。止產虛腹痛。解心腎邪熱。

而吐衄。發狂。清腸胃濕火。而便澀。艱閉。生血。涼血。

宜用。陰虛滯氣。滯痰。胃寒所忌。氣症。薑製。血病。酒

蒸。盜汗。肺清。寧則魂自定。膽氣強。壯則驚自除。心

腎交濟。則志自長矣。

藥錄

卷四

十二

天門冬

三十

氣薄。主升而入肺。味厚。屬陰。而入腎。腎

為水臟。平則溫。且堅。虛則熱。而軟。苦寒。功茂。熱除

而軟。堅故。骨強。肺為水源。平則聲清。亮熱則痰逆

壅。苦寒力。與痰散。而喘停。故肺靜。百合同煎。能除

肺痰。片苓並服。能療肺癰。未潰者。佐蘇葉。與枳殼

為已破者。輔貝母。與白芷。為尤止。血溢妄行。更潤

燥。腸閉結。須知天。麥門冬。並入手太陰。止欬消痰。

而天冬。復走足少陰。降火助元。益腎。生津。液燥。則

凝聚成痰。得潤劑。而化行。所謂治痰之本也。

白鮮皮三十一入肺經以去風入小腸以去濕風濕既除則血氣活楊梅瘡癰自光風熱不生則膀胱利陰痛驚厥自止

馬兜鈴四甯王肺熱喘嗽兼殺癆蟲益壽蓋肺與大腸相為表裏大腸受肺熱之遺故有痔瘡之症今臟熱既清則腸熱自退根名土青木香或搗末或水磨可塗疔瘡可抹蛇傷種種諸毒更治積聚下氣効甚速也

草龍膽四十一除胃中伏火消目內赤疼益肝膽而驚藥集

悸平殺蟲毒而黃疸退下焦濕熱此號仙丹嬰孺積疳是名神藥蓋目得肝中之血膽府滋明肝資目內之潮水根逾茂奏助脾胃厥有自矣雖然須知相火寄于肝膽有瀉無補故龍膽之益肝膽功在泄其邪熱生氣發于胃膽忌苦畏寒故苦寒久服氣勝患其反從火化空腹餌之令人頻溺
夏枯草四十一散結而濕痺又消故主癰癧乳癰鼠瘻瘰癧除熱而肝血又補故療肝虛目赤冷淚羞明蓋其氣稟純陽而能補養厥陰故治日珠夜寒尤

稱獨勝

大青四十一水煎服治天行熱病頭痛口瘡酒送下亦療小兒肚皮卒然青腫

蚤休四十一救驚亂而卒儼如僵扶癰瘤而忽則若絕解搖頭弄舌之怪症消喉鳴身熱之奇病虛庚火那堪不用癰腫毒作速推遵

馬齒莧四十五具代砂結末之能抱殺蟲利便之力飲汁則癥結惡物俱下搗傳則火丹疔瘡咸消脾血涼故赤白下痢連吉肺熱散故目盲白翳生光洗

腫脹之下疳聖脚氣諸濕熱與莧膏主治相同而功力遜之

烏芋四十六津生而熱除食消而氣下胡桃同食化銅物之誤吞微末研漂掃目睛之翳障

漏蘆四十七主通利其性也故能下乳汁行血排膿療癰腎腸風解而散熱其力也故能祛惡瘡疽痔濕痺生嫩肌長新肉

蒲公英四十八化熱毒消惡瘡忍冬藤今同取汁人酒溫服散乳癰取莖和根搗白汁惡刺狐尿刺塗藏

苦參

九

療惡瘡去熱毒遍身風癩能消癰瘰亦破

平胃氣逐寒邪填膈爽涎可吐結滯亦散用多能

滯腎氣久服亦致腰疼少入麻黃能掃皮膚癢疹

佐以山梔能止卒暴心疼同茵陳療濕病狂言致

心燥結胸垂死同槐花除腸風下血及熱痢刮痛

難當止淚目明服借甘菊解渴利竅煎並麥冬遺

溺與黃疸王利藥以逐水赤癰而肩脫若辛藥以

驅風益濕勝生熱熱則生風故東南地卑燥濕為

要

藥鑑

美

卷四

十五

貫衆五頭風除救瘵破兼療金瘡散濕熱殺三蟲單

攻鼻衄不但起發斑疹且解草木等毒之誤餐不

但墮硬軟堅亦治瘡腫瘡疫之諸症

紫背浮萍

五

散濕熱于皮膚染焦枯之鬚髮消水

腫而利小便去暴燥而止消渴同艾葉發汗登時

驅風效捷又一訣云紫背浮萍晒乾篩末密九如

彈薑酒化叩癰瘰諸風一類妙訣

白冬瓜

五

裝黃土煨以絞汁可治痢渴傷寒赤小

豆製而同吞除小腹水脹切片摩拂子取仁開脾

胃若使食未經霜陡見病成反胃

天竺黃

五

同犀角丹砂以養心除熱清而驚悸

頓平同膽星貝母以利竅豁痰痰消而癰癩立止

山厄

五

瀉心肺鬱結之火屈曲而走勝脫消脾胃

禽黃之積流利而清頭目單用于嘔吐有妨仁與

心通用其仁心熱可療炒服于魷鮑有益皮為肌

類剝其皮肌熱可除炒之黑而虛火降製以薑而

煩壯去酒妙上行鹽浸下走炒煎入薑汁胃脫火

痛立消鴉子清末調湯盪火傷急救去目赤睛脹

藥鑑

美

卷四

十六

止霍亂轉筋加生薑陳皮治嘔噦不止加厚朴枳

實除腹滿而煩加茵陳治濕熱發黃加甘草治中

氣虛滿

小若

五

化痰而解煩渴甘露均功消垢而醒睡魔

溫泉熾烈吾賞其清利頭目之奏須防其虛害生

化之源細者為茶大者為茗上病用茶取其輕清

而上升也下病用茗取其重濁而下降也

柿

五

導火熱下行則關竅利而鼻耳通祛血分濕

熱則肺臟清而肺病却潤喉燥者乾柿降呃逆者

帶錢喻化柿霜。利肺經。消痰火。止咳嗽。若乃乾柿。煨灰。飲服二錢。腸紅之神劑也。乾柿乾飯。日日乾餐。反胃之仙方也。

梨^{五十} 降心火而涼喉。利膈。清肺熱而湧嗽。痰黃連。漬彼汁中。點日弩之赤痛。丁香包煨紙裹。墮屋胃之食翻。

孩兒茶^{五十} 化痰生津。而上膈之熱清。長肌定痛。而金瘡之血飲。與礪砂等分。牙疳瘡口。堪搽。佐片腦珍珠陰瘡。下疳宜傳。

藥鏡

卷四 十七

八角茶^{五十} 入肝而涼血熱。煎其枝葉。白癩風除。入腎而清濕熱。剝皮浸酒。腰膝自強。所稱平陰虛之痰火。而肺免炎熱。消楊梅之結毒。而容顏復舊者。必須揀葉。芟刺。蜜塗蒸晒。服之經久。費鮮功多。

竹葉^{六十} 療風邪之煩熱。而消渴喉痺。俱平。定喘促之上術。而痰壅嘔吐咸止。

桑白皮^{六十} 利肺中之氣。氣泄而喘嗽。平透肺中之

水。水去而腫滿退。又治唾痰見血。抑^三客熱虎癆。

阿膠補血。怪其飲肺。製以桑皮。補瀉得均。蜜炙殺

肺蟲。作線縫瘡口。汁取新根。治小兒之驚口。與夫

天吊。瀝燒下酒。治破傷之中風。并及風瘡。桑葉清

涼補血。經霜明目。湯亦能消。至與胡麻合。并九蒸

氣血兩盈。晚葉焙研茶下。吐血立止。剪其柔枝。祛

風殺癢。兼同益母煎膏。紫白癩風。飲跡。搗其甘。惟

血養熱除。熬液蜜和酒下。百種風熱。落踪。桑柴灰

淋汁。煮乾。別名木槨。引藥攻毒。透骨鑽筋。同鐵鎖

蟾酥以拔疔。同乳香沒藥而止痛。桑蟲發毒。桑耳

破癥。

地骨皮^{六十} 療在表無定之風邪。更除囊濕風癢。去

傳屍蒸骨之有汗。尤治肝腎虛焦。退煩熱而渴除。

清肺氣而嗽止。君四物湯。鹿角膠。佐以丹皮。治婦

人骨蒸最妙。佐鮮薑湯。生地黃。臣以茜根。治痘家

熱毒為良。洗楊自然之汁。小便出血。能醫。研搽下

體之疳。止疳生肌。立効。

黃藥^{六十} 氣喘走皮。味喘走骨。自頂至踵。淪膚徹髓。

瀉腎水之狂蕩降相火之有餘去濕熱于膀胱起
癱疲于脚膝吐衄黃疸何有也淋瀝白濁豈難哉
安上焦虛熾之蛇而日熱者紅消楚解。暴下熱
結之痛而腸澀者痔瘡痢。先見醫諸膽同研以和
鉛粉則熱瘡之有蟲者久不合口而頓收使借龍
腦并拌黛青則心脾之鬱熱者。頰舌生瘡而可慘
蜜炒為末煨蒜搗丸米飲為湯則治痘疹之白痢
蛤粉等研煨加牡蠣蜜丸酒服則醫赤白之濁淫
枳實^{六十}最滑竅極破氣同半夏以消痰癖同桃仁

藥鏡

卷四

十九

以去血開快白朮而宿食磨隨大黃而結屎出氣
虛勿用痞滿宜投枳實小性酷而速枳殼大性寬
而緩脾病宜實胃病宜殼故胸中痞肺氣結也有
桔梗枳殼湯心下痞脾血積也有白朮枳實湯
枳殼^{六十}行氣血久滯筋骨而關節不利掃皮膚癢
中風濕而痛癢難禁與紫蘇香附同施有疎風散
寒之用血枯^{六十}為伍有寬中下氣之功人二陳則
消食化痰入五苓則利水退腫束胎瘦胎儘妙腸
風腸結皆通燒烟薰煎湯洗米飲調服總為醫痔

上藥

側柏葉

六

清榮衛耐寒暑煨灰可却崩中之血釀

酒能祛瘀節之風吐衄除濁有清服之又益聰明

槐實

六

清血受火傷而崩中痔漏腸風便血皆治

除內熱邪實而婦人乳癰子藏急痛咸痊枝洗風

瘡之陰囊膠藥肝風之筋掣疥爛皮治喉痺根醫

花王熱痢殺蟲葉王驚癇癰瘡

椿根白皮

六

治下血經年并瀉痢腹痛療小兒疳

痢并腸脫症餘同滑石而粥為丸醫女人白帶借

藥鏡

卷四

二十

人參而米飲下療腸內血膿痢疾積氣未盡者不
可驟用之而滋滯也

椿實

七

祛鬱積之濕熱諸蟲自消散浸淫之邪蒸疥

癢自愈子治腎虛疝氣而利水根殺腸胃諸蟲而

止痛用根之法須辨二端色白向陰方云可食紅

根立斃切宜忌之

綠豆

七

入心瀉火熱毒以除入胃和中風疹以散

豆皮留作枕卧堪清目翳頭風偕大黃之與薄荷

小兒丹腫可塗抹也同乳香之干甘草內攻疽毒

使外行焉。滑石粉勻和。暑月沸湯可撲。涼生夏

雪快並秋風。

浮麥七十止汗除煩。北產者厚。膠肝力。小麥帶皮退

熱。節麵者濕助渴增。楚能寬中行氣。去濕消膨。衍

義云。麵熱楚涼。炒而熨之。則收濕散氣。更有一法。

入麵和餅。覆于痛處。上以火熨。亦能除腫止疼。總

之解。少陰之熱而小便利。蓋小腸與心相表裏也。

益心經之血。而肝氣養。蓋子氣敷榮。令母實也。

善乃仁七十壯筋骨。善療屈伸不便之拘攣。調水腫。

藥鏡卷四 二十一

又理麻痺不仁之脚氣。分清脾濕。寧腸胃。令飲食

自進。維持肺痿。停咳嗽。使痰痰自除。補脾却腹稱

奇。益壽延年。其妙。惟受熱而筋攣。受濕而筋緩者。

可用。若受寒而筋急者。切須忌之。力勢和緩。倍用

方效。

黃丹七十性潤下。安心神。小便有節。質鎮重。平肝木。

勝藥自寬。入膏藥。風熱滑消。生肌止痛。得滑石。金

箔以飲吐逆兼醫。

鐵鑪七十油調塗疥癬惡瘡。蒜和傅。蜘蛛蟲咬。蟻蟻

癰。與此同研。宜用鉞挑而入肉。風熱肝經一時

平復。兼療疔瘡之根苗。

粉錫七十辛寒。解毒療瘡。重墜以下懷胎。滋膩以節

小水。臍脂輕和。潤嬌容。而益麗。穢氣偶逢。樟聚膚

而增玷。

丹砂七十血脈通調。魂魄安定。清心熱而煩渴不駐。

鎮驚悸而鬼祟來纏。解痘疹之毒根。納浮瀄之虛

火。和大楓子研末。則殺瘡蟲。佐條黃芩為丸。則絕

胎孕。

藥鏡卷四 二十一

石膏七十發陽明之汗。汗出而頭已。其疼墜陽明之

火。火息而齒蘇。其痛。痰喘有效。暑渴多功。張仲景

恐其重以趨下。緩以甘草之甘。恐其燥甚。動急。濡

以知母之苦。恐其大寒。瀉土。載以粳米之平。恐其

魄喪。氣消。益以人參之補。白虎性猛。功烈禍崇。須

認大汗大煩。口舌乾燥。渴能消水。脈洪大滑。不惟

無表症。而亦無裏症者。方堪用之。

滑石七十驅暑毒而消渴煩。利小便而實大腑。平霍

亂之吐瀉。補胃補脾。制火劫之傷寒。專清心火。痢

危噤口當入參煎積痛冲心宜加焦飲

芒硝八潰膿散血利便通淋下一種之實痰痰消山

其能軟堅也。鴻六腑之積熱去由其能潤燥也。

玄明粉八涼心膈而煩燥除清腸胃而宿垢去

翳明目實熱多功。軟積消痰。虛寒反累。疳家實熱

便秘。用于當歸解毒湯。不損真陰。婦人胞衣不下。

童便調和三三錢熱服立墮。

白礬八人骨以除固熱也。鼻中瘰肉能祛。禁瀉以

培虛脫焉。婦人白沃可療。同皂莢吐風痰。喉痺清

楚和蜜蠟消癰腫。瘡癤精光調臘醋漱齒舌痰涎

湧出

綠礬八酸滌化涎而喉痺愈。濕解毒而瘡癤除。

散熱收澁而腸風瀉血能止。大煅醋淬即為礬紅。

加以健脾諸藥。一切肉積食積堅久不消及酒黃

水腫悉皆攻治。

青鹽八助水臟而血涼。故能止目痛。而筋骨以堅。

補心虛而熱退。故能除腹疼。而積聚頓掃。鹹味于

五行也。水曰潤下。毒得水而邪盡自消。然多用則

傷肺引痰。心苗與小腸者相為表裏。心火降而溺

血自止。然錯投亦瀉精走血。

食鹽八自水生可以補腎。從火化故能實脾。炒來

黃色。和童便溫服。霍亂幾死而立甦。燒裹青皮。候

赤色。酒吞中惡心痛而隨止。至若血病喘嗽水腫

消渴法所均忌。

童便六降火最速。清血甚驗。虛寒泄瀉有礙產運

蹶傷尤神。中暈昏倒。火燒悶絕。灌下即甦。絞腸沙

痛。血腥衝喉。服之即愈。乘熱下咽。立除胃蒸勞熱。

咳嗽吐紅。煉成秋石。尤能滋腎。還元。清心明目。

人中白七退癆熱。傳屍。善療湯火。清肺痿。吐衄。又

治口疳。奪命于發狂。保生于血運。

夜明砂八散內外結滯。除血熱氣壅。栢葉末同牛

膽和吞。青盲障翳。即時淨盡。活提刺血。點目亦佳。

犀角八解心熱。傷寒發狂。清心神。中風不語。鎮肝

消癆。疎痘毒。而斑疹能消。理胃散邪。止吐血。而驚

癇可治。蓋火熱下行。燦腎則目昏。惟鹹以滋腎。故

明目。熱邪上行。逼肺則音啞。惟寒能制熱。故清音

易老云。上焦蓄血。犀角地黃湯主之。中焦蓄血。桃仁承氣湯主之。下焦蓄血。抵當湯主之。三法宜知。不可忽也。

羚羊角九清肺熱。治平傷風。賊毒。癰疽。驚風。瀉肝火。

一療平目痛昏花。氣逆噎塞。且理傷寒寒熱之不除。

抑調產血。血風之雜症。須知犀角鎮心。而心血以

涼。羚羊鎮肝。而肝血不焦。血虛之症。慎勿混用。

能膽九入水分。坐如練。不散。醒驚。清火。諸膽充長。

同使君。刪補諸疳。癰瘰。入片膽。滌酒。久痔。目衣。

藥鏡 卷四 二十五

牛乳九血脈養和。理癰。痛反胃。五臟滋潤。利燥結。

大便虛。癰消渴。能醫。肉人怪病。可療。牛肝補肝亮。

雀盲。牛酥滋肺。釋咳。血角。饒王帶下。行血止疼。牛

肝王風痰。涼肝明目。

象牙末九鍼箭入肉。和水塗。傳印出。惡毒。漏管入。

藥拔毒生肌。立通小便之。般帶生。煎飲。能戒小水

之數。燒服其灰。象膽苦寒。能殺百癆之蟲。蠱象皮

收斂。剪入諸膏。而長肌。而順。又能涼肝火。而散翳

障。眼目清明。去脾熱。而消積。疳口無雜臭。

猪懸蹄九並蝦皮。摘槐角。子漏管。退而生肌。同蟬

蛻。取角。羚羊。目翳。消于痘後。猪肺止嗽。而四足則

下乳汁。而濯潰瘍。猪脂。滌汚。而兩腎則洩腎氣。而

理腰痛。研牙皂。入膽。攪勻。通便秘。為甚捷。夾雄黃

蜈蚣。包指。縛天蛇。使內消。烏芋。入脂。煨。食下。反

寬腹脹。黃連。脂。同煮。搗丸。令膿毒血停。

牡鼠糞九治陰易。勞復。非白。同煎。惟汁是取。散乳

毒。初起。紅。棗。煨。入。爛。些。兒。

穿山甲九潰膿。破血。能消痔。殺鬼。止驚。兼下乳。登

藥鏡 卷四 二十六

痘漿之不足。定小兒之吐瀉。欲治乳囊腫痛。則于

木通。夏枯。同搗酒調。欲止痔瘻出血。則于蟬皮。條

芩。同研湯下。君薏苡。能却骨結之瘰癧。若鼠粘。能

透癰疽之頭點。

蛤粉九總理諸痰。疝氣。帶下。支香。附以和虛熱。心

疼。朋大蒜。而利氣。虛水腫。時借黃藥。則于白濁。遺

精。厥有裨也。

牡蠣九療遺精。旋施。帶下。善。治崩中。鹹以

軟堅。故墜。凝痰。于脇肋。寒以。消癰。癰。于喉。

龍若乃水腫陰囊須臾可瘳必須乾薑為末冷水同調欲止盜汗則佐以杜仲欲止自汗則佐以黃耆欲止頭汗則佐以麻黃欲消腫硬則引以芫花欲消項核則引以芽茶欲消股腫則引以大黃

蟬蛻九十止夜啼通乳汁於癰皮膚癢癢氣之虛也用茲氣實之物則補氣虛而瘥止目睛風熱翳淚

氣之結也用茲氣化之品則行氣結而翳消得風木之象類含楊柳之陰精消風定驚而催生殺瘡

除熱而發痘入疎散藥中則清肌表之熱入解毒藥中則除臟腑之火癰疽外腫同麻黃以散之痘

疹未實同麻黃以疎之

蟾蜍百治小兒疳腹作脹噤食立消療丈夫疔瘡出血取酥點治發背逢初起捉蟾連肚子破開乘熱

卷頭更易三四翻即愈若蝦蟆者另是一種僅能攻熱毒散血滯而已

真珠一百去心熱而定驚瀉散肝火而除目翳益脾消積而皮膚上逆腫自退補腎開胃而結毒中陰

蝕兼攻研林瘰癧瘰癧生肌腐

山螺汁二止渴能停痔痛醒酒更甚脫肛痢疾禁

口必危爛搗入麝烘貼臍間過半日自然思食尿

閉腹脹難忍生搗加鹽傅紫臍下約寸餘俄頃流

通納真珠與黃連悠閒取汁點風熱之目痛豁亮無虞

斑蝥一百傷肌肉蝕死肌療癰瘡癰消并醫狗咬逐

腸胃走下痰石瘰癧血積破兼墮懷胎

蟻螂一百除肝胃之風熱而驚癰支滿自下為大腸

之滯壅而便秘奔豚俱解引痔毒漸出搽肛脫徐

藥鏡

收水片少加燃紙蘸末入漏孔而肉生腹下度取

心肉稍白貼疔瘡而痛已微炒巴豆搗貼瘻生入

骨箭鋒拔之即出

白頭蛇蝎一百利黃疸消蟲殺荆芥同搗而煎其汁

熱病發狂得汗而解清水淋濾而出其滋濕熱便

閉隨呬而通夾鹽入葱管之中化水滴耳聾最效

煨灰入乳香于內油調抹癰爛無京蛇蝎屎炒枯

濾飲清濕熱于胃腸水和調塗解丹毒之一切搗

和藥葉汁時行腮腫能敷敷入百草霜瘡號號窩

油抹

藥鏡

宋

卷四 二十九

拾遺賦

遺寶物而人拾。拾遺棄連城遺棄品而我收。扶生起死。徐探他劑。先說溫材。梁上塵。王噎。屬中惡。又療腹疼。暨小兒軟疳。而兼鼻。鼻東壁土。得太陽初氣。能溫脾。暖胃。又祛濕熱。在伏天。邪暑。瀉痢。同科。石鍾乳。下行。補陽衰。而止寒嗽。伏龍肝。鎮墜。療產難。而消產。地龍骨。主膿血淋漓。致爛。瘡收口。水龍骨。主血風。腫毒。故血欬損傷。訶子。栗殼。何施。是虛寒嗽痢。無可奈何。之藥。黑丑。白丑。奚用。乃腫滿。便閉。萬不得已之圖。補血添精。腸虛。養潤。肉蓯蓉。佐鎖陽。搜風去濕。脚弱。能強。茄子根。伴松節。乳香。定諸經之痛。又能長肉。于損傷。妙尤在伸舒。流注之筋。縮沒藥。散血氣之凝。又食止。疼于腫刺力。且能祛除血熱之目。天金。櫻子。溫精。益腎。更主脾泄。血崩。青葙子。明目。清肝。兼疏風熱。濕。癢。烏柏樹皮。立通二便。功將已。率杉木。老師。脚痞。煎。腎兼平。漆咬。牆。薜。根。退熱。月季花。活血。退熱。故風除。濕散。好。眩而遺矢者。煎濃汁。以頻嘗。活血。故。卷。腫。壓。毒。癰。癰之未成者。羌。萎。沉。香。衰。茹。骨。盤。豈。和。非。菜。誤。

吞金石墜下登時煅刀葶子湯吞氣下呃停須臾平
復銀珠減惡癢而掃疥癬瘡瘍白前定氣升并降氣
逆嗽喘石鹼爛癰癰瘰癧肉煙膠殺疥癬蟲蟻羊頭之
骨燒灰消磨鯁咽之鐵羊脰之骨煨過便下誤吞之
金病後勞復預防燒研頭垢下以米湯吹乳乳岩
治水腫無根新九百齒羊肉至頭腦大風產婦諸痛
癆癰虛寒補形在表青腫損傷新鮮薄貼羊角至磨
熱青盲火風頭痛羊腎至精虛陽痿氣怯癆傷生食
子肝療火眼赤痛等疾刺血熱飲鮮水銀毒與砒霜

藥鏡

卷四

三十一

黃狗陰莖能令陽道豐隆精腰多子狗頭骨灰能止
虛寒久痢赤白帶下水蠟用止嗽却魚鱖治癆絕傳
尸海狗腎煖精壯陽根破癰辟尸疰白花蛇治癰
除風癢之癰疹烏梢蛇療不仁去瘡瘍之風熱鯽魚
溫胃扶脾治赤白久痢鯽魚補中益血治日眼咽喉
蚶肉溫中消食煖腰脊而益血類蚶殼火煨醋洗消
血塊而化痰積溫散熱痺溫熯熱天雄補陽虛于
下焦能腎癰癰脚氣多功草烏逐寒濕之風痰遇冷
卽消逢熱卽潰川烏破積濕痺能除入骨搜風散故

冷痛側子輕揚品能發表四肢風癢立奏神功胡椒
下氣溫中而療腹心冷痛鹿茸壯陽陰補而止崩漏
洩精大楓子燥濕散風經行蟲殺大風癰疾並治瘋
癲疥癩相宜樟腦氣香遠竄能通關利竅逐邪中惡
且去濕殺蟲熱溫異路和緩須平無名異酒調呷下
療血之繇損傷醋磨塗至生肌之在腫毒自然銅敷
療血接骨續筋破滯氣和傷止痛石韋清癆熱刺淋
癰而除煩下氣偏能火瘡和脾胃生咽津而過甘或
防脹作欲治風濕虛痿陰中腫痛子更蛇床欲療淋

藥鏡

卷四

三十二

癰疽疔瘡腎氣虛損蛻求桑蝶樺木皮濕熱性祛能醫
黃疸燒灰酒下尤治乳癰兼疏肺風劑之輒効紫荊
木破諸宿血能下五淋單末酒調可圍發背勿令滋
蔓應療初生木芙蓉清肺涼血散熱解毒之功臣山
茶花吐紅罌血腸風下血之良將豌豆痘疔紫黑可
救豇豆補腎健胃雙能剪刀草汁調蛤粉傳愈瘰癧
癰補杵頭棟下氣通塞喉開喉噎古文錢催產散血
風熱火眼尤涼蜜陀僧結散積消野蠻傳面至美半
枝蓮解蛇傷之仙草紫地丁消腫毒之靈苗屎蛆善

消疳積。脹滿無虞。蟬蛻。端理五疳。辟兒羸瘦。兔腦利胎產。以催生。兔肝補肝氣。以明目。兔血和蕎麥。能稀瘡。疳子兒家。免尿磨橫柳。能視目翳于痘後。白鴿瘡。白癰癰瘍。風瑋瑋。解痘疹中蠱毒。蟬皮清濕熱于下焦。防流痔血。熊掌益陽氣之不足。力禦風寒。文蛤化痰兼涼血。鱧魚脾補。又下水浮。受水氣而浮腫也。蛤蚧嗽止肺涼。益腎足陰。利膀胱淋瀝之水。道鰓鱓補虛癆。愈去濕風。消除傳尸鬼瘡之蟲。白蓋利疏理脾開胃。腦石堅重。主下石淋。禪福經衣是色痘女癆。陰陽藥鏡。
 卷四 三十三

易病之針對。姪婦爪甲乃肝虛弱障。飛絲入目之醫王平與寒降。請收寒劑。海藻散癭瘤而下水腫。脾濕宜停。大戟療癥瘕而利二便。脾虛勿用。淡豆豉理肺逆。却頭疼。借葱白而溫管。初起傷寒。統汗。甘蔗根解結熱。傳丹毒。同旱蓮而煎貯。血淋澀痛。徐通。力緊者。朴硝散。入肺之積聚。而腫目痺。喉可祛。力緩者。芒硝。瀉五臟之實熱。而血留痰結。能去膽熱。止驚癇而吐風痰。更清熱毒。水銀療癰瘍而除風疥。并墮懷胎。菴草根調沙淋。疏水腫。而身黃酒疸兼醫。水銀粉殺疥。

癰。傳痺疳。而鼻上酒皶。音查。亦治水腫濕腫。請商陸。濕熱腹。龜用雷丸。淡竹清心利水。葛花解酒毒除。淡咽膈之痰。平翻嗽之胃。石打穿。清微用口噎。膈翻胃。從來醫者病者。群相畏懼。以為不治之症。余得此劑。十投九效。不啻如獲。荒之。栗隆冬之。寒也。乃作歌以誌之。歌曰。誰人識得打石穿。藥深紋。露齒。是潤不盈寸。長更倍。圓莖。枝抱走。相連。秋發。黃花。細。五結。實。扁小。針刺。費。宿。根。生。本三尺。許。子。發。春。前。道。弟。有。味。苦。辛。平。入。脾。臟。穿。腸。穿胃。能。攻。堅。排。痰。散。結。平。復。功。最。先。世。服。愚。衆。知。者。鮮。岐黃。不。載。名。浪。傳。丹。砂。勾。漏。毒。傷。事。余。愛。養。生。者。數。言。識。得。者。誰。止。吐。衄。之。紅。收。腸。胃。之。血。血。見。愁。能。尋。有。幾。螻。蛄。逐。水。水。脹。隨。平。蛤。蚧。消。酒。酒。積。噴。滌。土。茯苓。伐。瘡。齊。斧。若。毒。極。筋。節。又。不。如。山。慈。菴。力。猛。無。前。黃。葵。花。膿。潰。先。鋒。若。瘡。關。氣。血。又。不。如。充。蔚。子。功。動。浩。大。紫。參。清。腸。胃。濕。熱。血。瘀。疏。兼。經。婦。之。滯。芋。根。涼。胎。姪。渴。焦。狂。發。浴。兼。兒。毒。之。丹。陳。醋。解。湯。火。腥。膻。苦。芭塗。疔。瘡。沙。風。苜。蓿。葉。取。汁。酒。疸。宜。投。芥。菜。滿。風。儲。肺癰。恰。中。泥。宿。尿。坑。之。底。疔。瘡。發。背。止。痛。當。塗。水。列。大。蚌。之。中。明。目。定。心。煩。除。渴。解。漆。瘡。熱。瘡。湯。傷。火。傷。廢。井。苔。及。萍。藍。同。川。鯽。血。吐。血。砂。淋。石。淋。破。胎。板。底。苦。青。與。和。鯉。魚。膽。點。脾。去。翳。滿。耳。聾。聾。其。功。不。小。鯉。鱗。

藥鏡
 卷四 三十四

皮煨末水服。便骨常喉。數晨可脫。解走血軟堅。漆瘡
 塗滅。去殼微炒。接骨連筋。搗爪水煎。附胎破血。蚘蛇
 膽。臨杖。喻化。護心。避痛。惡血。湧除。黑嘴。白鴨。童便。同
 煮。大補。虛勞。消腫。退熱。樞子。殺嗜。茶之。盡。盡。色。改。面
 黃。山柑。和熱。毒。於。胃。腸。皮。停。喉。痛。人。尿。理。融。金。汁。入
 心。坎。解。時。令。之。發。狂。與。陽。明。實。熱。年。久。黃。疸。消。鬱。火。
 起。痘。瘡。之。凹。陷。并。毒。藥。箭。傷。蛇。蟻。蝟。牛。益。陰。潤。燥。傳
 脫。肛。痔。痛。諸。熱。立。瘳。堅。軟。筋。舒。塗。蟻。蛇。楊。梅。毒。傷。俱
 解。蜚。蠊。蟲。散。臟。腑。宿。血。如。肌。屑。甲。錯。兩。目。點。黑。之
 症。治。撲。傷。瘡。癰。有。續。筋。整。骨。和。血。調。經。之。驗。青。魚。膽
 入。片。腦。點。火。眼。而。乍。轉。清。明。入。膽。攀。吹。豎。蛾。而。倏。抽
 瘳。曉。麒麟。竭。破。瘀。血。而。止。痛。生。新。血。而。長。肌。利。水。破
 血。諸。藥。令。婦。落。胎。散。風。發。汗。衆。材。致。人。虛。弱。熱。藥。多
 秘。惟。硫。黃。煖。潤。而。疎。通。冷。藥。多。瀉。惟。黃。連。肥。腸。而。且
 泄。傳。裁。往。論。約。選。新。編。氣。味。陰。陽。不。同。浮。沉。升。降。各
 異。酸。爲。木。化。入。肝。爲。溫。鹹。因。水。生。入。腎。爲。寒。火。苦。入
 心。爲。熱。金。辛。入。肺。爲。清。甘。則。屬。土。入。脾。爲。至。陰。而。西
 氣。兼。之。皆。增。其。味。而。益。其。氣。故。各。從。本。臟。之。氣。爲。用

辛甘發散爲陽。酸苦湧泄爲陰。氣爲陽。氣厚爲陽中
 之陽。氣薄爲陽中之陰。味爲陰。味厚爲陰中之陰。味
 薄爲陰中之陽。清之清者。濁之濁者。辛散酸收。淡能
 滲泄。鹹軟苦瀉。甘則緩結。考藥性。立濟世功勞。拾遺
 品。表活人心地。

藥鏡
 心 手少陰也 肝 足厥陰也 脾 足太陰也
 肺 手太陰也 腎 足少陰也 大腸 手陽明也
 小腸 手太陽也 膽 足少陽也 膀胱 足太陽也
 胃 足陽明也 三焦 手少陽也

疏原賦

每見醫家浪習書雖讀而病殊緣由議尚浮而不存實意。殃道匪鮮。業造滋深。夫困難以辭敘也。得其要領。達乎權變。非深心力學之士。其誰克之。故必先明經絡。使表裏精詳。而後知受病之深淺。亦必先明氣血。令虛實清理。而後知用藥之泄裨。以言乎心。乃多氣少血。手少陰也。實則熱見乎外。虛則熱潛乎內。味甘瀉而補之以鹹。氣熱補而瀉之以寒。以言乎肝。乃多血少氣。足厥陰也。虛則必資心火。實則須抑陽光。

藥鏡

疏原

卷四 三十七

味辛補而酸瀉。氣涼瀉而溫補。以言乎脾。乃少血多氣。足太陰也。實則飲食消而肌肉滑澤。虛則身體瘦而四肢懶擡。最忌臍凸肢浮。尤畏口青唇黑。因飲食勞倦之災。定溫多辛少之劑。甘補苦瀉。味貴有別。寒熱溫涼。氣各從時。以言乎肺。乃少血多氣。手太陰也。實則上熱氣相兼鼻塞。瀉必辛涼。虛則少氣不足息低微。補須酸熱。以言乎腎。乃少血多氣。足少陰也。實則小腹脹滿。而腰背急強。便黃舌燥。瀉腎湯可以推廣。虛則氣寒陰痿。而音聲混濁。強弱脉伏。從寒從宜。

加詳討。所云味之苦補鹹瀉。氣之熱瀉寒補。就其宜

乎腎者。固如是耳。以言乎心胞絡。是為心之腑。即膻中也。乃多血少氣。手厥陰也。若夫心應脉與心相表裏者。是曰小腸。乃多血少氣。手之太陽。其為病也。痛連腰脊。疼引睪丸。實則煩滿而口舌生瘡。虛則懊憹而唇青下白。氣涼補而溫瀉。味辛瀉而酸補。若肝之所腑。而同應乎爪者。非膽乎。乃少血多氣。足之少陽。其為病也。眉傾口苦而嘔宿汁。狀如人捕而善太息。實則精神不守。半夏湯瀉之則良。虛則煩擾不眠。溫

藥鏡

疏原

卷四 三十八

膽湯補之却善。若脾之所腑。而同應乎肉者。非胃乎。乃多血多氣。足之陽明。實則唇口乾而腋下腫疼。法宜涼瀉。虛則腹滿鳴而面目虛浮。藥應溫補。若夫肺應皮。與肺相表裏者。是曰大腸。乃多血多氣。手之陽明。其為病也。傷熱而腸滿不通。辛溫可瀉其實。傷寒而腸鳴泄瀉。酸涼可補其虛。若夫腎之所腑。而同應乎骨者。非膀胱乎。乃多血少氣。足之太陽。其為病也。轉胞不利。小便赤澀。煩滿囊腫。難于俯仰。瀉實貴用寒涼。痛引腰背。屈伸不便。脚筋緊急。可鳴重聽。補虛

還憑溫暖。若所稱水穀之道路。氣之所終始。而與心胞絡為表裏者。非三焦乎。乃少血多氣。手之少陽其為物也。有象而無質。空處而用存。上實熱而瀉心陽。上虛寒而補肺氣。瀉脾土。去中焦之熱。補胃土。扶中焦之寒。下熱瀉膀胱。下寒助腎臟。相臟腑之上下而補瀉自別。定藥品之主臣。而虛實自辨。總而言之。六腑為陽。五臟為陰。胞絡即是膈中。配成十二經。是知按經絡以推傳變。綱紀無差。遵歲氣以折陰陽。衡有準。表宜汗解。裏即下平。救表則桂枝。救裏則姜附。參苓當歸養血。無芍藥而功疎。大參養氣。無黃耆而力弱。陳皮不謀甘木。鮮補於脾。五苓未伴桂皮。曷疏厥水。表汗者麻黃。葱白不來不發。吐痰者瓜蒂。豆豉未加如壅。大黃能去實熱。枳實全資附子。再回元陽。乾姜有賴。嘔吐非半夏。姜汁不止。虛煩非人參。竹葉不除。竹瀝須姜汁。經絡流行。皂角助痰。諸通閉結。非承氣湯。誰禁狂。張昇肉陳散。不愈黃疸。補氣自然生血。氣藥過于血藥。反燥真陰。補血不能生氣。補陰過于補陽。元神克復。痰隨氣下。降痰利氣。須

藥鑑

疏原

卷四 二十九

先。痰造弱脾。化痰實脾為要。一水不盈。則二火不息。元氣不實。則虛氣不消。逐痰太過。傷脾。瀉火太多。損胃。脾傷則腫脹泄利。胃損則寒嘔不咽。開氣用溫藥。順其性也。更有氣盛上冲。非寒不制。瀉火用涼藥。制其性也。更有火極上熾。非熱不降。火壅咽喉。不宜下逐。氣滯腰膝。尤可升提。脾虛肺必受虧。若要補脾兼補肺。心弱脾必遭損。微圖心養養兼脾。風從上始。于汗劑而風平。譬于喘之在樹顛。雨來則靜。濕從下始。搜風藥而濕愈。譬泥水之滯。壅火風反斯。乾木利則

藥鑑

疏原

卷四 四十一

滑消。治渴尤禁逐水。氣清則血聚。理氣尤禁補血。春夏重于寒涼。秋冬重于溫熱。伐實補虛。引經為要。修方進藥。禁忌須知。巴豆大黃。尅伐藥宜西北。東南藥弱非宜。蒼木半夏。香乾劑利東南。西北燥強無用。運氣不齊。未堪執一。治男子。先要養陰。制火。治婦人。先要理氣。調經。辛苦之病。滋補為先。膏粱之疾。清利為上。治久病。先扶元氣。攻急疾。暫伐餘邪。治病不顧真元。論非探本。用藥不思後患。命曰勦標。醫道浩淵。數言未悉。學人茫昧。自此疏原。

通天地淹貫古今。一身之內。經絡次第可憐然。夫喉在前。堅空。接肺爲氣路。下通五臟。以激諸脉之行。咽在後。柔空。接胃爲飲食路。通于六腑。喉下肺。凡八葉。附脊第三椎。瑩華懸覆。察蓋諸臟。肺者勃也。言其氣鬱勃也。寅時氣血注此。氣血之行。周身之後。又從中焦而起。一日一夜有五十次起。于中焦。合於胃。而皆然。不但寅時而已。不可泥定。于寅時。心有系。絡于肺腕之下。心形如未敷蓮花。附脊第五椎。五臟系皆屬于心。心纖也。靈纖細微。無物不貫。又言深也。深者高拱。相火代之行事也。午時氣血注此。心外有胞絡。裹赤黃脂。其筋膜細如絲。在心下橫膜之上。豎膜之下。戌時氣血注此。心旁有系。下連腎而注氣焉。自天一生水。先結兩腎。兩腎左右開闔。命處乎中。如門中振闔。故曰命門。蓋一陽處于二陰之間。所以成乎坎也。酉時氣血注此。心下有膈膜。與脊膈周迴相着。遮蔽濁氣。使不得薰心。所謂膈中也。膈膜下有肝。肝葉左三右四。亦有左右獨一葉者。體右而治左。其系亦絡于心。附脊第九椎下。丑時氣血注此。是爲血之

素靈

疏原

卷四 四十一

漸也。肝短葉下有膽。膽者濫也。無所受輸。澹澹然也。又言膽也能擔當也。其狀如瓶子。時氣血注此。已上皆屬喉一路也。咽門長下至膈膜。膈膜下有胃。受飲食。上口是名食腕。下口與小腸上口相對。胃者糞也。五味會聚。萬物歸土也。辰時氣血注此。胃之左脘上有脾。色如馬肝。形如刀鋒。聞聲則動。動則磨胃化食。巳時氣血注此。脾胃屬土。胃居膈之上而正中。故田字在上之中。脾居膈之上而右。故田字亦偏右而在上。胃下左小腸。後附脊上口對胃下口。下口對大腸上口。泌清別濁。水液分于膀胱。滓穢分于大腸。未時氣血注此。胃下右大腸上接小腸。下接直腸。受滓穢而出之。貴通暢也。申時氣血注此。腹下之前爲膀胱。狀如綿毯。虛熱畜水。漸漬而滲入胞中。胞滿而後溺出。全賴氣化。氣閉則病。上系小腸。下聯前陰。溺出精施。兩竅並焉。申時氣血注此。已上皆屬咽一路也。上焦在胃上口。治在膈中。中焦在胃中脘。治在臍旁。下焦當膀胱上口。治在臍下一寸。所稱如霧如瀝如瀉。即上

素靈

疏原

卷四 四十二

中下三部臟腑空處是也。如腎氣血注此命門指所居之府而名。為藏精繫胞之物。三焦指分治之部而名。為出納腐熟之司。蓋一原一委也。命門非脂非肉。白膜裹之。在七節之旁。兩腎之間。二系着脊下通兩腎。上通心肺。貫屬于腦。為生命之原。相火之主。人物皆以此為生育之祖。兩腎形如豇豆。相並而附于脊下四椎。當胃下兩旁。前後與脾平直。外裹黃脂。各有帶二條。上條系于心。下條過肝腎穴。趨脊木大骨。有二穴。腎由之而入腦。是為髓海。三焦通心。膈中通海。如天地之尊。不屬五行也。真諦云。腦藏則髮素。又系還水之精。上補于腦。可見人身任督二脉。如永出崑崙。自尾箕寅位。週環宇內。注尾閭復上。謂之天河。二脉分子毛際。任自前至唇下。所以統一身之陰。督自後至唇上。所以統一身之陽。通貫前後上下。三脉聯通。則百脉通矣。誠能吸一清氣。徐徐嚥下。丹田轉尾閭上夾脊入頂。從前下丹田。是大之尾閭。亦係寅位。所流而上。崑崙與天地同一源流矣。

藥鑑

雜錄

卷四 四十三

滋生賦

古人立法。圓散用蜜。用糖。而湯飲勿施。則管散煎製。加茶加酒。而水泉載之。血乃成。夫水也者。純陰之精。而氣散微陽。萬物取準。而至柔排勁。縱觀難整。枚舉堪推。春雨水資始發生。助中氣之不足。合藥種子。起陽道之萌芽。朝露水。夜氣所積。萬卉攸資。因時令之殺生。附物性為美惡。治藥明之多汗。對脉症而奏功。水雪水。退大熱。而火症消。地漿水。解中毒。而煩悶醒。繇岩穴中。消涓而出者。為乳穴水。質清味重。茶釀均佳。從梁棟間。珠珠而滴者。為屋漏水。勢清穢承。洗瘡去腐。借夏水之涼氣。療食物而味衰。茹之必成寒熱。搏激之病。探蒸熱于溫泉。藥硫黃而性烈。浴體可助。疥癩頑痺等瘍。糯梗淘瀝。咸號米泔。調中而止霍亂。開胃而消宿食。黃梅天雨。罌蓋貯盛。經久彌淳。入膏易熟。沾水速敗。辦垢如造。疥癬疥肌。瘰癧悉滅。長流水。疏源通遠。四肢濕腫相宜。急流水。湍緩峻速。足腫風濕合治。如治脾胃虛弱。泄瀉不食等症。則用池沼停蓄之水。取其得土氣而助脾元也。如治陰不升。陽

藥鑑

滋生

卷四 四十四

不降。垂溺諸病。則用河井各半之水。取其陰陽和而可升。可也。逆流水。發吐。升散痰飲之機。井底泥大寒。能敷熱病。兼湯火。清晨井中。天一之氣。浮結于面。磁器輕取。是為井華水。饒有補陰之功。缸乘河水。播揚于遍。洒沫漂珠。盈溢騰翻。是為甘瀾水。獨療傷寒陰症。奔豚諸病。醃中氣水。得之非易。飯鍋將熟。仰接瓦盆。晨起沫頭。毛髮潤黑。龍下炊湯。棄之恐後。經宿洗面。消滅顏色。蠶用淨身。引瘡發癰。總之雨露水。雪水諸天。性以四時之節氣為衡。河流井泉水諸地。性以出處流止。土風化為定。生熟湯。洗兒湯。洗盤水。磨刀水。俱屬人為造作。性以隨所着物。倣例為裁。雖然既波別味。病人外藉滋生。源液膏流。玄士專資內養。一則曰舌下廉泉。乞靈乎地。每候潮至。卷舌上向。攪估數次。隨抵上脘。津液自爾湧至。分嚙丹田。炎暑勿渴。勞煩亦不索飲。一則曰呵氣進氣。誠求乎人氣。為真火。健運一身。老弱之夫。下元虧損而陽衰。體痺骨疼。晨昏洊至。童男少女。偕與寢處。而有裨。鼻吸勝吹。有投必納。一則曰呼吸關關。因乎月令。嘘於春令。

明目扶肝。呵於夏令。離前火關。代謂清金。而肺潤。冬吹益坎。而腎堅。類噀三焦。却除煩熱。呼經潤季。辟克消餐。聲微忌細。功勝神丹。凝神睜目。左轉右旋。雙手向頂。且又且擊。或時抱膝。或時聳肩。隨又漱津。隨又嚥涎。循序漸進。守竅通關。由是乃知地為天之根也。氣氣瀰布。陰制陽之亢也。水火廻環。五運相乘。沒假而枯。潤開際。七情紛至。輾轉而耗。燥多端。何以明其然也。蓋嘗覽求其精與細焉。葷腥蔬菜。都是攝生妙藥。知曾知戒。始却病良緣。酒藥力專冲突。厥性昏迷。嫌攸生痰助。喜其開胃合飲。多麴新發。耗血氣。而傷脾胃。斟禁燭醉。膏熟白酒。禦風邪而條營衛。量飲母食。一切炙煇薰香。發痰助火。積久必生疽毒。諸般鮮甘肥脆。生肌助氣。濫用恐決脾垣。陽虛食狗肉。不宜于血虛發熱。癆瘵嚼鰻骨。獨滑于泄痢腸寒。助脾胃者。鯽魚利胎水者。河鯉。母猪發病。助火魚鰾。瘡瘍莫啖鷄鵝。痔漏須餐龜鱉。猪首風發。猪肉肌生。蹄生乳汁。脂生肥。牛汁消痰。牛肉養胃。水粘發癰。湯去腐。菜理崩帶。精估烏鴉。止咳嗽。骨蒸水。雞雞。雞。

虛之腫田螺蜆肉生陰腹之寒鷄蛋精虛可吞猪
腎腰疼可食羊肝明目羊肉補形蟹爪墮胎蟹肉散
血須飲諸牲生血藉其長陰莫食猪腦肝腸防其發
病食兔生兒唇缺食蟹孕婦橫生蟹殼灰止兒梳骨
疼兔頭骨催艱滯產難驚掌黃抹脚指臭爛鷄冠血
全白蠟風瘡牛乳補胃潤腸未宜寒泄豬肉除癆防
蠱且利鼠癢禽肉發風獸齧生火土物性寒破腹海
珍性熱生瘡糟發嗽而血耗于鹹宿損脾而腸廢於
腐也芋石蓂菜利氣利痰麻腐豆粉清腸清胃

菜心

菜

卷四

四十七

菜心菜心是耗精之物芋頭填餓冠化
甚難老弱餐宜非夜銀杏即白服典功能止濁嬰兒
不勿宜生菜蔬食消血損于生熟偏脾補甜菜疴發
滑腸可厭况有毒停豐本是白濁瘀血之仙蔬有妨
瘡症烏梅去久嗽宿痰之快剪渴痢更神西瓜傷暑
助高乾柿熱腸凉沁胡桃祛食積且止腰疼痰喘反
為孽障生梨利痰火更清酒渴寒泄竟是仇家員眼
生血下心熟棗和脾與胃便結難下潤以條松脾濕
為殃致因仙橘石榴瀉血瓜子生痰蔗汁露甘解酒

渴而膀胱以利櫻桃冰火發口臭而疽毒是煤鮮柿
大寒大寒痢作荔枝大熱大熱血流鮮瓜破血落胎
鮮棗生蟲作泄鹽妨吐鯽醬礙人毫末開熱獨妨
虛汗頭目昏蒜能敵臭穢胡椒能散真氣幫胃火者
茴香榮快漿不細細衰膝而健蒲萄酒醉醺醺移時
便醒治傷飲利水為先治傷食吐下為急適飲適食
不藥而期順錯寒悞溫虛弱無上藥

菜

卷上

卷四

四

藥鏡四卷

浙江巡撫
採進本

明蔣儀撰儀嘉興人正德甲戌進士其厯官未詳
是編前後無序跋惟凡例謂醫鏡之鑄駢車海內
今梓藥性仍以鏡名其載藥性分溫熱平寒爲四
部各以儷語括其主治後附拾遺疏原滋生三賦
以補所未備詞句鄙淺徒便記誦而已

新編醫學正傳八卷

〔明〕虞搏撰

浙江圖書館藏明萬曆六年刻本

附《四庫全書總目·醫學正傳

八卷》提要

刻醫學正傳敘

昔太史公作史記其於本紀年表世家列傳平準封禪諸書論之詳矣迺秦越人淳于氏小道耳嚶嚶然弘獎不置口陸宣公節行文章蔚為名臣至其以諛去國惟杜門集古方書數卷無他奇也波其於醫學何勤勤哉豈非以濟民育物之秘而文人墨子所必錄與不佞目不知醫然最愛醫學家言嘗邀邇軒岐近撫丹溪紀乘汪洋浩瀚莫能得其指歸而稍有一二名能醫者則又多掛一漏萬棄人取我其疇能會諸家之大成而開千古之正訣哉長垣令邊君手醫學正傳示不佞曰此花溪虞氏所編也吾將重梓之試敘諸首簡以為是編重不佞受而卒業已而嘆曰其辨精其方

備陰陽虛實之變化形色氣脉之恍惚
則又長桑君諸家所未發者藉第令馬
陸二子而在能無意乎嗟嗟上醫醫意
下醫醫病趙括讀父書莫能難其父弗
是也卒敗死長平李廣不擊刀斗不嚴
部伍匈奴號曰漢之飛將軍夫醫與兵
其意豈二耶良醫以意求醫不以方求
醫若庖丁為文惠君解牛枝經肯綮之
會若然嚮然無不中音矣不則執此之
方印彼之病樊然淆亂其不至於殺人
者幾希秦越人之言曰與知者謀之而
與不知者敗之則天下無良醫是編之
刻也固非為不知者設也 時

萬曆戊寅夏日

賜進士出身直隸大名府推官吳興顧爾

行孟先甫書

九例

一凡諸病總論皆採撫內經要旨以為提綱繼之以
歷代名醫可法之語間或附以己意以成篇段謹
借列各病之首

一凡脉法皆採撫王叔和脉經要語本經缺者則於
歷代名醫諸書採其可法之語以附錄之

一凡方法備載於脉法之後其傷寒一宗張仲景內
傷一宗李東垣小兒科多本於錢仲陽其餘諸病
悉以丹溪要語及所著諸方冠於其首次以劉張

李三家之方選其精粹者繼之於後外有諸家名
醫有理妙方又採附於其末以備參攷

一凡祖父口傳心授及自己歷年經驗方法不敢私
匿悉皆附於諸條之末與衆共之本病無者則缺
之

一凡自己積年歷試四方之病或用心以變法取巧
而治愈者悉附於各條之末俾後人或可採擇
焉無者缺之

一凡集錄諸賢成方蓋為後學設繩墨耳學者不可

固執古方以售今病故又以丹溪活套備錄於各條之後欲使後學執中之有權耳

一凡丹溪諸方法見諸盧氏纂要者悉錄之無遺但有增而無減耳惟丹溪鑒按不錄非爲厭繁將欲採歷代名鑒治驗總成一書名爲古今諸賢鑒按有志未暇姑俟諸歲月云

一凡古方分兩重數太多難憑脩合今悉改爲小劑且如一料十貼之數原方用藥一兩一貼止該一錢從其輕重以十取一惟效東垣都作一服之義

庶使後學依方脩合之便云

一凡古方云咬咀者今悉改爲細切庶使後學之易曉也

一凡修製藥石不別立篇目就於各條藥下細注雖若繁瑣庶免鹵莽者忽畧以誤人也

一凡云用水一盞即今之白茶盞也約計半斤之數餘倣此

一凡鑒學或問五十條皆愚意設辭以申明先哲言不盡意之義是用書於卷首與賢者共議耳非改

自以爲是煩賢者斤正之勿謂愚之狂妄也幸甚

卷之二 凡例

三



醫學正傳卷之一目錄

醫學或問 九五十二條

○中風門 第一論 脉法

丹溪方法 九五

四君子湯 四物湯

二陳湯

小續命湯 大秦朮湯

三化湯

羌活愈風湯 四白丹

二仙丹

防風通聖散 大防風湯

稀涎散

獨聖散 胃風湯

丹溪活套

和傳經驗方 醫按一條

醫學正傳

目錄

乙

○傷寒門 第二論 脉法

丹溪方法 一條

桂枝湯 麻黃湯

葛根湯

小青龍湯 大青龍湯

小柴胡湯

大柴胡湯 調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯 桃仁承氣湯

白虎湯

理中湯 四逆湯

真武湯

朮附湯 小陷胷湯

大陷胷湯

抵當湯 小半夏湯

梔子散

玄參升麻湯 陽毒升麻湯

養附方



藿香正氣散 不換金正氣散 加減涼膈散

十神湯 消風百解散 黃連解毒湯

金沸草散 五苓散 九味羌活湯

兩感大羌活湯 六神通解散 防風通聖散

益元散 三一承氣湯 茵陳蒿湯

甘露飲 丹谿活套 已試醫驗 九二

醫學正傳

目錄

二

醫學正傳卷之一目錄

新編醫學正傳卷一

花溪恒德老人震搏天民編集

姪孫虞守愚惟明校正

醫學或問凡五十三條

或問醫學源流自軒岐以來以醫術鳴世與夫著書立言俾後人之可法者幾何人哉請明以告我曰予嘗閱故學士宋公景濂之文而得其說矣請陳如左夫黃帝內經雖疑先秦之士依倣而作之其言深而要其旨遂以弘其攷辯信而有徵是當為

醫學正傳卷一

醫家之宗下此則秦越人和緩和緩無書可傳越人所著八十一難經則皆舉內經之要而推明者也又下此則淳于意華陀之能經鵠顧固亦導引家之一術至於割腹背瀉腸胃而去疾則涉於神性矣意之醫狀司馬遷備誌之其所謂迴風沓風者今人絕不知為何病也况復求其治療之深旨乎又下此則張机之金匱玉函經及傷寒諸論誠千古不刊之妙典第詳於六氣所傷而於嗜慾食飲罷勞之所致者畧而不議其之文字錯簡亦

醫學正傳卷二

未易以序次求之也又下此則王叔和七經心伯華陀非書為脈經微陰陽內外辨三部九候分人迎氣口條陳十二經絡治法三焦五藏六府之病最為著明惜乎為高陽生括以膚陋之脉歌遂使其本書不盛行於世也又下此則巢元方其病源侯編似不為無所見者但言風寒二氣而不著濕熱之文乃其失也又下此則王冰七推五運六氣之變撰為天元玉策周詳切密亦人之所難苟泥之則局滯而不通矣又下此則王素孫思邈思邈以絕人之識操慈仁惻隱之心其啟千金方暨及粗工害人之禍至為憤切後人稍闡其藩垣亦足以其術鳴但不制傷寒之書或不能無遺憾也素雖闡明外臺秘要所言方證符禁灼灸之詳頗有所祖述然謂鍼能殺生人而不能起死人者則一偏之見也又下此則錢乙雁安時許叔微在準繩尺寸之中而無所發明安時雖能出奇應變而終未離於範圍二人皆得張機之粗者也惟乙深造機之闡與而顯其精華建為五藏之方各

隨所宜謂肝有相火則有瀉而無補腎為真水
有補而無瀉皆啓內經之秘尤知者之所取法也
世槩以嬰孺鑒目之何其知乙之淺哉其遺書散
亡出於閻孝忠所集者多孝忠之意初非乙之本
真也又下此則上谷張元素河間劉完素雖水張
從正元素之與完素雖設為奇異異人以神其授
受實關乙之風而興起者焉若從正則又宗乎完
素者也元素以古方今病決不能相值治病一切
不以方故其書亦不傳其有存於今者皆後來之

醫學正傳卷之十

所附會其學則東垣李杲深得之杲推明內外二
傷而多注意於補脾土之說蓋以土為一身之主
土平則諸藏平矣從正以吐汗下三法風寒暑濕
燥火六門為鑒之關鍵其治多攻利不善學者殺
人完素論風火之病以內經病機氣宜一十九條
著為原病式圖與粹微有非大觀官局諸鑒所可
髣髴究其設施則亦不越攻補二者之間也近代
名鑒若吳中羅益滄洲呂復皆承東垣之餘緒武
林羅知悌丹谿朱彥脩各抱完素之流風又若台

之朱佐越之滑壽咸有著述未易枚舉嗟乎自有
內經以來醫書之成有司者九一百七十九家二
百有九部一千二百五十九卷亦不為不多矣若
夫歷代名醫今但舉其最者言之耳豈能悉其於
斯乎

或問醫學授受之原既得開命矣未審吾子之學何
所適從傳曰醫不三世不服其藥或謂祖父相承
謂之三世或謂善讀三世之書則為三世之醫子
讀三世之書歟為祖父相承之家學歟請明言其

醫學正傳卷之十一

故可乎曰草莽之學其可云乎然醫不止於三世
而其書又奚止於三代哉當取其可法者言之耳
予同邑丹谿朱彥修先生上承劉張李三家之學
而得羅太無為之依歸以醫道大鳴於當世遐邇
咸取法焉予故曾叙祖誠齋府君幸與丹谿生同
世居同鄉於其獲沾親炙之化亦以其術鳴世故
予祖父相承家傳之學有所自來予惟愧夫才疎
質鈍而不能奉揚箕箒之業為憾耳奚足道哉
或問元則害承廼制之義何如曰王安道論之詳矣

其間猶有未悉之旨請陳其畧如左黃帝曰
地理之應六節氣位何如岐伯曰顯明之右君火
之位也君火之右退行一步相火治之復行一步
土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治
之復行一步水氣治之復行一步若火治之相火
之下水氣承之水位之下土氣承之土位之下風
氣承之風位之下金氣承之金位之下火氣承之
君火之下陰精承之尤則害承迴制也制則生化
外列盛衰害則敗亂生化大病夫五行之木土金
水各一惟火有二曰君火曰相火在地理分布六
方在歲時分為六氣初氣自丑至卯始於大寒而
終於春分厥陰風水主之二氣自卯至巳始於春
分而終於小滿少陰君火主之三氣自巳至未始
於小滿而終於大暑少陽相火主之四氣自未至
酉始於大暑而終於秋分太陰濕土主之五氣自
酉至亥始於秋分而終於小雪陽明燥金主之終
氣自亥至丑始於小雪而終於大寒太陽寒水上
之夫所謂顯明者指方位而言日出於卯之地也

少陰君火始於坎而右遷故曰顯明之右蓋天地
左旋六氣右旋故曰退行六位之下各有已所不
勝者承之於下王氏曰承猶隨也而又有妨之之
義以下奉上故曰承其五行之道不亢則隨之而
已一有所亢則起而尅勝之也或曰制者制何事
也害者害何物也制者制其氣之太過也害者害
承者之元氣也夫所謂元氣者總而言之謂之一
元分而言之謂之六元一元者天一生水水生木
木生火火生土土生金金復生水循環無端生生
不息六元者水為木之化元木為火之化元火為
土之化元土為金之化元金為水之化元亦運化
而無窮也假如火不亢則所承之水隨之而已一
有亢極則其水起以平之蓋恐害吾金元之氣子
來救母之意也六氣皆然以五行勝復之理不期
然而然者矣制則生化者言有制之常如亢則制
而生化不息何害之有外列盛衰者言所承者力
衰而所亢者極盛制之不盡耳在天地則為六淫
在人身則為六疾害則敗亂者言無制之變也所

承者衰甚而無氣故所尤者其勢縱橫而不可
也。在天地則大塊絕滅在人身則病真而死矣。大
畧如斯。未盡詳也。學者宜參考安道之論。斯備矣。
或問丹溪先生格致餘論云。陽常有餘。陰常不足。氣
常有餘。血常不足。然先生所著諸方。每云有氣虛
有血虛。有陽虛有陰虛。其所以自相矛盾者。有如是
者。其義何歟。曰。其所謂陰陽氣血之虛實。而以天
地日月對待之優劣論之。其理蘊奧難明。非賢者
莫能悟其旨也。請陳其大畧。如左。夫陽常有餘。陰
常不足者。在天地則該乎萬物而言。在人身則該
乎一體而論。非直指氣為陽而血為陰也。經曰。陽
中有陰。陰中亦有陽。正所謂獨陽不生。獨陰不長
是也。姑以治法兼證論之。曰。氣虛者。氣中之陰虛
也。治法用四君子湯以補氣中之陰。曰。血虛者。血
中之陰虛也。治法用四物湯以補血中之陰。曰。陽
虛者。心經之元陽虛也。其病多惡寒。責其無火。治
法以補氣藥中加烏附等藥。甚者三建湯。正陽散
之類。曰。陰虛者。腎經之真陰虛也。其病多壯熱。責

其無水。治法以補血藥中加知母黃柏等藥。或大
補陰丸。滋陰大補丸之類。經曰。諸寒之而熱者。取
之陰熱之而寒者。取之陽。所謂求其偏也。王注曰。
此言益火之源。以消陰翳。壯水之主。以制陽光也。
夫真水衰極之候。切不可服烏附等補陽之藥。恐
反助火邪。而燉真陰。元陽虛甚之軀。亦不可投辛
苓等辛散淡滲之劑。恐反開腠理而泄真氣。昧者
謂氣虛即陽虛。止可用四君子。斷不可用芎辛之
屬。血虛即陰虛。止可用四物。決不可用參芪之類。
殊不知東垣有曰。陽旺則能生陰。血此陰。陽二字
又曰。血脫益氣。古聖人之法也。血虛者。須以參芪
補之。陽生陰長之理也。惟真陰虛者。將為勞極。參
芪固不可用。恐其不能抵當。而反益其病耳。非血
虛者之所忌也。如王汝言之通達。亦未明此理。其
所著明醫雜著。謂近世治虛。但見虛證。便用參芪。
屬氣虛者。固宜若是。血虛豈不助氣。而反耗陰血。
抑是謂血病治氣。則血愈虛。耗又曰。血虛誤服參
芪。等其溫之藥。則病日增。服之過多。則死。不治。蓋

非溫助氣屬陽亡旺則陰愈消又曰婦人產後血虛陽無所依而浮散於外故多發熱止可用溫物湯補陰血而以灸乾姜之苦溫從治而收其浮散使歸依於陰亦戒勿用參芪也丹溪曰產後當以大補氣血為主既曰陽無所依而浮散於外非參芪等藥何以收救其散失之氣乎噫汝言之論何其與東垣丹溪俱不合耶世之膠柱調瑟者比比皆是予不容不辯也

或問古有四診之法何謂也曰形聲色脉四者而已

醫學正傳

卷之一

九

真

今人惟效脉法但知其一而遺其三焉請陳其理如左夫形診者觀其形以知其病也經曰形氣不足病氣有餘是邪勝也當瀉不當補形氣有餘病氣不足當補不當瀉形氣不足病氣不足此陰陽皆不足也急當補之不可刺刺之重不足重不足則陰陽俱竭血氣皆盡五藏空虛筋骨髓枯者者絕滅壯者不復矣形氣有餘病氣有餘此陰陽皆有餘也急瀉其邪調其虛實故曰有餘者瀉之不足者補之此之謂也又曰形肉既脫九候雖調

者

又曰頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣背者胃中之府背曲肩垂府將壞矣腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣骨者髓之府不能久立行則振掉骨將憊矣凡此之類皆形診之謂也夫聲診者聽其聲以驗其病也經曰聲如從室中言是中氣之濕也言而微終日迺復言者此奪氣也衣被不歛言語善惡不避親疎者此神明之亂也叔和云久病聲嘶者死小兒病忽作鵝聲者死東垣曰言語先輕後重高厲有力是為外感有餘之證言語先

醫學正傳

卷之二

十

小

重後輕沉困無力是為內傷不足之證凡此之類皆聲診之謂也色診者視其面之五色以察其病也經曰赤欲如帛裹朱不欲如赭白欲如鵝羽不欲如鹽青欲如蒼璧之澤不欲如藍黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土黑欲如重漆色不欲如地蒼又曰青如草滋者死黃如枳實者死黑如炁者死赤如衄血者死白如枯骨者死此五色之見死也青如翠羽者生黃如蟹腹者生赤如鷄冠者生白如豕膏者生黑如烏羽者生此五色之見生也生於

心如縞聚疎生於肺如縞一紅生於肝如縞聚生於脾如縞聚括裏實生於腎如縞聚紫此五所生之外色也欲觀五藏之五邪當辨四時之令色經曰從前來者為實邪子能令母實也從後來者為虛邪母能令子虛也從所勝來者為微邪乘者為虛也從所不勝來者為賊邪鬼賊為害也病者為正邪本經自傷也假如春令木旺病者其色青而帶赤是為實邪雖病易治法曰實者瀉其子其色青而帶黑是為虛邪病亦易治法曰虛者補其母其色青而帶黃是為微邪尤為易治法曰微者逆之為正治也其色青而帶白是為賊邪難治故多死法曰其者從之謂反治也若但青而帶白之澤廼是正邪本經自病勿藥而愈四時中以此而推又四時皆帶紅黃多吉青黑為凶若此之類皆色診之要訣學者其可忽乎

或問傷寒之邪中人固無定體然手足各有六經何故只傳足之六經而不及手之六經乎劉草窗謂足六經屬水之才蓋水得寒則冰上寒則折

醫學正傳

卷之二

七

木得寒則葉落枝枯手之六經惟屬金與火蓋火勝水而能敵寒金得寒而愈堅剛其理甚明將何以議之乎曰言似近理而實不然者也請陳一得如左蓋人之有身頂天履地身半已上天氣主之身半已下地氣主之是以上體多受風熱下體多感寒濕其為六節之氣前三氣時值春夏其氣升浮萬物生長故人之身半已上應之後三氣時值秋冬其氣降沉故人之身半已下應之自十月小雪之後為六氣之終太陽寒水用事房勞辛苦之

或問三焦為府有以心胞絡為藏者有以命門為藏者脉訣云三焦無狀空有名或問三焦與心胞絡皆有名無實之府藏而其位俱在膏肓之中或謂

醫學正傳

卷之二

七

心胞絡乃膏中之脂膜又或謂之裹心之肉凡此議論不一其孰非而孰是歟請明以告我曰其理蘊與甚矣難言雖然若夫天人之理不明其可謂之醫乎請畧陳其梗槩如左凡萬物之有形質著乎地者必有象以應乎天也且以五行之理論之如在地有木火土金水之五行在天則有風熱濕燥寒火之六氣蓋人肖天地其五藏六府之具於身者與天地造化生成之理若合符節是故在天為風在地為木在人藏府為肝為膽在天為熱在地為火在人藏府為心為小腸在天為濕在地為土在人藏府為脾為胃在天為燥在地為金在人藏府為肺為大腸在天為寒在地為水在人藏府為腎為膀胱五者之外又有相火遊行於天地上下氣交之中故合為五運六氣人為之相火亦遊行於腔子之內上下膏膜之間命名三焦亦合於五藏六府丹溪曰天非此火不能生物人非此火不能有生夫內經以心胞絡為藏配合三焦而為六藏六府總為十二經也其兩腎本為一藏初無

左右之分越人始分之亦未嘗言其為相火之藏王叔和始立說以三焦合命門為表裏亦有深意寓焉蓋命門雖為水藏實為相火所寓之地其意蓋謂左屬陽右屬陰左屬血右屬氣左屬水右屬火靜守常而主乎水動處變而化為火者也然而相火固無定體在上則寄于肝膽胞絡之間發則如龍火飛躍于霄漢而為雷霆也在下則寓于兩腎之內發則如龍火鼓舞于湖海而為波濤也或曰嘗聞人身之有府者若府庫然能盛貯諸物之名也若大小腸胃膀胱膽五府皆有攸受而盛之者未審三焦為府何所盛乎曰三焦者指腔子而言包函乎腸胃之總司也膏中膏膜之上曰上焦膏膜之下膈之上曰中焦膈之下曰下焦總名曰三焦其可謂之無攸受乎其體有脂膜在腔子之內包羅乎六藏五府之外也其心胞絡實乃裹心之膜包于心外故曰心胞絡其系與三焦之系連屬故指相火之藏府皆寄于膏中此知始而未知終也其餘諸說皆展轉傳訛之語耳管見如斯願

伏知者再論

或問東垣用藥多以升麻益胃目之而悉以升麻柴胡之類佐之何與曰夫天地四時之令春夏之氣溫而升浮則萬物發生秋冬之氣寒而降沉則萬物肅殺人肖天地常欲使胃氣溫而升浮而行春夏生發之令不欲使胃氣寒而降沉而行秋冬肅殺之令耳又升麻能令胃氣從右而上遷柴胡能使胃氣從左而上達經曰清氣在下則生飧泄濁氣在上則生脹脹是以清氣一升則濁氣隨降而無已上等證又參芪等補劑皆味厚而氣滯者若不以升柴等藥提之何以得行於經絡肌表而滋補哉或曰東垣生於北方天傾西北陽氣下陷此法固宜恐東南方上不宜也曰地不滿東南土氣下陷故脾胃之氣不升脾胃之氣不升則上脘不通穀氣不行而內傷之病作矣是以此法尤利於東南方也學者不可不知此意

或問內傷發熱之證其為有痰有食胃中迷悶者因不敢驟用補氣之劑其有未明明白知是

醫學正傳六

卷之

五

五

損內傷之候而投以東垣補中益氣等湯遂致胃中滿悶難當醫者其技窮矣若此者又將何法以治之乎曰此蓋濁氣在上而清氣不能上升故濁氣與藥氣相拒故耳宜以升柴二物用酒製炒更加附子一片以行參芪之氣及引升柴直抵下焦引清氣上升而濁氣下降而服參芪等補藥不致滿悶矣學者其可不知此乎

或問六淫之邪當從內經六氣之太過為是也昔暨和對晉平公之文不曰風寒暑濕燥火而曰陰陽風雨晦明何也曰辭雖異而理實同焉彼謂陰淫寒疾者即太陽寒水之令太過而為寒疾也陽淫熱疾者即少陽相火之令太過而為熱疾也風淫末疾者即厥陰風木之令太過而為末疾也雨淫腹疾者即太陰濕土之令太過而為腹疾也晦淫惑疾者即陽明燥金之令太過而為惑疾也明淫心疾者即少陰君火之令太過而為心疾也或曰陰陽風雨即為寒熱風濕之疾彼此固昭合矣所謂晦淫惑疾與明淫心疾二者似不相符請明以

醫學正傳六

卷之

六

六

告我曰歲金太過燥令大行久晴不雨黃埃蔽空
日月冒明當為疫癘之疾山嵐瘴氣是也感當作
疫傳寫之誤耳君火太過熱令早行火為離明之
象故曰明淫如內經所謂天明則日月不明是也
少陰君火司令故曰心疾春分至小滿時太熱也
有釋明為晝明晦為夜晦惑為蠱惑心志皆非也
夫晝明夜晦天道自然之理何淫之有其蠱惑心
志者亦非天地之淫邪也學者宜再思之

或問飲食同入於胃而水穀二者何如而分乎且如

醫學正傳

卷之

七

膀胱止有下口而無上口其水固可出不知從何
而入乎又何其如是之清乎內經曰飲食入胃游
溢精氣上輸於脾氣散精上歸於肺通調水道
下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五行陰
陽揆度以為常也夫胃為倉廩之官無物不受全
藉脾土轉輸而運化焉蓋水穀入胃其濁者為粗
滓下出幽門達大小腸而為糞以出於穀道其清
者脩焉而化為氣依脾氣而上升於肺其至清而
至精者由肺而灌漑乎四體而為汗液津濡助血

脉蓋氣力而為生生不息之運用也其清中之濁
者下入膀胱而為溺以出乎小便耳其未入而在
膀胱之外者尚為濁氣既入而在膀胱之內者即
化為水是故東垣有曰飲者無形之氣正謂此也
蓋肺屬金而覆乎脾胃之上即如天之覆於地之
上也經曰清陽為天濁陰為地地氣上而為雲天
氣下而為雨水入於胃轉化氣而上升亦猶天降
霖雨於地脩焉化為氣上騰而為雲又復化為霖雨
而下降也或曰老人與壯年者飲水無異多寡壯
年小便甚少而老者小便甚多何也曰壯者如春
夏之氣升者多而降者少老人如秋冬之氣降者
多而升者少耳或曰降多即小便多升多者未見
其為何物而出於上竅焉曰經曰清陽出上竅濁
陰出下竅清陽發腠理濁陰走五藏清陽實四肢
濁陰歸六府各從其化也夫大塊之為氣不可論
其涵容之量人之氣化亦猶是也賢者宜再思之
或問人之壽夭不齊何歟曰元氣盛衰不同耳夫人
有生之初先生二腎號曰命門元氣之所司性命

醫學正傳

卷之

八

七

之所繫焉是故腎元盛則壽延腎元衰則壽夭此一定之理也或曰今見肥白之人多壽大元氣反衰乎瘦黑之人多壽延元氣反盛乎曰丹溪謂白者肺氣弱黑者腎氣足又曰肥不如瘦白不如黑或曰四方之人皆同乎曰不同也內經五常政大論云陰精所奉其人壽陽精所降其人夭又曰東方陰也陽者其精降於下故右熱而左濕西北方陰也陰者其精奉於上故左寒而右涼王註曰陰精所奉高之地也陽精所降下之地也陰方之

醫學正傳

卷之十一

十九

子

地陽不妄泄寒氣外持邪不數中而正氣堅守故壽延陽方之地陽氣耗散發泄無度風濕數中其氣煩渴故夭折或曰常聞天人之理同一揆也今見於天地之四方者既得聞命矣而具於人之五藏者未之聞也請申明其說可乎曰西北二方在人為腎水肺金所居之地二藏常恐其不足東南二方在人為肝木心火所處之位二藏常恐其有餘難經曰東方實西方虛瀉南方補北方等語即此之義也夫腎水既實則陰精時上奉於心肺故

東方之水氣不實而西方之金氣不虛此子能令母實使金得以平水也是故水日以盛而火日以虧此陰精所奉於上而令人壽延也若夫腎水弱虛則無以制南方之心火故東方實而西方虛其命門與胞絡之相火皆挾心火之勢而來侮所不勝之水使水日虧而火日盛此陽精所降於下故令人夭折也大抵王水註天地之四方言越人主人身之五藏論皆不失內經之旨同歸於一理也學者詳之

醫學正傳

卷之十一

二十

或問經謂清氣在下則生飧泄濁氣在上則生腹脹夫病在上者法當用木香檳榔等藥以降之病在下者法當用升麻柴胡等藥以提之理固然也其或泄痢脫肛後重大孔痛不可忍是為氣下陷也法當舉之以升麻柴胡和之以木香檳榔若大四藥同劑不無升降混淆奚有歸一治病之功邪曰天生藥石治病各逞其能如張仲景制大柴胡湯用柴胡大黃同劑以治傷寒表裏俱見之證然柴胡升而散外邪大黃降而泄內實使病者熱退氣

和而愈今用升麻柴胡自能升清氣而上行水者
橫擲自能逐邪氣而下降故使脫肛舉而後重余
故可同劑而成功矣何疑之有哉欲用藥者宜做
此而擴充之可也

或問人身之兩腎猶車之有兩輪其形同色亦無異
不知王叔和何所見而獨謂左腎屬水而右腎屬
火又指右腎為命門以配三焦之經嘗聞有生之
初胚胎未成之際先生二腎即造化天一生水之
義今以水火岐之冰炭相反何歟曰予嘗私淑丹

醫學正傳

卷之十一

五十二

火

溪而得其說矣按內經以心胞絡為三焦相火之
配而並行於經也其兩腎本為一藏初未嘗有左
右之分而越人始分之亦不言其為相火之根叔
和立說以三焦合命門為表裏亦有深意存焉蓋
謂腎為陰而本主乎靜上則陽寓於其中陽既孕
矣其能純乎靜而無生氣之動歟若經所謂靜屬
水受五藏六府之精而藏之是陽歸之陰而成孕
者也又謂腎為作強之官伎巧出焉陽出之陰而
化生者也是故腎為一藏配五行而言者則屬之

小矣以其兩腎之形有二象而言者亦得以左右
分陰陽剛柔而命為五藏之根元也以左為陰右
為陽陰為水陽為火水為血火為氣於是左腎之
陰水生肝木肝木生心火右腎之陽火生脾土脾
土生肺金其四藏之於腎猶枝葉之出於根也雖
然但不可獨指右腎為命門耳經曰大衝之地名
曰少陰少陰之上名曰太陽太陽根起於至陰結
於命門按王註靈樞經云命門者目也抑考明堂
銅人等經命門一穴在脊中行第十四椎下陷中
醫學正傳

卷之十一

五十二

火

兩腎之間夫兩腎固為真元之根本性命之所關
雖為水藏而實有相火寓乎其中象水中之龍火
因其動而發也愚意當以兩腎總號為命門其命
門穴正象門中之振闔司開闔之象也惟其靜而
闔涵養乎一陰之真水動而開鼓舞乎龍雷之相
火夫水者常也火者變也若獨指乎右腎為相火
以為三焦之配尚恐立言之未精也未知識者以
為何如

問內經所謂壯火之氣衰少火之氣壯三焦之氣

氣食火火壯火散氣火生氣何謂也曰王太
己有註文但米甚詳耳請陳一得如左夫壯火之
氣衰少火之氣壯者言造化勝復之理少而壯壯
而衰衰而復生循環無端生生不息經雖不言衰
而復生其理實在其中矣壯火食氣者言元氣見
食於壯火也氣食火火者言元氣見助於少火也
壯火散氣謂耗散元氣少火生氣謂滋生元氣此
二句申明上文二句之言耳蓋火不可無亦不可
而不可壯也火則滋助乎真陰壯則燒燦乎元氣
陰陽造化之理無往不復大火壯而亢極則蕪水
化以制之經曰亢則害承廼制也又曰制則生化
故壯火衰而少火復生是以陰陽調和萬物生旺
四時生長化收藏之道即此理也以人論之胚胎
未成之初先生二腎以涵養真陰是故名為元氣
天一生水之義焉然後肝心脾肺以及五府相繼
而生五藏五府之外又有胞絡相火遊行於三焦
之間故以三焦為配二者皆有名無實之府藏
相火無定位故也抑攷先哲有曰天非此火不

生物人非此火不能有生言其不可無也此非少
火生氣之意乎又曰火與元氣不兩立一勝則一
負言其不可亢也又非壯火散氣之謂乎管見如
斯未知是否

或問越人難經第一難中所謂十二經皆有動脉獨
取寸口以決五藏六府死生吉凶之法又曰寸口
者脉之大會手太陰之脉動也夫寸口一脉何以
能決藏府死生吉凶乎蓋張氏註為右寸謂右
寸之屬肺也四明張氏註為寸謂脉會太淵穴
也二說不同其孰非而孰是與請明以告我曰古
聖立法以三部九候決人死生以六藏六府分配
於六部之中故可以驗人藏府之吉凶也殊不知
內經言寸口者頗多悉蕪闕尺而言也大槩古人
以寸口為六脉之總名耳不然內經何以言寸口
之脉中手短者曰頭痛寸口脉中手長者曰足脛
痛寸口脉中手促上擊者肩背痛若此之類莫能
盡談先哲註謂中手為醫者之中指也然非病者
之関脉乎夫越人之難經因內經而作故有是

今之註者皆以己意妄釋故與經旨不合學者宜再思之

或問難經第八難曰寸口脉平而死者何謂也然諸十二經脉者皆係於生氣之源所謂生氣之源者十二經之根本也謂腎間動氣也此五藏六府之本十二經之根呼吸之門三焦之源一名守邪之神故氣者人之根本也根絕則莖葉枯矣寸口脉平而死者生氣獨絕於內也夫所謂腎間動氣者釋者皆指為兩尺兩尺既絕何謂寸口脉平何不

醫學正傳

卷之一

五

三

言尺中腎脉而言腎間動氣請明辨以釋吾疑乎甚曰此言寸口脉平而死者亦兼尺而論也腎間動氣者脐下氣海丹田之地也或曰脐下中行乃任脉所屬與腎何相干哉曰各開寸半為第二行皆屬足少陰腎經其脐與背後命門穴對各開寸半腎腧穴也故丹田氣海與腎脉相通為腎之根也又若有生之初先生二腎胞系在脐故氣海丹田實為生氣之源十二經之根本也或曰寸口既平奚疑其死乎曰此為病劇形脫者論

曰形肉已脫九候雖調者死凡見人之病劇者人形羸瘦大肉已脫雖六脉平和尤當診候足陽明

之衝陽與足少陰之太谿二脉或絕更候臍下腎間之動氣其或動氣未絕猶有可生之理動氣如絕雖三部平和其死無疑矣醫者其可不詳察乎或問內經有曰陽明病甚則棄衣而走登高而歌或不食數日而踰垣上屋所上之處皆非素所能也素非所能因病而不食不飲登非當之處是有是哉曰難經有云重陰者狂重脉者顛又曰顛多喜

醫學正傳

卷之二

六

而狂多怒所謂重陽者三部陰陽脉皆洪盛而牢故病強健而有力故名曰狂謂重陰者三部陰陽脉皆沉伏而細故病疲倦而無力故名曰顛嘗見東陽樓氏一少年病狂一日天風大作忽騰上于邑東之塔巔且歌且哭其塔實無容步之皆舉皆以為狂予思龍乃純陽之物伏蟄于海內其身止有鱗甲且無羽翼遇陽氣升騰之日則借風雲之勢而能飛騰即此義也矣是為狂也

或問難經五十三難曰經言七傳者死問傳者生然

七傳者傳其所勝也間傳者傳其子也何以言之
假令心病傳肺肺病傳肝肝病傳脾脾病傳腎腎
病傳心一藏不再傷故言七傳者死也間藏者傳
其所生也假令心傳脾脾傳肺肺傳腎腎傳肝肝
傳心是子母相傳周而復始如環無端故言生也
夫經文所謂七傳者據其數止六傳而已謂一藏
不再傷按其數乃有四藏不再受傷且其間藏之
理未聞有發明之旨釋者止是隨文解義而已請
明辯以釋吾疑可乎曰夫此條言虛勞之證也其
醫學正傳大 卷之一 二十七 三百四十五
所謂七傳者心病上必脫腎病傳心一句其一藏
不再傷當作三藏不再傷皆傳寫之誤耳蓋虛勞
之證必始於腎經五藏從相剋而逆傳已盡又復
傳於腎與心則水絕滅而火大旺故死而不復再
傳彼之三藏矣其有從相生而順傳者蓋腎水欲
傳心火却被肝木乘間而遂傳肝木然後傳心火
次第由順行而及於彼之三藏而有生生不息之
義故日間藏者生學者其再思之
或問醫家以水煮藥石本草著名類多而未詳其

用曰長流水曰急流水曰順流水曰逆流水曰千
里水曰半天河水曰春雨水曰秋露水曰露花水
曰井花水曰新汲水曰無根水曰菊英水曰潦水
曰井爛水曰月窟水夫何一水之用而有許多之
名必其法各有所長請逐一明言其故無吝曰謂
長流水者即千里水也但當取其流長而來遠耳
不可泥於千里者以其性速而通達歷科坎已多
故取以煎煮手足四末之病道路遠之藥及通利
大小便之用也曰急流水者湍上峻急之流水也
以其性速急而達下故特取以煎煮通利二便及
足脛以下之風藥也曰順流水者其性順而下流
故亦取以治下焦腰膝之證及通利二便之用也
曰逆流水者慢流洄瀾之水也以其性逆而倒流
故取以調和發吐痰飲之劑也曰半天河水者即
長桑君授扁鵲飲以上池之水乃竹籬籬頭管內
之積水耳取其清潔自天而降未受下流污濁之
氣故可以為煉還丹調仙藥之用也曰春雨水者
立春日空中以器盛接之水也其性始得春升生

發之氣故可以煮中氣不足清氣不升之藥也古
方謂婦人無子者於立春日清晨以器盛空中之
雨水或此日有草曉露之水夫妻各飲一杯還房
當即有孕取其資始資生發育萬物之義耳曰秋
露水者其性稟收斂肅殺之氣故可取以烹煎殺
崇之藥及調付殺癩虫疥癬諸虫之劑也曰井花
水者清晨井中第一汲者其天一真精之氣浮結
于水面故可取以烹煎補陰之劑及修煉還丹之
用今好清之士每日取以烹茶茗而謂清利頭目
醫學正傳天 卷之九 子九
景佳其性味同於雪水也曰菊英水者蜀中有長
壽源其源多菊花而流水四季皆菊花香居人飲
其水者壽皆二三百歲故陶靖節之流好植菊花
日採其花英浸水烹茶期延壽也曰新汲水者井
中新汲水未入缸甕者取其清潔無混雜之劑故
用以烹煮藥劑也曰井爛水者器盛水以物揚躍
使水珠沫液盈於水面其水與月窟水性同取其
味甘溫而性柔故可以烹傷寒陰證等藥也曰潦
水者又名無根水山谷中無人跡去處新土科凹

中之水也取其性不動搖而有土氣内存故可以
煎熬調脾進食以補益中氣之劑也夫本草雖有
諸水之名而未詳言其用今故述之以為後學之
矜式云
問丹路治腫脹之證專主乎土敗木賊濕熱相乘
為病東垣又多主乎寒言病机諸腹脹大者屬於
熱之語乃言傷寒陽明經大寒大滿之證也又云
熱脹少而寒脹多二說不同其孰非而孰是與曰
東垣北方人也其地土高燥濕熱少而寒氣多故
醫學正傳天 卷之九 子九
有是論我丹溪先生生長於東南之地故病此者
盡因脾虛受濕肝木大旺故言然也或曰二說不
同之義既得聞命矣而丹溪治腫之大法曰必須
養肺以制木使脾無賊邪之慮滋腎以制火使肺
得清化之源斷妄想以保母氣卻鹽味以防助邪
以大劑人參白朮補脾使脾氣得實自能健運升
降此千載不易之定論萬舉萬全之妙法也活人
多矣嘗用此法以治黃腫之證反加悶亂增劇不
安改用香附蒼朮厚朴之劑反獲全功竊思水腫

與黃腫皆是濕熱傷脾所致何治法之不同與曰
夫水腫之證蓋因脾土虛甚而肝木太過故水濕
妄行其中雖有清痰留飲實無鬱積膠固故以參
朮為君而兼以利水清金去濕熱之藥此標本兼
該之治故有十全之功也彼黃腫者或酒疸或穀
疸沉積頑痰膠固鬱結於其中故或為痞癰或為
積聚是以積於中而行於外蓋因上氣外形而黃
也故宜以蒼朮厚朴香附陳皮之類以平其土氣
之敦阜用鐵粉青皮之類以平其木氣之有餘加

醫學正傳

卷之十一

三十一

以麴藥助脾消積退黃之後仍用參朮等補脾之
劑以收十全之功此標而本之之治也若二證之
藥易而治之禍不旋踵寧可不不知

或問飢甚方食而食反不運化多為嘔吐吞酸等證
何也曰飢而即食渴而即飲此造化自然之理也
飢不得食胃氣已損脾氣已傷而中氣大不足矣
遇食大嚼過飽益甚是以大傷胃氣輕則吞酸惡
心重則惡寒發熱而為內傷等症者多矣又或負
重遠行辛苦飢甚遇食太過則四體倦怠矣若又

用力復行適遇風雨外襲遂成內傷扶外感之
或為腫脹危篤之疾養生君子切宜防微杜漸戒
之戒之

或問鍼法有補瀉迎隨之理固可以平虛實之證其
灸法不問虛實寒熱悉令灸之其亦有補瀉之功
乎曰虛者灸之使火氣以助元陽也實者灸之使
實者瀉之氣而發散也寒者灸之使其氣之復溫
也熱者灸之引熱之氣外發火就燥之義也其
鍼瀉之法予恐但有瀉而無補焉經謂
瀉者迎而奪之以鍼迎其經脈之來氣而出之固
可以瀉實也謂補者隨而濟之以鍼隨其經脈之
去氣而留之未必能補虛也不然內經何以曰無
刺熇熇之熱無刺渾渾之脉無刺漉漉之汗無刺
大勢人無刺大飢人無刺大渴人無刺新飽人無
刺大驚人又曰形氣不足病氣不足此陰陽皆不
足也不可刺刺之重竭其氣老者絕滅壯者不復
矣若此等語皆有瀉無補之謂也學者不可不知
此等之疾世俗例用方寸士大補功以

醫學正傳

卷之十一

三十二

其方實為諸虛之關鍵也用參芪苓朮甘草以補氣虛用芍歸芍藥地黃肉桂以補血少吾子將何以議之乎曰此藥乃氣血兩虛之劑或血虛而氣尚實或氣虛而血尚充者其可一例施乎內經曰毒藥以治其病蓋藥性各有能毒然中病者藉其能以獲安不中病者徒惹其毒以增病耳假如心脾二經虛損當以茯苓補之虛而無汗及小水短少者服之有功虛而小便數者多服則令人目盲虛而多汗者久服損真氣夫人天年以其味淡而利竅也又如肺氣弱及元陽虛者當以黃芪補之然肥白人及氣虛而多汗者服之有功若蒼黑人腎氣有餘而未甚虛者服之必滿悶不安以其性寒而閉氣也甘草為健脾補中及瀉火除煩之良劑然嘔吐與中滿及嗜酒之人多服必飲膈不行而嘔滿增劇以其氣味之甘緩也川芍為補血行血清利頭目之聖藥然骨蒸多汗及氣弱人久服則真氣支散而陰愈虛甚以其氣味之辛散也生地黃能生血脈然胃氣弱者服之防損胃不食熱

地黃補血養血然痰火盛者恐泥膈不行人參為潤肺健脾之藥若元氣虛損者不可缺也然久嗽勞嗽咯血鬱火在肺分者服之必加嗽增喘不寧以其氣味之甘溫滯氣然也白芍藥為涼血益血之劑若血虛腹痛者豈可缺歟然形瘦氣弱稟賦素虛寒者服之恐伐發生之氣以其氣味之酸寒也藥性雖毒未易悉舉學者宜究本草之詳不可妄施以殺人

或問脈經謂一息四至以上為無病常人之脈今見無病之人或有一息五至有奇者有一息三至無餘者何如是之異乎曰生成之脈豈無緩急遲數之殊歟經曰性急脈亦急性緩脈亦緩大抵脈緩而遲者多壽脈急而數者多夭經曰根於中者命曰神機神去則機息蓋氣血者人身之神也脈急數者氣血易虧而神機易息故多夭脈遲緩者氣血和平而神機難損故多壽先哲論江海之潮即天地之呼吸晝夜止二升二降而已人之呼吸晝夜一萬三千五百息故天地之壽悠久而無疆人

之壽延者數亦不滿百也管見如斯未知是否
或問有人寸關尺三部之脉按之絕無形跡而移於
手陽明經陽谿與合谷之地動者何歟曰手太陰
經肺與手陽明大腸一藏一府相為表裏其列缺
穴乃二經之絡脉故脉從絡而出於陽明之經此
為妻乘夫位地天交泰生成無病之脉耳學者可
不曉歟

或問婦人產後之證丹溪為當以大補氣血為主治
雖有雜證以未治之又曰產後中風切不可作風

醫學正傳

卷五

五

五

治而用風藥然則產後不問諸證悉宜大補氣血
乎曰詳主禾二字其義自明若夫氣血大虛諸證
雜標但虛而無他證者合宜大補氣血自愈或因
虛而感冒風寒者補氣血藥帶驅風之劑或因脾
虛而食傷太陰者補氣血藥加消導之劑或因瘀
血惡露未盡而惡寒發熱者必先逐去瘀血惡露
然後大補經曰有本而標之者有標而本之者又
曰急則治其標緩則治其本丹溪主禾二字即標
本之意耳臨證之際其於望聞問切之間豈不可

辨乎若一例施之以補豈非刻舟求劍之術耶

或問妊娠之婦有按月行經而胎自長者有三五箇
月間其血大下而胎不墮者或及期而分娩或踰
月而始生其理何歟曰其按月行經而胎自長者
名曰盛胎蓋其婦血氣充盛養胎之外其血尤有
餘故也其有數月之胎而血大下謂之漏胎蓋因
事觸動任脉故血下而未傷於子宮故也雖然孕
中失血胎雖不墮其氣血亦虧多致踰月不產予
曾見有十二三月或十七八月或二十四五箇月
生者往往有之俱是氣血不足胚胎難長故耳凡
十月之後未產者當服大補氣血之藥以培養之
庶分娩之無憂也學者不可不知

醫學正傳

卷五

五

五

或問丹溪所謂難產之婦皆是八九箇月內不能謹
以致氣血虛故也請問其肯何歟曰蓋婦人有娠
大不宜與丈夫同寢今人未諳此理至於八九箇
月內猶有房事夫情慾一動氣血隨耗蓋胎孕全
伏氣血培養氣血既虧則胎息羸弱日月既足子
知夢覺即欲分娩遂能拆胞求路而出胞破之後

其胞中之漿水沛然下流胎息強健者即翻身隨
漿而下此為易產者也胎息倦弱者猶如夢寐未
醒轉頭遲慢不能隨漿而出胞漿既乾則汚血閉
塞其生路是以子無所向遂致橫生逆產臨產之
際谷見漿下而水分挽者便當憂恐急脹催生之
藥如蜀葵子之類逐去惡血道路通達庶有速產
之功醫者不可不知此意

或問山居野處之地云有狸魅之患誠有此歟否歟
曰妖祟為患自古有之非獨老狐成精至於人家

醫學正傳

卷之十一

三七

猶人亦有善為妖者大抵被其惑者皆性淫而氣
血虛者也故邪乘虛而入耳未有正人君子血氣
充實者而被其惑焉治法必滋補其真陰以壯其
正氣安養其心神以禦其姦邪房帏之內罅隙不
通邪何由而入焉若以師巫降童等邪術治之則
神愈不安決無可瘳之理斯疾者可不謹歟
或問中風之候皆半身不遂其有遷延歲月不死者
何也曰如水之根本未甚枯而一邊之枝幹先萎
耳經曰根於中者命曰神機神去則機息言動根也

於外者命曰氣立氣止則化絕言植也夫神機未息

亦猶氣化之未絕耳故半身雖不運用然亦未至

於機息而死也古所謂癱瘓者亦有深意存焉言

癱者坦也筋脉弛縱坦然而不舉也瘓者渙也血

氣散慢渙然而不用也或曰其為治之法與諸痺

同乎曰不同也經謂風寒濕三氣合而成痺故曰

痛痺筋骨痛曰著痺滯行曰行痺走注曰周痺周身痛

皆邪氣有餘之候也其癱瘓者或血虛或氣虛皆

正氣不足之證其治法故不同也惟痿痺屬血虛

醫學正傳

卷之十一

三八

麻痺屬氣虛與癱瘓治法大同而小異焉學者宜
加詳察毋蹈乎實實虛虛之覆轍云

或問雀目之證遇晚則目不見物至曉復明此何病

使然曰是則肝虛之候也或曰肝常慮其有餘然

亦有不足者乎曰邪氣盛則實正氣奪則虛其人

素稟血虛適遇寅申二年少陽相火司天厥陰風

木在泉火炎於上木鬱於下夫胞絡相火既盛則

心血沸淖而乾涸經曰天明則日月不明邪害空

竅蓋心出血肝納血心血既涸則肝無攸受經又

曰日得血而能視緣肝開竅在目肝既無血則目
瞽而不明矣或曰日瞽不明既得開命矣其晚暗
而曉復明者何也曰木生於亥旺於卯而絕於申
至於酉戌之時木氣衰甚遇亥始生至日出於卯
之地木氣稍盛而目復明矣雖然終不能瞭然如
故或曰雀目之患終變為黃膜而死何也曰木絕
於申乃水土長生之地木氣萎和土氣敦阜經謂
氣有餘則制已所勝而侮所不勝此土氣有餘而
侮所不勝之木也或曰治法何如曰先宜地黃芩
歸等藥以補益其腎肝之不足次用厚朴蒼朮陳
皮之類平其土氣之有餘此乃畧示端倪耳醫者
自宜臨症斟酌而處治之慎不可按圖而索驥也
或問小兒氣喘世俗例以為犯土謂犯其土皇也或
安碓或作竈或浚井填塞開通溝渠等事適遇小
兒氣喘遂云犯土無疑矣信聽術士退土或書符
命貼於動土之處或呪法水焚符調服或按家之
九宮謂土皇居於何宮太陽落於何宮當取太陽
之土與兒飲之能釋土皇之厄而喘定間亦有驗

有夫歷代醫書汗牛充棟何不該載而遺此證
黃冠之流醫治欺請明以告我曰夫小兒發喘多
由風寒外束腠理壅遏而肺氣不得宣通而為病
耳治法常用錢氏瀉白散或三拗湯等劑使腠理
開通肺氣舒暢而喘息定矣或因吐瀉之後而中
氣不足亦使短氣而喘治用錢氏益黃散東垣補
中益氣湯或用伏龍肝湯泡放溫飲之其喘立定
者有之蓋脾土大虛必借土氣以培益之其術士
窺竊此意而巧立名色而謂太陽之土能安土也
夫小兒之證不一或慢驚直視而喘或肺脹氣促
而喘縱取太陽土盈盎以沃之亦莫能救其萬一
醫者自宜檢方按法調治毋聽末流之俗以致惑
焉
或問婦人懷鬼胎者何歟曰昼之所思為夜之所見
凡男女之性媾而虛者則肝腎之相火無時不起
故勞怯之人多夢與鬼交夫所謂鬼胎者偽胎也
非實有鬼神交接而成胎也古方有云思想無窮
百病不遂為白淫白濁流於子宮結為鬼胎也

婦自己之血液凝精聚結成塊而胸腹脹滿微若胎孕耳非偽胎而何或曰嘗聞滑伯仁醫驗謂仁孝廟廟祝楊大成一女薄暮遊廟廡見黃衣神覺心動是夕夢與之交腹漸大而若孕邀伯仁治診之曰此鬼胎也其母道其山與破血墜胎之藥下如科斗魚日者二升許遂安此非與神交乎曰有是事而實無是理豈有土木為形能與人交而有精成胚胎耶噫非神之惑於女乃女之惑於神耳意度此女年長無夫正所謂思想無窮所願不遂

醫學正傳

卷之

四

也有道之士勿信乎邪說之惑焉

或問鰲峯熊氏纂集運氣全書及撰為傷寒鈐法以病者之所生年月日時合得病之日期推算五運六氣與傷寒六經證候無不脗合謂某日當得某經其經當用某藥而以張仲景一百一十有三方按法施治如六陽無汗麻黃湯有汗桂枝湯之類使後學能推此法不須問證察脉但推算病在此經即用此經之藥實為醫家之捷徑妙訣也吾子可不祖述乎曰此馬宗素無稽之術而以世之生

靈為戲玩耳竊謂上古聖人仰觀天文俯察地理以十干配而為五運以十二支合而為六氣天以六方寓之歲以六氣紀之以天之六氣加臨於歲之六節五行勝復盈虧之理無有不驗傳曰天之高也星辰之遠也苟求其故千載之日至可坐而致也今草莽野人而以人之年命合病日而為運氣鈐法取仲景之方以治之是蓋士師稷情而就法也殺人矣矣知理君子幸勿蹈其覆轍云

醫學正傳

卷之

四

或問龐安常傷寒總病論所載時氣瘟疫謂春有青筋卒證其候頸背雙筋牽急先寒後熱腰強急脚縮不伸脰中欲折或眼黃項背強直夏有赤脉攢證其候口乾舌裂咽塞戰掉驚動不定秋有白氣狸證其候經絡壅滯皮毛堅發泄體熱生斑氣喘引飲冬有黑骨瘟證其候腰痛欲折膏脇如刀刺切痛心腹膨脹四季有黃肉隨證其候頸下結核頭重項直或皮肉強硬而隱隱發熱嘗聞醫有賢愚疾無今古近年以來未嘗有已上諸證何今古之不同歟請明言其故幸甚曰瘟疫之證素無

定體或氣運之變遷或世情之千古愧予年踰八旬畧未見此異證或世有之而予未之見歟抑亦見之而予未之識歟安常稟出類拔萃之資為一代名世之士著述方書以為後學之規範豈好為異說以欺世罔俗哉姑錄之以俟達者再論

或問龐安常傷寒總病論所載聖散子方謂出於蘇子瞻尚書所傳又謂其方不知所從來而故人巢君穀世寶之以治瘟疫之疾百不失一安常讚曰自古論病惟傷寒至為危急表裏虛實日數證候

醫學正傳

卷之

四

大

應汗應下之法差之毫釐輒至不救而用聖散子者一切不問陰陽二感或男女相易狀至危篤者連飲數劑則汗出氣通飲漸進神宇完復更不用諸藥連服取差其餘輕者心額微汗正爾無恙藥性少熱而陽毒發狂之類入口即覺清涼殆不可以常理詰也時疫流行平旦輒煮一釜不問老少良賤各飲一大盞則時氣不入其門平居無病能空腹一服則飲食甘美百疾不生真濟世衛家之寶也吾子何不遵其法多合以濟世之瘟疫豈非

積德之一事乎曰予閱其方殆與醫道不合蓋其藥味止是燥熱助火之劑別無祛邪除瘴之能如黑附子高良姜吳茱萸石菖蒲麻黃細辛半夏厚朴肉豆蔻防風藿香豈非辛烈燥熱之劑乎其有扶苓蒼白朮藁本猪苓澤瀉獨活甘草稍溫不熱雖有柴胡芍藥枳殼三味之涼恐一杯之水難救一車薪之火夫熱藥治熱病素問謂之從治又謂之反治又謂之劫劑然此方必當時適遇瘟疫之身熱無汗或日期已過邪氣欲去正氣將復之際偶投一服二服劫而散之者有之由是衆皆以為得神仙之法爭錄其方以傳於世正所謂訛上傳訛也豈可以大釜煎煮令一家俱飲乎又豈可令無病之人空腹服此熱藥乎用藥者若不執之以理而謂不殺人者予未之信也安常為一代之名醫而載此方於傷寒論中而謂能博施濟衆亦賢者之過焉

或問脈砂之證古方多不該載世有似寒非寒似熱非熱四體懈急飲食不甘俗呼為砂病其治或先

以熱水蘸搭臂膊而以掌摩刮之甚者或以針刺
十指出血或以香油燈照視身背有紅點處烙
之以上諸法皆能使腠理開通血氣舒暢而愈此
病又何由而得之乎曰內經名為解僂原其
所因或傷酒或中濕或感冒風寒或房事過多或
婦人經水不調血氣不和皆能為解僂證與砂病
相似實非真砂病也夫砂病者嶺南煙瘴之地多
有之矣詩云為鬼為蜮則不可得註云蜮短狐也
江淮間多有之能含砂以射水中人影唐詩云射
工巧俟遊人影亦謂此也不見其形若被其毒
輒為寒熱而病一日蜮如蟹有三足一名射影病
瘡如疥痺雅曰有一角橫在口前如弩檐臨其角
端曲如上弩以氣為矢因水勢以射人俗呼水弩
鵝能食之本草云溪毒砂虱水弩射工蜮短狐鰕
鰕之類俱能含砂射人被其毒者則憎寒壯熱百
體分解若傷寒初發之狀彼土人治法以手捫摸
痛處用芋葉或井蔗葉捲角入肉以口吸出其砂
外用生大蒜搗膏封貼瘡口即愈諸虫惟鰕鰕最

毒者不早治十死七八其毒深入於骨若鰕鰕之
狀其瘡類乎疔腫彼地有鸛鵒鸛鵒等鳥專食已
上諸虫凡遇此病即以此鳥毛糞燒灰服之及籠
此鳥於病者身畔吸之其砂聞氣自出而病安也
其他無此諸虫之地實非真砂證也管見如斯學
者更宜博訪以長見聞可也
或問瘡與痰癰積聚癰疽病雖似而其名各不同請
逐一條陳其說以曉後學可乎曰瘡者否也如易
所謂天地不交之否內柔外剛萬物不通之義也
物不可以終否故瘡久則成脹滿而莫能療焉瘡
癰者懸絕隱僻又玄妙莫測之名也積者跡也挾
痰血以成形跡亦鬱積至久之謂爾聚者緒也依
元氣以為端緒亦聚散不常之意云癰者徵也又
精也以其有所徵驗及久而成精萃也瘡者假也
又選也以其假借氣血成形及歷年選遠之謂也
大抵瘡與痰癰乃膏肓間之候積與聚為肚腹內
之痰其為上中二焦之病故多見于男子其癰與
瘡獨見於臍下是為下焦之疾故常得於婦人大

凡腹中有塊不問積聚癥瘕俱為惡候切勿視為尋常等疾而不求醫早治若待脹滿已成膏腹鼓急雖倉扁復生亦莫能救其萬一遘斯疾者可不懼乎

或問世有巫蠱魘魅之術云可咒人致死果有此乎否乎曰有此事而實無此理也夫蠱毒魘魅之術皆闕廣深山僻野之俗或因姦或因財及謀產爭婚等事蓋惡欲其死之念一興故無所不用其極矣多竊仇家之生命或琢木成像書其名與年命

醫學正傳卷之十一

而塗之或畫其像書其名作紙棺以埋之或書符以焚之或咒水以祝之種種不同雖有其事而實無應驗之理夫上帝好生為此者多反受殃或曰既無殺人之驗律法何以該載曰造律之士皆至公仁者深嫉其惡是蓋追其心之不仁而置之極刑於十惡之中而常赦所不原也或曰今之夢寐中而常魘者似有鬼神所附之狀何也曰然夢寐間常魘者蓋火起於下而痰閉於上心血虧欠而心神失守故爾豈有鬼神所附之理哉賢者願無

惑焉

或問古者醫家有禁咒一科今何不用曰禁咒科者即素問祝由科也立教於龍樹居士為移精變氣之術耳可治小病或男女入神廟驚惑成病或山林溪谷衝斥惡氣其證如醉如痴如為邪鬼所附一切心神惶惑之證可以借咒語以解惑安和而已古有龍樹咒法之書行於世今流而為師巫為降童為師婆而為翫惑人民哄嚇取財之術噫邪術惟邪人用之知望者勿用也

醫學正傳卷之十一

或問丹溪所謂有外感挾內傷者有內傷挾外邪者其證何如而見當以何法而治請詳以語之曰假如先因勞役過度飲食失節而其體已解休又為感冒風寒而作其證必惡寒發熱頭身俱痛右手氣口及關脉則大於左手人迎及關脉二倍而兩手陽脉俱有緊盛之勢此內傷重而外感輕謂之內傷挾外邪也治法必以東垣補中益氣湯為主加以防風羌活柴胡之類或先因秋冬之月觸冒風寒鬱積已久欲發未發之間而加之飲食勞倦

觸動而發其證必大惡風寒頭身大痛而大

左手人迎及關中脉則大右手氣口及關中一

二倍而兩手陽脉亦各有紫盛之勢此外感重而

內傷輕謂之外感挾內傷也治法必以仲景傷寒

論六經見證之藥為主治少加以補中健脾之劑

夫外感重者宜先攻而後補攻者下之類內傷重者宜

先補而後攻二證俱重宜攻補兼施或曰勞倦飲

食二者俱甚而為大熱之證欲補則飲食填塞中

中恐愈增飽悶欲消導則恐元氣愈虛而病益甚

醫學正傳六 卷之一

四九

其將何法以處治乎曰此正王安道所論不足中

之有餘證也必宜攻補兼施以補中益氣湯間與

丹溪導痰補脾飲加神麴炭芽之錫甚者以東垣

枳實導滯丸之類與補中益氣湯間而服之食去

而虛證亦除是亦攻補兼施之法也醫者誠能斟酌

權宜而處治之無有不妥之理也

或問人之壽夭各有天命存焉凡人有生必有死自

古皆然醫何益乎曰夫所謂天命者天地之氣

元氣也父為天母為地父精母血感氣不同故人

之壽夭亦異其有生之初受氣之兩盛者父母元氣皆壯

盛也當得上中之壽受氣之偏盛者當得中下

之壽受氣之兩衰者能保養僅得下壽不然多夭

折雖然又不可以常理拘泥論也或風寒暑濕之

感於外飢飽勞役之傷乎內豈能一一盡乎所稟

之元氣耶故上古神農氏嘗百草製醫藥乃欲扶

植乎生民各得盡乎天年也今時人有不信醫而

信巫枉死者皆不得盡正命而與巖墻桎梏者何

異焉或曰今之推命者皆以所生日時之天上星

醫學正傳六 卷之一

辛

辰推算其生死安危無不節節應驗子以父母之

元氣為天命恐非至當之語曰天人之理盛衰無

不昭合如河出圖洛出書聖人取以畫八卦而成

易書九人之一動一靜與夫吉凶消長之理進退

存亡之道用之以卜筮毫髮無差雖然聖賢諄諄

教誨必使盡人事以副天意則凶者化吉亡者得

存未嘗令人委之於天命也傳曰修身以俟命而

已矣是故醫者可以通神明而權造化能使天者

壽而壽者仙醫道其可廢乎

或問先哲謂諸痛為實諸痺為虛丹溪亦曰諸痛不可用參芪蓋補其氣旺不通而痛愈甚然則凡病痛者例不可用參芪等藥乎曰以上所論諸痛特指其氣實者為言耳如暴傷風寒在表作痛或因七情九氣鬱鬱不得宣通而作痛者固不可用補氣藥也若夫勞後傷形致身體解而作痛者或大便後及大瀉痢後氣血虛弱身體疼痛及四肢麻痺而痛或婦人產後氣血俱虛致身軀百節疼痛等病其可不用參芪等補氣藥乎學者毋執一也

醫學正傳

卷之二

十一

或問寸關尺三脉部位既得聞命矣外有人迎氣口神門三脉其位安在請明以告我曰按活人謂左手關前一分人迎是也右手關前一分氣口是也又按脉經謂左手人迎以前寸口脉即知人迎在病人左手關前寸後之位診者右手食指與中指兩歧之間是也又謂右手氣口以前寸口脉即知氣口在病人右手關前寸後之位診者左手食指與中指兩歧之間是也經又曰兩手神門以後尺

中脉即知神門各在病人兩手關後尺前之位診者中指與無名指兩歧之間是也今人多不識此或指人迎於左關或指人迎於左寸或指氣口於右關或指氣口於右寸或指神門於兩關相對者皆非也學者可不審乎

醫學正傳

卷之二

十一

或問藥性有相畏相惡相反而古方多有同為一劑而用者其理何如曰若夫彼畏我者我必惡之我所惡者彼必畏我蓋我能制其毒而不得以自縱也且如一劑之中彼雖畏我而主治之能在彼故其分兩當彼重我輕畧將以殺其毒耳設我重彼輕制之太過則盡奪其性而治病之功矣然藥性各有能毒其所畏者畏其能所惡者惡其毒耳如仲景制小柴胡湯用半夏黃芩生薑三物同劑其半夏黃芩畏生薑而生薑惡黃芩半夏因其分兩適中故但制其慄悍之毒而不減其退寒熱之能也其為性相反者各懷酷毒如兩軍相敵決不與之同隊也雖然外有大毒之疾必用大毒之藥以攻之又不可以常理論也如古方感應丸用巴

豆牽牛同劑以為攻堅積藥四物湯加人參五靈脂輩以治血塊丹溪治宛瘕二十四味蓮心散以甘草芫花同劑而謂妙處在此是蓋賢者真知灼見方可用之昧者固不可妄試以殺人 also 夫用藥如用兵善用者置之死地而後存若韓信行皆水陣也不善者徒取滅亡之禍耳可不慎哉

或問當歸一物雷公謂頭破血身和血尾止血東垣又云頭止血身養血尾破血二說不同豈無歸一之論乎請明以告我曰東垣曰當歸者使氣血各

醫學正傳

卷之二

五

五

有所歸之功之號也蓋其能逐瘀血生新血使血脉通暢與氣並行周流不息故云然又曰中半已上氣脉上行天氣主之中半已下氣脉下行地氣主之身則獨守乎中而不行也故人身之法象亦猶是焉予謂瘀血在上焦與上焦之血少則用去蘆上截瘀血在下焦與下焦之血虛則用下截之尾若欲行中焦之瘀與補中焦之血則用中一段之身非獨當歸他如黃芩用上截之虛者以降肺火用下截之實者以瀉大腸之火防風桔梗之類

亦然此千古不易之定論也學者詳之

或問黃檗地黃之類俱忌鐵器蒸搗何歟曰大地黃苦藥之類皆腎經藥也錢仲陽謂腎有補而無瀉又曰虛者補其母實者瀉其子蓋腎乃陰中之少陰為涵養真元之水藏其所以忌鐵器者防其伐木瀉肝恐子能令母虛也竟無他說

或問本草所載竹茹竹葉及烹竹瀝皆云用淡竹夫竹類頗多未審何竹名為淡竹耶曰東坡蘇公之方有云淡竹者對苦竹為文除苦竹之外皆淡竹

醫學正傳

卷之二

五

五

也我丹溪先生常用早筍俗名雷竹此淡中之淡者也此竹又名甜竹以其筍之味甜也別有一種水竹其筍味純淡故已上二竹皆可入藥用綠二筍俱無痼疾之味故知其無毒故也如無二竹晚筍竹亦可代用餘皆不可用也

或問嶺表烟瘴之地其俗平居無病之人朝夕常噉檳榔云可辟除山嵐瘴氣之疾吾儒有仕於彼地者亦隨其俗而噉之果有益乎否乎曰按本草檳榔味辛氣溫為純陽之物善驅逐滯氣故以同

膏中至高之氣除痰癖下行以治後重脫肛之
如果有以上諸疾用之以佐木香芥末等藥無不
應驗若無病中和胃氣 朝夕常噉吾恐又泄
真氣非徒無益而又害之是也嗚呼因習之弊死
而無悔者焉羅謙甫曰無病服藥如壁裏添柱誠
哉是言也嘗聞用藥如用兵朝廷不得已而行之
以禦寇耳若無寇可平而無故發兵不惟空糜糧
餉抑且害及於無辜之良民也戒之戒之

問婦人產後諸疾古方多用四物湯加減調治我

丹溪先生獨謂芍藥酸寒能伐發生之氣禁而不

用何歟曰新產之婦血氣俱虛之甚如天地不交
之否有降無升但存秋冬肅殺之令而春夏生發
之氣未復故產後諸證多不利乎寒涼之藥大宜
溫熱之劑以助其資始資生之化源也蓋先哲制
四物湯方以川芎當歸之溫佐以芍藥地黃之寒
是以寒溫適中為婦人諸疾之妙劑也若或用於
產後必取白芍藥以酒重煎製煉去其酸寒之毒
但存生血活血之能胡為其不可也後人傳為既

久脫去製煉註文丹溪慮夫俗醫鹵莽不製而
之特舉其為害之由以戒之耳若能依法製煉為
用何害之有哉學者其可不知此

中風一

論

內經曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為厲風或為偏枯又曰風者百病之長也至其變化乃為他病無常方又曰諸風掉眩皆屬肝木千金云岐伯所謂中風大法有四一曰偏枯謂半身不遂也二曰風非謂身無疼痛四肢不收也三曰風懿謂奄忽不知人也四曰風痺謂諸痺類風狀也是以古之名醫皆以外中風邪立方處治

醫學正傳 卷之五 五十七

惟河間劉守真氏所謂中風癱瘓者非為肝木之風實甚而卒中之亦非外中於風良由將息失宜心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣拂鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也亦有因喜怒思悲恐五志有所過極而卒中者夫五志過極皆為熱甚俗云風者言末而忘其本也東垣李明之亦謂中風者非外來風邪乃本氣自病也凡人年踰四旬氣衰之際或因憂喜忿怒傷其氣者多有此證壯歲之時無有也若肥盛者則

間而有之亦是形盛氣衰故如此耳丹溪先生亦曰有氣虛有血虛有痰盛又曰西北二方其為濕所中者有之東南之人皆是濕土生痰痰生熱熱生風也夫上古之論中風一以為外感風邪之候及乎三先生之論一出皆以風為虛象而謂內傷正氣為動然三先生又別各有外感之論而使後學狐疑不決故王安道有論三子主氣主火主濕之不同而與昔人主風之不合而立真中類中之目岐為二途愚竊疑焉曰卒中曰暴仆曰暴瘖曰

醫學正傳 卷之五 五十八

蒙昧曰喑僻曰癱瘓曰不省人事曰語言謇澀曰痰涎壅盛其為中風之候不過如此無此候者非中風之病也夫外候既若是之相伴而病因又何其若彼之異耶欲求歸一之論終不可得於是積年歷試四方之病此者若十人盡因風濕痰火痰虛而作何常見其有真中類中二者之分哉是以一旦豁然有所感悟未知是否請陳梗槩如左與明達者共議夫中風之證蓋因先傷於內而後感於外之候也但有標本輕重之不同耳假如百病

皆有因有證因則為本證則為標古人論中風者言其證也二先生論中風者言其因也知乎此則中風之候可得而詳論矣其所謂真中風邪者未必不由氣體虛弱榮衛失調然後感於外邪也若非體虛所致則西北二方風寒大盛之地而中風者比比皆是何暇為他證哉其所謂因火因氣因濕者亦未必絕無外邪侵侮而作也若無外邪侵侮則因氣因火因濕各自為他證豈有啗僻癱瘓暴仆暴瘳之候乎經曰邪之所湊其氣必虛是也

醫學正傳

卷之

五

豈可以一中風之證岐為二途哉治之之法重於外感者先驅外邪而後補中氣重於內傷者先補中氣而後驅外邪或以散風藥為君而以補損藥為臣使或以滋補藥為君而以散邪藥為臣使全在活法量輕重而處治之也內經曰有取本而得者有取標而得者有本而標之者有標而本之者又曰急則治其標緩則治其本若夫初病暴仆昏悶不省人事或痰涎壅盛舌強不語兩寸脉浮大而實者急宜以瓜蒂散蘆薈藥吐之以過其

醫學正傳

卷之

六

人迎脉緊盛或六脉俱浮弦者急宜以小續命湯表之蓋風氣大盛心火暴升而痰涎壅遏於經絡之中於斯時也豈尋常藥餌而能通達於上下哉故本方用附子以其稟雄壯之資而有斬關奪將之勢能引人參輩並行於十二經以追復其散失之元陽又能引麻黃防風杏仁輩發表開腠理以驅散其在表之風寒引當歸芍藥川芎輩入血分行血養血以滋養其虧損之真陰或加石膏知母以降胃火或加黃芩以清肺金看所挾見證與夫時月寒溫如或施治病勢稍退精神稍復輒當改用丹溪之法而以補氣補血清痰之劑以調養其本氣而安此急則治其標與夫標而本之之治也凡人手足漸覺不隨或臂膊及髀股指節麻痺不仁或口眼歪斜語言蹇澁或胃膈迷悶吐痰相續或六脉弦滑而虛軟無力雖未至於倒仆其中風暈厥之候可指日而定矣早當從丹溪之法調治其左手脉不足及左半身不遂者以四物湯補血之劑為主治右手脉不足及右半身不遂者以四

君子湯補氣之劑為主治痰盛者二陳導痰

兼用氣血兩虛而挾痰者八物湯加南星半夏

實竹瀝姜汁之類若夫真元漸復痰飲漸消或覺

有風邪未退者仍以羌活愈風湯防風通聖散之

類出入加減調治而安此緩則治其本與夫本而

標之之治也抑考先哲有云其證有中藏中府之

分證各不同中府者多着四肢故面加五色脉浮

而惡風寒四肢拘急不仁或中身之前或中身之

側皆曰中府也其治多易中藏者多滯九竅故唇

緩失音耳聾鼻塞目瞽大小便秘結皆曰中藏也

其治多難大法中府者小續命等湯以發其表中

藏者三化等湯以通其裏府藏兼見者又不可以

拘泥或一氣之微汗或一句之通利又曰治須少

汗亦須少下多汗則虛其衛多下則損其榮斯又

不可不謹或外無六經之形證內無便溺之阻隔

但手足不遂語言蹇澁者此邪中於經也又當從

乎中治而不可以標本論也是宜養血通氣大秦

湯羌活愈風湯之類治之夫所謂諸方乃

脉法

先哲立權衡以為後學之矜式耳其於臨證切脉之際又當順時令而調陰陽安藏府以和榮衛察病機審氣宜全在活法以度其輕重之權量甚毋膠柱以調瑟也

脉經曰脉微而數中風使然○寸口沉大而滑沉

則為實滑則為氣氣實相搏入於藏則死入於

府則愈此為卒厥不知人唇青身冷為入藏死

身溫和汗自出為入府而復自愈○脉陽浮而

滑陰濡濡當作濡與軟通下同而弱或浮而滑或沉而滑

或微而虛或微數寸口或浮而緩或遲皆為中

風之證大法浮遲者吉急疾者凶又曰脉浮而

遲者易治大數而急者死

方法先哲有云方者法之體法者方之用故二者不可偏廢也

丹溪曰中風大率主血虛有痰或挾火與濕諸方

書皆謂外中風邪惟劉河間作將息失宜水不

制火極是然地有不同不可一途而論西北人

外中者亦有東南之人皆是濕土生痰痰生熱

熱生風也真中風邪者東垣中血脉中府中藏之說甚好治法以治痰為先補養次之初中急搦人中令省○子和三法亦可用痰壅盛者口眼歪斜者不能言語者皆當用吐法輕者用瓜蒂散或鰕汁或稀涎散吐之或重而口禁者用藥蘆末少加麝香或半錢或一錢灌入鼻內吐之一吐不已再吐亦有氣血虛而不可用吐法者

慎之吐法詳見痰門

○半身不遂大率多痰在左屬死血火血宜四物湯

醫學正傳卷之十一 李主

加桃仁紅花竹瀝姜汁○在右屬痰與氣虛宜

二陳湯合四君子湯加竹瀝姜汁能食者去竹

瀝加荊瀝尤妙肥人多濕少加附子行經

○氣虛卒倒參芪補之挾痰則濃煎人參湯加竹瀝

姜汁血虛者以四物湯補之挾痰者其藥俱用

姜汁炒過更加姜汁竹瀝服

○中風者屬氣虛多以參芪補之

○中風口開手散眼合遺尿吐沫直視喉如鼾齕

肉脫筋痛髮直提頭上竄面赤如狂汗綴如珠

○中風不治之症也○若動止筋痛是無血

子湯

○芎藭湯已上二方並

○二陳湯飲門

○小續命湯和法東垣曰中風自汗者不可重發

其汗故此藥亦不可輕用也

麻黃去節 人參去蘆 黃芩

白芍藥 防已 桂枝

川芎各七 防風去蘆 甘草各

附子童便煮 杏仁去皮尖 另研

金匱要畧本方有石膏當歸無附子防風防已

愚按本方石膏當歸固不可無而附子防風防

已尤不可缺此恐傳寫者之脫簡耳

右細切作一服水一盞半加生姜五片煎至一

盞溫服凡中風不審六經之形證加減用藥雖

治之不能去其邪也內經曰開則漸然寒閉則

熱而悶知暴中風邪宜先以加減續命湯治之

治之

中風無汗惡寒麻黃續命主之

麻黃

防風

杏仁

依本方加添一倍宜鍼太陽至陰出血崑崙舉

中風有汗惡風桂枝續命主之

桂枝

芍藥

杏仁

依本方加一倍宜針風府已上二証皆太

中風無汗身熱不惡寒白虎續命主之

醫學正傳卷之六

全五

葛根一錢四分

桂枝

黃芩依本方加一倍

宜針陷谷刺厲兌針陷谷者去陽明經之賊邪

刺厲兌者瀉陽明經之實也已上二証陽明經

之中風也

中風無汗身涼附子續命主之

附子加一分

乾姜加七分

甘草加二分

宜刺陰白去太陰之賊邪也此證太陰經中風

也

中風有汗無熱桂枝續命主之

桂枝

附子加一分

甘草依本方加一倍

依本方加一倍宜針太谿此證少陰經中風也

中風六經混淆係之於少陽厥陰或肢節痠痛或

麻木不仁宜羌活連翹續命主之

小續命湯八錢加羌活四錢連翹六錢

古之續命混淆無六經之別今各分經治療又分

經針刺法厥陰之井大敦刺以通其經少陽

之經絕骨灸以引其熱是針灸同法象之大体

也愚按羌活製小續命湯以治中風初病無汗

醫學正傳卷之六

全六

標之藥也後人不分表裏虛實通用以治中

風之証故張易水授東垣以加減之法夫中

風無汗表實者固宜其有汗表虛之証雖有

○大秦羌湯中風外無六經之形證內無便溺之阻

隔知血弱不可養筋故手足不能運動舌強不能

言語宜養血而筋自榮此方主之

秦艽一錢

甘草一錢

川芎

川歸

白芍各一錢

細辛一分

羌活

防風

黃芩各五分

石膏一錢

白芷

白朮五分

獨活一錢

生地黃

熟地黃五錢

白茯苓一錢

右細切作一服水煎溫服無時如遇天陰加生姜

三片同煎如心下痞滿加枳實一錢同煎服

愚按此方用歸芍藥生熟地黃以補血養

筋甚得體既曰外無六經之形證但當少用

羌活秦朮引用以利關節其防風獨活細辛

白芷石膏等藥恐太燥而耗血雖用此川芎

止可六分之一尤宜加竹瀝姜汁同劑最好

連者詳之

醫學正傳六 卷之二

李

○三化湯中風外有六經之形證先以加減續命湯

隨證治之內有便溺之阻隔後以此藥利之

厚朴

大黃

枳實

羌活各等分

右細切每服三兩重水三升煎至一升半終日服

之以微利為度

○羌活愈風湯并加減法 療腎肝虛筋骨弱語言蹇

泄精神昏憤此藥安心養神調理陰陽使無偏勝

治中風內外無邪服此藥以行中道

羌活

北草

防風

蔓荊子

川芎

細辛

枳殼

熟地黃

人參

麻黃

薄荷

甘菊花

當歸

知母

黃芪

地骨皮

獨活

白芷

杜仲

枸杞子

秦朮

柴胡

半夏

梓厚朴

醫學正傳六 卷之二

李

前胡

防己已上各

黃芩

白茯苓

芍藥已上各

蒼朮

生地黃已上各

桂枝一分

天陰雨加生薑三片

右細切作一服水二大盞煎至一盞去粗溫服

○空心一服嚥下二麥丹○臨卧一服嚥下四

白丹動以安神靜以清肺假令一氣之微汗本

方藥一劑加麻黃一錢生薑五片空心服以熱

羹粥投之得微汗則佳如一旬之通利本方藥

一劑加大黃三錢如前前臨卧服得利為度如

少可也

○四白丹能清肺氣養氣謂中風者多昏冒氣不清利此藥主之

白芷一兩 白檀一錢半 白茯苓半兩

白朮半兩 羌活一錢半 知母二錢

縮砂仁半兩 人參半兩 獨活一錢半

防風半兩 甜竹葉二兩 薄荷三錢

細辛二錢 甘草半兩 香附子半兩炒

川芎半兩 麝香一分 牛黃半錢

望春大寒之後加半夏三分人參三分柴胡三

分謂迎而奪少陽之氣也望夏之月加石膏三

分黃芩三分知母三分謂迎而奪陽明之氣也

季夏之月加防己三分白朮三分茯苓三分謂

勝脾土之濕也初秋大暑之後加厚朴三分藿

香三分桂一分半謂迎而奪太陰之氣也霜降

之後望冬之月加附子一分半桂一分半當歸

三分謂勝少陰之氣也此雖立四時加減之法

更宜臨證審察虛實寒熱土地之宜邪氣之多

蘆香一錢半 龍腦半錢

右為細末煉蜜為丸每兩作十九臨卧嚼一丸

分五七次嚼以愈風湯送下上清肺氣下強骨

髓

愚按此方多輕揚走竄之味雖有參朮茯苓甘草之補益而寡固不可以敵衆也若用之於風痰壅盛昏瞶不省人事者固宜其為血氣虛弱神不守舍而昏迷者則促其死耳學此者宜知

○二丹丹治健忘養精神定志和血內安心神外華

腰理

醫學正傳卷之六

丹參一兩半 丹砂五錢 遠志五錢

熟地黃半兩 茯神一兩 人參五錢

菖蒲五錢 炙甘草一兩 天門冬半兩

麥門冬一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸至

一百丸空心以愈風湯送下

○防風通聖散併加減法治中風及諸風等證

防風 川芎 川歸

白芍藥 大黃 芒硝

連翹

薄荷葉

麻黃

各四錢

石膏

桔梗

黃芩

各四錢

白朮

枳實

荆芥穗

各二錢

滑石

甘草

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞

溫服日再服勞汗當風汗出為酸鬱乃瘥去芒

硝倍加芍藥當歸或生癰疹或赤或白倍加去

節麻黃鹽豉葱白發汗罷依前方加四物湯黃

連解毒三藥合而飲之日二服小便淋閉去毒

黃加滑石連翹煎調木香末一錢匕腰脇走注

疼痛加硝石當歸甘草煎調車前子末海金沙

末各一錢匕破傷風者如在表則辛以散之在

裏則苦以泄之用此以蕪散之汗下後通利血

氣驅逐風邪加荊芥穗大黃煎調全竭末一錢

匕羌活末一錢匕諸風潮搐小兒急慢驚風大

便秘結邪熱暴甚腸胃乾燥寢汗咬牙目睛上

竄睡語不安轉筋驚悸倍大黃枳子煎調茯苓

末一錢匕如肌肉蠕動者調羌活末一錢匕風

傷於肺咳嗽喘急加半夏桔梗紫苑如打撲傷

損肢節疼痛腰中惡血留滯不下加當歸大黃

煎調乳香沒藥各一錢匕鮮利四時傷寒加益

元散半兩加葱白鹽豉生姜水一大碗煎至五

七沸溫服一半以錫箔探之即吐吐後更服一

半汗出立解如飲酒中風身熱頭痛如破加黃

連葱白煎服立愈頭旋腦熱鼻塞濁涕時下加

薄荷黃連煎服內經曰膽移熱於腦則辛頰鼻

淵鼻淵者濁涕下不已也如氣逆者本方煎調

木香末一錢匕此方最治痢後鶴膝風良驗

○大防風湯去風喚氣活血壯筋又治痢後腳弱緩

痛不能行履名曰痢風或兩腳腫痛足脛枯腫

名曰鶴膝風一切麻痺痿軟風濕挾虛之候服

之其効如神

熟地黃一錢 白朮一錢半 羌活半錢

人參半錢 川芎七分半 附子七分半

防風一錢 川牛膝去蘆酒 當歸去蘆酒

黃芪一錢 甘草炙半錢 白芍藥一錢

杜仲去粗皮細切姜汁

右細切作一服水二盞姜五片棗一枚煎至一

盞空心溫服

愚按此方用歸芍芍藥熟地以補血用參芪
白朮甘草以補氣用羌活防風散風濕以利
關節用牛膝杜仲以補腰膝用附子以行參
芪之氣而走周身肺蓋治氣血兩虛換風
濕而成痼疾不能行者之聖藥也觀其治
後風可見矣然可以治不足之痿弱而不可
以治有餘之風痺也

○稀涎散治中風痰涎壅盛口眼歪斜膈塞不通等
證

明白礬一兩半生

猪牙皂角四錢黃去皮

右為細末每服一二錢溫水調下以吐為度

○聖藥治諸風膈實痰盛及諸痼疾飲壅溢等證

甜瓜蒂一兩炒黃色瓜
黃熟脫落者佳

右為細末每服半錢或一錢量人虛實用之以

酸薑汁調下以吐為度凡行吐法宜於天氣清

朗之日行之晦日難得吐病暴急者不拘先令

病者隔宿不食如服藥不吐再用熱薑水投之

如吐風痼病者加全蝎半錢微炒如神

猪油五七點雄黃末一錢甚者加羌花末半錢

立吐其重如濕腫滿者加赤小豆末一錢故以

藥不可常用人要辨其虛實實則可吐吐罷可

服降火利氣安神定志之藥

附胃風證

丹溪曰胃風為病初飲食訖乘風涼而致其證食

飲不下形瘦腹大惡風頭多汗膈塞不通脉右

關弦而緩帶浮胃風湯主之

○胃風湯

人參

茯苓

川芎

川歸

桂心

白朮

白芍藥各等分

右細切每服八錢入粟米一小撮溫服如腹

加木香半錢

○丹溪活套

凡中風證悉以二陳湯加姜汁竹瀝為主○風

痰盛聲如拽鋸者加南星枳殼皂角防風括婁

仁○如血虛者加川歸川芎白芍藥生地黃有

赤血加桃仁紅花○如氣虛加人參白朮黃
白汗者以黃芪為君少用茯苓半夏或佐以附
子○如風邪盛自汗身體痛者加防風羌活薄
桂○頭目不利或頭痛如破加川芎白芷荆芥
穗細辛蔓荊子頂痛者去川芎加藁本或加酒
炒片苓○如無汗身體痛脉浮緩有力或浮緊
或浮弦皆風寒在表之證本方加羌活防風川
芎白芷蒼朮秦艽之類或只用小續命湯倍麻
黃以表之○如大便秘結不行四物三化湯以
微利之三五日一去可也○心血虧欠致心神
恍惚本方加黃連遠志石菖蒲或心動搖驚悸
者更加酸棗仁茯神側柏葉竹茹連前共作一
劑煎服○凡中風小便不利者不可利小便熱
退自能利也凡中風年老虛弱者不可吐氣虛
卒倒者不可吐○肥人中風口喎手足麻木不
分左右皆發痰用貝母瓜婁子南星半夏陳皮
白朮黃連黃芩黃蘗羌活防風荆芥歲靈仙薄
桂甘草天花粉因痰者加附子竹瀝姜汁入

一匙行經行火○瘦人中風屬陰虛火熱四物
湯加牛膝黃芩黃蘗有痰加痰藥入竹瀝姜汁
服○遺尿者屬氣虛以參芪大劑補之○右癱
者酒苓酒蘗酒連防風各半兩半夏一兩羌活
半兩人參蒼朮各一兩川歸川芎各半兩麻黃
三錢甘草半兩南星一兩附子三片九如彈子
大酒化下○肥人憂思氣鬱石手癱口渴補中
益氣湯有痰加半夏竹瀝姜汁○中風證口眼
歪斜語言不正口角流涎半身不遂或全體不
能舉動因元氣虛弱蕪酒色之過而更挾外邪
用人參防風麻黃羌活升麻桔梗石膏黃芩荆
芥天麻南星薄荷葛根芍藥杏仁川歸川芎白
朮細辛皂角等分加姜煎更入竹瀝半盃服外
以艾灸治風穴通得微汗而愈○或有因寒而
中宜姜附湯每服三錢挾痰挾氣攻刺加芍藥
半錢手足不仁加防風挾濕加白朮筋脉牽急
加木瓜肢節痛不可忍加薄桂一錢加姜棗水
煎服之

○祖傳經驗秘方 蠲風飲子 治中風癱瘓口眼歪斜

及一切手足走注疼痛肢節攣急麻痺不仁等

證

防風 去蘆 杜仲 去蘆皮 羌活

白芷 川芎 去蘆頭 川芳

生地黃 酒浸洗 白芍藥 川牛膝 酒去蘆

秦艽 去蘆 何首烏 草薢

蒼朮 米泔浸 白朮 木通 去皮

大楓子肉 威靈仙 血藤 即過山

防己 丁公藤 各一兩 荊芥穗

海桐皮 去粗皮 五加皮 天南星 煨裂

半夏 橘紅 去白 赤茯苓 去皮

桑寄生 天麻 鱉板 炒

釣鈎藤 各半兩 薄桂 去粗皮 烏頭 去皮

甘草節 川烏 炮去 猪牙皂角 各一錢

兩頭尖 陰地蕨 一名大蕨

小蓴 聖省藤 桑絡藤 已上各一

生薑 一兩另研

醫學正傳 卷之十一 七十九

右各切細用無灰好酒二斗五升以磁罐一箇

盛酒浸藥以皮紙十數重包封罐口冬半月夏

七日秋春十日每日清晨午前午後臨卧各服

一太白蓋忌鷄猪魚羊驢馬飛禽蝦蟹等肉味

及煎燂油膩水菓生冷花麥熱麪一切動氣發

風之物其効如神萬舉萬全之藥也

○如神救苦散治癱瘓手足走痛不止非痛御米壳

一錢陳皮錢五壁虎錢五黃即乳香沒藥甘草

為末每服三錢煎服

醫學正傳 卷之十一 七十八

○予長嫂何氏年五十七身肥白春初得中風暴仆

不省人事身僵直口噤不語喉如拽鋸水飲不

能入六脉浮大弦滑右甚於左以藜芦末一錢

加麝香少許灌入鼻竅吐痰一升許始知人事

身體畧能舉動急煎小續命湯倍麻黃連進二

服覆以衣被得汗漸甦省能轉側但右手足不

遂語言蹇澁後以二陳湯加芩歸芍藥防風羌

活等藥合竹瀝姜汁日進二三服若三四日大

便不去則不能言語即以東垣導滯丸或潤腸

九微利之則語言復正如此調理至六十四歲
得他病而卒

傷寒二

論

內經曰人之傷於寒也則為病熱熱雖甚不死若
兩感於寒者則不免於死矣蓋傷寒之證非若雜
病之易知也惟漢張仲景深達是理而為立法之
祖著傷寒論一書載三百九十七法一百一十有
三方以為後學之矜式惜乎其書一變於王叔和

醫學正傳

卷之一

七十九

之機次再變於成無己之詮註傳之愈久而愈失
其真也考其法與方也何嘗合其數焉且三陰寒
證之用熱藥者十居七八其內經所謂傳經之傷
寒自三陽而傳入於三陰之經但一於熱耳何由
而為寒哉是以不能不使人之致疑也故後人紛
紛之論俱未得其旨要愚竊憾焉有至人傳云傷
寒大法有四曰傳經曰專經曰即病曰鬱病夫即
病者多為專經鬱病者多為傳經蓋寒邪之中人
無有定體或中於陽或中於陰或但中於太陽未

及鬱熱而即發首尾只在木經而不傳變者治宜

麻黃桂枝等湯驅散表邪而愈或有從太陽未及

鬱熱不從陽明少陽過而遂入於三陰之經者亦

有初不曾入於陽經而直傷於三陰之經而即病

者因其未曾鬱熱是以一切為寒證焉故多自霜

降後至春分前發者是也為其無頭疼無大熱脉

沉遲而微故古方又出中寒一條實此證也治宜

四逆真武等湯溫中通脉而愈若夫始從太陽鬱

熱以次而傳至於陽明少陽次第傳變於三陰之

醫學正傳

卷之一

八十

經者則為傳經之熱證明矣其經曰一日巨陽受之

其脈尺寸俱長其證身熱目痛鼻乾不得卧故

宜解肌三日少陽受之其脈尺寸俱弦其證胸

脇痛而耳聾往來寒熱故宜和解四日太陰受

之其脈尺寸俱沉細其證腹滿咽乾自利故宜

分利五日少陰受之其脈尺寸俱微變其証口

燥舌乾而渴故宜清之六日厥陰受之其脈尺

寸俱沉瀋其証煩滿而囊縮故宜下之自此以

後病日乃愈至故多自春分後至夏至前發者
是也夫春夏固無即病傳經之寒證而秋冬豈無
鬱病傳經之熱證與惟寒邪之傳注經絡實無定
體故東垣有曰太陽者巨陽也為諸陽之首膀胱

經病若渴者自入於本也名曰傳本太陽傳陽明胃土者名曰巡經傳為發汗不徹利小便餘邪不盡透入於裏也太陽傳少陽膽木者名曰越經傳為原受病脉浮宜汗當用麻黃而不用之故也太陽傳少陰腎水者名曰表裏傳為表病急當發汗而反下所以傳也太陽傳太陰脾土者名曰誤下傳為受病脉緩有汗當用桂枝而反下之所致也當臍腹痛四肢沉重太陽傳厥陰肝木者為三陰不至於首惟厥陰與督脉上行與太陽相接名曰

也通關內經中但有六經傳變之傷寒而無三陰直傷即病之寒證焉大抵內經以春三月及夏至前發者為真傷寒張仲景以秋分後至冬三月發者為真傷寒抑未敢議其孰非而孰是也若夫春為溫病夏為熱病皆冬受寒邪鬱積之久之重病也外有四時感冒新受風寒之輕證亦有頭疼體痛惡寒發熱等候自當作感冒處治非冬傷寒邪過時而發之重病比也今人因借仲景治傷寒法治之獲効遂通謂之四時傷寒實非仲景立法之本意也夫欲治傷寒者切宜潛心洞察不可苟且輕試且如不當汗而汗者為亡陽為畜血為鼻衄為筋惕肉瞤為下厥上竭為咽乾為小便淋閉不當下而下者為結胃為痞氣為懊懣為失血為復熱又陰盛陽虛汗之即愈下之即死陽盛陰虛下之即愈汗之即死又曰桂枝下咽陽盛即斃承氣入胃陰盛乃亡醫者其可輕視之乎

脉法

脉陽浮而陰弱謂之傷風邪在六經俱加之以陽浮衛中風也陰弱

桂枝二錢半 芍藥一錢半 甘草一錢

右細切作一服加生薑三片大棗二枚水一盞半煎至一盞去粗溫服本方惟冬及春初可行

○春末及夏至前加黃芩一錢○夏至後加知

母一錢石膏一錢或加升麻半錢若病人素虛

寒者不用加減小便數其素飲酒人不喜甘者

切不可用桂枝也○如發汗過多心下悸而欲

按者去芍藥姜煎服○如傷風項背強有汗

不惡風而變為柔痙者本方中加乾葛一錢○

如汗後身痛脉沉本方中加人參一錢○如風

濕身痛脉浮虛濇多汗本方中加附子半錢○

如關脉沉實大便秘而腹痛者本方中加大黃

一錢半芍藥一錢減甘草半錢○如太陽下之

太早成協熱利不止心下痞表裏不解 本方

中去芍藥加白朮人參乾姜各一錢○如太陽

汗多成柔痙者本方中加乾葛桂枝芍藥各半

錢括蕤根甘草各一錢○如太陽脉浮微而大

方中加芍藥一錢錫糖一匙名小建中湯○如

傷寒汗後身痛脉遲弱本方中加黃芪一錢錫

糖一錢名黃芪建中湯○如太陽發熱無汗惡

寒脉微弱者本方中加麻黃石膏各等分名桂

枝二越婢一湯○如服桂枝後形似瘡日再發

或身痒而汗不出者得汗必解本方中加麻黃

一錢半杏仁十箇名桂枝麻黃各半湯

○麻黃湯併加減法 治太陽證脉浮頭及身軀疼痛

惡寒發熱無汗而喘

醫學正傳卷之八 八十六

麻黃 去根節 桂枝 一錢 甘草 六分

杏仁 十箇

右細切作一服水一盞半先下麻黃煎一沸掠

去上沫下餘藥煎八分去粗溫服覆取汗蓋麻

黃湯性熱惟冬及春初無病人素有寒者乃用

正方夏至後服必發斑黃狂闕○如夏月得太

陽證惡寒發熱頭痛脉浮洪盛無汗以子和六

神通解散代之○如太陽發熱無汗惡寒漸變

為剛痙者本方中加赤芍藥六分葛根一錢並

豉二錢入葱白同煎○如傷寒中濕身體痛身

目俱黃本方中去桂枝加連軹一錢生桑白皮

赤小豆各二錢入生姜大棗同煎○傷寒即病

少陰經脉沉微身體痛得汗則已本方中去桂

枝杏仁甘草加細辛一錢二分附子一錢○傷

寒大下後脉沉遲尺脉不至咽喉不利唾膿血

厥逆泄利不止者雖曰難治本方中去杏仁加

升麻當歸各一錢知母黃芩萎蕤各半錢石膏

白朮芍藥天門冬茯苓乾姜各七分次第取微

汗而愈○即病少陰經無表裏證本方中去桂

枝杏仁倍甘草加附子一錢二三服後得微汗

而愈○如風濕相搏脉浮一身疼痛本方中去

桂枝意以仁一錢得微汗而愈

○葛根湯併加減法 治太陽與陽明合病無汗惡風

身體肌肉俱痛

葛根一錢 桂枝 甘草

芍藥各七 麻黃一錢

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水一盞

半煎先下麻黃葛根一二沸掠去上沫納諸藥

煎至一盞去粗溫服取微汗即愈○如見陽明

正病頭目痛鼻乾無汗肌肉疼痛本方中去麻

黃桂枝加升麻一錢半倍芍藥取微汗而愈名

升麻葛根湯○如風濕脉浮身重汗出本方中

加石膏大青龍膽草萎蕤各半錢○如瘦癯春

感胃發熱而渴不惡寒本方中加黃芩六分不

問已汗未汗頭痛肌熱者本方中去麻黃甘草

桂枝加知母川芎各六分入生姜葱白同煎○

如濕毒發斑心煩嘔逆本方中去桂枝芍藥加

橘紅杏仁知母黃芩各六分○如太陽誤下之

成協熱利不止本方中去麻黃桂枝芍藥加黃

芩各三分甘草只用二分○如太陽與陽明合

病不下利但嘔者本方中加製半夏五分

○小青龍湯併加減法 治太陽表證未解心下水

氣乾嘔發熱而咳

麻黃 芍藥各二錢 細辛

乾姜炮 甘草炙 桂枝各一錢五

五朱子上枝 半夏各二錢

右細切作一服用水三盞先煮麻黃減半盞掠去上沫納諸藥煮取一盞去粗溫服連日三服

○如表證未解而渴甚者本方中去半夏加

葛根一錢○如嘔而微利熱而欬本方中加羌

花龍眼大○如太陽汗後飲水多欬而喘本方

中去麻黃加杏仁泥一錢重○如太陽咳欬表

未解心下水氣而小便不利者本方中去麻

黃加茯苓一錢半○如水寒相搏咳逆不止者

本方中去麻黃加附子一錢

大青龍湯治傷寒見風或傷風見寒太陽無汗脉

浮緊煩躁可服脉弱汗自出不可服

麻黃五錢 桂枝 甘草各錢半

杏仁上箇去皮另研 石膏三錢

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水二盞

先下麻黃煎一二沸掠去上沫納諸藥煎至一

盞去粗服如一服得汗則止後服未汗再投一

服或二服得汗為度○如太陽無汗惡風煩躁

夏月於本方中加黃芩二錢

○小柴胡湯併加減法治傷寒四五日往來寒熱胃

滿脇痛心煩喜嘔風濕身熱邪在少陽經病

柴胡去蘆二錢 黃芩 人參各一錢

甘草半錢 半夏八分

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水二盞

煎至一盞去粗溫服○如小便難潮熱腹滿本

方中加茯苓一盞○如下後陰虛生熱脉微惡

寒本方中去黃芩加芍藥二錢○如嘔而發熱

胃脇滿小便不利本方中去黃芩加茯苓一錢

半○如飲水過多成水結胃本方中去大棗加

牡蠣一錢半○如少陽往來寒熱咳嗽胃脇痛

者本方中去人參大棗加五味子乾姜各半錢

○如往來寒熱而渴甚者本方中去半夏加人

參半錢梔蓂仁一錢○如身熱欲近衣不渴者

本方中去人參加桂枝半錢○如病後熱而渴

不惡寒而嗽者本方中更加五味子半錢○如

病而胃脇滿服本方中加乾姜半錢牡蠣一錢

○如風濕汗後身熱心下妨悶有動氣者本方中加桂枝半錢芍藥一錢。如往來寒熱胃弱滿小便不利嘔而不渴者本方中去人參半夏外加桂枝乾姜牡蠣各六分枳實一錢。如傷寒八九日下之胃滿小便不利譫語驚狂自汗亡陽煩躁起臥不安一身盡痛本方中加龍骨桂枝鉛丹茯苓牡蠣半錢大黃七分煎服。

○大柴胡湯治傷寒內實大便難身熱不惡寒反惡熱者

柴胡 四錢

黃芩

芍藥 各二錢半

半夏 二錢

人參 一錢

大黃 二錢

枳實 一錢半

右細切作一服加生薑三片大棗二枚水二盞

煎八分去粗溫服以利為度未利再投一服

○調胃承氣湯治太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘

結譫語而嘔日晡潮熱者

大黃 六錢半

甘草

芒硝 各一錢

右細切水二盞煎至一盞去粗納芒硝再煎

一沸溫服

○小承氣湯六七日不大便腹脹滿悶病在陽明無表證汗后不惡寒潮熱狂言而喘者

大黃 七錢

厚朴 二錢

枳實 二錢

右切細作一服水一碗煎半碗去粗溫服以利為度未利再投一服

○大承氣湯治胃實譫語五六日不大便腹滿煩渴併少陰舌乾口燥日晡發熱脉沉實者

大黃 七錢半

厚朴

枳實 各一兩

芒硝 半合

右細切水二碗先煎枳朴二物取一碗半去粗

納大黃再煎至一碗去粗納芒硝更煎一二沸

溫服以利為度未利再投一服

桃仁承氣湯外證已解小腹急大便黑小便不利

為瘀血證此藥主之

大黃 三錢

桃仁 十箇去

桂心 去皮

芒硝 各一錢半

甘草 一錢

右細切水一盞半煎至一盞去粗納芒硝再煎

一二沸溫服。血盡為度。米盡再服。

○白虎湯 併芩 治陽明證汗後脉洪大而渴及

虛煩中喝等證

知母二兩 甘草二錢 石膏一兩二錢

粳米五錢

右細切作一服水二盞煎待米熟去粗溫服○

如口燥煩渴或發赤斑木方中加人參二錢名

化斑湯又名人參白虎湯○如秋感熱之痲痘

或陽明下後大便不固熱不退者或溫溫證熱

醫學正傳卷之九十二 東

不退而大便溏者本方中加蒼朮六錢添水煎

名蒼朮白虎湯

○理中湯併加減法 治即病太陰自利不渴寒多而

肚腹痛下利鴨瀉厥霍亂等證

人參 甘草 乾姜

白朮各二錢半

右切細作一服水二盞煎八分去粗溫服○如

腎氣動者去白朮加肉桂二錢○如吐多者去

白朮加生姜三錢○如下多者倍白朮人參添

水煎○寒多者加乾姜一錢半○如腹滿下

脉沉遲而微者加炮附子二錢○如傷冷中寒

脾弱氣虛變為陰疽木方中加茵陳蒿二錢○

如霍亂轉筋木方中加石膏半兩○如痞而胃

寒或霍亂吐瀉不洩胃滿未成結胃者或厥陰

厥不飲食食即吐就理中九以本方藥為細

末煉蜜為丸如彈子大每用白湯半盞化一丸

○四逆湯治即病太陰自利不渴及三陰證脉沉細

而遲身體痛者

醫學正傳卷之九十四 云

附子一枚去皮甘草炙六錢 乾姜五錢炮

右細切分作二服每服用水二盞煎至一盞去

粗溫服取少汗乃愈

○真武湯治即病陰證傷寒脉沉細身體痛或發少

陰汗致筋惕肉瞤等證

茯苓 芍藥 生姜

附子各三錢 白朮二錢

右切細作一服水二盞煎至一盞去粗服○如

數者加五味子乾姜細辛各一錢○如小便利

者去茯苓○如下利者去芍藥加乾姜二錢○
如嘔者去附子倍生姜

○木附湯治風濕小便自利及濕溫身痛等證

白朮二錢 甘草二錢 附子炮

主姜各二錢半

右細切作一服水二盞大芰二枚煎至一盞去

粗溫服

○小陷胃湯治小結胃陽證傷寒下之太早變為結

胃中作痛痞滿

黃連二錢 半夏二錢 枳實二錢

右細切作一服用水二盞先煮枳實取一盞去

粗納諸藥再熬至七分去粗溫服未和再投一

服

服

○大陷胃湯治大結胃併熱實結胃中大痛高起

手不可捫摸者

大黃三錢 芒硝二錢 甘遂一分二厘

右細切作一服水二盞先煮大黃至一盞去粗

納芒硝煮一二沸納甘遂末服以利為度

○大陷胃湯治血結胃證語因瘀血結於胃中狂言小

腹亦滿漱水不欲嚥者

水蛭炒黃色 蜚蠊各十五枚去翅足炒黃色

桃仁一十箇去皮尖另研

右細切水一盞半煎至一盞去粗服血下止後

服

○小半夏茯苓湯治水結胃

半夏四錢 茯苓三錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗入生

姜自然汁半合再煎一二沸溫服

○梔子豉湯治吐下後心胃懊懣無奈或大下後

身熱不去心中痛結

肥梔子四枚 香豉半兩

右細切作一服水二盞先煮梔子至一盞納豉

同煮至七分去粗溫服得吐止後服

○玄參升麻湯治發斑咽痛

升麻 玄參 甘草各半兩

右細切水三盞煎至一盞去粗服

○陽毒升麻湯治陽毒赤斑出狂言吐膿血

升麻二錢 犀角屑 射干

黃芩 人參 甘草生用各錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○姜附湯併加減法治下後復發汗晝不得眠無表

證而脉微者

乾姜五錢 附子一枚生用

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗服○

如丁利厥逆脉不至者加甘草五錢倍乾姜添

醫學正傳卷之

九十七

倉

水煎服○如面赤者加葱九莖○嘔者加生姜

○咽痛加桔梗○利止脉不出加人參三錢名

通脉四逆湯○吐利止汗出而厥四肢拘急脉

微欲絕本方煎成正藥加猪膽汁半合攪勻分

二服其脉即起○少陰證腹痛或泄利下重本

方中加芍藥二錢半

○和劑藿香正氣散治四時感冒頭痛憎寒壯熱或

風濕氣霍亂吐瀉常服除山嵐瘴氣

大腹皮先以手抄板淨用清酒洗淨去鹹乾用烏豆煮汁洗淨用蓋山物煎有烏豆貴

毒不制 紫蘇連莖用 藿香

白芷 茯苓各六分 厚朴製姜汁

白朮 陳皮去白 桔梗

半夏各四分 甘草炙二分

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水二盞

煎至一盞三分溫服

○和劑不換金正氣散治四時感冒傷寒瘟疫時行

及山嵐瘴氣寒熱往來霍亂吐瀉下利赤白及

出遠方不伏水土並皆治之

醫學正傳卷之

九十八

方

厚朴製姜汁 陳皮去白 藿香洗

半夏湯泡 蒼朮米泔浸 甘草半錢

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水一盞

半煎至一盞溫服

○東垣加減涼膈散退六經熱及傷寒餘熱不解膏

煩等證

連翹二錢 梔子 薄荷葉

淡竹葉 黃芩 桔梗各半錢

甘草生一錢半

右細切作一服水一盞半煎至一盞日三五服
熱退即止。○易老曰涼膈散減芒硝大黃加桔
梗同為小餅之劑浮而上之治胃膈中與六經
熱以其手足少陽之氣俱下胃膈中三焦之氣
同相火遊行於身之表膈與六經乃至高之分
此藥浮載亦至高之劑故能於無形之中隨高
而走去胃膈中及六經熱

○十神湯治時令不正瘟疫妄行或四時感冒風熱
發熱憎寒頭疼身痛無汗此藥不問陰陽兩感
並宜服之
醫學正傳卷之九十九

川芎

甘草

麻黃

乾姜

紫蘇

升麻

白芷

赤芍藥

陳皮

香附各一錢

右細切作一服加生姜三片連鬚葱白三箇如
中滿氣實者加枳殼一錢水二大盞煎至一盞
三分去粗熱服

○消風百解散治四時感冒頭疼發熱咳嗽鼻塞

重喘急等證

荊芥穗

白芷

陳皮

麻黃去節

蒼朮各一錢

甘草半錢

右細切作一服加生姜三片葱白三箇水一盞
半煎至一盞熱服咳嗽甚者加烏梅一箇同煎
服

○黃連解毒湯治傷寒大熱不止乾嘔煩渴錯語呻
吟不得安卧

黃連一錢

黃芩

黃柏

梔子各二錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗服

○金沸草散治傷寒咳嗽頭疼發熱胃膈痰壅喘嗽
等證

前胡一錢半

半夏七分半

細辛三分

旋覆花一錢半

荊芥穗二錢

赤茯苓一錢

一方無細辛茯苓有麻黃芍藥

右細切作一服加生姜五片大棗一枚水一盞

牛煎至一盞溫服

○五苓散治傷寒中暈煩躁小便不利而渴或霍亂

吐利不止東垣曰五苓散乃太陽裏之下藥也

夫太陽高則汗而發之下則引而竭之渴者邪

入太陽本也當下之使邪從膀胱出也其腎燥

膀胱熱小便不利此藥主之小便利者不宜用

然太陽病熱而渴小便雖利亦宜此藥下之當

服不服則穀消水去形亡必就陽明燥火戊胃

發黃此太陽入本失下也由不服此藥故也

醫學正傳卷之二

澤瀉一兩半 白朮一兩

赤茯苓一兩

猪苓一兩 肉桂半兩

右研為細末每服三錢白湯或清米飲調服或

細切加姜棗煎服執甚者去桂加黃芩○如傷

寒三四日間往來寒熱自利者邪入太陰而少

陽病猶在也本方合小柴胡名柴苓湯加姜棗

煎服以分利其陰陽也

○東垣此事難知曰經云有汗不得服麻黃無汗不

得服桂枝若誤服則其變不可勝數故立此法

不犯三陽禁忌解利神方此易老之法也名曰

九味羌活湯

○九味羌活湯

羌活治太陽陽肢節痛君主之藥也然非無為主

也乃為祛風去濕之正主故太無不通小無

防風治一身風寒濕乃軍卒中卑下戰也

蒼朮治一身風寒濕乃軍卒中卑下戰也

細辛治少陰腎苦

白芷治陽明頭痛

醫學正傳卷之二

黃芩治太陰肺

已上九味雖為一方然亦不可執一執中無權

猶執一也當視其經絡前後左右之不同從其

輕重大小多少之不一增損用之如神其効細

切水煎服若急汗熱服以羹粥投之若緩汗溫

脹之而不用湯投之也○脉浮而不解者宜先

急而後緩○脉沉而不解者宜先緩而後急○

此藥不獨解利傷寒治雜病亦有 ○中風行

經者加附子○中風秘澀者加大黃○中風并

三氣合而成痺等證各隨十二經上下內外寒熱溫涼四時六氣加減補瀉用之

○東垣曰經云兩感於寒者死不治一日太陽與少陰俱病頭痛發熱惡寒口乾煩滿而渴太陽者府也自背胸而入人所共知少陰者藏也自鼻息而入人所不知也鼻氣通於天故寒邪無形之氣從鼻而入腎為水也水流濕故腎受之經曰傷於濕者下先受之同氣相求耳又云天之邪氣感則害人五藏以是知內外兩感藏府俱病欲表之則有裏欲下之則有表表裏既不能一治故死矣然所稟有虛實所感有淺深虛而感之深者必死實而感之淺者猶或可治治之而不愈者有矣未有不治而復生者也予嘗用此問有生者十得二三故立此方以待好生君子用之名曰解利兩感神方大羌活湯

○解利兩感神方大羌活湯

防風

羌活

獨活

防已

黃芩

黃連

醫學正傳六卷之一

百零三

水

蒼朮

白朮

甘草

細辛各三分

知母

川芎

地黃各一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞半去粗熱飲之未解再服三四劑病愈則止若有餘證並依仲景法如證治

○張子和六神通解散治夏月傷寒得太陽陽明二經病汗不出頭項痛腰脊強目疼鼻乾不得卧代麻黃葛根等湯發表藥也

醫學正傳六卷之一

百四

土

蒼朮三錢

石膏

滑石

黃芩各一錢

麻黃半

甘草半錢

右細切作一服水二盞煎至七分服春加防風

一錢

○劉河間守真治傷寒直格要訣

傷寒前三日在表法當汗可用雙解散連進數

服必愈

○雙解散二方

○防風通聖散方見中風門

○益元散又名六一散又名天水散方見痢門

二藥合而服之當得汗而解若不解者病已傳

變

傷寒後三日在裏法當下若下之太早則表邪乘

虛入裏遂成結胸虛痞懊憹斑疹發黃之證輕

者必危危者必死但當以平和之藥宣散其表

和解其裏病勢或有汗或無汗發熱未愈當用

小柴胡涼膈天水合而服之

病若半在表半在裏法亦當和解小柴胡涼膈主

之

若裏熱微者則當微下大柴胡合解毒湯主之若

熱勢未退又以大柴胡合三一承氣下之

○三一承氣湯

大黃

芒硝

厚朴

枳實

各半錢

甘草

一錢

右細切作一服水一大盞姜三片煎七分熱服

其病膏膈滿悶或喘或嘔陽脉緊盛者宜瓜蒂散

吐之

汗吐下三法之後別無異證者涼膈散調之

病大熱已去微熱未盡除者以益元散服之與令

再病此傷寒治法之大要也

或傷風自汗脉浮緩者雙解散去麻黃以解利之

其病半表半裏白虎和解之

其病在裏脉沉細者無問風寒暑濕或表裏證俱

不見或內外諸邪所傷有汗無汗心腹痛滿譫

語煩躁畜熱內盛俱是脉沉者並用承氣合解

毒下之

或中暑自汗以白虎湯解之白虎解後以五苓合

天水調之多進數服無妨

或腹脹滿脉沉者亦當以承氣合解毒微下之

或發汗之後熱不解脉尚浮者白虎加蒼朮再解

之

或裏熱內盛陽厥極深皆因失下而成此證以致

身冷脉微昏憤將死切不得以寒藥下之誤下

即死有一輩庸醫妄言是陰厥便欲投玄貳四

逆溫熱之劑下咽必死殊不知此證乃陰耗陽

竭陰氣極弱謂之耗陽厥極深謂之竭蓄熱拂
鬱將欲絕者當此之際寒劑熱劑俱不可投但
進涼膈解毒以養陰退陽宣散蓄熱脉氣漸生
得大汗而愈亦有無汗氣和而愈者未愈却用
解毒合承氣下之次以解毒涼膈天水三藥合
而為一調和陰陽洗滌藏府則其餘別證自不
生矣有大下之後熱不退再三下之熱愈盛若
下之不愈脉微氣虛力弱不加以法則無可生
之理若輟而不下則邪熱極盛陰氣極衰脉息
漸絕必不可救似此之證是下之亦死不下亦
死鑒者到此殺人活人一彈指間其不至手足
失措者幾希訣云傷寒汗後汗出不解或反不
汗脉尚浮白虎加蒼朮湯再解之
又按餘論云傷寒下後自汗熱不已白虎
以蒼朮人參一服如神汗止身涼此通仙
法之問也如此則汗下之後熱不退不
汗無汗並宜白虎加蒼朮解之又加人參亦
妙仍前承膈
解熱調之
經云三下而熱不退者即死後人有四五次下而
生及十數次下而生者此偶然誤中耳活者得
一二死者已千百後學切不可以此為法但當

依前法用解毒合涼膈調之使陽熱除退陰脉
漸生庶不夭人命也
若傷飲不解散成結瘕之證臨時擇用大小陷胃
湯九累下之若脉浮者不可下是表證未出小
柴胡合小陷胃湯投之脉雖浮而熱大極者承
氣徐徐疎利之
或有留飲過度溫熱内生自利不止其熱未退解
毒湯治之陽毒生斑涼膈散加當歸
佛鬱熱盛在表燥而無汗濕熱在裏不能發於外
相搏遂成發黃茵陳湯調五苓散甚者茵陳合
承氣下之
一心煩不得卧梔子豉湯
○茵陳湯
山茵陳 一兩 大黃 半兩 梔子 十枚
右細切水二盞煎一盞溫服以利為度
○梔子豉湯方見前
一誤下大早遂成結瘕虛痞涼膈散加枳殼桔梗
剛柔二症謔語發狂踰垣赴井皆陽熱極盛而然

承氣合解下之

一汗下之後煩渴飲水涼膈散及戒桂五苓止露益

元選而用之

○甘露飲

茯苓

澤瀉

甘草

石膏

寒水石各二兩
白朮

桂枝

猪苓各半兩
滑石四兩

右為末每服三錢白湯調或新汲水調姜湯尤

妙

醫學正傳卷之二

二百八

一小便不通五苓泄之大使閉結承氣下之更有外

證加戒防風通聖散方內隨證用藥處治方無

一失也

一婦人證治皆然惟孕婦三四月併七八月不用硝

黃其餘月分用之無妨

一小兒戒劑服之

此中有古人治傷寒不傳之妙後之學者宜慎實

之

愚按河間已上治傷寒法宜用於春三月及

夏至前後溫病及中暑熱傳經之證能按法
施治無有不安

○丹溪活套

凡傷寒傳經之證初得太陽經病惡寒發熱頭

項強腰脊痛無汗急用東垣九味羌活湯表之

而愈或諸痛悉除亦不惡寒但發熱不解或微

汗濺濺然出此為挾虛證宜用補中益氣湯為

主治有汗加桂枝芍藥汗未透尿尚浮緊加羌

活蒼朮防風葛根倍升麻柴胡滿悶者去黃芩

醫學正傳卷之二

二百九

人參仍頭痛未去加川芎白芷薄荷荊芥細辛

葛根如渴加五味子麥門冬天花粉三四日間

不宜前藥則以小柴胡湯驗證加減如寒熱

痛少陽外證悉具只以本方服之若兼腹滿自

利已見太陰證而少陽證猶未除者本方中加

五苓散名柴苓湯熱甚者去桂倍黃芩湯甚者

本方去半夏加五味子天花粉五六日不大便

潮熱引飲本方中去人參甘草加芍藥枳殼厚

朴大黃甚者加芒硝或用河間三一承氣湯七

八日過經不鮮熱不退或黃連解毒湯涼膈散
選而用之或仍以小柴胡看證調治而愈或愈
後因勞役復熱者仍用補中益氣湯多服數貼
自安雖因食復病切不可輕用大黃芒硝之類
下之蓋病後氣血大虛若復下之必死慎之慎
之

又傷寒下後譫語初能認人三五日後妄言不
休此神不守舍慎勿復下脉多沉細足冷氣促
面青褐色口乾燥宜用補中益氣湯倍人參加

醫學正傳

卷之

百一

竹葉二三十片○內外本弱得汗下後大虛脉
細數熱如火炙氣促宜用人參當歸白朮黃芪
并草五味子知母加竹葉數片煎用童便二三
貼而安○大病虛脫本是陰虛用艾灸丹田補
陽陽生則陰長故也不可用附子止可用參
多服為佳傷寒已經發汗吐下誤治後三焦生
熱脉洪數譫語不顧體晝夜喘息不休衄血熱
不解身目俱黃狂叫欲走三黃石膏湯連進三
四服而愈○如怯弱人因感寒濕發熱不食

附子一錢大黃二錢半服之不甚瀉夏月服
不妨○傷寒發斑生熱用黃瓜根杆汁黃瓜根汁
小瓜黃色累然四調伏龍肝服之去紅點甚
月黃瓜生即此瓜也妙○發斑似傷寒乃發熱之病發於外微汗以
散之通聖散消息用之

○東陽杜世良乃兄三月間得傷寒證惡寒發熱小
便淋瀝大便不行初病時葦中出小精血片如
棗核大由是衆醫皆謂房事所致遂作虛證治
而用補中益氣等藥七八日後熱愈甚大渴引

醫學正傳

卷之

百一

飲胃中滿悶語言錯亂召予診視六脉俱數甚
右三部長而沉滑左手畧平亦沉實而長予曰
此大實大滿證屬陽明經宜大承氣湯衆皆驚
愕曰先生誤矣予不聽作大劑連進二服大瀉
後熱退氣和病愈十數日後因食鴨肉太多致
復熱來問予教用鴨肉燒灰存性生韭汁調下
六七錢下黑糞一碗許而安

○東陽戚十八歲四月間得傷寒證惡寒發大熱而
渴舌上白胎三日前身脊百節俱痛至第四日

日後不省人事言語亂妄神思昏迷面青齒黑
人以為必死之證脉沉細先用小柴胡湯等藥
不愈急用四君子湯加附子數片煎一碗盛放
水盆中少時殺其熱性稍溫服之脉與神思即
回然後可用別藥此謂之陰證傷寒○傷寒怫
鬱不解三陽併入三陰藏府結燥面赤口渴心
驚譫語內熱多而外熱少宜用三一承氣湯或
以此藥送下木香檳榔九三五粒下其燥屎
而安○如汗下後熱未能除用梔子豉湯或
東垣加減涼膈散煎服以徹其邪而愈○凡傷
寒身體疼痛惡風寒遇暖則喜脉浮而數必得
大汗而愈不問日數皆以六神通解散煎服如
譫語神思不寧蓋熱邪已入裏不能盡解本方
加人參黃連即安服前藥如汗不透更加紫蘇
葉葛根白芷等藥助之當得大汗而病如掃此
張戴仁之法藥雖輕微不知自有神妙不可易
而忽之○傷寒發斑面赤昏瞶譫語脉洪而虛
按之無力或絕不見用人參生地黃各五錢炮

惟脇痛而嘔自利六八來召予治診其脉左右
手皆弦長而沉實且數甚予曰此本三陽合病
今太陽已罷而少陽與陽明仍在與小柴胡合
黃連解毒湯服之脇痛嘔逆皆除惟熱猶甚九日後
漸加氣築痰響聲如拽鋸出大汗退後而身發
熱愈甚法當死看其面上有紅色潔淨而無賊
邪之氣言語清亮間有譫語而不甚含胡予故
不辭去而復與治用涼膈散倍大黃服二服視
其所下仍如前自利清水其痰氣亦不息與大
承氣湯合黃連解毒湯二服其所下亦如前予
曰此蓋熱結不開而燥屎不來耳後以二方相
間日三四服每藥又各服至五貼如得結糞如
肥皂子大者十數枚痰氣漸平熱漸減至十五
日熱退氣和而愈一知醫者問曰何以言
後不可再下連日用此峻劑而獲安者何也曰
燥屎未下而脉尚實胡為不可再下是故為醫
者不可膠柱而調瑟也

醫學正傳卷之二目錄



○瘟疫門三 論 脉法 丹溪方法一條

陶氏治瘟疫法 三黃石膏湯 敗毒散

九味羌活湯 黑奴丸 神木散

附大頭天行病

丹溪方法一條 東垣方法一條 二黃湯

普濟消毒飲子 甘桔湯 姜蕤散

祖傳人黃散 丹溪活套 已試醫驗一條

○斑疹門四 論 脉法 丹溪方法九七條

消風散 葛根橘皮湯 陽毒升麻湯

玄參升麻湯 陽毒梔子湯 犀角消毒飲

解毒防風湯 升麻鱉甲湯 加味羌活散

調中湯 化斑湯 黑膏

大青四物湯 祖傳加味敗毒散

○內傷門五 論 脉法 丹溪方法一條

補中益氣湯 硃砂安神丸 調中益氣湯

丹陽順氣湯 當歸補血湯 升陽補氣湯

木香化滯湯 升麻益胃湯 雙和散

門冬清肺飲 寬中進食丸 白木和胃丸

枳木丸 草豈蔻丸 枳實導滯丸

白朮丸 木香見現丸 三稜消積丸

備急大黃丸 丹溪保和丸 加味二陳湯

祖傳通源散 參苓白朮散 已試醫驗三條

○中暑門六 論 脉法 丹溪方法九二條

清暑益氣湯 白虎湯 益元散

香薷飲 黃連香薷飲 十味香薷飲

生脉散 桂苓甘露飲 祖傳經驗方法

○濕證門七 論 脉法 丹溪方法九四條

加味二陳湯 防己黃芪湯 甘草附子湯

加味五苓散 除風濕羌活湯 羌活勝濕湯

茯苓滲濕湯 茵陳五苓散 經驗白朮散

丹溪活套

○燥證門八 論 脉法 丹溪方法九一條

瓊脂膏 瓊玉膏 天門冬膏

地山煎 和血益氣湯 當歸潤燥湯

生津甘露湯 生津甘露飲 辛潤緩肌湯

通幽湯	潤燥湯	活血潤燥湯	潤腸丸	○火熱門九論	脉法	丹溪方法九二十條	左金丸	大補丸	抑青丸	石膏丸	四物馬脰湯	又丹溪方法九條	火鬱湯	升麻散火湯	瀉陰火升陽湯	滋腎丸	涼膈散	三補丸	紫雪	妙香丸	瀉心湯	麥門冬湯	梔子仁湯	當歸龍會丸	醫學正傳卷之十一	三黃丸	丹溪活套	祖傳人中白散	已試醫驗一條	○鬱證門十論	脉法	丹溪方法九八條	越麴丸	生韭飲	六鬱湯	升發二陳湯	升陽散火湯	火鬱湯	已試醫驗一條	○痰飲門十一論	脉法	丹溪方法九十六條	燥痰星夏丸	中和丸	小胃丹	墜痰丸	青蒙石丸	二陳湯
-----	-----	-------	-----	--------	----	----------	-----	-----	-----	-----	-------	---------	-----	-------	--------	-----	-----	-----	----	-----	-----	------	------	-------	----------	-----	------	--------	--------	--------	----	---------	-----	-----	-----	-------	-------	-----	--------	---------	----	----------	-------	-----	-----	-----	------	-----

導痰湯	千縉湯	利膈化痰丸	痰痰丸	神木丸	黃芩利膈丸	蠲飲枳實丸	十棗湯	三花神祐丸	控涎丹	半夏丸	取竹瀝法	取荆瀝法	丹溪活套	已試醫驗一條	○咳嗽門十二論	脉法	丹溪方法九六條	嗽煙筒	喘嗽遇冬發方	寒嗽加味二陳湯	清金化痰丸	乾咳嗽治法	痰因火逆治法	補陰四物湯	四物合三陳湯	陰虛嗽紅治法	醫學正傳卷之十一	又丹溪方法九二十三條	嗽失音潤肺散	嗽而無聲有痰方	嗽而有聲無痰方	寒熱交作痰嗽方	小陷胃湯	五味子湯	嗽分肺虛肺實方法	訶子收斂之功	瓊玉膏	九仙散	三拗湯	溫肺湯	人參荊芥散	加味二陳湯	杏蘇飲	丹溪活套	祖傳經驗方	祖傳三聖丹	○哮喘門十三論	脉法	丹溪方法九十四條
-----	-----	-------	-----	-----	-------	-------	-----	-------	-----	-----	------	------	------	--------	---------	----	---------	-----	--------	---------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	----------	------------	--------	---------	---------	---------	------	------	----------	--------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-----	------	-------	-------	---------	----	----------

葶藶大棗瀉肺湯 濟生中藏散 瀉白散

祖傳治咳方 九四條

○瘡證門 十四論 脈法 卅溪方法 九十六條

截瘡常山飲 截瘡七寶散 東垣方法 九十七條

溫脾散 卅溪活套 祖傳截瘡神方 九十八條

已試醫驗一條

○霍亂門 十五論 脈法 卅溪方法 九十九條

桂苓甘露飲 五苓散 半夏湯

理中丸 六和湯 漿水散

醫學正傳卷之十一

姜附湯 理中湯 灸法 九二條

洗法 卅溪活套

○泄瀉門 十六論 脈法 卅溪方法 九十二條

青六丸 溫六丸 姜麴丸 止瀉方

脾泄丸 茯苓湯 黃芪補胃湯 升陽除濕湯

痛泄方 白朮芍藥湯 茯苓湯 蒼朮防風湯

防風芍藥湯 蒼朮芍藥湯 良方神術散

胃風湯 卅溪活套 祖傳經驗方 九二條

已試醫驗 九二條

醫學正傳卷之二

金匱要略 恒德堂 虞博編集 校正

瘟疫 附大頭天行 喉嚨痛

論

內經曰蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固雖有賊邪弗能害也又曰冬不藏精者春必病瘟是以多感於房勞辛苦之人安樂者未之有也俗名瘟病醫書曰疫癘曰黃病嶺南閩廣等處曰瘴氣蓋指山嵐霧露煙瘴濕熱惡氣而名之也一皆觸胃四時不正之氣而為病焉傷寒論曰春應溫而反清夏應熱而反寒秋應涼而反熱冬應寒而反溫龐安常曰疫氣之發大則流行天下次則一方次則一鄉次則偏着一家悉由氣運鬱發有勝有伏遷正退位之所致也視斯疾者其可不推運氣而治之乎陶氏曰夫疫氣之中人輕重不一仲景無治法後人用敗毒散治甚得理然亦有愈不愈者蓋疫氣有淺深資稟有壯怯怯而受厲氣之

深者雖智者尚不能治况庸劣之士乎若資稟壯實所感又淺則庶幾可愈切不可作傷寒症治而大汗大下也但當從乎中治而用少陽陽明二經藥明陽小柴胡湯也看所中陰陽經絡脉證而以二方加減和治之殊為切當學者宜詳察之毋忽脉法

脉陽濡弱陰弦緊更遇溫氣變為瘟疫

溫病二三日體熱腹滿頭痛食飲如故脉直而疾

八日死

醫學正傳卷之七

溫病四五日頭痛腹滿而吐脉來細而強十二日

死

溫病八九日頭身不疼目不赤色不變而反利脉

來牒牒按之不鼓手時大心下堅十七日死

溫病汗不出出不至足者死厥逆汗自出脉堅強

急者生虛軟者死

溫病下利腹中痛甚者死

方法

川溪曰衆人病一般者此天行時疫也治有三法

宜補宜散宜降用大黃黃芩黃連人參桔梗蒼朮防風滑石萎蕤人中黃神麴糊為丸每服五七十丸氣虛以四君子湯下血虛以四物湯下痰多以二陳湯下熱甚者加童便謂人中黃者人多有以糞中清汁頻飲一二碗病隨愈然但恐畏其臭穢不能下咽耳故丹溪所取人中黃法於冷月以竹截筒削去青兩頭留節一頭打通一竅以大甘草納入筒內以竹釘塞其竅後糞缸中二三箇月取出晒乾用

○陶尚文治瘟疫法

若病只在少陽經者小柴胡加防風羌活微發

醫學正傳卷之七

之而愈若病兼陽明經者柴葛二方合服之

小柴胡對非麻葛根湯也

若見太陽證大便泄者以本方小柴胡去黃芩也

對五苓散尤當看脉寒熱若無寒去桂留苓

若小便不利是膀胱本病本方加去桂五苓散

若入太陰經無熱證見者用理中湯此證必須

腹痛而瀉明日瀉止痛止仍小柴胡和之

若入少陰經及厥陰經用陰證傷寒傳經法治

之

若初看未端的且先以敗毒散治之看歸在何

經再隨經施治無不効者

若發黃小柴胡合去桂五苓散未退茯苓滲濕

湯

瘟疫作渴本方加石膏知母濕溫渴蒼木白虎

湯

瘟疫發狂不識人大柴胡湯加當歸如大便秘

者三黃石膏湯柴苓湯

瘟疫膏膈滿悶本方中加枳殼橘紅黃連若大

便不通大柴胡湯微利之

○三黃石膏湯

石膏三錢

黃芩

黃連

黃柏各一錢

豆豉

半合

麻黃

一錢

梔子五枚

右細切作一服水二盞煎至一盞三分連進三

五劑愈

○敗毒散治瘟疫四時通用

羌活

獨活

前胡

柴胡

川芎

枳殼

桔梗

白茯苓

人參各等分

甘草減半

右為細末每服三錢加生姜三片水一盞半煎

至一盞溫服或沸湯點服亦可此藥治傷寒瘟

疫風濕風眩四肢痛憎寒壯熱項強睛疼不問

老人小兒皆可服或嶺南煙瘴之地或瘟疫時

行或人多風痰或處卑濕之地脚氣痿弱此藥

不可缺也日三五服以知為度一方加薄荷少

許每服五錢加姜水煎服

○九味羌活湯

方見傷寒門

治瘟疫初感一二日間

服之取汗而愈其効如神

○黑奴丸治溫毒發斑煩躁大渴及時行熱病六七

日未得汗脉洪大而數面赤目眩身痛大熱狂

言欲走渴甚又云五六日已上不解熱在胃中

口禁不能言為壞傷寒醫所不治棄為死人精

氣已竭心下尚溫拊開其口灌藥下咽則活

黃芩

金底煤

芒硝

麻黃

梁上塵

小麥奴

灶突墨

各一兩

大黃 一兩三錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大新汲水化服飲水足當發寒寒已汗出乃差若特頃不汗再服一九須見微利若不渴不可與此藥

○大無神木散治四時瘟疫頭痛強憎寒壯熱身痛專主山嵐瘴氣之妙劑也

陳皮二錢

蒼朮

厚朴 各一錢

甘草

石菖蒲 各一錢半

藿香

醫學正傳

卷之十一

十一

水

右細切作一服加姜三片大棗一枚水一盞半煎至一盞去粗溫服一方無菖蒲有香附一錢名神木散氣散

附大頭天行病

○丹溪曰大頭病乃濕熱在高巔之上用羌活及酒

炒黃芩酒蒸大黃隨病加減切不可用降藥

○東垣曰陽明邪熱太甚實少陽相火而為之也

濕熱為腫火盛為痛此邪見于頭多在兩耳前

後先出皆主其病也治法大不宜藥速速用

其病所謂上熱未除中寒後生必傷人命宜用

緩藥緩服徐徐少與當視其腫勢在何部分隨

經處之陽明為邪首大腫少陽為邪出於耳項

前後也

○二黃湯治大頭天行疫病

黃芩

酒製炒

黃連

酒製炒

生甘草

各等分

右細切每服三錢水一盞煎七分溫服徐徐呷

之○如未退用鼠粘子 不拘多少水煎入芒硝等分

亦時時少與毋令飲食在後如未已只服前藥

醫學正傳

卷之十一

十一

和

取大便邪氣已則止○前方宜各少加引經藥

陽明渴加石膏少陽渴加瓜蒌根陽明行經升

麻芍藥葛根甘草太陽行經甘草荆芥防風並

與上藥相合用之或云頭痛酒芥口渴乾葛身

痛羌活桂枝防風芍藥俱宜加之

○普濟消毒飲子

泰和二年四月民多疫癘初覺憎寒壯熱體重

次傳頭面腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾

口燥俗云大頭傷寒諸藥雜治終莫能愈漸至

危篤東垣曰身半已上天之氣也邪熱客於心肺之間上攻頭面而為腫耳須用下項藥共為細末半用湯調時時服之半用蜜丸噙化服盡良愈活者甚衆時人皆曰天方謂天仙所製也遂刻諸石以傳永久

黃芩半兩酒製炒 黃連半兩酒製炒 人參三錢

陳皮去白 甘草二錢 連翹一錢

玄參二錢 白殭蚕七分炒 升麻七分

柴胡五分 桔梗三分 板藍根一錢

馬勃一錢 鼠粘子一錢

右為末服如上法或加防風川芎薄荷當歸身細切五錢水二盞煎至一盞食時時稍熱服之如大便硬加酒蒸大黃一錢或二錢以利之腫勢甚者以砭鍼刺之

蝦蟇溫

○丹溪曰蝦蟇溫屬風熱防風通聖散加減用之或用小柴胡加防風羌活荊芥薄荷桔梗煎服外以側柏葉搗汁調火煨蚯蚓糞付之或用丁香

尖附子尖南星醋調付之或五葉藤車前草皆可傷付之有效

○非枯湯治冬瘟咽喉腫痛

甘草 桔梗各等分

右細切水煎時時頻呷之

○萎蕤散治冬瘟頭面腫

萎蕤二錢半 石膏一錢半 麻黃

白薇 羌活 杏仁

甘草 青木香 川芎各半錢

乾菊花一錢半

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗日三服
○祖傳經驗秘方人黃散治四時疫癘大頭天行等病

糞缸岸置風露中一年速者佳 甘草三錢

辰砂 雄黃各一錢半

右為細末每服二錢煎薄荷桔梗湯送下日三五服煎藥甘草桔梗茯苓藁本白朮各半錢水煎服○疫癘夏感寒伏於少陰咽痛次必下利

名曰腎湯寒宜用半夏枯梗甘草各一錢加
五片煎服○大頭天行病從頤頤腫熱者又名
顯顯瘟東垣有方用羌活酒炒黃芩酒蒸大黃
加減水煎服十五六日服小柴胡湯不愈者仍
用陳皮紫蘇發散而愈又法酒炒黃芩黃連為
君炙甘草為佐水煎細細呷之再加黍粘子酒
蒸大黃煎入芒硝亦細細頻與服之微利為度
睡成後去後二味只服前藥如渴屬陽明加石
膏屬少陽加瓜蒌根若陽明行經加升麻芍藥

醫學正傳

卷之二

五

子

加黃芩湯加葛根身

東陽李文會內子陳氏年二十九三月間得瘟疫
證病三日經水適來發熱愈甚至七八日病劇
膏中氣築作痛莫能卧衆醫枝窮辭去黑夜來
迎予診治病者以綿花袋盛托背而坐于床令
婢磨膏不息手六脉俱微數極而無倫次又語
鯁遊狀予問曰恐下早成結胃耳主人曰未嘗
下予再思之三日而經水適來致中氣

同用黃龍湯四物湯小陷胃湯共合一劑如姜
東煎服主人曰此藥何名予曰三合湯也一服
而諸病悉減遂能卧再服熱退而病全安愈後
又曰食粥太多而病復熱又作內傷處治而用
補中益氣湯出入加減調理而愈

班疹四附錄

論

內經曰少陰所致為瘍疹夫少陰所至者言君火
有餘熱令大行戊子戊午之歲也在人則心主之

醫學正傳

卷之二

七

卯

心火大過則制已所勝而燒燥肺金蓋肺主皮毛
故紅點如蚤之狀見於皮膚之間心火侮而乘之
之色也名曰癰疹或傷寒濕熱病而發班班似錦
文者名曰發班皆熱毒之所致也其證有陽毒有
陰毒是皆冬應寒而反溫人受不正之氣故至春
夏而發為班爛夫陽脉浮數而陰脉實大者名為
溫毒或為內外結熱極深舌卷焦黑鼻着烟煤往
言見鬼面赤而班爛者名為陽毒如溫病下之太
早熱氣乘虛入胃或下之太遲熱病鬱結

醫者誤用熱藥過多胃氣熱甚及內傷熱病虛火
燔灼肺之間皆能成發斑也是故發赤斑者半生
半死發黑斑者九死一生治法用化斑湯即人參
白虎湯升麻葛根湯去參升麻湯痛加羌活防風荆芥桂
枝芍藥隨宜用之入上藥相合煎服 時疫腫毒
疔瘡或藏府積熱發於頭項咽嗑堵塞水漿不下
或面赤脉浮洪熱甚涌蘆湯治之升麻黃芩大黃
各一兩藍葉即大青葉各二兩煎服

○丹溪活套云衆人病一緩者乃天行時疫蓋冬月
醫學正傳卷之二

閉藏之時反行春令濕勝於寒而發泄真陰土
一勝水虧矣所勝者妄行土有餘也所生者受病
所勝者侮之火土相合濕熱相侵故春來木長
之時無水滋生化源故人病瘟治有三法見前
春感清氣無汗惡寒為疫癘通用升麻葛根湯
○春感清氣發熱而渴不惡寒宜解肌湯葛根
黃芩芍藥各一錢麻黃一錢半甘草桂枝各七
分牛大棗一枚水煎服○春溫發熱咳嗽身疼
口燥渴脉浮洪熱甚宜小柴胡湯加桂枝治之

咳嗽加五味子渴去半夏加瓜蒌根人參脉實
渴宜大柴胡湯下之渴加知母石膏○凡溫病
脉尺寸俱浮素傷於風因而傷熱風熱相搏其
證四肢不收身熱自汗頭痛喘急發渴昏睡或
體重不仁慎勿發汗汗之則譫語煩燥目昧無
睛光病在少陰厥陰二經宜萎蕤湯人參敗毒
散葛根龍膽湯小柴胡湯甚者括萎葛根湯脉
浮身腫汗出漢防已湯誤汗者防已黃芪湯○
四時傷寒疫癘或傷風有汗或風濕身腫體痛
惡風口乾日晡潮熱脉實並用人參敗毒散○
夏應熱而反寒夏及秋初而為暴寒折於盛暑
熱結四肢則壯熱頭痛或寒傷於胃下利膿血
或水瀉脉實者宜下之安調中湯大黃三錢葛
根黃芩等藥各二錢
黑膏黑奴丸之類是皆正治之法也學者宜詳察
而用之

脉法

脉陽浮而數陰實而大火盛在表故陽脉浮數
下焦實故陰脉實大

一 脉多沉伏或細而散或絕無滑伯仁曰脉者血之波淵故發班者血散

故脉伏

方法冊溪方法
凡七條

丹溪曰發班屬氣熱挾痰而作自裏而發於外通

聖散中消息用當微汗以散之下之非理也

○戴氏曰有色點而無顆粒者曰班一云發班似傷

寒痰熱之病發於外也

○有屬裏者因胃熱助手少陰火入手陽明肺也故

紅點如班生於皮毛間耳白虎瀉心調胃承氣

醫學正傳卷之二

十九

從長選用之

○內傷發班者胃氣極虛一身之火遊行於外所致

宜補以降之

○疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有

可下者

戴氏曰浮小有顆粒者是也隨出即沒而又出

是也

○丹疹皆是惡毒熱血蘊蓄於命門遇君相二火合

起即發也如遇熱時以通聖等辛涼之劑解之

寒月以升麻葛根等辛溫之劑解之凡丹疹先

從四肢起而後入腹者死

○有乳孩因胎毒兩腋生癰後腹脹發赤疹如霞片

取剪刀草杵汁調原蚕沙付之而愈

○冷丹屬血風血熱用通聖散有痰血相搏用

蟬退殭蚕荊芥南星治之

○消風散

荊芥穗

甘草炙

陳皮去白

厚朴

白殭蚕炒

蟬蛻去土炒

醫學正傳卷之二

二十

人參

茯苓

防風

川芎

藿香

羌活各等分

右細切每服二錢煎荊芥湯或茶清調下

○元戎葛根橘皮湯肌膚斑駁冬溫始發欬而心悶

但嘔清汁

葛根

橘紅

杏仁

知母

黃芩

麻黃

甘草各等分

右細切每服五錢水一盞半煎至一盞溫服

○陽毒升麻湯治傷寒一二日間身發斑爛或吐下後變成陽毒腰片疼痛面赤狂言下利脉浮大咽痛方見傷寒門

○陽毒梔子湯治傷寒壯熱百數煩痛身發斑爛

升麻 梔子仁 黃芩

芍藥 各一錢 石膏二錢 知母一錢半

杏仁 七分半 柴胡一錢 甘草 五分

右細切作一服入姜三片香豉一百粒煎服

○犀角消毒飲子發斑癰疹等證

醫學正傳 卷之十一

牛蒡子 四分 荆芥穗 防風 錢半 各二

甘草 一分

犀角 一盞半另鎔為細末

右細切作一服水二盞煎至一盞調犀角末服

○解毒防風湯治發斑及癰疹痒痛

防風 一錢半 地骨皮 黃芪

芍藥 荆芥穗 枳殼

牛蒡子 炒各七分半

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○升麻葛根湯治傷寒陽明實熱發斑方見傷寒門

○陽毒升麻鱉甲湯治陰斑

升麻 二錢 當歸 升草 各一錢二分

蜀椒 三粒 鱉甲 炙一錢 椎黃 四分另研

右細切水二盞煎至一盞去粗調椎黃末服

○加味羌活散治感四時不正之氣發為癰疹

羌活 前胡 各一錢 人參 枳殼 炒黃色

桔梗 甘草 炙 茯苓 各半錢

川芎 天麻 薄荷 各三分

蟬蛻 薄荷 各三分

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞

溫服

○調中湯治內傷外感所發陰斑

蒼朮 一錢半 陳皮 一錢 砂仁

藿香 芍藥 煨 甘草 炙

桔梗 去芦 半夏 湯泡七次 白芷

羌活 枳殼 各七分 川芎 五分

麻黃 去節 桂枝 各三分

右細切作一服加生姜三片水二大盞煎七分

溫服

○化斑湯治傷寒汗吐下後發斑脉伏即傷寒門白虎加人參湯也守其類萃又加白朮水煎時時服之

○黑膏治溫毒發斑冬月大溫人受不正之氣至春發斑如錦文脉浮散屬陽沉伏消疫毒之氣屬陰用此以生地黃半斤香豉一升

右二味細切以猪膏二斤合煎之取濃汁如膏用椎黃射杵如豈大肉中攪和勻每服用彈子

醫學正傳卷之二
大白湯化下

○大青四物湯治瘟疫發斑

大青四錢阿膠炒成珠子甘草炙各二錢

香豉一合

右細切作一服水煎服之

○祖傳經驗加味敗毒散治瘟疫及癰疹等証

羌活獨活前胡

柴胡川歸川芳

枳殼桔梗茯苓

人參各五分甘草薄荷各二分半

加白朮防風荊芥

蒼朮芍藥生地黃各五分

右細切作一服加生姜三片大寒二枚水煎服此因虛而感冒風濕以致發斑者服之良驗

醫學正傳卷之二

醫學正傳卷之二

醫學正傳卷之二

花溪恒德老人虞搏天民編集

姪孫虞守愚惟明校正

內傷五

論

內經曰陽者天氣也主外陰者地氣也主內故陽道實陰道虛犯賊風虛邪者陽受之食飲不節起居不時者陰受之是故陽受之則入六府陰受之則入五臟以內外陰陽府藏虛實之不同也舉世

醫學正傳

卷之二

二五

東

醫者但見惡寒發熱頭目沉重之證更不察內外虛實便作傷寒模糊處治輒用仲景汗下解利之法治之多死良可嘆哉我東垣先生憫生靈之夭枉著內外傷辨惑論脾胃論等書一皆以扶植胃氣為本誠萬世不刊之妙典也其諄諄告誡之意屢以飲食失節勞役過傷為言而立補中益氣湯湯為主治若能確守其法而行之無有不驗惜乎今之醫者多承因習之弊愴然不識機變睥睨其書而不視間有讀者不明脉候虛實不偏於此則

偏於彼或遇內傷挾痰與食清氣拂鬱於下濁氣

填塞胃中之候驟以補中益氣等藥一試則氣滿

痞塞遂謂補藥不宜於此證也決意改用汗下解

利之法醫死而不之悔故王安道有內傷不足中

有有餘之議此發東垣之所未發者耳學者宜潛

心究察其虛實似是之非庶不夭人之天年也東垣

辨內外虛實之法學者宜熟究於胃中論證之際庶無魯

魚亥豕之訛焉抑考辨惑論曰夫外傷風寒有餘

之證其發熱惡寒寒熱併作其熱也拂之發熱發

於皮毛之上如羽毛之拂明其熱在表也其口鼻

氣塞不通心中煩悶不安其惡風寒也稍似裸體

便不能禁雖重衣厚幕逼近烈火終不能禦其寒

一時一日增加愈甚必待邪傳入裏乃已語聲重

濁前輕後重高厲有力腹中和口知穀味大小便

如常筋骨疼痛不能動搖手背熱手心不熱是皆

外感有餘之候也其內傷飲食勞役不足之證其

發熱惡寒寒熱間作及熱也蒸蒸燥熱發於肌肉

之間刺之烙手明其熱在內也其口鼻中氣短少

氣不足以息其惡風寒也居露地中遇大漫風起

醫學正傳

卷之二

二六

東

却乃不惡惟門窓隙中些少賊風則大惡之亦必待其陰陽既和汗出則已語言困倦前重後輕氣不相續腹中不和口不知穀味大小便或閉或澀或心下痞悶或背脊中如刀割之痛手心熱手背不熱是皆內傷不足之候也以此辨之豈不如黑白之易見乎愚故畧述東垣之言以為後學之矜式耳臨證又當察其脈候求其有餘中之不足或不足中之有餘或外感挾內傷或內傷挾外感視其輕重而推宜用藥以施治之庶幾登東垣之堂而為當世之司命矣

醫學正傳卷之二十一 二十七

脈法

東垣曰右寸氣口脈大於人迎一部過在少陰則二倍太陰則三倍右寸三部屬三陰少陰在關主脾肺二臟之氣盛也

右寸氣口脈急大而數時一代而澀此者肺之元氣不固後續此飲食失

謂獨大者數中顯緩時一大也此不甚勞右關脾脈大而數

關胃脈弱甚則隱而不見但內顯脾脈之大

數微緩時一代此飲食不節寒濕失所之脈也○右關脈沉而滑此宿食不消之脈也

方法

丹溪曰東垣內外傷辨甚詳世之病此者為多但有挾痰者有挾外邪者有熱鬱于內而發者皆當以補元氣為主看所挾而兼用藥氣虛甚者必少加附子以行參芪之氣挾痰者補中益氣加半夏更以竹瀝姜汁傳送

醫學正傳卷之二十一 二十八

傷挾外感證治法宜先補益而後散邪或以補中益氣為主治加散邪藥當以六經脈證參究各加本經藥治之或外感重而內傷輕者為外感挾內傷證治法宜先散邪而後補益或以辛涼解毒散藥為君而以參朮茯苓歸芍藥為臣使是其治也

○補中益氣湯

黃芪一錢 甘草炙五分 人參病甚者錢

白朮 當歸各七分 陳皮五分

升麻

柴胡各三分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪以益皮毛而閉腠理不令自汗也上喘氣短損其元氣用人參以補之心火乘脾用炙甘草之甘溫以瀉火熱而補胃中元氣若脾胃急痛腹中急縮者宜多用之此三味除濕熱煩熱之聖藥也白朮苦甘溫除胃中熱利腰膈間血升麻柴胡苦平味之薄者升胃中之清氣又引黃芪甘草甘溫之氣

醫學正傳

卷之十一

二十九

升麻

味上升能補衛氣之散解而實其表又緩帶脉之縮急用當歸以和血脉橘紅以理胃中之氣又能助陽氣上升以散滯氣助諸甘辛為用或少加黃柏以救腎水而瀉陰中之伏火也表熱者一二服氣和微汗而愈○如咽乾者加乾葛○如心刺痛乃血澁不足加當歸○如精神短少者加人參五味子○如頭痛加蔓荊子痛甚加川芎頂痛腦痛加藁本細辛○有痰加半夏生薑○如咳嗽夏加五味子麥門冬秋冬加糖

節麻黃春加佛耳草欬冬花久咳肺中伏火去

人參○如食不下乃胃中有寒或氣澁滯加青

皮木香陳皮寒月更加益智草葶藶夏月更加

芩連秋更加檳榔砂仁○如心下痞悶加芍藥

黃連○如腹脹加枳實木香砂仁厚朴天寒加

生薑肉桂○如腹痛加白芍藥甘草有寒加桂

心夏加黃芩甘草芍藥冬加益智草葶藶半夏

○如脇痛或縮急加柴胡甘草○如膈下痛加

熟地黃不已乃是寒也加肉桂○如大便閉澁

醫學正傳

卷之十一

三十

升麻

加當歸大黃○如脚軟乏力或痛加黃柏不已

更加防已○如氣浮心亂以硃砂安神丸鎮固

之則愈

右此方加減法是飲食勞倦喜怒不節如病

熱中則可用之若未傳寒中則不可用也

蓋其酸適足以益其病耳如黃芪人參甘

草芍藥五味子之類是也見脾胃論

○硃砂安神丸

黃連一錢

五分

硃砂一錢

酒生地黃

酒當歸身 炙甘草 已上各五分

右為極細末湯浸蒸餅為丸如黍米大每服十

五九津唾嚥下食後服身月生甘草

○調中益氣湯

其脉弦洪緩而沉按之中之下得時一澁其證

四肢倦怠肢節煩疼難以屈伸身体沉重煩心

不安忽肥忽瘦口失滋味腹難舒伸大小便清

利而數或上飲下便或大便澁滯不行一二日

一見夏月發滯米穀不化或便後見血或見白

醫學正傳 卷之十一

三十一

膿胃滿短氣膈噎不通或痰嗽稠粘口中沃沫

食入反出耳鳴耳聾目中溜火視物昏花努肉

紅絲熱壅頭目不得安穩嗜卧無力不思飲食

此藥主之

黃芪 一錢 人參 半草

蒼朮 各五分 柴胡 此味為上氣不足胃氣興脾

橘紅 如腹中氣下得運轉 升麻 各二分

木香 一分或二分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗空心溫

服寧心絕思藥必神効蓋病在四肢血脉空心

在旦是也○如時顯熱躁乃下元陰火蒸蒸發

也加生地黃二分黃柏三分○大便虛坐不得

或了而不了腹中逼迫血虛血澁也加當歸身

三分○如身體沉重雖小便數多亦加茯苓二

分蒼朮一錢澤瀉五分黃柏三分○胃氣不和

加半夏五分生薑三片有嗽加生地黃二分以

制半夏之毒○如痰厥頭痛非半夏不能除此

是太陰脾經所作也○如兼燥熱加黃柏生地

醫學正傳 卷之十一

三十一

黃各二分如無以上證只服前藥○如春夏腹

痛加白芍藥三分○如惡熱而渴或腹痛者更

加白芍藥五分生黃芩二分○如惡寒腹中痛

加桂心三分去黃芩名桂枝芍藥湯○如冬月

腹痛不可用芍藥蓋其性之大寒也只加乾姜

二分或加半夏五七分以生薑制之○如秋冬

之月胃脉四道為衝脉所逆併脇下少陽脉二

道而反上行病名厥逆內經曰逆氣上行滿脉

去形明七神昏絕離去其形而死矣其正氣上

衝咽不得息而喘息有音不得臥加吳茱萸五分或一錢湯泡去苦用觀厥氣多少而用○如夏月有此証為大熱也蓋此病隨四時為寒熱溫涼也宜以酒黃柏酒黃連酒知母各等分為細末熟湯為丸如梧桐子大每服二百丸白湯空心送下仍多飲熱湯服畢少時便以美膳壓之使下用胃中停留耳至下元以瀉衝脉之邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虛勞七損証也常用溫平甘多辛少之藥治之是其本法也

○升陽順氣湯治因飲食不節勞役所傷腹脇滿悶短氣遇春則口沒無味遇夏雖熱猶有惡寒飢則常如飽不善食冷物

黃芪一錢 半夏六分 甘草二分
 草薢四分 神麴炒三分 升麻 柴胡各二分
 當歸身 陳皮各三分 黃柏一分半
 人參三分

右細切作一服水二盞生姜三片煎至一盞去渣食前溫服夫脾胃不足之証須用升麻柴胡

若平味之薄者陰中之陽引脾胃中清氣行於陽道及諸經生發陰陽之氣以滋春氣之和也又引黃芪人參甘草甘溫之氣味上行充實腠理使陽氣得衛外而為固也凡治脾胃之藥多以升陽補氣名之者此也

○升陽補氣湯治飲食不時饑飽勞役胃氣不足脾氣下溜氣短無力不能寒熱早飯後轉增昏悶頻要眠睡怠惰四肢不收懶倦動作五心煩熱厚朴姜製 升麻 羌活各三分

醫學正傳卷之二 三十四

白芍藥煨一錢 獨活五分 防風四分
 甘草炙三分 澤瀉七分 柴胡一錢二分
 生地黃七分半

右細切作一服生姜三片大棗二枚水二盞煎至一盞去粗食前大溫服 如腹脹及腹中窄狹加厚朴一倍 如腹中似硬加砂仁三分

○當歸補血湯治肌熱燥熱因渴引飲目赤面紅晝夜不息其脉洪大而虛重按全無內經曰脉虛血虛又云血虛發熱證像白虎能脉不長實為

曾耳誤服白虎湯必死此病得之於飢困勞役

黃芪

兩

當歸酒洗二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服

○木香化滯湯治因憂食濕麴結於中脘腹皮抵痛
心下痞滿不思飲食食之不散常帶痞氣或胃
脘當心而痛並皆治之

半夏湯泡洗

草薢薑煨碎

甘草各七分

柴胡去蘆

木香

橘紅各四分

枳實炒

當歸各三分

酒紅花一分

醫學正傳卷之

三十五

右細切作一服水二盞生薑五片煎至一盞去

粗熟服

○升陽益胃湯肺及脾胃虛則怠惰嗜卧四肢不收

時值秋燥令行濕熱少退休重節痛口燥舌乾

飲食無味大便不調小便頻數不欲食食不消

化見肺病洒淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和

乃陽氣不伸故也當升陽益氣此藥主之

黃芪一錢

半夏

人參去蘆

甘草炙各五分獨活三分

防風因秋旺

白朮二分

白芍藥

何故秋旺用

胃虛則肺最易邪故

羌活各三分

獨活二分半

茯苓小便利不渴者勿用

柴胡去蘆

澤瀉二分不淋秘者不可用黃連一分

右細切作一服生薑五片大棗二枚水二盞煎
至一盞去粗早飯後溫服

服藥後如小便罷而病加增劇是不宜利小便

當去茯苓澤瀉○如方喜食一二日不可飽食

恐胃再傷以藥力尚少脾胃之氣不得轉運升

醫學正傳卷之二

三十六

發也須滋味之食或美食助其藥力益升浮之

氣而滋其胃氣慎不可淡食以損藥力而助

氣之降沉也可以少役形體使胃與藥得轉運

升發慎毋大勞後使氣復傷若脾胃得安靜尤

佳若胃氣稍強少食加菓以助藥力經云五菓

為助是也

○雙和散補血益氣治虛勞少力不熱不寒溫而有

補

白芍藥一錢

黃芪蜜炙

熟地

川芎

川歸各六分

甘草炙

肉桂各四分

右細切作一服生姜三片大棗二枚水一盞半

煎至一盞溫服大病後血虛氣乏者以此調治

○門冬清肺飲治脾胃虛弱氣促喘精神短少或

衄血吐血等證

紫苑茸一錢

黃芪蜜炙

白芍藥炒

甘草炙各七分

人參

麥門冬去心

當歸身各五分

五味子九粒

醫學正傳

卷之二

主治

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗食後

溫服

○寬中進食丸滋形氣喜飲食

麥蘖麴一兩

半夏湯泡七次

豬苓去黑皮

草豆蔻濕麴

神麴各五錢

枳實麴炒

橘紅各三錢

白朮五錢

白茯苓

澤瀉各三錢

砂仁二錢

乾生薑炮

甘草炙

人參

青皮各二錢

木香一錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三

十丸清米飲送下食後服

○白朮和胃丸治病久厭厭不能食而臟腑或閉或

澹此胃氣虛弱也常服則和中理氣去濕消痰

和脾胃進飲食

白朮一兩

半夏湯泡洗

厚朴姜製各

陳皮去白

人參五錢

甘草炙二錢

枳實麴炒

檳榔各二錢

木香一錢半

乾生薑七分

醫學正傳

卷之二

主治

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五

十丸溫米飲送下

枳朮丸治痞滿消食強胃

白朮二兩

枳實麴炒黃

右為細末用沸湯泡青荷葉亦可頃間去葉用

湯浸晚粳米杵粉以原湯煮糊為丸如梧桐子

大每服五十丸多至七八十丸白湯送下○本

方加橘紅一兩名橘皮枳朮丸治元氣虛弱飲

食不消心下痞悶○本方加炒神麴一兩炒麥

藥效一兩名曲，藥枳朮丸治飲食太過，心腹
滿悶不快。○本方加水香一兩名，木香枳朮丸
能破滯氣，消飲食，開胃進食。○本方加半夏一
兩名，半夏枳朮丸治因冷食內傷。○本方加酒
炒黃連、酒蒸大黃、炒神麴、橘紅各二兩，黃芩四
兩名，三黃枳朮丸治傷肉食濕，麴辛辣味厚之
物填塞，悶亂不快。

草薺冠丸治傷飲食，卒心痛甚，効或秋冬傷寒，冷
之物胃脘當心而痛，上支兩脇痛，膈噎不通，食
飲不下。

草薺冠炒黃芩 枳實炒 白朮各一兩

麥蘗炒黃芩 半夏湯泡洗 黃芩酒炒

神麴炒黃芩 乾姜炮 橘紅

青皮炒 炒鹽五分

右為細末，湯浸蒸餅為丸，如菴薺大，每服五十
丸，白湯送下。如冬月不可用黃芩，歲火不及，又
傷冷物，加以溫劑，是其治也。然亦有熱物傷者，
從權以寒藥治之，隨時之宜，不可不知也。

○枳實導滯丸治傷濕熱之物，不得施化而作痞滿

悶亂不安

大黃一兩 枳實去穢炒 神麴炒

茯苓去皮 黃芩去朽 黃連

白朮各二錢 澤瀉二錢

或加木香、檳榔各二錢，名木香導滯丸。

右為細末，湯浸蒸餅為丸，如梧桐子大，每服七
八十九丸，溫水送下。食遠量強弱，加減丸數，以利
為度。

○白朮丸治傷濕粉濕，麴油膩之物

白朮六兩 枳實炒 半夏泡洗七次

神麴炒 橘紅七錢 黃芩五錢炒

白礬枯三分

右為細末，湯浸蒸餅為丸，如菴薺大，每服六七
十丸，白湯送下。量所傷加減丸數，因素食多用
椒，故用黃芩以瀉之。

○木香見睨丸治傷生冷硬物，心腹滿悶疼痛

神麴炒 京三棱炮 草薺炒

香附子各五錢 升麻

柴胡各三錢

木香一錢

巴菝 五分

石三稜 五錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十丸白湯送下量所傷多少服之

○三稜消積丸治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

京三稜 醋炙

廣木 醋炙

神麴 炒各七錢

淨青皮

巴菝 去心膜及油 炒

陳皮 去白各五錢

丁香

益智 去壳各三錢

右為細末醋調麴糊為丸如梧桐子大每服十

丸如至二十九生

姜湯送下

食前量虛實加減

如更衣止後服

○備急大黃丸治心腹諸卒暴痛

大黃

巴菝 去皮膜

乾姜 各半分

右為細末煉蜜和搗為丸如小菰大每服二丸

以利為度

○丹溪保和丸治一切飲食所傷胃腹飽悶不安或

腹中有食積癖塊多服日漸消散脾胃虛者勿

服

服

服

山楂肉 五兩

神麴 炒三兩

半夏 湯泡洗

茯苓

陳皮 去白各一兩

連翹 一兩

蘿菔子 炒一兩 麥蘗麴 炒一兩

右為細末別用生神麴五兩入生姜汁一小盞

水調打糊為丸如梧桐子大每服三五十丸白

湯或清米飲送下○一方加麥蘗麴有白朮二

兩名大安丸健脾胃消食積最効○一云脾胃

者服之虛虛之禍疾如反掌或以四君子等作

湯使送下蓋山查一物大能化食物若胃中

無食脾虛不運不思食者服之則勉伐脾胃之

氣故云然也

○丹溪加味二陳湯導痰補脾消食行氣

橘紅

茯苓 各七分

半夏 湯泡洗

甘草 各三分

川芎

蒼朮

白朮 各八分

山查肉 五錢

砂仁 五分

神麴 炒四分

香附子 一錢

麥蘗麴 炒五分

右件除神麴麥蘗麴細研炒另包餘細切作一

服如生薑三片大棗一枚水二盞煎至一盞調

服

神效麥藥入內服

○机傳經驗源散

凡傷食物致惡寒發熱久不愈或傷寒後食諸物致食復潮熱不已必詢問其先食何物所傷或糞糲或肉食則以原食之物燒存性一兩重細研為末別用生薑菜連根藥一握杵汁調服過一二時以東垣枳實導滯丸百餘粒催之其所傷之宿食即下熱退而愈

○參苓白朮散治脾胃虛弱飲食不進或嘔吐瀉利

醫學正傳

卷之二

四十三

其大病後補助脾胃此藥極妙

人參

白朮

白茯苓

乾山藥

白扁豆

云壳姜汁浸炒

甘草

桔梗

薏苡仁

連肉

已上各一兩

家傳治禁口痢用石連肉又加石菖蒲一兩有

氣加木香半兩

右為細末每服二錢棗湯調下禁口痢用粳米

湯休息痢用砂糖湯調下別方有

杜門付氏婦予族姪女也年三十歲因勞倦傷食

致腹痛腹脹面黃十數日後求予治診得右手

氣口脉洪盛而滑右關脉浮診虛大而滑重按

則沉實左寸關亦弦滑而無力兩尺皆虛而伏

予曰此中氣不足脾氣弱而不磨當補瀉兼施

而治初與補中益氣湯二服次日又與枳實導滯

丸八十九大便秘去二次次日又與補中益氣湯

如此補一日瀉一日二十日服補藥十數貼導

滯丸千數九腹脹漸退而安

醫學正傳

卷之二

四十四

東陽盧廉夫善

年四十五時正月間因往求康路途跋涉勞倦

發熱身體畧痛而頭不痛自以為外感而用九

味羌活湯三貼汗出熱不退前後又服小柴胡

湯五六貼熱愈甚經八日召予診視至卧榻前

見煎湯飲一盞在案問之乃大承氣湯將欲

飲診其脉右三部浮洪畧弦而無力左三部畧

小而亦浮軟不足予曰汝幾自殺矣此內傷虛

證服此藥大下必死伊曰我平生元氣頗實素

無虛損證明是外感無疑也予曰將欲作陽明
內實治而下之歟脉既不沉實而又無目赤鼻
乾潮熱譫語非證將欲作太陽表實治而汗之
歟脉雖浮洪而且虛又無頭痛脊強并證今經
八月不應仍在其表汝欲作何經而處治之乎
伊則唯唯不語以補中益氣湯加附子三分作
大劑與之是夜連進二服天明往診脉畧平和
伊言尚未服仍謂前藥無効欲易外感退熱之
藥予曰再飲前藥二服不効當罪我又如前二
服脉證俱減半伊始曰我幾誤矣去附子再煎
二服與之得熱退氣和而愈予則告回其熱雖
退體猶困倦伊如前自各二十餘貼服後方得
強健復元而安

上湖呂氏子年三十餘九月間因勞倦發熱醫作
外感治用小柴胡黃連解毒白虎并湯反加痰
氣上壅狂言不識人目赤上視身熱如火中醫
技劣八日後召予診視六脉數疾七八至又三
部謬大無力左畧弦而扎予曰此病先因中氣

醫學正傳

卷之二

四

下

不足又內傷寒涼之物致內傷發熱因與苦寒
藥太多為陰盛隔陽之證幸元氣稍充未死耳
以補中益氣湯制附子二錢乾姜一錢又加大
棗生姜煎服衆醫笑曰此促其死也黃昏時服
一劑痰氣遂平而熟寐伊父報曰自病不寐今
安卧鼾聲如平時至半夜方省始識人而諸病
皆減又如前再與一劑至天明時得微汗氣和
而愈

中署六

論

醫學正傳

卷之二

四

花

內經曰因於暑汗煩則喘喝靜則多言潔又曰靜
而得之為中暑動而得之為中熱中署者陰證中
熱者陽證又曰暑熱之時無病之人或避暑於深
堂大厦得之者名曰中署其病必頭痛惡寒身形
拘急肢節疼痛而煩心肌膚大熱出汗為房室之
陰寒所遏使周身之陽氣不得伸越大噴散并熱
藥主之若行人或農夫於日中勞役得之名曰中
熱其病必苦頭痛發躁熱惡熱捫之肌膚大熱必

大渴引飲汗大泄無氣以動乃為大熱外傷肺氣
蒼朮白虎等涼劑主之王安道曰暑熱之氣一也
皆夏月中傷其邪而為病焉豈以一暑熱分為陰
陽二證而名之即其避暑於深堂大廈及恣食藏
冰瓜果寒涼之物正經所謂口得寒物身犯寒氣
之病耳自當同秋冬即病陰證傷寒處治不可名
中暑也此論固是抑亦有未悉之旨也與愚按仲
景傷寒論中一證曰中暍即中暑也虛而微弱煩
渴引飲體熱自汗此蓋得勞後體虛而暑邪干衛
之候是宜東垣清暑益氣湯等補益之劑治之而
愈一證曰熱病即中熱也脉洪而緊盛頭疼身熱
口燥心煩此蓋得之於冬感寒邪鬱積至夏而發
乃挾暑而成大熱之候是宜黃連白虎解毒等湯
清涼之劑調之而愈曰仲暑者陰證內傷之為病
也曰中熱者陽證外感之為病也曰陰曰陽豈不
茲斯而明辨之乎學者宜再思之

脉法

經曰脉虛身熱得之傷暑

脉弦細芤遲許李上云傷暑其脉弦細芤遲何也

傷形則氣消而脉虛所謂弦細芤遲皆虛脉也

仲景以弦為陰未眩亦曰中暑脉虛細弱暑脉

脉虛而微弱或浮大而散或隱不見微弱隱伏虛

方法丹溪方注凡二條

丹溪曰夏月陽氣盡出於地人之腹屬地氣陽氣

於此時浮於肌表腹中之陰虛矣夏月伏陰在內

此陰字有虛之義若作陰冷看誤矣古人治暑有

用大順散等劑蓋以涼亭水閣寒凉水雪之傷不

用溫劑病何由安非為伏陰而用也火令之時流

金鑰石何陰冷之有孫真人製生脉散令人夏月

服之非虛而何

暑證用黃連香薷飲清暑益氣湯五苓散等藥有

挾痰者加南星半夏之類挾虛者加人參黃芪之

類

戴氏曰暑有胃有傷有中三者輕重之分或腹痛水

瀉者胃與大腸受之惡心者胃口有痰飲二者胃

暑也可用黃連香薷飲黃連退熱香薷消暑氣或

身熱頭疼躁亂不寧者或身如針刺者此為熱傷在肉分也當以解毒白虎等湯加柴胡氣虛加人參或咳嗽發寒熱盜汗出不止脉微者熱在肺經火乘金也此為中暑宜用清肺湯柴胡天水散之類急治則可

○清暑益氣湯治長夏濕熱大勝人感之多四肢困倦精神短少懶於動作胃滿氣促肢節煩疼或氣高而短身熱而煩心下痞滿小便黃而數大便澀而頻或泄瀉如糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗體重或汗少者血先病而氣未病也其脉中得洪緩若濕熱相搏必加以遲遲病雖互換少差其脉暑濕今則一也宜以清燥之劑治之

醫學正傳卷之九

黃芪汗少一錢 蒼朮一錢 升麻一錢

人參 白朮 陳皮

神麴炒 澤瀉各五分 甘草炙

黃柏酒浸炒 川歸 青皮

麥門冬去心 乾葛各三分 五味子九粒

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○白虎湯治暑熱發渴

○益元散一名天散治中暑身熱煩渴小便不利

此藥能燥濕分利水道實大腑化熱毒行積滯

逐凝血補脾胃降火之要藥也方見痢門

○香薷飲治一切暑熱腹痛霍亂吐利煩心等證

香薷三錢 厚朴姜製 白扁豆炒各一錢半

右細切作一服水二盞煎七分去粗溫服

○黃連香薷飲治證同前以前方去扁豆加黃連七分半也

醫學正傳卷之九

○十味香薷飲

香薷一錢 人參 陳皮

白朮 白茯苓炒

黃芪 木瓜 厚朴各七分薑汁製炒

甘草炙二分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○桂苓甘露飲

桂心 人參 黃芪

茯苓 白朮 甘草

葛根

澤瀉

石膏

寒水石 各一兩 滑石 二兩 火煨 木香 一錢

右為細末每服三錢白湯調下

○五苓散 方見傷寒門 本方加茵陳名茵陳五苓散

治濕熱發熱黃證最捷

○大順散

甘草

乾姜

杏仁 湯煮去皮

肉桂 各等分

右先將甘草用白砂同炒次入姜却下杏仁炒

醫學正傳卷之一 五十一 過篩去砂同桂研為細末每服二錢白湯調下

王安道曰大順散本為胃暑伏熱引飲過多脾

胃受濕嘔吐水穀不分臍腹不調所立故其草

乾姜皆經火炒又肉桂而非桂枝蓋溫中藥也

內有杏仁不過取其能下氣耳若以此藥治靜

而得之之證吾恐不能解表及增內煩矣

愚按內經必先歲氣無伐天和其暑月豈可用

此熱藥此方雖錄于此不可輕用

○生脉散

人參

五味子

麥門冬 各等分 泡去心

右細切水煎夏月時時代熱水飲之孫真人曰
夏月必服五味子以補五臟氣東垣曰夏月服
生脉散加黃芪其草令人氣力湧出

○祖傳經驗秘方

凡人夏月衝斥道途或於田野中務農作勞或

肥白氣虛之人不能抵當暑熱忽然昏悶運仆

其氣將絕如在日中即當移病者於陰處徐徐

以溫湯水灌之如未甦急灸氣海穴以復其元

氣醒後以大劑滋補之藥補之切不可灌以涼

水即死

愚按內經有曰陽氣者煩勞則張精絕辟積於

夏使人煎厥目盲不可以視耳閉不可以聽憤

憤乎若壞都汨汨乎不可止是則中暑運厥之

候也

濕證七

論

內經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰濕勝則濡泄地

之濕氣感則害人皮肉筋脉原病式曰諸濕腫滿

積飲痞膈中滿霍亂吐下體重跗腫肉如泥按之不起皆屬於濕夫濕之為病所感不同有從外感而得之者有從內傷而得之者若居處卑濕之地與夫道途衝斥風雨或動作辛苦人汗沾衣皆濕從外感者也或恣飲酒漿醱酪多食柑橘瓜果之類皆濕從內傷者也大抵宜發汗及利小便使上下分消其濕是其治也經又曰因如濕首如裹濕熱不攘大筋繆短小筋弛長繆短為拘弛長為痿因於氣為腫四維相代陽氣乃竭丹溪釋曰濕者

醫學正傳

卷之二

五十二

火

脈法

脈經曰濕家為病一身盡疼發熱而身已似濕黃也

脈浮而緩濕在表也脈沉而緩濕在裏也或弦而緩或緩而浮皆風濕相搏也

方法

丹溪曰六氣之中濕熱為病十居八九

濕在上宜微汗而解經曰濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗為効而止也不欲汗多故不用麻黃乾葛等劑

醫學正傳

卷之二

五十四

濕在中下宜利小便此淡滲治濕也一云濕在下宜升提之

濕有自外而入者有自內得者陰雨濕地皆從外治宜汗散久則踈通滲泄之

蒼朮治濕上下部都可用一云上焦濕用蒼朮

其功甚烈

二陳湯加酒芩羌活蒼朮木通散風行濕最妙

金匱防己黃芪湯治風濕脈浮身重汗出惡風或

周身疼痛

防己 三錢 甘草 一錢半 白朮 二錢

黃芪 三錢半

右細切作一服加生薑三片大棗二枚水二大盞煎至一盞去粗溫服○喘者加麻黃○胃氣不和加芍藥○氣上衝加桂枝○下有寒加細辛○濕勝身重陽微中風則汗出惡風故用黃芪炙甘草以實表防己白朮以勝濕

○甘草附子湯治風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲

醫學正傳六卷之二 五十五

去衣或身微腫而痛者

甘草 炙二錢 附子 一錢半 白朮 二錢

桂枝 四錢

右細切作一服水煎金匱方桂枝加生薑大棗名白朮附子湯

○加味五苓散治濕勝身痛小便不利軀重發渴者本方中加羌活一倍是也

○防風羌活湯治風濕相搏一身盡痛

羌活 七分 防風 升麻

柴胡 各五分 藁本 蒼朮 各一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○羌活勝濕湯治肩背痛不可回顧此手太陽氣鬱而不行以風藥散之脊痛項強腰似折項似拔此足太陽經不通行此藥主之

羌活 獨活 各一錢 藁本

防風 甘草 炙 川芎 各五分

蔓荊子 三分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服食

醫學正傳六卷之二 五十六

前○如身重腰痛沉沉然經中有寒濕也加酒

洗漢防己五分輕者附子五分重者川烏五分

○茯苓滲濕湯治濕鬱成黃疸寒熱嘔吐而渴身體

面目俱黃小便不利不思飲食莫能安卧

黃芩 黃連 梔子

防己 白朮 蒼朮

陳皮 青皮 枳實 各四分

赤茯苓 澤瀉 各五分 茵陳 六分

猪苓 去黑皮 一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○茵陳五苓散治濕熱大勝黃疸發熱五苓散內加茵陳一倍即是也

○經驗白朮酒治中濕遍身疼痛不能轉側及皮肉痛難着席白朮一兩

右細切作一服無灰老酒一盞半煎至一盞去粗溫服

丹溪活套云濕本為土氣火熱則能生濕土故夏

熱則萬物濕潤秋涼則萬物乾燥夫熱而怫鬱

醫學正傳卷之十一 五十七

則生濕也因濕生痰故用二陳湯加酒苓活

防風去風行濕蓋風藥能勝濕也大抵治濕宜

利小便為上策故曰治濕不利小便非其治也

○如一身盡痛或無汗是濕流關節邪氣在表

宜五苓散加羌活蒼朮以微汗之不可太汗恐

汗去而虛濕仍在也若自汗多者宜白朮甘草

湯○若小便自利清白大便泄瀉身痛自汗此

為寒濕宜五苓散加生附蒼朮木瓜○如風濕

身痛微腫惡風宜杏仁湯官桂五錢天門冬芍

藥麻黃各二錢半杏仁七箇水三盞姜十片煎

分二服○又治濕消腫脹利小便健脾胃葶藶

木香散葶藶子茯苓猪苓白朮各一兩木香澤

瀉水通甘草桂枝各半兩滑石三兩為末湯調

服○然已上諸方乃畧示其端倪耳全在活法

加減而用之不可執一論也夫治濕者固當以

參朮為君以補脾為主治然亦有濕盛氣滿膨

脹者又當以利水行氣為先補脾藥又未可遽

用我以參朮為君而利水藥為臣使或以水通

醫學正傳卷之十一 五十八

澤瀉葶藶車前子等利水藥為君而以茯苓白

朮人參等補脾藥為臣使有本而標之者亦有

標而本之者看緩急而施治則萬舉萬全之功

可立而待也

燥證八

論

內經曰諸澁枯涸乾勁皴揭皆屬於燥原病式曰

經云風熱火同陽也寒燥濕同陰也又燥濕少異

也然燥金雖為秋陰而異乎寒濕而反同其風熱

也故火熱勝則金衰而風生緣風能勝濕熱能耗液而反寒陽實陰虛則風熱勝於水濕而為燥也凡人風病多因熱甚而風燥者為其熱化以熱為其主也蓋肝主於筋而風氣自甚又燥熱加之則筋大燥也燥金主於收斂其脉緊澁故為病勁強緊急而口噤也或病燥熱太甚而脾胃乾涸成消渴者或風熱燥甚怫鬱在表而裏氣平者或善伸數欠筋脉拘急或時惡寒筋惕而搐又或風熱燥併而鬱甚於裏故煩滿而或秘結也及風癰之發作者由熱甚而風燥為其熱化涎溢膏膈燥燥而痰癰昏冒僵仆也凡此諸證皆由熱甚而生風燥病各有異者由風熱燥各微甚不等故也所謂中風筋緩者因其風熱勝濕而為燥之甚也然筋緩不收而痿痺故諸損鬱病痿皆屬於肺金乃燥之化也如秋深燥甚則草木萎落而不收病之象也是以掌得血而能持足得血而能步夫燥之為病者血液衰少不能榮養百骸故若是也學者不可不知

醫學正傳卷之九 五十九

脉法

脉緊而澁 或浮而弦 或扎而虛

方法

丹溪曰皮膚皴揭折裂血出大痛或肌膚燥痒皆

火燥肺金燥之甚也宜以四物湯去川芎加麥

門冬人參天花粉黃柏五味之類治之

○瓊脂膏治血虛皮膚枯燥及消渴等證

生地黃二十斤洗淨細搗 鹿角膠 一斤

白沙蜜二斤煎去渣 真酥油 一斤

生薑二兩搗取真汁

右先以文武火熬地黃汁數沸以絹濾取淨汁

又煎二十沸下鹿角膠次下酥油及蜜同煎良

久候稠如餠以磁器收貯每服一二匙空心溫

酒調下

○瓊玉膏治證同前及肺熱咳嗽甚者方見咳嗽門

○天門冬膏治血虛肺燥皮膚拆裂及肺痿咳膿血

證

天門冬新搗者不拘多少

右一味淨洗去皮心細搗絞取汁澄清以布濾去粗滓用銀鍋或沙鍋慢火熬成膏每用一二匙空心溫酒調服

○地仙煎治諸燥證

山藥一斤 杏仁一斤 生牛乳二斤

右件將杏仁研細入牛乳山藥拌勻絞取汁用新磁瓶密封重湯煮一日每服一二匙空心溫酒或湯調下

○和血益氣湯治口燥舌乾便數舌上赤脉此藥生

津液除乾燥生肌肉方見消渴門

當歸潤燥湯治消渴大便秘澀乾燥結硬兼喜溫

飲陰頭退縮舌燥口乾眼澀難開等證方見消渴門

○生津甘露湯一名清涼飲治消中飢食而瘦口舌乾燥

自汗大便結燥小便頻數方見消渴門

○生津甘露飲子治消渴諸燥證方見消渴門

○辛潤緩肌湯諸燥肌渴及皮膚燥澀等證方見消渴門

○潤燥湯治大便秘結腸胃枯澀等證

○潤腸丸治大便秘結不通潤燥和血

○活血潤燥丸治大便風秘血秘常常燥結

○潤腸湯治人腸結燥不通方見上方並見大便結

○通幽湯治大便秘結燥治在幽門以辛潤之

予仲兄懷德慶士年四十五平生體瘦弱血少值庚子年歲金太過至秋深燥金用事久晴不雨得燥證皮膚挺裂手足枯燥搔之屑起血出痛楚一指甲厚反而莫能搔痒予製一方名生血潤膚飲服數十貼其病如脫後治十數人皆驗

○生血潤膚飲

川歸身酒洗 生地黃 熟地黃酒洗

黃芪各一錢 天門冬一錢半 麥門冬一錢

五味子九粒 片苓五分 括萎仁五分

菴仁泥五分 酒紅花一分 升麻二分

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服如大便

結燥加麻仁郁李仁各一錢

火熱丸

內經曰諸熱瞀瘳暴瘳胃味燥擾狂越罵詈驚駭
附腫疼瘵氣逆衝上禁慄如喪神守逮嘔瘡瘍喉
閉耳鳴耳聾嘔湧溢食不下目昧不明暴注癰痰
暴病暴死皆属于火丹溪曰太極動而生陽靜而
生陰陽動而變陰靜而合而生水火木金土各一
其性惟火有二曰君火人火也曰相火天火也火
內陰而外陽主乎動者也故凡動皆属火以名而
言形質相生配於五行故謂之君以位而言生於
虛無字位稟命因動而見故謂之相天主生物故
醫學正傳六卷之二
恒於動人有此生亦恒於動其所以恒於動者皆
相火之為也云又曰五者之性為物所感不能
不動謂之動者即內經五火也相火易起五性厥
陽之火相扇則妄動矣火起於妄變化莫測無時
不有煎熬其陰陰虛則病陰絕則死愚按心為君
火而又有相火寄於肝腎二藏即內經一水不能
勝二火也五性之火為物所感而動即內經一水
不能勝五火也夫五行之理天人所同知乎此則
造化陰陽洞明於膏臆之間又能灼知其火邪之

虛實或補或瀉用藥以平之則愈疾之功如刻之
中鵠矣學者其可忽諸

脉法

脉浮而洪數為虛火 脉沉而實大為實火

洪數見於左寸為心火見於右寸為肺火見於左

關為肝火右關為脾火兩尺為腎經命門之火

男子兩尺洪大者必遺精陰火盛也

方法丹溪方法凡
二十一條

丹溪曰陰虛火動者難治

醫學正傳六卷之二

實火可瀉黃連解毒之類○虛火可補參朮生

甘草之類謂之實者邪氣實也○鬱火可發

當看有何經○風寒外束者可發輕者可降

重則從其性而升之

凡火盛者不可驟用寒涼必須溫散

火急甚者必緩之生甘草黃連黃芩緩參朮亦可

人壯氣實火盛煩狂者可用正治硝黃米水之

類

人虛火盛狂者以生薑湯與之若投以米水之

類

正治立死

有補陰則火自降炒黃柏熟地黃之類

九氣有餘便是火氣從左邊發者肝火也氣從

臍下起者陰火也愚按氣有餘者非真氣也五志厥陽之火動而為相火也

飲酒人發熱者難治不飲酒人因酒發熱者亦

難治

輕手按之熱甚重手按之不甚此熱在肌表宜

清之地骨皮麥門冬竹茹之類

醫學正傳

卷之二

六十五

火

重手按之熱甚而烙手輕手按之不覺熱此病

在肌肉之內宜發之東垣升陽散火湯火鬱

湯之類

煩燥者氣隨火升也

木通下行瀉小腸火 人中白瀉肝火原紅岸也秋石亦是

黃芩黃連以猪膽汁拌炒能瀉肝膽之火

黃柏加細辛瀉膀胱之火

青代龍瀉五藏之鬱火

玄參能瀉無根之遊火

小便降火極速山梔子能降火從小便中泄去

其性能屈曲下行人所不知

人有氣如火從脚起入腹者此虛極也蓋火

起於九泉之下也此病十不救一治法以四

物湯加降火藥服之外以附子末津調貼脚

心湧泉穴以引火下行愚按此條言猶有未

之入有此固當作陰虛治若世實之人有此

則是濕鬱成熱之候也愚嘗見雨後行人衣濕

得此證以蒼木黃柏加牛膝防已等藥作丸

服之而愈後景醫教人皆驗若發作陰虛治

醫學正傳

卷之二

六十六

火

○左金丸一名回治肝火

黃連六兩 吳茱萸一兩湯泡浸半時許焙乾用

右為細末粥丸煎白朮陳皮湯下

○大補丸治陰火

黃柏去粗皮細切用新瓦盛鹽酒炒褐色

右為細末粥丸或水丸煎四氣湯送下又云氣

虛四君子湯血虛四物湯送下

抑青丸治肝火

黃連不拘多少 為細末粥丸白湯送下

○石膏丸瀉胃火併食積痰火

石膏煨為細末醋丸菴豈大清水飲送下

○四物湯加白馬脛骨降陰火代芩連用

○陰虛發熱四物湯加炒黃柏酒知母乃降火補陰

之妙劑甚者加龜板煎氣虛加參芪白朮

○手心熱屬執鬱當用火鬱湯或用梔子香附白芷

半夏川芎麴糊為丸服

○火鬱湯治四肢熱及五心煩熱因熱伏土中或血

虛得之或胃虛多食冷物抑遏陽氣於脾土之

中

醫學正傳卷之十一

羌活

升麻

葛根

芍藥

人參各七分

柴胡

甘草

生各三分

防風

葱白五莖

右細切作一服水一盞半煎至一盞稍熱服

○升陽散火湯治男子婦人四肢發困熱筋骨間熱

肌表熱如火燎捫之烙手此病多因血虛而得

之或胃虛過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中火

鬱則發之

升麻

葛根

獨活

羌活

白芍藥

人參各六分

炙甘草一分

柴胡三分

防風三分

生甘草二分

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一

盞熱服忌生冷物

○瀉陰火升陽湯治肌熱煩熱面赤食少喘咳痰盛

右關脉緩弱或弦或浮而數

羌活

甘草

黃芪

蒼朮各一分

升麻八分

柴胡一錢去芦

人參

黃芩各七分

黃連酒炒五分

石膏五分秋冬勿用

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

○滋腎丸降腎火

黃柏二兩火炒陰乾

知母二兩去毛酒浸陰乾肉桂一錢去粗皮

右二味氣味俱陰以同腎氣故能補腎而瀉下

焦火也桂與火邪同體故以寒因熱用凡諸病

在下焦皆不渴也右為細末以熟水丸百沸湯

下

○涼膈散

大黃

酒浸紙裹

朴硝

甘草

各半錢

連翹

一錢

枳子

黃芩

薄荷

各二分

淡竹葉

五片

右細切作一服水一盞煎至八分去粗入蜜一

匙和勻服

○三補丸瀉三焦火

黃芩

黃連

黃柏

各等分

醫學正傳

卷之二

六

六

六

六

右為細末新汲水丸服

○紫雪治內外煩熱不解口中生瘡顛狂吐衄解諸

熱毒邪熱小兒驚癇等證

黃芩

兩

寒水石

磁石

石膏

各二斤

滑石

研

已上用水一石煮至四斗去粗入下項藥

甘草

炙八兩

青木香

生犀角屑

羚羊角屑

沉香

各五兩

丁香

一兩

升麻

玄參

各一斤

已上再煮至一斗五升入下項藥

硝石

二斤

朴硝

十斤

已上入煎藥汁中微火煎柳枝不住手撓

候有七斤投放水盆中半日入下項藥撓

令勻

硃砂

三兩

當門子

即射香一兩二錢半

右煎成霜雪紫色每服一錢或二錢涼水調下

大人小兒臨時以意斟酌加減多寡服之並食

後服

醫學正傳

卷之二

六

六

六

六

○妙香丸治時疫傷寒解五毒潮熱積熱及小兒驚

癇等證

巴豆

取淨三百粒

牛黃

片腦

膩粉

各七錢

射香

五分

辰砂

九兩

金鉤

九十片

右研極細煉蠟六兩入蜜七錢半同煉令勻每

兩作三十九每服一九小兒葦葢大二九白湯

下○按葦方無金鉤有水銀硃砂治久遠成積

按硃砂不可輕用製煉不精則害人慎之

○渴心湯治心經蘊熱

右以黃連一味為細末水調服之

○千金麥門冬湯治諸病後大熱乘肺欬喘有血膏

脇脹滿上氣喘急羸瘦五心煩熱渴而煩悶

麥門冬去心 桑白皮蜜炒 生地黃各七分

半夏湯泡七次 紫苑茸 桔梗

淡竹葉 麻黃各五分 五味子

甘草各三分

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一

醫學正傳卷之十一 七十一

盞溫服

愚按此方曰病後火熱乘肺麻黃似可用乎曰

渴而煩悶半夏亦不用可也宜去此二味加貝

母天門冬方為穩當也

○梔子仁湯治發熱潮熱發狂煩躁面赤咽痛

梔子仁 赤芍藥 大青

知母各五分 升麻 黃芩

石膏各一錢 杏仁煮去皮尖 柴胡一錢二分

生甘草一錢 豆豉五十粒

右細切作一服水二盞煎八分去粗溫服

○當歸龍薈丸治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸

惕搖搦神昏不寧榮衛壅滯頭目昏眩肌肉

瘰癧咽嗑不利腸胃燥澀躁擾狂越罵詈驚

駭火熱等證

當歸 草龍膽 梔子仁

黃連 黃柏 黃芩各一兩

大黃 青代 蘆薈各半兩

木香一錢 射香五分

醫學正傳卷之十一 七十二

右為細末煉蜜丸如小豆大每服三十九姜湯

送下

○三黃丸治三焦火盛消渴不生肌肉

大黃 黃連 黃芩各半分

右為細末煉蜜丸如小豆大每服五丸漸加至

十丸白湯送下服至一月行及奔馬

丹溪活套云凡去上焦濕熱須酒洗黃芩以瀉肺

火如肺有實熱宜用如虛熱而用黃芩則傷肺

氣須先用天門冬保定肺氣然後用之○如去

中焦濕熱與痛須用黃連以瀉心火若中焦有實熱宜用若脾胃氣虛不得轉運及中焦有鬱熱者當用茯苓白朮黃芩為根代之○如膏中煩熱須用梔子實熱者切當若虛煩須用補藥為主人參白朮黃芩芍藥茯苓麥門冬大棗之類下焦有濕熱腫痛併膀胱有火邪者須用酒洗防已草龍膽黃柏知母之類固是捷藥若肥白人氣虛者宜用白朮蒼朮南星滑石茯苓之類○如黑瘦之人下焦有濕熱腫痛者必用當歸紅花菝葜仁牛膝檳榔等藥○柴胡瀉肝火須用片苓佐之片苓又能瀉肺火須用桑白皮佐之若鼠尾者能瀉大腸之火○黃連瀉心火若用猪膽汁拌炒更以草龍胆佐之大能瀉膽中之火○白芍藥瀉脾火若冬月用必以酒浸炒蓋其性之酸寒也○知母黃柏瀉腎火又瀉膀胱之火○梔子瀉三焦之火在上中二焦連殼用在下焦須去殼水洗去青漿炒焦色研細用之人中白非獨瀉肝火又能瀉三焦火及膀胱之火從小便中出蓋膀胱乃三焦物之故道也○祖傳經驗秘方人中白散治陰虛火盛其五心煩熱等證

人中白 二兩
黃柏鹽酒拌炒褐色 生甘草

青代 各五錢

右為細末每服二錢童子小便調服

駱氏婦年四十餘夜間發熱早晨退五心煩熱無

休止時半年後求予治六脉皆數伏而且牢浮

取全不應予與東垣升陽散火湯四貼而熱戒

太半宵中覺清快勝前再與二貼熱悉退後以

四物湯加知母黃柏少佐以炒乾姜服二十餘

貼全安

鬱證十

論

內經曰木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之水鬱拊之張子和曰木鬱達之謂吐之令其條達也火鬱發之謂汗之令其疎散也土鬱達之謂下之令無壅礙也金鬱泄之謂瀉泄解表利小便也

水鬱拆之謂抑之制其衝逆也此治五鬱之大要耳我丹溪先生觸類而長之而又著為六鬱之證

蓋謂氣血冲和百病不生一有拂鬱諸病生焉此發前人之所未發者也夫所謂六鬱者氣濕熱痰血食六者是也或七情之抑遏或寒熱之交侵故為九氣拂鬱之候或雨濕之侵凌或酒漿之積聚故為留飲濕鬱之疾又如熱鬱而成痰痰鬱而成癖血鬱而成癥食鬱而成痞滿此必然之理也又氣鬱而濕滯濕滯而成熟熱熱鬱而成痰痰滯而血不行血滯而食不消化此六者皆相因而為病者也是以治法皆當以順氣為先消積次之故藥中多因香附撫芎之類至理有焉學者宜知此意

脉法

脉多沉伏 氣鬱則必沉而瀦濕鬱則脉必沉而緩熱鬱脉必沉數痰鬱脉必弦滑血鬱脉必芤而結促食鬱脉必滑而緊盛鬱在上則見於寸鬱在中則見於關鬱在下則見於尺左右亦然脉或結或促或代

滑氏診家樞要曰氣血食積痰飲一有留滯於其間脉必因之而止結矣但當求其有神何害之有夫所謂有神者即經所謂有中氣也

方法

丹溪曰氣血冲和百病不生一有拂鬱諸病生焉其證有六曰氣鬱曰濕鬱曰熱鬱曰痰鬱曰血鬱曰食鬱

氣鬱戴氏曰胃膈痛脉沉香附此味而能橫行胸臆間必用童便浸焙乾用否則藥

蒼朮米泔浸五七日

濕鬱戴氏曰周身走痛或關節病遇陰寒則發脉沉撫芎即紫蘇葉氣脉上行故能散鬱也

蒼朮 白芷 川芎 茯苓

熱鬱戴氏曰赤脉沉散梔子 青代 香附

蒼朮 撫芎

痰鬱戴氏曰脉動則喘海石 香附 南星

瓜蒌子

血鬱戴氏曰四肢無桃仁 紅花 青代

川芎 香附

食齋

蘇氏曰嘔腹悶不能食
五寸脈平和五寸脈緊盛

香附 蒼朮 山楂 神麴

針砂 或保和丸

諸齋藥春加防風夏加苦參秋冬加其茱萸

凡藥在中焦以蒼朮撫芳間提其氣以升之假令

食在氣上氣升則食降餘倣此

○越麴丸

越音艾細切也
一名苦木丸 能解諸齋

神麴

炒 香附 童便浸 蒼朮

川芎

枳子 炒

醫學正傳

卷之十一

七十七

右為細末水丸薑豈大每服五七十丸溫水下

○生韭飲治食齋久則胃脘有瘀血作痛大能開提

氣血

生韭葉

一握搗取自然汁一盞

右先以生桃仁連皮細嚼十數箇後以韭汁送

下

○六齋湯解諸齋

陳皮 去白

半夏 湯泡

蒼朮 米泔浸

撫芳

各一錢

赤茯苓

枳子 炒各七分

香附 三錢

北草 炙半錢

砂仁 研細五分

右細切作一服加生薑三片水二盞煎至一盞

溫服○如氣齋加烏藥木香枳榔紫蘇乾姜倍

香附砂仁○如濕齋加白朮倍蒼朮○如熱齋

加黃連倍枳子○如痰齋加南星枳殼小皂莢

○如血齋加桃仁紅花牡丹皮○如食齋加山

查神麴麥蘖麴

○升發二陳湯治痰齋火邪在下焦大小便不利以

藥能便大便潤而小便長

醫學正傳

卷之十一

七十八

陳皮 去白

半夏 一錢半

茯苓 一錢

甘草 半錢

撫芳 一錢

升麻

防風

柴胡 各半錢

右細切作一服加生薑三片水一盞半煎至一

盞溫服

○升陽散火湯治熱齋

○火齋湯一方並見火門

一男子年二十九歲三月間房事後騎馬渡溪

遇深淵沉沒幸得馬便無恙然行一二

抵家次日憎寒壯熱肢節煩疼似瘧非瘧之狀
一醫作虛證治而用補氣血藥服月餘不効又
易一醫作勞瘵治用四物湯加知柏地骨皮之
類及丹溪大補陰丸倍加紫河車服至九月反
加滿悶不食乃顧倩有乳婦人在家止吃人乳
汁四五杯不吃米粒召予診視六脉皆洪緩重
按若牢右手為甚予作濕鬱廢治用平胃散倍
蒼朮加半夏茯苓白朮川芎香附木通砂仁防
風羌活加姜煎服黃昏服一貼一更時又進一
貼至半夜通身發紅丹如癰疹片時遂沒而大
汗索粥與稀粥二碗由是諸病皆減能食勉前
方服三貼後以茯苓滲濕湯倍加白朮服二十
餘貼平安

痰飲十一

論

內經曰諸氣臍鬱皆屬肺金蓋肺氣鬱則成熟熱
盛則生痰丹溪曰自鬱成積自積成痰痰挾瘀血
遂成窠囊此為痞為痛為噎膈翻胃之次第也王

醫學正傳六

卷之二

七十九

東

隱君曰痰證古今未詳方書雖有懸飲留飲支飲
痰飲諸飲之異而莫知其為病之源或頭風目昏
眩運耳鳴或口眼蠕動眉稜耳輪癢痒或四肢遊
風腫硬似痛非痛或為齒頰痒痛牙床浮腫而痛
痒不一或噎氣吞酸嘈雜嘔噦或咽噎不利咯之
不出嚥之不下色似煤始形如破絮桃膠蜆肉之
類或心下如停冰雪心頭冷痛時作或夢寐奇怖
鬼魅之狀或足腕痠軟腰背卒痛或四時骨節煩
疼並無常所乃至手麻臂痛狀若挫閃或脊中每
有一點如冰凍之寒痛者或渾身習習如虫行者
或眼沿流痒口糜舌爛甚為喉閉等證又或遠項
結核似瘰非瘰或膏腹間如有二氣交紐噎塞煩
悶有如煙氣上衝頭面烘熱或為失志顛狂或為
中癰瘰或為勞瘵在莖之疾或為風痺及脚氣之
候或心下怔忡驚悸如畏人將捕或喘嗽嘔吐或
嘔冷涎綠水黑汁甚為肺癰腸毒便膿寧跋其為
內外疾病非止百端皆痰之所致也蓋津液既凝
為痰為飲而滄湧上焦故口燥咽乾流而下則

醫學正傳六

卷之二

八十一

東

大小便閉塞而如枯骨毛髮焦乾婦人則經閉不通小兒則驚癇搐搦治法宜先逐去敗痰然後看虛實調理故製沉香滾痰丸為通治三焦痰飲之要藥也愚竊以其論證固詳不問虛實而以一般藥攻之恐未中乎肯綮也與蓋資稟有厚薄病邪有淺深一或失手何以收效故丹溪有曰治痰用利藥過多致脾氣虛則痰反易生而多矣又曰中焦有食積與痰而生病者胃氣亦賴所養卒不可便攻攻盡則愈虛而病劇夫滾痰丸止可投之於形氣壯實痰積膠固為病者若氣体虛弱之人決不可輕用也慎之慎之

醫學正傳

卷之十

八十一

云

脉法

要畧云脉雙弦者寒飲也或太下微善虛

其脉偏弦者飲也○肺飲不弦但喘短氣

又云脉浮而細滑者傷飲○脉弦數有寒飲春夏

難治○脉沉而弦者懸飲內痛

其人短氣四肢歷節走痛脉沉者有留飲

陳無擇云飲脉皆弦微沉滑

或云左右手關前脉浮弦大而實者膈上有宿痰也宜吐之有愈

病人百藥不効關上脉伏而大者痰也眼胞及眼

下如炭煙薰黑者亦痰也

丹溪曰久得瀉脉痰飲膠固脉道阻澁也卒難得

開必費調理

方法丹溪方法九十六條

丹溪曰有熱痰有濕痰有酒痰有食積痰有風痰

有寒痰有老痰

醫學正傳

卷之十

八十二

計

○熱痰用青黛黃連及用青礞石丸最捷

○濕痰身多軟而重用蒼朮白朮又曰濕痰用黃芩

香附半夏貝母熱痰加瓜蒌青黛

○酒痰用瓜蒌青黛蜜餾化

○食積痰用神麴麥芽山查或化痰丸消積丸攻之

○風痰用南星 白附子

寒痰用半夏盧氏註曰凝結清冷其狀若寒非寒也然亦有用溫藥者蓋寒因熱用使

引導九

老痰用海石香附半夏瓜蒌五倍子一云五倍子引格也

佐他藥大治頑痰

○痰結核在咽喉嗽而不能出化痰藥加鹹能軟堅之味瓜蒌仁杏仁海石桔梗連翹少佐以朴硝姜汁蜜丸嚥化

○痰在脇下非白芥子不能達痰在四肢非竹瀝不行痰在腸胃間可下而愈痰之為物隨氣升降故無處不到

○脉浮當吐痰在膈上必用吐膠固稠濁必用吐痰在經絡中非吐不可吐中就有發散之義

醫學正傳

卷之二

八十三

大

○凡吐法宜先升提其氣用防風山梔川芎桔梗芽茶生薑之類或就此藥探吐吐時須先以布勒腰腹而於不通風處行之

○吐法用蘿蔔子半升搗和以漿水一碗去粗入少油與蜜溫服或用鰕半斤入醬葱薑茸物料水煮先吃鰕後飲汁少時以鵝翎探吐其鵝翎須先以桐油浸而以皂角水洗晒乾待用如服瓜蒂藜蘆等藥不用探法自吐

○凡虛弱人中焦有痰胃氣亦賴所養卒不可便攻

攻盡則愈虛治痰用利藥過多致脾氣虛則痰反易生而多

○許學士用蒼朮治痰挾瘀血成窠囊行痰極効神也

○油炒半夏大治濕痰又治喘心痛粥丸生薑湯下燥濕痰星下丸

南星 半夏 各一兩 海蛤粉 三兩

右為細末姜汁浸蒸餅為丸青黛為末如梧桐子大每服三五十丸姜湯送下

醫學正傳

卷之二

八十四

大

○中和丸治濕痰氣熱

蒼朮 黃芩 半夏

香附 各等分

右為細末姜汁調神麴糊為丸如梧桐子大每服五七十丸白湯送下

○小胃丹上可取胃膈之痰下可利腸胃之痰能開胃不食胃氣虛而少食者不可用

此遂 熟去麴 大戟 長流水煮一時許洗淨曬乾用

芫花 醋拌經宿炒黑勿焦 已上各一兩重

大黃酒拌熱紙裹煨熟倍乾 黃柏炒二兩

右為細末粥丸麻子大每服十九溫湯送下

○墜痰丸能利痰從穀道中出

風化硝 枳實炒 黑牽牛取頭末

生白礬三錢 猪茅皂角去皮弦酥炙黃三錢

一本有貝母三錢

右為細末蘿麻汁丸如梧桐子大每服五十九

白湯下

鷄鳴時服先見尿次見痰古方無硝枳而用

醫學正傳卷之十 火

○青礬石丸能化痰降痰一云治食積去濕痰

風化硝三錢 茯苓錢半

南星慢火煨裂 青礬石敲碎入鍋煨黃色

半夏湯泡七次 黃芩各五錢

右為細末神麴糊入姜汁為丸如梧桐子大每

服三五十九姜湯送下此藥重在風化硝○一

方加蒼朮五錢滑石一兩○一方無南星有白

朮○一方有枳實倍青礬石

○枳實瀉痰能衝墜倒壁黃芩治痰假其下火

花粉大能降上膈熱痰海粉熱痰能降濕痰

頑痰能消

○人中黃釵九如菴豈大每服十數丸白湯送下能

降陰火清痰又治食積

○痰因火盛逆上治火為先白朮黃芩石膏之類

○凡久病陰火上升津液生痰不生血宜補血制相

火其痰自除血藥必用姜汁傳送

○痰成塊吐咯不出氣鬱滯者難治

○脾虛者清中氣二陳湯加白朮之類兼用提藥

醫學正傳卷之二 倉

○實脾土燥脾濕是治其本

○二陳湯一身之痰都管治痰之要藥也欲下行加

引下藥上行加引上藥引上藥胡非麻防風之

類又曰二陳加升麻之藥能使大便潤而小長

陳皮去白 半夏湯泡七次 茯苓一錢

甘草半錢

右細切作一服加生薑三片水一盞煎至七分

溫服

○治風濕痰等證

半夏二錢湯 南星煨裂 橘紅去白

枳殼麩炒 甘草炙 茯苓各一錢

右細切作一服加生姜五片水一盞半煎至一盞溫服如久嗽肺燥熱者去半夏加五味子九

枚杏仁泥五分

○千縑湯治風痰壅盛

半夏湯泡七次 皂角一寸去 甘草炙一寸

右細切作一服入生姜三片水一盞煎至七分

溫服

醫學正傳卷之二 八十七
○利膈化痰丸

南星煨裂 蛤粉 半夏湯泡

貝母去心 瓜蒌仁去殼 香附去皮童便

皂角去皮弦 杏仁去皮 青黛炒

右以前六味研為細末却以皂角杵碎煎濃汁

搗杏仁如泥再以姜汁和蒸餅為丸如菴荳大

青黛為衣每服五十九姜湯送下

○痰痰丸治濕熱食積成窠囊老痰

大黃酒半蒸 黃芩去朽各 沉香五錢

礞石硝煨黃金

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服三五十

九量人強弱加減丸數

○神木丸治痰飲

蒼朮一斤米 生芝蔴五錢川水二小

大棗十五枚炙

右以蒼朮焙乾為末然後以芝蔴漿及棗肉和

勻丸如梧桐子大每服五七十丸溫湯下

○黃芩利膈丸除胸中熱利膈上痰

醫學正傳卷之二 八十八
黃芩各一兩 半夏湯泡七次

澤瀉去毛 黃連各五分 天南星煨裂

枳殼麩炒 陳皮去白各 白朮二錢

白礬五分

右為細末湯浸蒸餅入姜汁為丸如梧桐子大每

服三五十九食遠溫水下忌酒及濕麵

○蠲飲枳實丸逐飲消痰導滯清膈

枳實麩炒 半夏泡 陳皮去白

黑丑半取頭

右為麩糊為丸如梧桐子大每服五十九丸姜湯送下

○十棗湯治懸飲內痛

芫花醋炒黑色 甘遂麵包水煮熟 大戟各等分

右為細末以水一升半煮大棗十枚至八合去粗調藥末強人一錢弱人半錢平旦服之不下更加五分下後以糜粥調養之河間曰芫花之辛以散飲大戟之苦以泄水其甘遂直達水氣所結之處乃泄水之之聖藥也然亦有大毒人虛者不可輕用

醫學正傳卷之十一

十九

○三花神祐丸治一切濕熱沉積痰飲變生諸病或風濕燥鬱肢體麻痺走注疼痛風痰涎嘔氣血壅滯不得宣通等證人壯氣實者可服

甘遂依前製 大戟 芫花拌濕炒

黑丑頭末 大黃一兩 輕粉一錢

右為細末滴水為丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫水下日三服加至快利利後須服至省根盡除為度痞悶極甚者服多服則斷

不開轉加痛悶則當初服二丸每服加二丸至快利即止

○控涎丹治患膏背脇頸項及手足腰膝隱痛不忍筋舉引釣痛時時走易乃是痰涎在膏膈間隨氣升降於經絡中作楚而然或手足冷痺氣脉不通誤認為癱瘓者

甘遂去心依前製 大戟去皮 白芥子主上氣痰汗

右件各等分為細末糊丸如梧桐子大每服五十九丸淡姜湯下食後卧服量病人虛實加減丸數一方名妙應丸治驚痰加硃砂為衣痛甚者

醫學正傳卷之十一

十九

加全蝎酒痰加雄黃全蝎驚氣痰成塊者加穿山甲驚甲玄胡索蓬義術臂痛加木鱉子霜桂心熱痰加盆硝寒痰加丁香胡椒肉桂

○半夏丸治肺熱痰嗽

瓜蒌仁另研 半夏湯泡七次去皮

右為細末和勻姜汁打糊為丸服

○取竹瀝法 大治熱痰及能養血清熱有痰厥不省人事幾死者得竹瀝灌之遂甦誠

起死回生藥也

用水竹早筆竹

俗名帶竹蘇東坡曰淡竹苦竹為文耳除苦竹之外皆淡竹

我川溪先生存中只用此二竹蓋取其為諸竹中之最淡者其笋味之

截長二尺許每段劈作四片以薄磚二塊排定

將竹片架於磚上兩頭露一二寸下以烈火

之兩頭以盆盛瀝六分中加姜汁一分服之痰

熱甚者止可加半分耳

○取荆瀝法能治熱痰切勝作瀝但不神耳

卷之三

九十一

虎

○丹溪活套云二陳湯一身之痰無所不治但在上

加引上藥在下加引下藥如偏頭痛在右本方

加川芎白芷防風荆芥薄荷升麻之類在左太

方合四物湯亦加防風荆芥薄荷細辛蔓荊子

柴胡酒片苓之類頂痛者本方加川芎藁本升

麻柴胡蔓荊子細辛薄荷等藥如痰在腰膝膝

下腫痛本方加蒼朮防己木通黃柏草薢川牛

膝之類○如痰在膈腹中作痛或痞滿本方加

白朮神麴麥芽砂仁之類○如痰在脇下作痛

或減瀝有聲本方加柴胡青皮川芎芍藥之類

○如痰在經絡中或膏肓手足臂膊作痛者在

上加防風羌活歲靈仙在下加防己牛膝木通

之類冬月加烏附行經○如風痰壅盛喘急咳

嗽不寧本方加防風羌活商星枳殼皂角之類

○如熱痰為病腹脹喘滿本方加黃芩黃連梔

子瓜蒌子滑石石膏竹瀝之類○如濕痰身重

倦怠本方加蒼朮白朮南星之類○如酒痰本

方加葛根枳仁神麴麥芽之類○寒痰本方加

醫學正傳六

卷之三

九十二

水

乾姜附子益智草菖蒲之類○氣痰本方加木

香枳榔砂仁枳殼烏藥香附之類○燥痰本方

加瓜蒌仁杏仁貝母五味之類○陰虛咯血痰

嗽本方加天門冬麥門冬知母黃柏貝母款冬

花紫苑馬兜鈴之類○如痰在中焦作噯氣吞

酸胃脘當心而痛或嘔清水惡心等證本方多

加白朮蒼朮神麴麥芽川芎砂仁草薢枳實

猪苓澤瀉黃連真茱萸梔子仁木香枳榔之類

作丸服之

○子姪婦何氏在室時四月間因多食青梅得痰飲
病日間膏膈中大痛如刀錐至晚宵中痛止而
腰跨大痛蓋痰飲隨氣升降故也一醫作胃寒
治用乾姜良姜官桂烏附子沉輩及煮糊椒粥
間與病日劇加之口渴小水淋瀝求予治診其
六脉洪數而滑予作清痰處治令其急烹竹瀝
服三日口不渴小水亦不淋瀝但宵中與膝互
痛如舊用蘿蔔子汁研與半碗吐痰半升許晝
夜痛尤甚而頻數丹溪所謂引動其猖狂之勢
耳次日用人參蘆二兩逆流水煎服不吐又次
日與苦參煎湯服又不吐又與附子大桔梗蘆
皆不吐一日清晨蘆末一錢入射香少許酸
漿水調與始得大吐至次日天明止方定前後
得頑痰及稠飲一小桶許其痛如脫後以軟粥
將理而安

咳嗽十二

論
內經曰五藏六腑皆令人嗽非獨肺也皮毛者肺

之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也五藏之
嗽延久乃移於六腑問曰嗽謂無痰而有聲肺氣
傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而生痰也
咳嗽謂有痰而有聲蓋因傷於肺氣動於脾濕欬
而為嗽也脾濕者秋傷於溫積於脾也故內經又
曰秋傷於溫冬必欬嗽大抵素秋之氣宜清肅反
動之氣必上衝而為欬其則動於脾溫發而為痰
焉又曰寒暑燥濕風火六氣皆令人欬惟濕病痰
飲入胃留之而不行止入於肺則為咳嗽假令濕
在心經謂之熱痰濕在肝經謂之風痰濕在肺經
謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰為患不同宜隨證
而治之是故欬而無痰者以辛甘潤其肺夫欲治
欬嗽者當以治痰為先治痰者必以順氣為主是
以南星半夏勝其痰而咳嗽自愈枳殼橘紅利其
氣而痰飲自降痰盛而能食者小承氣湯微下之
痰盛而不能食者厚朴湯疎導之夏月嗽而發熱
者謂之熱嗽小柴胡加石膏知母冬月嗽而發寒
熱謂之寒嗽小青龍湯加杏仁此治法之大要也

學者不可不知

脉法

關上脉微為欬 肺脉微急為欬而唾血

脉弦潘而欬為少血 脉緊者為肺寒

雙弦者寒 脉浮而緊者為虛寒

脉浮而緩者傷風脉細者濕 脉數為熱

脉沉數為實熱 脉弦為水 偏弦為飲

脉沉為留飲 洪滑多痰 濕脉浮直者生

脉浮濡者生 脉緊者死 沉小伏匿者死

醫學正傳

卷之一

九十五

欬而癰瘦脉堅大者死

欬而脫形發熱脉小緊急者死

凡肌瘦脫形熱不去欬嘔腹脹且泄脉弦急者皆

死證也

方法

丹溪方法

丹溪曰欬嗽有風寒有火有勞有痰有肺脹

○風寒者舉發散行痰二陳湯加麻黃杏仁桔梗

之類戴氏曰風寒者鼻聲重惡寒是也

○風寒鬱熱於肺夜嗽者三拗湯加知母脉大而

浮有熱加黃芩生姜

○寒嗽古方有以生姜切作薄片焙乾為末糯米

糊為丸如芥子大空心清米飲下三十九

○聲啞為寒寒包熱也此言宜細辛半夏生薑辛

以散之

○風入肺久嗽者用鵝管石椎黃蔚金欬冬花為

末以生薑一片置舌上以藥末拌艾於姜上

炙之取烟入喉中愈

一方有南星佛耳草無蔚金此即烟筒

醫學正傳

卷之一

九十六

○治嗽煙筒用鵝管石椎黃欬花佛耳草為末以

鷄子清刷帛上捲藥末作筒燒煙以口啣吸

煙入喉姜湯送下

○喘嗽遇冬則發以寒包熱也解表熱自除

枳殼

桔梗各一錢

麻黃

防風

甘草

陳皮

紫蘇

木通

黃芩各半分

如嚴寒去黃芩加杏仁半錢

○感冷則嗽隔上有痰二陳湯加炒殼黃芩桔梗

蒼朮麻黃水通生姜

○火者主降火清金化痰黃芩海石瓜蒌青代桔梗半夏香附訶子青皮之類戴氏曰有青痰少面赤是也

蜜丸噙化

○乾咳嗽者係火鬱之甚難治乃痰鬱火邪在肺中用桔梗以開之下用補陰降火不已則成勞瀕行倒倉法此證不得志者有之

○有痰因火逆上者必先治火然亦看痰火孰急若痰急先治痰而後降火也

○勞者主補陰清金四物湯加竹瀝姜汁戴氏曰盜汗出無痰多作寒熱是也

○陰虛火動而嗽四物合二陳順而下之加妙黃柏知母

○陰虛嗽嗽或吐紅者四物湯加知母黃柏五味子人參麥門冬桑白皮地骨皮

○好色之人元氣虛弱咳嗽不愈瓊玉膏最捷

○肺虛甚者人參膏以生姜陳皮佐之有痰加痰

藥此好色賢虛者有之

○久嗽勞嗽用貝母知母各一兩以巴菀同炒青

色去巴菀再用白礬白芨各一兩為末以生

姜一片蘸藥時噙化藥盡嚼姜嚥之麥門

冬陳皮阿膠珠各等分蜜丸噙化又方有人

參五味子

○咳嗽聲嘶者乃血虛受熱用青黛蛤粉蜜調服之

○醫說內一方治痰嗽用蚌粉新瓦上炒通紅拌

入青黛以淡菹水滴入麻油數點調服

○痰者主豁痰戴氏曰動便有痰聲痰出嗽止是也

○痰嗽用半夏瓜蒌子各五兩貝母桔梗各二兩知母一兩枳殼一兩半為細末生薑汁浸蒸餅為

丸服

○一方黃芩一兩半酒洗白芥子去殼滑石各五錢

貝母南星各一兩風化硝二錢半姜汁浸蒸餅

為丸青黛為衣

○痰多喘嗽白朮半夏蒼朮香附杏仁各一兩黃芩

五錢為末姜汁調麩糊為丸服

○痰因酒傷肺瓜蒌杏仁如前法連為末以生

入紫蘇葉煎甬入薑汁調丸服○一方用青黛

瓜蒌蜜丸噙化以救肺

○久嗽有積痰留肺皖中如膠氣不能升降或挾濕

與酒而作諸根俗名過山龍便浸疆蚕炒海粉瓜蒌仁

蜂房杏仁神麴為末姜汁竹瀝調噙化

○痰嗽氣急蒼朮三兩香附一兩半蘿蔔子蒸杏仁

瓜蒌仁半夏各一兩黃芩茯苓各五錢川芎三

錢丸服

○嗽而有痰宜灸天突穴肺腧穴以泄火熱瀉肺氣

醫學正傳不卷之三 九十九

○食積痰嗽發熱半夏南星為君瓜蒌羅麻子為臣

青黛海石石礮為使姜汁浸蒸餅丸服

○食積痰嗽三補加二母炒為末丸如椒核大以竹

瀝藕汁吞之三補母知母也

○肺脹者主收飲戴氏曰動則喘滿

○肺因火傷極遂成鬱過脹滿用訶子為君佐以海

粉香附青黛杏仁之類

○肺脹抑遏不得眠者難治

○凡嗽春是春升之氣夏是火痰於上秋是濕熱傷

肺冬是風寒外束用藥發散之後必以半夏等藥逐去其痰庶不再作

○早晨嗽多者此胃中有食積至此時火氣流入肺

中以知母地骨皮降肺火上半日嗽多者胃中

有火知母石膏降之午後嗽多者屬陰虛四物

湯加知母黃柏先降其火黃昏嗽多者火氣浮

於肺不宜用涼劑以五味子五倍獻而降之

○嗽而脇痛宜以青皮疎肝氣後以二陳湯加南星

香附青黛姜汁○一云實者白芥子之類

醫學正傳不卷之三 一百

○嗽而心煩不安六一散加辰砂服

○嗽而失聲聞肺散

訶子肉 五倍子 五味子

黃芩 甘草各等分

右為細末蜜丸噙化

○嗽而無聲有痰

半夏 白朮 五味子

防風 枳殼 甘草各等分

○嗽而有聲無痰

生姜

杏仁泡去皮尖

五味子九枚

升麻

防風

桔梗各半分

甘草炙二分

嗽而有聲有痰

白朮

半夏

五味子

防風

久不愈加殼阿膠珠各半分

寒熱交作而痰嗽者小柴胡加知母之類一方加

白芍藥五味子桑白皮

陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘促瀉白散加青

醫學正傳卷之十一

一百一

等

皮五味子人參茯苓桔梗

熱嗽膏滿小陷膏湯方見傷寒門

治嗽却藥五味子湯

五味子五錢

甘草二錢半

五倍子

風化硝各一錢

右為末蜜丸噙化或用訶子百藥煎煎芥穗蜜

丸噙化

治嗽最要分肺虛肺實若肺虛久嗽宜五味子欬

冬花紫苑馬薤鈴之類補之若肺實有火邪宜

黃芩天花粉桑白皮杏仁之類以瀉之

東垣曰治嗽必用五味子為君然有外邪者難用

之恐閉住其邪氣必先發散之而後用之可也

治嗽用訶子味酸苦有收斂降火之功五味子收

肺氣乃火熱必用之劑杏仁散肺氣風熱然肺

實有熱因於寒者為宜桑白皮瀉肺氣然性不

純良用之多者當戒

或用馬薤鈴以其去肺熱補肺也多用生薑以

其辛能發散也瓜蒌子甘能補肺潤能降氣膏

醫學正傳卷之十一

一百一

等

中有痰者以肺受火逼失降下之令今得甘緩

潤下之助則痰自降宜其為治嗽之要藥也

瓊玉膏治虛勞乾咳

人參十二兩

白茯苓去皮淨者

白砂蜜五斤

生地黄去淨者十斤洗淨銀石器

沉香五錢

琥珀五錢

臘仙曰今予所製此方加沉香琥珀二味其功

効異於世傳之方

右以人參茯苓沉香琥珀俱為細末先將蜜

與白沙蜜攪勻用蜜絹搗去細粗入藥末攪勻
入好磁瓶或銀瓶內用綿紙十數層外加箭箬
包封扎瓶口入砂鍋內或銅鍋內以長流水浸
沒瓶頸用桑柴文武火煮三晝夜取出換蠟帘
數重包扎瓶口浸沒井中半日以出火毒提
仍入前鍋內煮半日以出水氣然後收藏每日
清晨及午前後取一二匙用溫酒一盞調服不
飲酒人白湯亦可此法須用不聞鷄犬聲處煨
煉之及不許孝子婦人見之

醫學正傳

卷之二

百一

金

○九仙散治一切咳嗽久嗽乃擊其隋歸之藥也

人參

款冬花

桑白皮

桔梗

阿膠

炒成珠

五味子

各一錢

烏梅

貝母

半錢

罌粟殼

去穢帶蓋
蜜炙二錢

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞

溫服

○三拗湯治風寒咳嗽喘急

麻黃

不去根

甘草

生用

杏仁

不去皮

火研
細各一錢半

右細切作一服加生姜五片棗二枚水一盞半

煎至一盞溫服痰滑乃止

○溫肺湯治肺感寒邪咳嗽吐痰

半夏

泡

陳皮

去白

五味子

乾姜

桂心

各五分

杏仁

去皮炒

北細辛

阿膠

炒成珠

甘草

炙各二
分半

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水一盞

半煎至一盞去粗溫服

愚按此方乃冬月寒冷之時獨用寒邪而未
兼熱者極効如久嗽鬱熱者切不可用

○杏蘇飲治上風喘嗽面目浮腫

醫學正傳

卷之二

百四

同

紫蘇葉

七分

五味子

大腹皮

酒洗淨

烏梅肉

杏仁泥

各五分

陳皮

去白

桔梗

麻黃

去根節

桑白皮

蜜炙

阿膠珠

各二分

柴苑茸

三分

甘草

炙二分

右細切加生姜五片水一盞半煎至一盞溫服

丹溪活套云二陳湯治咳嗽去痰伐病根之藥也

除陰虛血虛火盛乾咳嗽者勿用。如血虛有

痰者本方合四物湯加五味子麥門冬瓜蒌仁

之類。如傷風邪咳嗽本方加南星枳殼防風

荊芥前胡細辛旋覆花之類。如傷寒邪咳嗽
本方加麻黃杏仁桔梗乾姜桂枝之類。如傷
熱邪咳嗽本方加黃芩薄荷知母石膏桔梗之
類。如先傷風寒鬱熱咳嗽不已欲成勞者本
方加知母貝母款花紫苑五味子天麥二門冬
馬薤鈴當歸生地黃之類。如傷風寒喘嗽並
作本方加麻黃杏仁防風荊芥枳殼桑白皮桔
梗地骨皮紫蘇之類。如咳嗽聲嘶引兩脇痛
不可忍者本方加芫歸芍藥青皮柴胡草龍膽
黃芩竹茹之類。如年久喘嗽遇風寒則發作
者本方加紫苑款花桑白皮杏仁五味子知母
石膏之類。不問風寒鬱熱勞嗽久嗽曾先服
麻黃杏仁防風等藥病雖退減而病根未除者
本方加栗殼烏梅阿膠五味子瓜蒌仁之類可
一服而愈。凡諸嗽須分氣虛氣實新久用藥
如新咳嗽挾虛者可用人參風寒邪盛者亦不
用如久嗽已鬱熱者切不可用人參反增喘滿
嗽劇如肺虛久嗽加五味子款冬花紫苑茸馬

地鈴之類以補之若肺實而有火邪者宜桑白
皮片黃芩天花粉杏仁枳殼桔梗之類以瀉之
○祖傳經驗潤肺除嗽飲治遠年咳嗽如神
人參 杏仁 生甘草
薄荷 各三分 五味子 九粒 款冬花
紫苑茸 麻黃 陳皮 去白
石膏粉 桔梗 半夏
桑白皮 蜜炙 枳殼 炒 烏梅
栗殼 去穢蜜炙
○祖傳三聖丹治久嗽極効
天南星 泡裂 半夏 湯泡七
先以星夏二味研為細末用生姜自然汁拌勻
盒作麴春秋七日冬十日夏五日取出再鞣草
共研為細末別取淡竹瀝一碗將前藥末用竹
瀝拌勻作餅子焙乾又將竹瀝沃濕又焙乾如
此沃焙十數次待竹瀝盡為度研為極細末用

白沙密調如飴每臨卧抄一匙於口內嚥化下
再用竹瀝漱口嚥之

孝喘十三

論

內經曰諸逆衝上皆屬於火又曰夫起居如故而
息有音者此肺之絡脉逆也河間曰火氣甚為夏
熱衰為冬寒故病寒則氣衰而息微病熱則氣盛
而息粗又寒水為陰主乎遲緩熱火為陽主乎急
數是以寒則息遲氣微熱則息數氣粗而為喘也

醫學正傳

卷之十

一百七

大抵哮以聲響名喘以氣息言夫喘促喉中如水
雞聲者謂之哮氣促而連屬不能以息者謂之喘
雖然未有不由痰火內鬱風寒外束而致之者與
外有陰虛發喘氣從臍下起直衝清道而上者又
有氣虛發喘而短氣不能以接續者是故知喘之
為證有實有虛治法天淵懸隔者也若夫損不足
而益有餘者醫殺之耳學者不可不詳辨焉

脉法

喘急脉滑而浮者生

瀉而數者死

○脉宜浮遲不宜急數

脉數有熱喘咳吐血上氣不得卧者死

上氣而浮腫肩息脉浮大不治又加喘尤甚

上氣躁而喘者為肺脹欲作風水發汗則愈云

欬而上氣肺脹其脉沉心下有水氣也醫家千金

寸口伏胷中有逆氣尺寸俱沉關上無有者苦心

下喘

方法丹溪方法
九十四條

丹溪曰喘急者氣為火所鬱而胃痰在肺胃也有

醫學正傳

卷之十

一百八

痰者有火痰者有陰虛自小腹下火起而上逆

者有氣虛而致氣短而喘者

○哮專主於痰宜用吐法亦有虛而不可吐者謹之

○治哮必使薄滋味不可純用寒涼藥必兼散表

戴氏曰痰者凡喘便有痰聲大痰者乍進乍退
得食則減食已則喘大痰則暫止稍久食已入胃
稠痰得食墜下其痰喘則暫止稍久食已入胃
反助其火痰再升上喘反大作俗不知此作胃

虛治以熱燥之藥以火落火也昔葉都督患此
證諸醫作胃虛治之不愈後以導水丸利五六
次而安氣短喘息者呼吸急促而無痰聲又有
胃虛喘者權肩拮肘喘而不休者是也

○痰者降痰化氣為主 火炎者降心火清肺金

陰虛痰喘者補陰降火四物湯加枳殼半夏一
云陰虛氣喘四物湯加陳皮甘草些少以降氣
補陰白芍藥須以酒浸日乾火忌

○氣虛發喘以參芪補之而愈

○九人喘未發時以扶正氣為主已發以攻邪為主

○火急甚者不可用苦寒藥火盛故也宜溫劫之劫
藥用椒目五七錢研為極細末生姜湯調服喘
止之後因痰治痰因火治火

○千縑湯治痰喘不得卧人扶而坐數日一服而安

醫學正傳卷之三
痰門
方見

○一方用導痰湯合千縑湯服

○一方用蘿菥子二兩蒸熟皂角五錢燒存性瓜蒌
仁海粉南星用白礬一錢半研細各一兩為末
入水浸一宿曬乾

煉蜜為丸化一方無南星

○一方治喘而嗽用南星瓜蒌半夏香附橘紅蘿菥
子青黛皂角為末神麴九姜湯送下一方有杏
仁

○喘用阿膠須分虛實若久病發喘必是肺虛故用
阿膠人參五味子之類補之若新病肺實而發

喘者宜桑白皮葶力子麻黃杏仁之類瀉之
東垣日久嗽鬱熱在肺不用人參
新病未成鬱熱者用人參未熟是

○氣實人因服黃芪過多而喘者宜服三拗湯以瀉
氣

○三拗湯治肺感風寒喘急不已方見咳嗽門

○葶蘆大棗瀉肺湯治肺壅脹膏膈滿悶上氣喘急
身體面目浮腫等證

○葶蘆子不拘多少炒黃為末
煉蜜丸如彈子大

右以水三盞大棗十枚煎至二盞去棗入葶蘆
一丸再煎至一盞溫服之

○濟生葶蘆散治過食煎燂或飲酒過度致肺癰喘
不得卧及肺癰咽噪不渴濁唾腥臭

甜葶蘆子炒 桔梗去芦 瓜蒌子

升麻 薏苡仁 桑白皮蜜炙

葛根各八分 甘草四分

右細切作一服加生姜五片水一盞半煎至一
盞溫服

○瀉白散治大人小兒風寒傷肺喘咳嗽

桑白皮一錢 地骨皮一錢 生甘草半錢

右細切作一服加姜水煎服 一方加防風荆芥各七分半又方加麻黃杏仁各半錢其効尤捷

○祖傳經驗秘方治遠年喘急

桑木內竄虫糞一升炒 蘿藤子半升炒

杏仁半升不去皮大炒 甘草二兩生

共為極細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五七十丸淡姜湯送下

○又方治哮喘用苧麻根和砂糖爛煮時時嚙嚥下

永絕病根神効

○又方用貓兒頭骨燒灰酒調二三錢一服便止

○又方用郭公莓刺根煎服即止而不發

○東陽一羽士年五十餘素有喘病九月間得發熱

惡寒證喘甚脉洪盛而似實一醫作傷寒治而用小柴胡湯加枳殼陳皮等藥六月後欲行大承氣一醫曰不可當作傷食治宜用枳實導滯九爭不決召予視之二醫皆曰脉實氣盛當瀉

予為盼後曉之曰此火盛之脉非真實也短氣不足以息當作虛治而用補中益氣湯加麥門冬五味子入附子三分煎服二貼脉收斂四貼而病輕減六貼病痊安

瘰癧十四

內經曰夏傷於暑秋為痲瘰又曰先寒而後熱者名曰寒瘰先熱而後寒者名曰溫瘰其但熱而不寒者名曰痺瘰丹溪曰瘰瘰皆生於風瘰瘰者老

瘰瘰以其隔二日以作纏綿不去古方多用峻劑

恐非稟受怯弱與居養所移者不宜始悟常山烏

海訛丹劫劑或誤投之輕病變重重者必危夫三

日一作者邪入於三陰經也作於子午卯酉日者

少陰瘰也作於寅申巳亥日者厥陰瘰也作於辰

戌丑未日者太陰瘰也瘰得於暑當以汗解或因

取涼太過汗鬱成痰其初感也弱者即病胃氣強

者伏而未動至於再感復因內傷其病乃作宜其

雖瘰夫感暑與風皆外邪也故非汗多不鮮

遺此疾者已經再三劫試胃氣里傷何由得愈欲
 治此證必先與參朮非補劑為君加柴葛升發散
 藥漸而發汗得汗而虛又行補養下軀屬陰最難
 得汗補藥力到汗出至足方是佳兆又有感病極
 深邪氣必自藏傳出至府其發無時若發於午之
 後寅之前者血受病也為難愈須漸斂早亦佳兆
 也治斯疾者春夏為易秋冬為難大忌飽食遇發
 日食飽病愈加重尤當以汗之難易較輕重也內
 經又曰瘧之日發也陰陽之日移也必從四末始
 陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不得
 入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血者皆
 取之謂用三稜針此直往而未得併者也故今人
 多以諸般草藥於臂膊內縛之即此遺意耳外有
 陰虛證每日午後惡寒發熱至晚亦得微汗而解
 脉必虛濡而數且瘧脉弦而虛脉不大弦為辨耳
 若誤作瘧治而用常山砒丹及柴胡乾葛并藥多
 至不救醫者宜以脉證參驗其虛實而療之毋縱
 巨膽以殺人也

肝法

吳氏曰瘧脉自弦弦數多熱弦遲多寒弦而小陰
 者下之瘧弦遲者宜溫弦緊者可發汗針灸浮大
 者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之

脉經云瘧脉自弦微則為虛代散則死

方法冊溪方法凡十六條

丹溪曰有暑瘧有風瘧有濕瘧有痰瘧有食瘧三

日一發者受病一年間日一發者受病半年一

日一發者受病一月連發二日住一日者氣血

醫學正傳卷之十一 俱受病俗名脾寒乃因名而迷其實也苟因飲

食所傷而得之未必是寒况其他乎

暑瘧宜入參白虎湯之類

有痰者二陳湯加常山草菓柴胡黃芩

不能食者必於飲食上得之當從食治

虛者必用參朮一二貼托住其氣不使下陷後用

他藥若無汗要有汗散邪為主帶補若有汗要

無汗正氣為主帶散

數發之後便宜緩而除之久則氣虛

數發之後便宜緩而除之久則氣虛

邪已深而難治世有砒丹等截藥有大毒不可輕用

○大渴大熱用小柴胡去半夏加知母麥門冬黃連

黃柏梔子天花粉

瘧渴用生地黃麥門冬天花粉牛膝知母炒黃柏

乾葛生甘草

○久瘧二陳湯加川芎蒼朮柴胡葛根白朮一補一

發藥也

甚者發寒熱頭痛如破渴而飲水多汗可以參芪

醫學正傳

卷之十一

百十五

水

芩連梔子川芎蒼朮白朮之類治之

○痰滯胸滿熱多寒少大便燥實大柴胡利之愈

久瘧不得汗以二陳湯倍加蒼朮白朮少加檳榔

○小兒瘧疾者有痞塊生地黃芍藥各一錢半陳皮

川芎炒黃芩半夏各一錢甘草二分加生姜煎

調醋炙鱉甲末

瘧母用丸藥消導之醋鱉甲為君三稜蓬朮香附

海粉青皮桃仁紅花神麴麥芽隨證加減為丸

醋湯送下

○老瘧係風暑入在陰分宜用血藥引出陽分而散

川芎撫芎當歸紅花蒼朮白芷黃柏甘草煎露

一宿服之

○瘵瘧老瘧也三日一發陰經受病也夫瘵得於暑

當以汗解或取風汗冷汗不得泄鬱而成痰又

復嗜慾縱飲及經試却藥胃氣大傷其病難愈

必先與參朮陳皮芍藥等劑佐以本經引用之

藥若得汗而瘵虛又須重補俟汗通身不過委

中方是佳此仍節飲食避風寒遠房勞無不愈

醫學正傳

卷之十一

百十六

水

○截瘵常山飲

川常山

草蓂

知母

炙甘草

檳榔

穿山甲

慢火煨脆

右各等分細切每服五錢水酒各半盞煎至八

分露星月一宿清晨服之欲吐則順之忌熱

湯一日然常山性暴悍善驅逐痰飲大傷真氣

病人稍虛弱者戒勿輕用

○截瘵七寶飲

常山 一錢

厚朴

青皮

陳皮

炙甘草

檳榔

草薢仁 各半錢

右細切作一服酒水各半。寒多加酒熱多加水煎八分。露星月一宿。空心冷服。忌熱茶湯。一日至午食溫粥。

○東垣曰：夏月天氣上行，秋月天氣下行，治者當順

天道。如先寒後熱，太陽陽明病，白虎加桂也。此

天氣上行宜用之。若天氣下行，則不宜瀉肺。宜

醫學正傳 卷之二

一百一十七

陽明經

瀉命門相火則可矣。亦有內傷冷物而作者，當

先調中後定瘧形，治隨應見。乃得康寧，亦有久

而不瘥者，當求虛實以脉為期。虛補實瀉，可使

卻疾，此之謂也。

太陽證：令人腰痛頭重，寒從背起。先寒後熱，燭燭

暘暘然，熱止汗出，難已。羌活加生地黃湯。小柴

胡加桂湯。

陽明證：令人先寒洒淅，寒甚久乃熱，去汗出，喜

日月光，火氣乃快。然桂枝二白虎一湯。黃芩芍

藥加桂湯

少陽證：令人身體解，微寒不甚，熱不甚，惡人見，人心惕惕然，熱多汗出，甚小柴胡湯。

太陰證：令人不樂好太息，不嗜食，多寒熱汗出，病

至則善嘔，已乃衰。小建中湯異攻散。

少陰證：令人悶嘔吐甚，多寒熱，多寒少欲，閉戶

牖而處，其病難已。小柴胡加半夏湯。

厥陰證：令人腰痛，小腹滿，小便不利，如癰狀，數便

思，恐俱氣不足，腹中悒悒，四物玄胡苦練附子

醫學正傳 卷之二

一百一十八

厥陰經

湯

○白虎加桂枝湯治溫瘧

知母 四錢

甘草 一錢

石膏 五錢

桂枝 二錢

梗米 一錢

右以水三盞煎米至二盞，去米入諸藥，再煎至

一盞，溫服三服，汗出愈。

○溫脾散治久瘧不愈

柴河車 俗各金葉莖 各一兩

甘草 半兩

信砒 一兩半

研細

右為細末入砒一處研勻每服半錢新汲水許調下須於發日隔夜上深眠藥忌薑酒瓜菓生食魚腥鷄肉葷物三日孕婦勿服但至誠合此藥與人並不吐此雖有砒一味而有河車菴荳茸草三味及新汲水皆能解毒不妨一

按已上二方劫病之捷勝於他方但虛弱或久病羸瘦之人終不可輕用如服上藥吐不止者以生薑細研新汲水調飲多即止

醫學正傳卷之十一

一百一十九

醫

○丹溪活套云凡瘧證或連日或間日發作惡寒發熱腰背頭項俱痛此屬太陽經瘧也宜二陳湯加麻黃羌活藁本防風之類○如連日或間日發作先寒後熱或寒少熱多或但熱不寒目痛鼻孔燥此屬陽明經瘧也宜用二陳湯加乾葛升麻石膏知母白芷之類○如連日或間日發作或先寒後熱或寒熱間作脇痛口苦或嘔吐惡心此少陽經瘧也○宜二陳湯倍加柴胡及黃芩人參青皮之類○如於子午卯酉日發者

嘔吐舌乾口燥此少陰經瘧宜二陳湯加川歸

加川芎黃柏黃連柴胡之類○如辰戌丑未日

發寒熱嘔吐不嗜食或腹滿自利此太陰經瘧

也宜二陳湯加蒼白朮柴胡芍藥之類○如於

寅申巳亥日發惡寒發熱寒多熱少或腹痛引

陰如淋狀善恐此厥陰經瘧也宜用二陳湯加

桂枝附子乾姜之類大抵瘧屬三陽宜汗宜吐

麻黃葛根柴胡常山草菓烏梅之屬治之瘧屬

三陰宜下宜溫宜和大柴胡湯柴胡桂姜湯柴

胡四物湯附子理中湯之類選而用之

○祖傳經驗截法神方

木通

秦元

常山

川山甲

各錢一錢辰砂半錢另研

烏梅七箇

大棗七枚

右細切以水三盞煎至一盞先以棗和辰砂末

食後服藥

○一方用常山草菓知母檳榔各一錢酒一盞浸一

日臨發日早服

○又方治久瘧不愈一服便止永不發其効如神

常山一錢半

檳榔一錢

丁香半錢

烏梅一枚

右細切作一服用好酒一盞浸一宿臨發日清晨飲之

○予壯年過杭同舟有二男子皆年踰四十五各得瘵瘧三年矣俱發於寅申巳亥日一人晝發於巳而退於申一人夜發於亥而退於寅予曰但到杭可買藥俱與痊訶發者乃陰中之陽病宜

醫學正傳

卷之十一

百廿

如

補氣解表與小柴胡湯倍柴胡人參加白朮川芎葛根陳皮青皮蒼朮夜發者為陰中之陰病宜補血疎肝用小柴胡合四物加青皮各與一貼教其加姜棗煎未發前二時服每日一貼服至八貼同日得大汗而愈永不復發

瘵亂十五

論

內經曰歲土不及風乃大行民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨轉併陳無擇曰霍亂者心腹卒痛嘔止

下利憎寒壯熱頭痛眩暈先心痛則先吐先腹痛

則先利心腹齊痛吐利並作甚則轉火入腹即死

蓋陰陽反戾清濁相混陽氣暴升陰氣頓墜陰陽

否隔上下奔趨河間曰吐瀉不止者其本在於中

焦或因渴而大飲飲而過量或因肌而始食食而

過飽以致濕熱內甚故陰陽交錯而不和是為吐

瀉仲景曰邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中

焦則既吐且瀉此為急病也然吐利為急十死其

一二如揮霍撩亂而不得吐瀉者此名乾霍亂也

醫學正傳

卷之十一

百廿

三

多死法曰既有其入必有所出今有其入而不得

其出者否塞也故轉筋吐瀉者其氣有三一曰火

二曰風三曰濕大抵霍亂吐瀉之證皆風木濕熱

之為害耳治法宜分利陰陽散風行濕而降火也

又當引清氣上升使濁氣下降無有不安仲景又

曰熱多欲飲水五苓散寒多不飲水理中丸河間

亦曰凡覺此證急用五苓散元散桂苓甘露飲乃

吐瀉之聖藥也慎勿與粟米粥湯入胃必死丹溪

曰內有所積外有所感陽不升陰不降乖隔而成

非因鬼邪皆飲食所致此先哲確論也切勿與
食雖米湯一呷下咽立死必待吐瀉止過半日飢
甚方可與稀粥少食以漸而將息也學者詳之

脉法

脉微而澁 或代而散 或隱而伏 或大而虛
脉右關滑為霍亂吐瀉 脉結促代者不可斷死
脉大者生 脉微弱漸遲者死 脉洪者為熱
脉弦者為飲

氣口脉弦滑腸間有宿食留飲宜順其性以鹽湯

探吐之

方法 丹溪方法凡七條

丹溪曰大法生痰理中湯最好

有宜吐者雖自吐利還須以吐法提其氣用二

陳湯探吐或樟木屑煎湯或鹽湯皆可吐之

○一方蒼木厚朴陳皮乾葛各一錢半水煎服

○或用姜湯下保和丸四五粒

○轉筋屬血熱四物湯加酒芩紅花蒼木南星煎服

○轉筋男子以手挽其陰女子以手牽乳兩傍此千

金妙法也

○乾霍亂

忽然心腹痞痛欲吐不吐欲瀉瀉不瀉者是也俗名痧脹沙即是難治死在

須臾升降不通故也宜吐以提其氣最是良法

內有物所傷外為邪氣所遏大法宜發汗有用

吐法者即煎發散之義有用溫藥解散者二陳

湯加川芎蒼木防風白芷等解散藥也

○委中穴出血或十指頭出血皆是良法

○桂苓甘露飲五苓散二方並見中暑門

○半夏湯治霍亂轉筋吐瀉不止

半夏麴

茯苓

白朮各五錢

淡桂二錢半

炙甘草一錢

右為細末每服二錢渴者以涼水調下不渴者

以溫水調下不拘時候

○理中丸

白朮

人參

乾姜

甘草各等分

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸涼水

化下

○六和湯治霍亂吐瀉不止

白朮

半夏泡

砂仁炒

杏仁

泡去皮尖

人參

甘草

各五分

赤茯苓

藿香

洗去土

白扁豆

姜汁炒

木瓜

各一錢

香薷

厚朴

姜汁製炒

右細切加生姜三片大棗一枚水二盞煎至一

盞溫服

○漿水散治暴泄如水周身汗出盡冷脉弱不能言

語甚而吐逆不止

醫學正傳卷之十

一百五

半夏二錢

附子

乾生姜

炙甘草

桂心各半錢

良姜三分半

右細切作一服漿水煎服之

○姜附湯治霍亂吐瀉轉筋手足厥冷多汗方見傷寒門

○理中湯治過食生冷遂成霍亂吐瀉食不消心腹

滿悶不快加青皮陳皮各治中湯更加丁香附

子名丁香治中湯宜臨病斟酌施治方見傷寒

○祖傳灸法治霍亂已死而膏中尚有暖氣者灸之

立甦

其法以塩填滿臍孔灸之不計壯數

○又法治霍亂吐瀉不止灸天樞氣海中脘四穴立

愈

天樞二穴在臍心兩傍各開二寸 氣海一穴

在臍下一寸半 中脘一穴在臍上四寸

○洗法治霍亂轉筋用大蓼一握水煮薰洗立効

○丹溪活套云凡霍亂不渴用生薑理中湯如渴用

五苓散加五味子麥門冬滑石轉筋用四物湯

酒芩紅花南星蒼朮又云冬月用理中湯夏月

醫學正傳卷之十一

一百六

用黃連香薷湯放井中浸水冷頓服乃効

○一方治吐瀉用藿香蒼朮厚朴陳皮砂仁白芷

草半夏茯苓人參炒神麴各等分水煎過寒加

乾姜寒甚加附子

泄瀉十六

論

內經曰濕勝則濡泄又曰春傷於風夏必飢泄又

曰暴注下迫皆屬於熱又曰諸病水液澄徹清冷

皆屬於寒叔和云濕多成五泄是故知風寒濕熱

皆能令人泄瀉但濕熱良久而風寒差少耳原
式曰瀉白為寒青黃赤黑為熱也大抵瀉利小便
清白不澀為寒赤澀為熱又大便完穀不化而色
不變吐利下腥穢水液澄澈清冷小便清白不澀
身冷不渴脉遲細而微者皆寒證也凡穀肉消化
名無及他證便斷為熱夫寒泄而穀消化者未之
問色有也或火性急速傳化失常完穀不化而為飧泄
者亦有之矣仲景曰邪熱不殺穀然熱得濕則為
飧泄也噫寒熱二證水炭相反治之者差之毫厘
醫學正傳六 卷之十一 百廿七

謬以千里者也醫者可不謹乎

脉法

內經曰脉細皮寒少氣泄利前後飲食不入是為

五虛死其漿粥入胃泄注止則虛者活

脉經曰泄注脉緩時小結者生浮大數者死

又洞泄食不化不得留下膿血脉微小流連者

生動急者死

脉訣云下利微小則為生脉大浮洪者無差日

方法 丹溪方法九十二條

丹溪曰泄屬氣虛有火有痰有食積者

戴氏曰凡瀉水腹不痛者濕也飲食入胃不住
完穀不化者氣虛也腹瀉瀉水腸鳴痛一陣瀉
一瀉也腹痛甚而瀉瀉或不瀉或多或少者
痰也腹瀉甚而瀉瀉後痛減者食積也

○燥濕四苓散加蒼朮倍白朮甚者二朮炒為末米

飲調服

○氣虛用人參白朮芍藥

○火宜伐火利小水四苓散加滑石黃芩梔子木通

○痰宜伐痰海石青代黃芩神麴為丸服或用吐以

提其清氣

醫學正傳六 卷之十一 百廿八

○食積宜消導疎滌之神麴大黃枳實之類

○水瀉用蒼朮厚朴陳皮炒麴茯苓澤瀉地榆

甘草冬加乾姜等分煎服

○泄瀉水多者必用五苓散

○夏月水瀉桂苓甘露飲二方並見暑門

○治泄瀉猪藥多作丸子効

○脾胃不和泄瀉者胃苓湯五苓合平
胃散是也

○世俗例用瀉藥治瀉若病久而虛者或可若初得
者必變他證為禍不小殊不知瀉多因於濕分

柳上策也

○清六九治泄瀉

六一散一料加紅麴伍錢

右為細末湯浸蒸餅為丸服

○溫六九治泄瀉或蕪嘔吐者

六一散加乾姜或生薑汁亦可蒸餅丸服

○姜麴丸治食積瀉

陳麴 茴香各五錢 生薑一兩

右為細末蒸餅丸服

○止瀉方

肉豆蔻 五錢 白滑石 各二兩 錢半夏兩半

右為細末姜汁調神麴作糊為丸服

○脾泄丸

白朮 神麴 芍藥並炒各半

冬加肉豆蔻去芍藥為細末神麴糊為丸服

○茯苓湯治困傷冷飲水泄瀉注下一夜十餘次變

作白痢或變赤白相雜腹中痞痛食減熱躁咽

肢沉困無力

生黃芩一錢半當歸二錢

肉桂

炙甘草各二分猪苓 茯苓各三分

澤瀉三分 芍藥七分半 蒼朮

生甘草 升麻 柴胡各一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞稍熱服

○黃芪補胃湯治一日大便三四次澹而不多有時

作泄腹中鳴小便黃

黃芪 柴胡 當歸身

益智 橘紅各半 升麻二錢

醫學正傳 卷之十 百三十一

炙甘草半錢 紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞稍熱食前服

○升麻除濕湯自下而止者引而去之

蒼朮一錢 柴胡 羌活

防風 升麻 神麴

澤瀉 猪苓各五分 炙甘草

陳皮 麥藥各三分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗空心服

如胃寒腸鳴加益智仁半夏各五分生薑三

大棗一枚同煎非腸鳴勿用

○劉草窓治痛泄要方

白朮一兩炒 白芍藥二兩炒 陳皮一兩半炒

防風一兩

右細切分作八服水煎或丸服久瀉加升麻六錢

○白朮芍藥湯治太陰脾經受濕水瀉注下體重微

滿困弱無力不欲飲食水穀不化宜此和之身重暴下是大勢來亦宜和

醫學正傳六 卷之二 一百二十一

白朮 白芍藥各四錢 甘草二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

○茯苓湯治濕瀉又治食積濕熱作瀉

白朮 茯苓各五錢

右細切作一服水煎食前服一方有芍藥三味各等分名白朮散為末米飲調下

○蒼朮芍藥湯治證如前

蒼朮五錢 芍藥二錢半 黃芩一錢半

茯苓五分

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

○防風芍藥湯治飧泄身熱脉弦腰痛微汗

防風 芍藥 黃芩各二錢

右細切作一服水煎空心服

○蒼朮防風湯治泄瀉脉弦頭痛

蒼朮二錢 防風一錢 白朮四錢

麻黃一錢

右細切作一服加生姜五片水二盞煎至一盞食前服

醫學正傳六 卷之二 一百二十二

○良方神木散治春傷於風夏必飧泄之證

蒼朮一錢半 藁本 川芎各六分

羌活四分 甘草炙三分 細辛二分

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞

去粗溫服如欲汗加葱白三莖

○胃風湯治證如前及治風冷乘虛入客腸胃米穀

不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁或下疥

血或如魚腦日夜無度久不得愈者方見中風

丹溪活套云泄瀉注下如水用生料五苓散

木車前子倍白朮末米湯調服○濕熱甚下
泄如熱湯者本方去桂加滑石黃芩梔子木通
之類○如腹中疴痛下泄清冷喜熱手溫熨口
不燥渴乃寒泄也本方倍桂加肉豆蔻有氣加
木香病甚者更加丁香附子作丸服○如久泄
穀道不合或脫肛比元氣下陷及大腸不行收
令而然用白朮芍藥神麴陳皮肉豆蔻阿子肉
伍倍子烏梅為丸以四君子湯加防風升麻煎
湯送下○如食積時常腹痛瀉積先以木香檳
榔丸或東垣枳實道滯丸推逐之而後以四苓
加厚朴蒼朮神麴麥芽之類作丸服之以安胃
氣○如瀉水腹不痛者屬氣虛宜四君子湯倍
白朮加黃芪升麻柴胡防風之類補以提之而
愈

○祖傳經驗秘方治暴泄注下用

車前子一兩
微炒

右一味研為細末清米飲調服

○又方治腹痛泄瀉用

艾葉一握 車前子葉一握陰乾

右先將二葉細切用水二盞煎至一盞去粗入
姜汁再煎一沸稍熱服立愈

一人泄瀉日夜無度諸藥不効偶得一方用針
少地龍猪苓三味共為細末生葱搗汁調方七
貼刺上小便
長而瀉止

○一人吐瀉三日垂死囑付後事子為灸天樞氣海
三穴立止

醫學正傳卷之十一

一百廿二

醫學正傳卷之十一

一百廿四

醫學正傳卷之二終

醫學正傳卷之三目錄

卷之三

○痢門 十七 論 脉法 丹溪方法 九十二條

芍藥湯 黃芩芍藥湯 黃連湯 芍藥黃連

湯 大黃湯 香蓮丸 益元散 神効參香

散 丹溪活套 祖傳和中飲 經驗三根飲

經驗二防飲 禁口痢法 已試醫驗一條

○嘔吐門 十八 論 脉法 丹溪方法 九十一條

藿香安胃散 和中桔梗湯 木香散

荊黃湯 換柳散 清鎮丸 白朮湯

金花丸 紫沉丸 小半夏湯 姜汁半夏湯

藿香平胃散 胃苓湯 黃連六一湯

丁香安胃湯 丁附治中湯 加味二陳湯

丁香安胃湯 茯苓半夏湯 丹溪活套

已試醫驗一條

○噎膈門 十九 論 脉法 丹溪方法 九十一條

瓜蒌實丸 寬中進食丸 人參利膈丸

丹溪活套 祖傳潤腸膏 大力奪命丸

又經驗方 已試醫驗二條

○蛇逆門 二十 論 脉法 丹溪方法 九六條

陳皮竹茹湯 橘皮半夏生姜湯 六君子湯

丹溪活法 經驗灸鉅逆法

○吞酸門 二十一 論 脉法 丹溪方法 九七條

藿香安胃散 加減二陳湯 三因麵米丸

祖傳治吞酸方

○嘈雜噯門 二十一 論 脉法 丹溪方法 九八條

三聖丸 木蓮丸 軟石膏丸 麴米丸

○痞滿門 二十三 論 脉法 丹溪方法 九三條

厚朴溫中湯 木香順氣湯 痞挾瘀血方法

七氣湯 大消痞丸 失笑丸 消痞湯

黃連消痞丸 黃芩利膈丸 丹溪活套

已試醫驗一條

○腫脹門 二十四 論 脉法 丹溪方法 九八條

禹餘糧丸 黎矩三和湯 紫蘇子湯

木香順氣湯 中滿分消丸 廣木潰堅湯

半夏厚朴湯 破滯氣湯 草薢菴湯

葶歷木香散 白朮木香散 葶歷膏

二氣散 牽牛丸 三花神祐丸 雞屎醃飲

丹溪活套 祖傳雞屎醃 又經驗方

經驗桃奴丸 自己試醫驗二條

○積聚門二十五論 脉法 丹溪方法 九六條

三聖膏 琥珀膏 附魏丸 大中丸

小溫中丸 婦人腹中有塊說 一方治婦人

血塊 又治婦人血塊如盤 塊在皮裏膜外

方 倒倉法 肥上骨 痰木潰堅湯 半夏厚朴

湯 三因散聚湯 大七氣湯 千金硝石丸

醫學正傳卷之三 三

局方妙香丸 導氣祿壳丸 木香三棱丸

草薢薢丸 肥氣丸 伏梁丸 痞氣丸

息奔丸 奔豚丸

○虛損門二十六論 脉法 丹溪方法一條

老人調養方 四君子湯 四物湯 八物湯

六君子湯 十全大補湯 大補陰丸

補陰丸 加味虎潛丸 滋陰大補丸

補腎丸 補天丸 六味地黃丸 人參固本

丸 人參膏 補中益氣湯 益胃升陽湯

濟生芪附湯 參附湯 濟生芪苓湯

○勞極門二十七論 脉法 方法 丹溪九四條

二十四味蓮心散 青蒿飲子 白蠟塵

匙哭飲子 天靈蓋散 射香散

取最出神仙秘方 神授散 無比丸

秘傳取勞虫禁方 紫河車汁 柴胡散

散莫甲散 貫衆丸 輕骨散 蛤蚧散

蛤蚧飲子 五蒸湯

灸崔氏四花穴法

醫學正傳卷之三 四至六

醫學正傳卷之三目錄終

痢十七

孫虞守愚惟明校正

論

內經曰澁而便膿血知氣行而血止也愚按經文

也蓋一澁字洩即尿也洩澁而使血膿者言病因血止者言治法也故河間開明其說所謂和氣則後重自除而用木香枳實等藥以和之即此意也

河間曰行血則便膿自愈和氣則後重自除又曰

後重則宜下腹痛則宜和身重則除溫脉弦則

去風膿血稠粘以重藥竭之身冷自汗以熱藥

溫之風邪外束宜汗之驚澁為痢宜溫之又曰

在表者發之在裏者下之在上者湧之在下者

竭之身表熱者內疎之小便澁者分利之又曰

盛者和之去者送之過者止之兵法云避其來

銳擊其惰歸此之謂也夫古方以瀉痢滾同論

治朱紫混淆殊不知瀉屬脾而痢屬腎也丹溪

曰先水瀉而後膿血者此脾傳腎賊邪難愈先

膿血而後水瀉者此腎傳脾微邪易愈是皆先

哲之格言以為後學之繩墨醫者其可不詳究

乎

脉法

脉經云腸澼下膿血脉沉小流連者生洪大數身

熱者死又曰腸辟筋牽脉小細安靜者生浮大

而緊者死

方法丹溪方法凡二十四條

丹溪曰痢赤屬血自小腸來白屬氣自大腸來

醫學正傳卷三

○原病式曰痢為濕熱甚於腸胃佛鬱而成其病皆

熱証也俗以痢白為寒誤也如熱生瘡癰而出

白膿可以白為寒乎陰陽水火一高則一下一

盛則一衰若以白為寒赤為熱則兼赤白者乃

寒熱俱甚於腸胃之間而為病乎况下迫窘痛

小便赤澁而痢白者必多有之為熱明矣世有

用辛熱藥而愈者蓋辛甘發散熱主出行故病

微者則鬱結開通氣和而愈若病甚者鬱結不

開其病轉加而死故治痢者必用寒以勝熱苦

以燥溫微加辛熱佐之以為發散開通之用如此固無不效者

○仲景治痢可下者悉用承氣等湯加減下之大黃之寒其性善走佐以厚朴之溫善行滯氣緩以甘草之甘飲以湯液灌滌腸胃滋潤輕快積行即止局方用砒丹巴硃類聚成丸其氣悍暴其體重滯積氣已行而毒氣未消猶暴賊手持兵刃使之徘徊瞻顧於堂與之間縱有愈病之功而腸胃清純之氣寧無損傷之患乎可溫者乃醫學正傳大 卷三 九

用姜附溫之局方例用熱藥為主溫藥為佐用之於下利清白者猶可其裏急後重經所謂下迫者皆屬火熱所為加以溫熱之劑非殺而何○初得一二日間元氣未虛必推蕩之此通因通用

之法用大承氣湯或調胃承氣湯下後看氣血調哩氣用參朮血用四物五日後不可下此亦言之氣血弱者雖一二日亦不可下實者十餘日後亦有下之而安者

○腹痛以白芍藥甘草為君當歸白朮為佐惡寒者加桂惡熱者加黃芩

○腹痛因肺金之氣鬱在大腸之間以苦梗發之役用痢藥一云實則可下虛則以苦梗發之

○初下痢腹痛者用溫藥姜桂之屬切不可驟用參朮縱氣虛胃虛皆不可用

○後重者積與氣墜下之故兼升兼消尤當和氣木香枳榔九保和丸之類

○身熱挾外感者不惡寒用小柴胡去人參發熱惡寒身首俱痛此為表証宜微汗和解又蒼朮川芎陳皮芍藥甘草生薑煎服而以上二方并

奇效也者亦多獲醫學正傳大 卷三 十

○發熱不止者屬陰虛用寒涼藥必兼溫藥升藥

○大孔痛肛門也因熱流於下也木香枳榔芩連加炒乾姜

○仲景法治孔痛一曰溫之一曰清之若父病身冷自汗脉沉小宜溫之暴病身熱脉洪大宜清之

○下血者宜涼血活血當歸黃芩桃仁之類或用朴硝有風邪下陷宜升提之蓋風傷肝肝主血故

也有溫傷血宜行溫清熱

○濕熱下痢小便澀少煩渴能食脉洪大而緩腹痛

後重桂苓甘露飲送下保和丸二三十粒

○濕多熱少脾胃不和食少腹痛後重夜多利下胃

苓湯送下保和丸二三十粒

○氣虛面色痿黃枯白色人困倦痢頻併痛後重不

食脉細弱或微汗時出黃芪建中湯送下保和

丸二三十粒

○濕熱為痢不渴者建中湯加蒼朮茯苓下保和丸

○脾胃不和食少腹脹痛後重脉弦宜平胃散加芍

藥官桂葛根白朮茯苓下保和丸

○下痢血氣大虛腹痛頻併後重不食或產後得此

証用四君子湯加當歸陳皮下保和丸二三十

粒

○下痢白積者用芍藥湯加白朮陳皮甘草滑石桃

仁

○下痢赤積身熱一元散加木通炒芍藥炒陳皮白

朮煎湯送下保和丸加黃芩丸

○久下痢已數日不能起床不食疲弱之甚者用人

參半錢

參半錢

白朮一錢黃芪半錢當歸七分芍藥一錢

炙甘草三分御米殼醋炒地榆五分木香三分

宿砂五分陳皮一錢升麻三分白芷薏仁三分

澤瀉五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫

服

○如下墜異常積中有紫黑血而又痛甚者此為死

血証用桃仁細研及滑石行之

○血痢久不愈者屬陰虛四物為主

○下痢如莖汁者濕也蓋脾胃為水穀之海無物不

受常兼四藏故有如五色之相染當先通利此

迎而奪之之義如虛宜審之

○古方用厚朴專為行疑滯之氣滯氣稍行則去之

枳殼雖少緩亦不宜久服只以陳皮和藥可也

○古方多用粟殼治痢與痢但要先出病根乃收功

後藥也

○如力倦氣少惡食此為快虛証宜用白朮當歸

子 42-503

尾甚者加入參陳皮補之虛而而前自止

○如久痢體虛氣弱滑泄不止亦當以澁藥止之訶

子肉薑蔻白礬半夏牡蛎之類擇而用之然須

以陳皮為佐恐太澁亦能作疼又甚者須炙天

樞氣海取穴法見前

○如痢已減十之七八穢積已盡糟粕未實用炒芍

藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸九二

三十粒此丸性多泄滯有去濕實腸之功若滯

氣未盡除者不可遽用

醫學正傳卷之六

十三

○如痢後糟粕未實或食粥稍多或飢甚方食腹中

作疼以白水陳皮二味煎湯和之自安

○如氣行血和積少但虛坐努積此為無血証倍用

歸身尾芍藥生地黃而以桃仁泥佐之陳皮和

之血生自安

○如痢後脚弱漸細小用蒼朮二兩白芍藥龜板各

二兩半黃柏五兩粥糊丸以四物湯加陳皮甘

草煎湯送下

○噤口痢胃口熱甚故也用黃連人參煎湯終日呷

之如吐則再強飲但得一呷下咽便好又用

螺搗盒臍中以引下其熱胃中熱結當開以導

之人不知此多用溫藥其味以火濟火以滯益

滯也亦有誤服熱毒之藥犯胃者當推明而祛

其毒用糞蛆焙乾為末清米飲調下一錢七甚

效

○多有時疫作痢傳染相似宜推明運氣之勝復以

治之

○小兒痢疾用黃連橫大黃甘草煎服赤痢加桃仁

醫學正傳卷之六

七

紅花白痢加滑石末同煎

○一小兒八歲下痢純血作食積治蒼朮白朮黃芩

白芍藥滑石茯苓甘草陳皮神麴煎湯下保和

丸

○凡下痢純血者如塵腐色者如屋漏水者大孔開

如竹筒者唇如硃紅者俱死○如魚腦髓者身

熱脉大者俱半死半生經所謂身涼脉細者生

身熱脉大者死是亦大槩言之耳不可一途而

論也

○一方治熱痢血痢用大黃黃連黃芩黃柏枳殼
芍藥川歸滑石甘草桃仁白朮等分神麴糊丸
如梧桐子大每服五六十丸白湯下

○青六九治血痢神効

○溫六九治痢及水瀉皆効已上二方並見泄瀉門

○固腸丸治濕熱下痢大便下血去腸胃陳積之後

用此以燥下濕而實大腸

樗根白皮不拘多少細切畧炒

右一味研為末米糊為丸如梧桐子大每服三

○芍藥湯行血則便膿自愈和氣則後重自除此藥

五十九陳米飲送下或用炒芍藥炒白朮炙甘

草陳皮茯苓煎湯下

是也

白芍藥

二錢 當歸尾 黃連

黃芩各一錢 大黃七分 甘草

枳榔 木香 桂心各五分

右細切作一服水一盞半煎一盞空心服

如初病後重窘迫甚者倍大黃加半兩一錢

如瘡漏氣不宣通加枳實一錢。如藏毒下血
加黃柏一錢

○黃芩芍藥湯治瀉痢腹痛或後重身熱久而不愈
脉洪數者及膿血稠粘者

黃芩 芍藥各二錢甘草一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服腹痛

甚加桂二分稍熱服之

○黃連湯治大便後下血腹中不痛謂之濕毒下血

黃連 當歸各二錢

○芍藥黃連湯治大便後下血腹中痛者謂之熱毒

下血

芍藥 黃連各一錢半

下血

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

大黃三分 桂心半錢甘草三分

○大黃湯治痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無

度脉沉實人不甚困倦者或初得腹痛甚者窘

迫不安者

大黃 一兩

右細切作一服用好酒二大盞浸半日煎至一

盞半去粗分作二服損飲之如痢未止再進

服後以芍藥湯和之又再服黃芩芍藥湯以

其邪此乃蕩滌邪熱之劑用酒煎者蓋欲其上

至頂顛外微皮毛也

○香連丸治下痢膿血赤白相雜裏急後重

黃連 各以二十兩酒洗更十兩二味

木香 四兩入錢不見火

右為細末醋調麪糊為丸如梧桐子大每服三

五十九清米飲送下○一方加石連肉半斤治

噤口痢尤佳

○益元散謂此為治痢之聖藥也其功不能盡述

桂府膩白滑石 六兩

粉甘草 一兩炙

右二味共為極細末每服三錢白水調無時

○神効參香散治痢疾日久穢積已少腹中不痛或

微痛不後重窘迫但滑瀉不止乃收功之

也

粟殼 去積蒂蜜 陳皮 一兩炙 肉苳菴 麩裹煨 四錢

茯苓 去皮 白術 莖 四錢 木香

人參 各二錢

右為細末每服一錢七清米飲調下食後

○升溪活套云痢疾乃外感熱內傷之候也須分表

裡治之在表者必惡寒發熱身首俱痛宜以小

柴胡湯去人參麥子加蒼朮川芎陳皮生芍藥

微汗以散之在裡者必後重窘迫腹痛下積早

宜以大小承氣河間酒煎大黃湯之類下之餘

邪未盡更以芍藥湯香連丸之類以徹其邪穢

積已盡而更衣未息者此大腸不行收令故也

宜以固腸丸參香散之類以止澁之噤口者須

詳証按法調治切不可輕用粟殼肉苳菴訶子

之類以遏之殺入於反掌之間也但凡痢証不

問輕重若邪氣正盛而以粟殼之類止遏之雖

不死亦成休息痢二三年不能愈也又不可輕

用巴豆牽牛等熱毒之藥攻之蓋病因熱毒入

得熱毒之劑以火濟火不死何待

○祖傳經驗秘方和中飲治痢疾不分赤白久近服

之無有不安者但發熱噤口不食者不可服

陳皮

白朮

茯苓

芍藥

各一錢

草菓仁七分

甘草三分

陳倉米

二錢

砂糖三錢

粟殼醋炙二錢半

烏梅一箇

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水二盞

煎至一盞去粗溫服

○經驗三根飲治休息痢年久不愈者其効如神

五倍木根

蒼耳草根

臭櫟木根刮取白皮

各等分細切每服七錢重加生姜三片大棗一

枚大黑荳三十六粒糯米四十九粒水二盞煎

至一盞去粗溫服

○經驗二防飲治痢後不謹感冒寒濕或涉水履霜

以致兩足痛癢如刀剥虎咬之狀膝脰腫大不

能行動名鶴膝風此藥神効

人參

白朮

黃芪各一錢

甘草

各半錢

川歸

川芎

芍藥

熟地黃各一錢

防風

防己

羌活

牛膝各七分

杜仲

姜汁拌炒

草薢各一錢

附子

童子尿浸三日去皮臍十分冬月一錢

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水二盞

煎至一盞去粗空心溫服

○仁齋云下痢噤口不食者雖曰脾虛蓋亦熱氣閉

膈心胃間所致也俗用木香則失之溫用山藥

則失之閉惟真料參苓白朮散加石菖蒲末以

醫學正傳六卷之三

二十

道地粳米飲多年陳倉米尤佳溫調下或人參茯苓

石連子肉入些少菖蒲為末與之膏次一開自

然思食

其參苓白朮散本方該有宿砂或山入木香見內傷門

一子年將五十夏秋間得痢疾月餘服藥而少

愈穢積已但盡糟粕不食晝夜五六次入廁兼

脫肛不安又半月諸藥不効予記祖傳一方用

池塘中鱉一箇如法修事多用生薑米補作羹

入沙糖一小塊不用鹽醬熟煮吃一二碗三日

不登廁大腸自此實矣肛門亦收而不脫夫此

証蓋因脾土受虛致肺與大腸俱失化源之所
滋養是故大腸不行收令也此母能令子虛耳
驚乃介虫屬金而有土性溫能補脾肺又况肺
惡寒先得苓連等寒涼之味已多今月生姜之
辛以補肺金用沙糖之甘以補脾土肺氣既實
其大腸亦隨而實故得以行收令也故其功效
如是之驗焉

嘔吐十八

論

醫學正傳

卷之三

三十一

內經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於火東垣曰夫
嘔吐噦三者俱屬於胃胃者總司也以其氣血多
少為異耳嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有
物氣血俱病也吐者太陽也太陽多血少氣故有
物無聲血病也噦者少陽也少陽多氣少血故有
聲無物氣病也河間曰胃膈熱甚則為嘔火氣炎
上之象也吐証有三氣積塞也皆從三焦論之上
焦在胃口上通於天氣主納而不出中焦則中脘
上通天氣下通地氣主腐熱水穀下焦在臍下下

通地氣主出而不納是故上焦吐者皆從於氣氣
者天之陽也其脉浮而洪其証食已即吐渴欲飲
水太便秘結氣上衝膈而發痛其治當降氣和中
中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣相假為積
而痛其脉浮而長其証或先痛而後吐或先吐而
後痛治法當以毒藥去其積枳榔木香行其氣下
焦吐者皆從於寒地道也其脉沉而遲其証朝食
暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通治法當
以毒藥通其秘塞溫其寒氣大便秘通復以中焦
藥和之不令大便秘結而自愈也外有傷寒陽明
實熱太甚而吐逆者有內傷飲食填塞太陰以致
胃氣不得宣通而吐者有胃熱而吐者有胃寒而
吐者有久病氣虛胃氣衰甚聞穀氣則嘔噦者有
脾濕太甚不能運化精微致清痰留飲鬱滯上中
二焦時時惡心吐清水者宜各以類推而治之不
可執一見也

脉法

脉經曰嘔而脉弱小便復利身有微熱厥者難治

脾浮者胃氣虛寒氣在上嘔氣在下二氣相爭但出而不入其人即嘔而不得食恐怖即死寬緩即瘥

脉陽緊陰數其人食已則吐陽浮而數亦為吐

寸口脉緊而芤緊則為寒芤則為虛虛寒相搏脉

為陰結而遲其人則噎關上脉數其人則吐

脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐暮食朝吐變

為反胃寒在於上鑿反下之令脉反弦故名曰

虛

醫學正傳卷之五

二十三

寸口脉微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血

不足血不足則胸中冷故吐

方法丹溪方法九一十條

丹溪曰胃中有熱膈上有痰二陳湯加炒梔子姜

炒黃連生姜煎服

○凡嘔吐者切不可下逆之故也

○有久病吐者胃氣虛不納穀也生姜人參黃芪白

朮香附治之凡痞滿短氣而嘔宜補中氣止

用調中益氣湯

○肝火出胃逆上嘔吐抑青丸方見火門

○夏月嘔吐不止五苓散加姜汁入湯調服

○吐虫而嘔用黑錫炒成灰枳榔末米飲調服

○惡心吐清水者有熱有痰有虛皆用生薑隨証佐

藥治之

○胃中有熱者二陳湯加姜汁制炒黃連黃芩煨虛

者加人參白朮又云胃虛弱嘔者二陳湯加砂

仁霍香白朮

○痰飲為患或因多食生冷脾胃不和以致嘔吐惡

醫學正傳卷之五

二十四

太

心或頭眩或胃脘懊憹不快或發寒熱二陳湯

加丁香烏梅生薑煎服心下痞而痛者加草薢

薤仁

○痰熱惡心嘔吐氣盛者道痰湯加宿砂姜炒黃連

竹茹

○霍香安胃散治胃氣虛弱不能飲食時時嘔吐惡

心者

藿香

人參

陳皮各一錢

丁香半錢

右細切作一服水一盞煎至七分溫服

○和中桔梗湯治上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮而

洪宜先和中

桔梗一錢半 半夏麴二錢 陳皮去白一錢

枳實錢妙黃色 白茯苓一錢 白朮一錢半

原朴姜汁拌炒一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去渣取清

汁調木香散二錢空腹服三服後氣漸下吐漸

止然後去木香散加芍藥二錢黃芪一錢半煎

醫學正傳六 卷之三 二十五

服病愈則已如大便秘結食不盡下以大承氣

湯去芒硝微下之再服前藥補之如大便復結

又依前微下之

○木香散

木香

檳榔

各等分為細末前藥調之服

荆黃湯治暴吐上焦熱氣所衝脉浮而洪者

荆芥穗五錢 人參二錢半 甘草一錢

大黃一錢半

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗調檳榔散二錢空腹服

○檳榔散

檳榔一錢 木香一錢半 輕粉少許

右為細末用前藥調服為丸亦可用水浸蒸餅

丸如小豆大每服二十九丸食後服

○青鎮丸治上焦吐頭痛發熱有汗脉弦

柴胡二兩 黃芩七錢半 甘草五錢

半夏五錢 青代二錢半 人參五錢

醫學正傳六 卷之三 二十六

右為細末姜汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服

五十丸生薑湯送下食後服

○白朮湯治胃中虛損及有痰而吐者

半夏麴五錢 白朮二錢 檳榔二錢半

木香一錢 甘草一錢 茯苓二錢

右為細末每服二錢生薑湯調下食前服

○金花丸治吐食脉弦者肝乘於脾而吐乃由脾胃

之虛宜治風安脾

半夏湯泡七次一錢 檳榔二錢 雄黃一錢半

右為細末姜汁和蒸餅為丸如梧桐子大小兒丸如黍米大生姜湯送下從少至多漸加服之以止為度無羈絆於脾故飲食自下

○紫沉丸治中焦吐食由食積與寒氣相假故吐而痛宜服此藥

半夏麴二錢 烏梅肉二錢 代赭石三錢

杏仁去皮尖另研一錢 砂仁三錢 丁香二錢

沉香一錢 檳榔一錢 木香一錢

陳皮一錢 白荳仁半錢 白朮一錢

醫學正傳卷之三 二十七

巴荳霜另研半錢

右為細末入巴荳霜和勻醋麴糊為丸如黍米大每服五十丸食後生薑湯下吐愈則止小兒另丸如芝麻大治小兒食積吐食亦大妙

○小半夏湯治陽明傷寒不納穀而嘔吐不已者

半夏湯泡七次 生薑二錢

右細切水三盞煎至一盞去粗分作二服服之

○生薑汁半夏湯治胃中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心憤憤然無奈者

半夏湯泡洗七次 一兩

右細切水一盞半生薑自然汁半盞同煎至一盞溫服仲景曰嘔多雖有陽明証慎不可下孫思邈曰嘔家多服生薑乃嘔家之聖藥也氣逆者以辛散之故以生薑為主治之

○藿香平胃散治內傷飲食填塞太陰嘔吐不已

藿香一錢 厚朴姜制一錢半 蒼朮一錢半

陳皮一錢 甘草炙三分 砂仁半錢研

神麴半錢炒

醫學正傳卷之三 二十八

右細切作一服加生薑五片大棗一枚水一盞半煎至一盞去粗溫服

○胃苓湯治証同前

平胃散加五苓散加姜棗水煎服之

○黃連六一湯治因多食煎煇燒餅熱麴之類以致胃脘當心而痛或嘔吐不已漸成反胃

黃連六錢 甘草炙一錢

右細切作一服水一大盞煎至七分去粗溫服

○丁附治中湯治胃傷寒冷之物致心腹疼痛而嘔

錢不止

人參五分 白朮一錢 乾姜一錢

甘草三分 陳皮 青皮

丁香各一錢 附子二錢

右細切作一服加生姜五片大棗二枚水一盞
半煎至一盞去粗溫服

○加味二陳湯治胃中有伏火膈上有稠痰時常胃

口作痛及惡心吐清水不快

陳皮去白一錢 半夏泡一錢 茯苓一錢

醫學正傳卷之三 二十九

甘草炙三分 梔子炒一錢 黃連姜汁拌炒一錢

川芎一錢 白朮一錢 乾姜炒半錢

蒼朮一錢 香附一錢 牡荊子炒另研一錢半

挾虛者加人參一錢

右細切作一服水二盞加生姜三片煎至一盞

稍熱服如胃口痛甚入生姜自然汁一合和勻

服

○丁香安胃湯治嘔吐噦胃虛寒所致

丁香半錢 吳茱萸一錢 草豆蔻一錢

黃芪二錢 人參一錢 炙甘草半錢

柴胡半錢 升麻 當歸身

陳皮各半錢 黃柏二分 蒼朮一錢

右細切作一服水一大盞煎至七分食前溫服

茯苓半夏湯治脾胃虛弱身重有痰惡心欲吐風

邪羈絆於脾胃之間當先實其脾土

白朮一錢 茯苓一錢 半夏一錢

神麴一錢炒 橘紅七分 天麻七分

麥蘖麴炒黃色一錢二分

右細切作一服水一盞半加生姜五片煎至一

盞熱服

○丹溪活套云胃中有熱膈中有痰令人時常嘔吐

清水作噦氣吞酸等証用二陳湯加姜炒黃連

梔子蒼朮川芎香附砂仁神麴山查少加木香

以行滯氣加姜水煎服。久病虛者加人參白

朮。胃寒者加益智草豆蔻乾姜桂心之類去

黃連梔子又甚者加丁香附子。如脇痛或脾

痛關脉弦嘔吐不已此木來土之分也本方加

人參白朮升麻柴胡青皮芍藥川芎砂仁神麴之類。如時常吐清水或口甘不喜食冷涎自下而湧上者此脾熱所致也。本方加白朮芍藥升麻土炒芩連梔子神麴麥芽乾生薑或丸或煎皆可。如時常惡心吐清水心胃作痛得食則漸止饑則甚者此胃中有虵也。本方加苦練根使君子煎服即愈。或用黑錫灰枳榔末等分米飲調下。

在城黃氏婦將年三十產後因食傷致胃虛不納

醫學正傳

卷之三

三十一

穀四十餘日矣聞穀氣則惡心而嘔聞藥氣亦嘔求予治予曰藥不能入口又將何法以治之乎懇求不已遂制一方用人參白朮茯苓各一錢甘草二分陳皮藿香砂仁各伍分炒神麴一錢十年以上陳倉米一合順流水二大盞煎沸泡伏龍肝研細攪渾放澄清取一盞加姜棗同煎前藥至七分稍冷此藥遂納而不吐別以陳倉米煎湯時時與之日進前藥二三服漸能吃粥而安後以此法治十數人皆驗

論

噎膈十九

內經曰三陽結謂之膈子和云三陽者大小腸膀胱也結謂熱結也小腸熱結則血脈燥大腸熱結則不能圓膀胱熱結則津液涸三陽既結則前後閉塞下既不通必反而上行所以噎食不下縱下而復出也此陽火不下降而上行也故經又曰少陽所至為嘔湧噎食不下此理明矣又先哲論膈噎反胃大率以血液乾槁其或咽喉窒塞食不能下其槁在吸門或食下則胃脘當心而痛須臾吐出食出痛止其槁在貫門此皆上焦之膈噎也其或食物可下良久復出其槁在幽門此中焦之膈噎也其或朝食暮吐暮食朝吐其槁在蘭門大小腸之間此下焦之膈噎也雖然亦有斯須輕病而為醫所誤者川溪論之詳矣謂夫氣之初病其端甚微或因些少飲食不謹或外冒風雨內傷七情或食味過厚偏助陽氣積成膈熱或資稟充實表裏無汗或性急易怒相火上炎以致津液不行清

醫學正傳

卷之三

三十二

濁相干惟氣之為病或痞或痛或不思食或噫腐
吞酸或嘈雜痞悶鑿者不求其本便認為寒遽以
辛香燥熱之劑投之時暫得快以為神方厚味仍
前不節七情反覆相侵舊病被劫暫開濁液易於
攢聚或半月或一月前証復作如此延蔓自氣成
積自積成痰此為痰為飲為吞酸之由也良工未
遇謬藥又行痰挾瘀血遂成窠囊此為痞為痛為
嘔吐膈噎反胃之次第也鑿者尤謂虛而積寒非
尋常草木可療竟以烏附助佐丹劑專意服餌積
而久也血液俱耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下
水飲可行食物難入間或可入食亦不多名之曰
噎其槁在下與胃為近食雖可下難盡入胃良久
復出名之曰膈亦曰反胃大便秘小若羊屎然名
雖不同病出一體又曰噎病生於血乾血陰也陰
主靜內外兩靜則藏府之火不起而金水二藏有
養陰血自生腸胃津液傳化合宜何噎之有醫者
當知此意不可妄以燥熱之劑以火濟火則何以
異刺人而殺之也慎之慎之

醫學正傳六卷之三 三十三

法
脉經曰寸緊人澁其人胃滿不能食而吐止者
為下之故不能食誤言未止者此為反胃故尺
為微澁也
寸口脉紫而扎緊則為寒扎則為虛虛寒相搏脉
為陰結而遲其人則噎閉上脉數其人則吐脉
弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐暮食朝吐變於
胃反寒在於上鑿反下之令脉反弦故名曰虛
跌陽脉浮而澁浮則虛澁則傷脾脾傷則不磨朝
食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脉紫而
澁其病難治
脉滿而小血不足 脉大而弱氣不足
方法
丹溪曰大率屬血虛氣虛有痰
戴氏曰氣虛者脉必緩而無力血虛者脉必數而
無力痰者寸關脉必沉或伏而大有氣滯結者寸
關沉而滿
○張雞峯曰噎當是神思間病惟內觀以自養可安
此言深中病情

醫學正傳六卷之三 三十四

○屎如羊屎者不治大腸無血故也年高者不治年五十余則不可治矣

戴氏曰氣血俱虛者則口中多血沫但見沫大出者必死不治

○治法用童便韭汁竹瀝姜汁牛羊乳一本有氣虛

入四君子湯血虛入四物湯切不可用香炒藥

宜薄滋味

○一法用黃連三錢姜汁炒山查肉二錢保和丸二錢

同為末糊丸麻子大胭脂胚子為衣人參湯入

竹瀝下五十九

○一方用馬鮑兒燒存性陳米湯調服即野田瓜北

醫學正傳卷之三 三十五 書馬剝兒誤也

○一云馬鮑兒燒存性一錢好棗肉四枚平胃散二

錢溫酒調服食即可下然後隨病源調理

○一方用吳茱萸黃連貝母瓜蒌子牛轉草丸服

○一方用韭汁二兩牛乳一盞生姜半兩搗汁和勻

頓服効

○有氣結者用開導之劑有陰火上炎者作陰虛治

有積血者當消息去之韭汁能下膈上瘀血

○古方用人參以補肺御米以解毒竹瀝以清痰乾

姜以養血粟米以實胃蜜以潤燥姜以去穢有

治寒者必為當時有實因於寒者用之也挾寒

者間或有之今人悉因痰氣久誤於醫傳變而

成其無寒也明矣

○瓜婁實丸治膈噎噎膈痞滿微背脇喘急妨悶

瓜婁實去壳別枳殼去穢半夏湯泡七次

桔梗炒各一兩

右為細末姜汁米糊為丸如梧桐子大每服五

十九生薑湯送下

醫學正傳卷之三 三十六

○寬中進食丸滋形氣喜飲食方見內傷門

○人參利膈丸治膈噎胃中不利大便結燥痰嗽喘

滿脾胃壅滯推陳致新治膈氣之聖藥也

木香 檳榔各七錢 人參

當歸 藿香 甘草

枳實炒黃各一兩 大黃 酒濕蒸熟 厚朴 姜製一兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五十九

溫水下

○丹溪活套云凡膈噎反胃悉用二陳湯加姜汁竹

瀝童便韭汁之類為主治。如胃中覺有熱悶
 本方加土炒黃連黃芩瓜蒌仁桔梗之類。如
 血虛瘦弱之人本方合四物湯少加杏仁泥紅
 花童便韭汁之類仍不可缺。如飲酒人本方
 加沙糖麥入內服。如朝食暮吐暮食朝吐
 或食下須臾即吐者此胃可容受而脾不能傳
 送也或大小腸秘結不通食返而上奔也本方
 多加酒蒸大黃桃仁之類以潤之脾不磨者本方
 加麥蘖麴神麴之類以助化之。如氣虛肥白
 人膈噎者本方合四君子湯亦加竹瀝姜汁為
 要藥也。有因七情鬱結成氣噎者本方加香
 附撫芎木香枳榔枳實砂仁之類。凡膈噎
 大便燥結用大黃乃急則治其標之劑也仍用
 四物湯加童便韭汁多飲牛羊乳為上策也但
 不可以人乳代之蓋人乳內有飲食烹飪之火
 及七情之火存於中故不可代服也
 祖傳經驗秘方潤腸膏治膈噎大便燥結飲食良
 久復出及朝食暮吐暮食朝吐者其功甚捷

新取威靈仙四兩搗汁四五 生姜四兩搗汁
 真麻油二兩 白砂蜜四兩煎沸掠出上清
 右四味同入銀石器內攪勻慢火煎候如錫時
 時以筴挑食之一料未愈再服一料決効
 經驗大力奪命丸治膈噎不下食及翻胃等証
 杵頭糠 牛轉草各半斤 糯米一斤
 右為細末取黃母牛口中涎沫為丸如龍眼大
 入鍋中慢火煮熟食之加沙糖二三兩入內丸
 尤佳
 一方治噎膈久不納穀者
 隔年炊飯乾不拘多少
 右一味以急流順水煎煮糜爛取濃汁時時與
 之待能食後以調脾進食生血順氣之藥調治
 而安
 〇稻溪金賢九里年五十三夏秋間得噎証胃脘痛
 食不下或食下良久復出大便燥結人黑瘦殊
 甚求予治診其脉右手關前弦滑而洪關後畧
 沉小左三部俱沉弦又帶芤予曰此中氣不足

本表併土上焦濕熱結成痰下焦血少故大

便燥結陰火上衝吸門故食不下用四物以生

血用四君子以補氣用二陳以祛痰三合成劑

加姜炒黃連炒枳實括萎仁少加砂仁又間服

潤腸丸或服丹溪墜痰丸半年服前藥百餘貼

病全安

○梅林駱氏婦予妻嬌也年四十九身材畧瘦小勤

於女工得瞞噫証半年矣飲食絕不進而大便

結燥不行者十數日小腹隱隱然疼痛求予治

診之六脉皆沉伏予以生桃仁七箇令細嚼杵

生韭汁一盞送下片時許病者云宵中畧見寬

舒以四物湯六錢加括萎仁一錢桃仁泥半錢

酒蒸大黃一錢酒紅花一分煎成正藥一盞取

新溫羊乳汁一盞合而服之半日後下宿糞若

干明日腹中痛止漸可進稀粥而少安後以四

物湯出入加減合羊乳汁服五六十貼而安

二訖逆

讀書既與訖通氣上逆作聲之名也古

逆亦有書為吃逆者皆誤也 訖於立切

論

內經曰諸逆衝上皆屬於火丹溪曰鉅病氣逆也

以其氣自臍下直衝上出於口之名也東垣謂

火與元氣不兩立又謂火為元氣之賊古方悉

以胃弱言之而不及火且以丁香柿蒂竹筴陳

皮等劑治之未審孰為降火孰為補虛人之陰

氣依胃為養胃上損傷則木來侮之矣謂之土

敗木賊也陰為火所乘不得內相木挾相火之

勢故其氣直衝清道而上言胃弱者陰弱也虛

之甚也病者見此以為危証依正法而治之者

尚不能保其一二而况誤醫者乎雖然亦有因

實而為鉅者不可不審或因飲食太過填塞胃

中而氣不得升降者或有痰閉於上火起於下

而氣不得伸越者有為傷寒熱病陽明內實過

期而失下清氣不得升降濁氣不得降以致氣不

宣通而發鉅者凡若此者皆實証也醫者宜專

心致意察審虛實而調治之不可妄為處治以

天人之天年也幸甚

脉法

脉浮而緩者易治弦急而按之不鼓者難治

脉結或促或微皆可治 脉代者危

右關脉弦者木乘土位難治

方注丹溪方法

丹溪曰大率有痰有氣虛有虛火上衝視有餘不

足治之

○痰與食在上者吐之人參芦稀涎散之類

○不足者補之人參白朮煎湯下大補丸

醫學正傳

卷之三

四十一

○痰用陳皮半夏氣虛用人參白朮陰火用黃連黃

柏滑石或吐或補隨証施治

○飢逆自利滑石甘草黃柏芍藥人參白朮陳皮加

竹瀝服

○痢疾發餒用人參白朮煎湯調益元散頻服自止

○陳皮竹茹湯治傷寒餘熱未解氣虛發餒

甘草炙一錢 人參二錢 陳皮去白三錢

青竹茹四錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎服

○橘皮半夏生薑湯治氣虛有痰發餒

陳皮 半夏 乾生薑

人參 通草各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去渣溫服

○六君子湯治痰挾氣虛發餒

陳皮一錢 半夏一錢 茯苓一錢

甘草五分 人參一錢 白朮一錢

右細切作一服加大棗二枚生姜三片新汲水

煎服

醫學正傳

卷之三

四十二

○丹溪活套云凡傷寒發餒有四証不可不辨有中

氣不足脉虛微氣不相續而發餒者宜用補中

益氣湯加生脉散黃柏以降虛火或少加附子

服之立愈有陽明內實失下而發餒者宜大承

氣湯下之而愈有渴而飲水太過成水結胃而

又發餒者宜小陷胃湯或用小青龍湯去麻黃

加附子治水寒相搏發餒大妙有傳經傷寒熱

証鑒者誤用姜桂等熱藥助起火邪痰火相搏

而為咳逆者宜用黃連解毒白虎湯及竹瀝之

類治之

○祖傳經驗灸咳逆法

乳根二穴直乳下一寸六分婦人在乳房下起肉處陷中灸七壯即止其効如神

又氣海一穴直臍下一寸半灸三七壯立止

東陽李氏子病傷寒陽明內實雖與補藥治而或發熱十日後召予診其脉長而實大并大氣湧入下之熱退而脈亦止盤松周氏子得傷寒証七日熱退而脈連聲不絕舉家徬徨召予診脉六脉皆沉細無力人倦甚以補中益氣湯作大劑加炮附子一錢一日三貼熱與氣根氣海三處當日施止脉亦充而平安

醫學正傳卷之三

平三

VIII

吞酸二十一

論

內經曰諸嘔吐酸皆屬於熱惟李東垣獨以為寒

誠一偏之見也河間原病式曰酸者肝木之味

也由火盛制金不能平木則肝木自甚故為酸

也如飲食熱則易於酸矣是以肝熱則口酸也

或言為寒者但謂傷生冷硬物而喜噫醋吞酸

故俗醫主於溫和脾胃豈知人之傷於寒也則

為病熱蓋傷寒皮毛則腠理閉密陽氣怫鬱而

為熱証故傷寒熱在表而以麻黃湯熱藥發之

使腠理開通汗泄熱退而愈也凡內傷冷物者

或但陰勝陽而為病寒或寒熱相搏怫鬱而為

病熱亦有內傷冷物而反病熱得汗泄熱退身

涼而病愈也或微而止為中酸俗謂之醋心法

宜溫藥散之亦猶傷寒解表之義若久喜酸不

已則不宜溫宜以寒藥治之後以涼藥調之結

散熱去則氣和矣所以中酸不宜食粘滑油膩

者謂能令氣鬱不通暢如食物在器覆蓋熱而

自酸宜食糲食菜蔬能令氣之通利也曰寒曰

熱於斯明矣學者詳之

脉法

脉弦而滑 兩手或浮而弦或浮而滑或沉而

遲或緊而洪或洪而數或沉而遲胃中有寒飲

洪數者痰熱在膈間時吐酸水欲成胃反也

方法丹溪方法
凡七條

○茱萸丸

吳萸丸去梗湯泡
浸半日陳皮去白黃芩陳壁土炒
為末

黃連

土炒一兩 蒼朮米泔浸七錢半

右為細末神麴糊丸如菽豆大每服二三十丸

津唾嚥下一方萊菔連二味隨時令寒熱迭為

佐使

與月倍萊菔
熱月飲本方

蒼朮茯苓為補助湯浸蒸餅為小丸吞之

○治酸必用萊菔順其性而折之

○食齏有痰二陳湯加南星黃芩之類

○加味平胃散治吞酸因食齏所致

生料平胃散加炒神麴炒麥芽姜棗同煎

醫學正傳

卷之三

四十五

附

○酸味宜節厚味必疏食自養則病易安

○吐清水用蒼朮

陳壁
土炒

茯苓滑石

炒

白朮陳皮煎服

○參朮丸上可治吞酸下可治自利又云治濕而氣

滯者濕熱甚者用之為鄉導

六一散

一料

吳茱萸

一兩制

右為飯丸服

○藿香安胃散治脾胃虛弱飲食入胃嘔吐作酸不

待腐熟

藿香

丁香

人參各二錢半

陳皮 五錢

論

痞滿二十三

內經曰備化之紀其痞又曰太陰所至為積飲

痞膈夫痞滿之証東垣論之詳矣謂太陰濕土主

壅塞乃土來心下為痞滿也傷寒下之太早亦為

痞滿乃寒傷榮血而然心主血邪入於本故為心

下痞仲景以瀉心湯用黃連瀉心下之土邪功効

甚速非止傷寒為然至於酒積雜病下之太過亦

作痞滿蓋下多則亡陰也亡陰者謂脾胃水穀之

陰亡也故育中之氣因虛而下陷于心之分野故

心下痞宜升胃氣以血藥治之若全用利氣之藥

導之則痞尤甚痞甚而復下氣愈不降必變為中

滿鼓脹皆非其治也又有虛實之異如實痞大便

秘者厚朴枳實主之虛痞大便利者芍藥陳皮主

之如飲食所傷而為痞滿者宜消導其胃中窒塞

之氣上逆无无欲吐者則宜吐之所謂在上者因

而越之是也學者宜詳究焉

右為細末每服二錢加生薑水煎溫服

○加減二陳湯治痰飲為患嘔吐頭眩心悸或因食生冷硬物脾胃不和時吐酸水

丁香 半錢 半夏 陳皮 各二錢半

茯苓 一錢半 甘草 七分半

右細切作一服加生薑三片水煎服

○三因麴朮丸治中脘宿食留飲酸蜇心痛吐清水

神麴 炒三兩 蒼朮 米泔浸一兩半 砂仁 一兩

陳皮 去白一兩

醫學正傳 卷之三

右為細末生薑汁別煮神麴糊為丸如梧桐子

大每服七十九姜湯送下

○祖傳經驗治吞酸方

用黃連吳茱萸各一兩右以黃連細切同茱萸

以井花水浸七日去連將茱萸焙乾每日清晨

以米湯下四十九粒

嘈雜噯氣 二十二

論

內經曰胃為水穀之海無物不受若夫濕麵魚腥

水菓生冷以及烹飪調和粘滑難化等物恣食無

節朝傷暮損而成清痰稠飲滯于中宮故謂嘈雜

噯氣吞酸痞滿甚則為翻胃膈壅即此之由也夫

嘈雜之為証也似饑不饑似痛不痛而有懷懷不

自寧之况者是也其証或兼噯氣或兼痞滿或兼

惡心漸至胃脘作痛乃痰火之為患也治法以南

星半夏橘紅之類以消其痰痞連梔子石膏知母

之類以降其火痞不白朮芍藥之類以健脾行濕

壯其本元又當忌口節慾無有不妥者也

醫學正傳 卷之三

脉法

右寸關脉緊而滑 兩寸弦滑胃中有留飲

寸脉橫者膈上有橫積也。右關弦急甚者木乘

土位欲作胃反難治

方法 丹溪方法

丹溪曰此為食積有熱炒梔子姜炒黃連乃必用

之藥也

○肥人宜二陳湯少加撫芩蒼朮白朮梔子

○若濕痰氣滯不喜食用三補丸加蒼朮倍香附

○三聖丸治嘈雜神効

白朮 四兩

黃連 五錢

橘紅 一兩

右為細末神麴糊丸如蒸豆大每服五十九津
瀉下或姜湯下

木連丸治嘈雜

白朮 四兩

黃連 四錢半

右為細末神麴糊丸如黍米大津瀉下

軟石膏丸治噯氣嘈雜

南星 炮製

半夏 湯洗

軟石膏 煨

香附 童便浸透 梔子 炒

後四七

右各等分為細末粥丸如梧桐子大每服五十

丸姜湯下

麴朮丸治中脘有飲則嘈宿食則酸方見吞酸門

大抵嘈雜是痰因火動令人心嘈似飢非飢有積

有熱也宜用山梔子黃連煨計為君南星半夏

陳皮為臣熱多加青代若食鬱有熱梔子與姜

炒黃連不可無

脈法

脈經曰痞脈浮堅而下之緊反入裏因作痞

脈濡弱弱及在關濡反在顛微反在上澁反在下

微則陽氣不足澁則無血陽氣反微中風汗出而

燥煩澁則無血厥而且寒陽微不可下下則心下

痞堅

右關脈多弦弦而遲者必心下堅此肝木熱脾土

府氣不舒

方法丹溪方注

丹溪曰痞滿與脹滿不同脹滿內脹而外亦形痞

則內覺痞悶而外無脹急之形也蓋由陰伏陽

蓄氣血不運而成位心下之中膜滿痞塞皆土

邪之所為耳有因誤下裏氣虛和乘虛而入於心之分野有因食痰積不能施行鬱而作痞者有濕熱太甚土來心下而為痞者

○用黃連黃芩枳實之苦以泄之厚朴生姜半夏之辛以散之人參白朮之甘溫以補之茯苓澤瀉之鹹淡以滲之大藥與濕同治使上下分消可也

○厚朴溫中湯治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛時發時止

厚朴姜汁製炒 陳皮去白各一錢 茯苓

草薢各半錢 甘草

乾生薑一錢 右細切水煎服

○木香順氣湯治腹脹心腹滿悶

木香 益智 陳皮

蒼朮 草薢各半錢 厚朴姜製

青皮各四分 茯苓 澤瀉

半夏各六分 乾生薑 萊菔各三分

當歸 人參各五分 升麻

茶胡各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○痞有痰挾血成窠囊者用桃仁紅花香附大黃之類治之

○七氣湯治七情所傷憂思鬱結府藏氣不和平心腹痞悶

半夏 茯苓各二錢 厚朴姜製一錢

紫蘇葉一錢

右細切作一服加生薑三片水一盞半煎至一

盞溫服

○大消痞丸治一切心下痞及年久不愈者

乾生薑 神麴炒 甘草炙各二錢

猪苓二錢半 澤瀉 厚朴姜汁拌炒

砂仁各三錢 半夏湯泡七次 陳皮去白

人參各四錢 枳實五錢去穢 黃連陳壁炒去

黃芩如連制 姜黃 白朮各一兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五

十九至百九空心白湯下

○失咲丸一名枳實消痞丸治右關肝弦心下虛痞惡食懶

倦開胃進食

乾生薑一錢

北草炙

麥蘖麴炒

白茯苓

白朮各二錢

半夏麴

人參各三錢

厚朴姜制四錢

枳實麴炒黃色

黃連各五錢

右為細末蒸餅丸如梧桐子大每服七八十九

白湯下

○消痞湯一名木香化滯湯治因憂氣鬱結中脘腹皮裏微

醫學正傳卷五十一

痛心下痞滿不思飲食

川歸

枳實炒各四分

陳皮

生薑

木香各六分

柴胡七分

甘草炙

草薺麴各一錢

半夏一錢半

紅花一分

右細切作一服加生薑三片水二盞煎至一盞

溫服

○黃連消痞丸治心下痞滿壅滯不散煩熱喘促不

安

澤瀉

姜黃各一錢

乾生薑二錢

北草炙

茯苓

白朮各三錢

陳皮五錢

猪苓去黑皮五錢

枳實麴炒黃色

半夏湯泡七次

黃連一兩

黃芩二兩炒

右為細末蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九

白湯下

○黃芩利膈丸除胃中熱利膈上痰

生黃芩

炒黃芩各一兩

黃連各五錢

澤瀉五錢

南星

醫學正傳卷五十一

枳殼麴炒去穢

陳皮去白各三錢

白礬一錢

今加蘿蔔子五錢炒

小皂角一錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五

十九白湯下忌酒濕麴魚腥

○丹溪活套云凡心下痞滿須用枳實黃連○如肥

人心下痞內有濕飲宜蒼朮半夏礬砂茯苓滑

石之類○如瘦人心下痞乃鬱熱在中焦宜枳

實黃連以導之葛根升麻以發之○如人飲食

後因胃風寒飲食不消而作痞滿宜吳茱萸湯
砂礬齊草豈菹之類溫以化之○如脾氣虛弱
轉運不調飲食不化而作痞者宜白朮山查神
麴麥芽之類以消之○又曰痞滿之証不一有
傷寒下早而作痞者枳殼桔梗湯小陷胷湯之
類○有因飲食填塞胷中而作痞者保和丸東
垣枳實導滯丸木香化滯湯之類○傷寒下多
則亡陰而痞者四物湯加參苓白朮升麻柴胡
少佐以陳皮枳殼之類監之○或大病後元氣
未復而胷滿氣短宜補中益氣湯陳皮枳朮丸
木香枳朮丸之類○夫痞滿之証不可執一全
在活法詳脉証虛實而調之可也

山頭沈三十一丈年三十餘身材肥盛夏秋間因
官差丈量田地辛苦至冬間得痞滿証兩脇氣
攻胷中飽悶不能臥欲成脹滿証歷數醫者皆
與疎氣耗散之藥皆不効十一月初旬召予診
治兩手關前皆浮洪而弦滿兩關後脉皆沉伏
予曰此膈上有稠痰脾土之氣敦阜肝木鬱而

不伸常用吐法木鬱達之之理也奈何值冬月
降沉之令未可行此法且先與豁痰疎肝氣經
脾胃敦阜之氣用平胃散加半夏茯苓皮川
芎草龍胆香附砂仁柴胡黃連瓜蒌仁等藥病
退之十有三回待次年二月初旬為行倒倉法
平安

腫脹二十四

論

內經曰諸濕腫滿皆屬於脾又曰諸腹脹大皆屬
於熱夫脾虛不能制水水漬妄行故通身面目手
足皆浮而腫名曰水腫或腹大如鼓而面目四肢
不腫者名曰脹滿又名鼓脹皆脾土濕熱為病腫
輕而脹重也丹溪曰心肺陽也居上腎肝陰也居
下脾居中亦陰也屬土經曰飲食入胃滯滯精氣
上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀
胱水精四布五經並行是脾具坤靜之德而有乾
健之運故能使心肺之陽降腎肝之陰升而成天
地交之泰是為平人今也七情內傷六淫外侵歎

金一節勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失職
 胃雖受穀不能運化故陽自升陰自降而成天地
 不交之否清濁相混經道壅塞濕鬱為熱熱又生
 濕濕熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以其外雖
 堅滿中空無物有似於鼓膠固難治又名蠱者若
 虫侵蝕有蠱之義理宜補脾又須養肺以制木使
 脾無賊邪之慮滋腎以制火使肺得清化之令卻
 菹味以防助邪斷妄想以保母氣遠音樂戒暴怒
 無有不安醫者不察急於獲効病者苦於脹滿喜
 行利藥以求通快殊不知寬得一日二日腹脹愈
 甚真氣已傷去死不遠矣俗謂氣無補法者以其
 痞滿壅塞似難於補不思正氣虛而不能運行邪
 氣着而不出所以為病經曰壯者氣行則愈怯者
 著而成病氣虛不補邪何由退病何由安且此病
 之起固非一年根深蒂固欲取速効自求禍耳知
 王道者可與語此其或受病之淺脾胃尚壯積滯
 不遇者惟可累功疎導而不可峻與利藥也
 愚按先生此論詳明於書誠千古不易之定議
 也及觀東垣脹滿論又以歲寒生滯病之說

脉法
 脉經曰其脉大堅以滿者脹也
 脉經曰關上脉虛則內脹 遲而滑者脹
 脉盛而緊者脹 虛而緊滿者脹
 或弦而遲或浮而數皆脹也
 丹溪曰水腫脉多沉伏病陽水兼陽証脉必沉數
 ○病陰水兼陰証脉必沉遲○煩滿小便赤澀
 大便秘結此為陽水○不煩滿大便溲小便少
 而不赤澀此為陰水
 脉沉而滑為風水
 脉浮而遲弦而緊皆為腫也
 水病腹大如鼓脉實者虛者死洪大者生微細
 者死
 腹脹便血脉大時絕劇脉小疾者死
 中惡腹大四肢滿脉大 有生浮而緊者死
 緊而微者死
 唇腫齒焦者死 平唇腫而蒼黑者死

掌腫無紋者死 臍腫凸出者死

鉄盆平者死 陰囊墜俱腫者死

脉絶口張足腫者死 足跌腫膝如斗者死

方法 丹溪方法

丹溪曰古方惟禹餘糧丸制肝補脾殊為切當然亦須隨時隨証加減一友人得脈疾自制此藥服之予曰溫熱藥多且煨煉之火尚存宜自加減彼不聽服之一月口鼻出血骨立而死

○朝寬暮急血虛暮寬朝急氣虛朝暮急氣血俱虛

醫學正傳 卷之三 五十七

○治腫脹大法宜補中行濕利小便以人參白朮為

君蒼朮陳皮茯苓為臣黃芩麥門冬為使以制肝木少加厚朴以消腹脹氣不運加水香木通氣下陷加升麻柴胡提之血虛加補血藥痰盛加利痰藥隨証加減用之無不効者

○盧氏醫鏡以水腫隸於腎肝胃而不及脾又肺金盛而生水水溢妄行豈理也哉夫脾土受病肺為之子固不能自盛而生水然肺金氣清而能生水則滋長腎陰奉行降令為生化之源何病

腫之有今為腫之水乃腐濁之氣滲透經絡流

注谿谷灌入縫道血亦因之而化水欲藉脾土

以制之通腎氣以利之殊不知脾病則金氣衰

木寡於畏而來侮土脾欲不病不可得矣治法

宜清心經之火補養脾土全運化之職肺氣下

降滲道開通其精氣之清者復回而為氣為血

為津液收濁者在土為汗在下而為溺以漸而

分清矣

○腰已上腫者宜發汗腰已下腫者宜利小便此仲

醫學正傳 卷之三 五十八

景之法

○東垣曰宜以辛散之以苦瀉之以淡滲利之使上

下分清其濕正所謂開鬼門潔淨府開鬼門者

謂發汗也潔淨府者利小便也

○產後浮腫必大補氣血少佐以蒼朮茯苓使水自

降大劑白朮補脾壅滿者用半夏陳皮香附

鹽有熱當清肺金麥門冬黃芩之屬

○熱水腫用山梔子仁炒為末米飲調下三五錢若

胃脘熱病在上者連殼用

○禹餘糧丸治中滿氣脹喘滿及水氣脹

蛇含石 三兩煨 針砂 五兩 禹餘糧 三兩同炒

已上三味為主其次量人虛實入下項藥

木香 牛膝 蓬莪朮

白茯苓 桂心 川芎

茴香 白芷仁 三稜

羌活 茯苓 乾姜

青皮 陳皮 附子

當歸 各伍錢

醫學正傳卷之三 五十九

右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十

丸空心溫酒下

○絜矩三和湯

陳皮 去白 柴蘇 甘草 炙各七分

厚朴 姜製 枳櫚 白朮 各一錢

海金沙 四分 木通 二分

右細切作一服加生薑三片水煎服

○濟生紫蘇湯專治憂慮過度致傷脾肺心腹脹滿

喘促治腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉

而緊瀯

紫蘇子一錢研白朮二錢 人參一錢

大腹皮酒洗淨草菓仁 半夏

厚朴 木香 陳皮

枳殼 麩炒黃色 甘草 炙各五分

右細切作一服加生薑三片大棗一枚水煎溫服

○木香順氣湯治濁氣在上則生腹脹

木香 三分 厚朴 四分 青皮

醫學正傳卷之三 六十

陳皮 益智 茯苓

澤瀉 乾生薑 半夏 各二分

吳茱萸 湯泡二分 川歸 五分 升麻

柴胡 各一分 草薺 三分 蒼朮 五分

白朮一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

○中滿分消丸治中滿鼓脹氣脹水脹熱脹

黃芩 去朽細切酒拌 黃連 枳實 麩炒黃色

半夏 湯泡七次去皮 姜黃 白朮

人參	各二錢半	甘草	炙	猪苓	去黑皮各一錢
乾生薑		白茯苓		砂仁	各二錢
厚朴	姜制五錢	知母	去毛酒炒	澤瀉	
陳皮	去白各三錢				
右為細末蒸餅糊丸如梧桐子大每服百丸煨熱白湯或淡姜湯下					
○廣木漬堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐卧不寧二便澀滯上氣喘促或通身虛腫					
厚朴	姜制	黃芩		黃連	
益智		草薢	薢	當歸	各五分
半夏	七分	廣木		升麻	
紅花		吳茱萸	各二分	生甘草	
柴胡		澤瀉		神麴	炒
青皮		陳皮	各三分	渴加乾葛	四分
右細切作一服加生薑三片水二盞煎七分溫服食遠忌酒醋濕麪二服之後中滿減半止有積塊未消再服後藥					
○半夏厚朴湯					

紅花		蘇木	各十分	木香	
青皮	各二分	吳茱萸		乾生薑	
黃連	各一分	肉桂		蒼朮	
白茯苓		澤瀉		柴胡	
陳皮		生黃芩		草薢	薢
生甘草	各三分	京三稜		當歸	梢
猪苓		升麻	各四分	神麴	炒六分
厚朴	姜制八分	半夏	湯炮三錢	桃仁	七箇去皮
昆布		如渴加乾葛	三分		
右細切作一服水三盞煎至一盞稍熱服服此藥二貼之後前証又減一半却於前藥中減服之					
○破滯氣湯一名木香破滯氣心腹滿悶					
甘草	炙一分	白檀香		藿香	
陳皮		大腹子		白芷	薢
白茯苓		桔梗	各二分	砂仁	
人參		青皮		檳榔	
木香		美真		白朮	各四分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服不拘時候

○草菑慈湯治腹中虛脹

澤瀉一分 木香三分 神麴四分

半夏泡 枳實麩炒 草荳蔻

黃芪春夏不用 益智 甘草各五分

青皮 陳皮各六分 茯苓

當歸各七分

右細切作一服加生姜三片水二大盞煎至一

醫學正傳卷之三

六十三

盞溫服冬月加黃芪五七分春夏止服正藥食

遠溫服

○葶藶木香散治濕熱內外甚水腫腹脹小便赤澀

太便滑泄此藥下水濕消腫脹止瀉利小便之

藥聖也

葶藶子 茯苓去皮 猪苓去皮

白朮各二錢半 木香半錢 澤瀉

木通 甘草各五錢 辣桂二錢半

白滑石三兩

右為細末每服三錢白湯調下食前服

○白朮木香散治喘嗽腫滿欲變成水病者不能卧

不敢多食小便閉而不可通者

白朮 木猪苓去皮 甘草

澤瀉 木通 赤茯苓各五分

木香 檳榔各三分 陳皮去白二錢

官桂二分 滑石二錢

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一

盞溫服

醫學正傳卷之三

六十四

○三氣散治水氣蠱脹滿悶

白丑 黑丑各二錢

右為細末外用大麥麴四兩同一麴拌勻做燒

餅臨卧用茶清一盞下降氣為驗

○葶牛丸治一切濕熱腫滿等証 大黃 黑丑

椒目 滑石各等分 黃芩

右為細末酒煮麴糊為丸如梧桐子大每服五

九至七九生薑湯下食後服看虛實加減丸數

○三花神祐丸治中滿腹脹喘嗽淋瀝一切水濕腫

滿濕熱腸垢陳積變生諸疾久病不已黃瘦困
倦氣血壅滯不得宣通或風熱燥鬱肢體麻痺
走注疼痛風痰涎嗽頭目眩運癰疾不已癥瘕
積聚堅滿痞悶酒積食積一切痰飲嘔逆及婦
人經病不快帶下淋瀝無問赤白併男婦傷寒
濕熱腹滿實痛久新瘦弱俗不能辨兼瀉新舊
腰痛併一切下痢及小兒驚疳積熱乳癖腹滿
並宜服之

甘遂

大戟

芫花

醋拌濕炒
各五錢

黑丑

二兩取頭
末一兩淨

大黃

一兩

輕粉

一錢為研

右為細末同輕粉拌勻滴水為丸如小荳大初
服五九每服五九溫水下日三服加至快利為
度利後却又常服病去乃止設病愈後惟老弱
久病虛人勿服平人常服保養宣通氣血消進
飲食病痞悶極甚者便多服則頃刻不開轉加
痛悶宜初服二九每服加二九至快利為度以
意消息小兒九如麻子大隨強弱大小增減九
數三四歲者三四九依前法服

○宜明雞屎醴飲

論出素問
腹中論

治鼓脹旦食則不能暮

大黃

桃仁

去皮

乾雞屎

右各等分為細末每服二錢水一盞生薑三片
煎湯調下食遠臨卧服

○丹溪活套云凡腹脹須用姜制厚朴肥人腹脹必

用利濕蒼朮茯苓滑石海金沙之類。色白人

腹脹必是氣虛用人參白朮白茯苓之類。瘦

人腹脹是熱必用黃連黃芩梔子厚朴之類。

如因有故蓄血而腹脹者用桃仁紅花甚者用

抵當湯丸之類。如因食積而腹脹者保和丸

加木香枳榔阿魏之類。有熱鬱結而脹者局

方丁香脾積丸東垣三稜消積丸之類。如因

外寒鬱內熱而腹脹者用藿香官桂升麻乾葛

之類。如因多怒鬱氣而脹者宜用蒼朮撫芎

香附青皮芍藥柴胡及龍薈丸之類。凡腹脹

初得是氣脹宜行氣疎導之劑木香枳榔枳殼

青皮陳皮厚朴之類。久則成水脹宜行濕利

水之劑

○祖傳經驗雞屎醴治鼓脹氣脹等証

雞屎一升

右一味研細炒焦色地上出火毒研極細百沸

湯三升淋汁每服一大盞調木香檳榔末各一

錢日三服空腹服以平為期

○又經驗方治腫脹或通身水腫或腹大堅滿

三稜

莪術各用醋炒陳皮去白

青皮

砂仁 羌活

醫學正傳 卷之三

六十七

防已

澤瀉

連喬

檳榔各三錢

甘遂二錢半

椒目

木香

乾漆炒煙盡白丑

黑丑

各二兩取頭末九錢

大黃八錢

雙頭連三錢

右研為細末麪糊為丸如梧桐子大每服三錢

重空心溫酒送下以利為度病退即止藥忌甘

草菰菜鹽醬

○又經驗桃奴丸治婦人或室女月經不通漸成脹

滿及男子墜馬跌撲損傷以致瘀血停積成血

蟲病皆能治之

桃奴桃樹上乾朽嫩桃也十二月收用 猥鼠糞兩頭大者是雄鼠糞也

玄胡索

官桂

香附子

五靈脂

砂仁

桃仁去皮尖各等分

右為末每服三錢溫酒調下

○予族八一兄素能飲酒年五十得腫脹病通身水

腫腹脹尤甚小便澀而不利大便滑泄召予治

予曰若戒酒色並醫此病可保無危不然去生

漸遠兄曰自今日戒起予以泔溪之法而以參

醫學正傳 卷之三

六十八

朮為君加利水道制肝木清肺金等藥十貼而

小水長大便實腫退而安又半月有二從弟平

日同飲酒者曰天民弟素不飲酒山中之鹿耳

我與兄水中之魚也鹿可無水魚亦可無水乎

三人遂痛飲沉醉而止次日病作甚於前復來

求治予曰不可為矣挨過一月而逝

○梅林妻姪孫略智二 得腫脹証亦令戒前四事

用前法服藥四五十貼而愈頗安五年一日嘆

曰人不吃鹽醬與死何異遂開鹽十數日後瘡

病大作再來求治不許又告欲行倒倉法予曰
脾虛之甚此法不可行於今日也踰月膨脹而
死予用丹溪之法治腫脹愈者多矣不能盡述
特書此二人不守禁忌者以為後人病此者之
戒云

積聚 二十五

論

內經曰積聚留飲痞滿中滿濕積霍亂吐下癥瘕
堅硬腹滿皆大陰濕土乃脾胃之氣積聚之根也

醫學正傳

卷之十一

六十九

七

難經曰積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而伏陽
浮而動血之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積
者五藏所生聚者六府所成也夫所謂積者陰氣
也其始發有常處其病不離其部上下有所終始
左右有所窮處謂聚者陽氣也其始終無根本其
痛或隱或見上下無所留止痛發無所定位是故
肝之積名曰肥氣在右脇下如覆杯有頭足久不
愈令人發欬逆痰壅連歲不已心之積名曰伏梁
起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心脾之

積名曰痞氣在胃脘右側覆大如盤久不愈令人

四肢不收發黃疸飲食不為飢膚肺之積名曰息

奔在右脇下大如覆杯久不愈令人洒淅寒熱喘

咳發肺壅腎之積名奔豚在小腹上至心下若豚

狀或下或上無時久不愈令人喘逆骨疼少氣東

垣曰鍼經云其成積者蓋厥氣生足悅足悅生疔

寒疝寒則血脈凝澀故寒上入腸胃所以腹脹腹

脹則腸外之汁沫迫聚而不得散日以成積矣或

盛食多飲則脾傷若起居不節用力過度則陽絡

脉傷陽絡脉傷則血外溢血外溢則衄血陰絡脉

傷則血內溢血內溢則便血腸胃之絡脉傷則血

溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則氣聚而成

積矣或外中於寒內傷於憂怒則氣上逆氣逆則

六輸不通溫氣不行凝血蘊聚不散津液凝滲滲

着不去而成積矣又曰生於陰者蓋憂思傷心重

寒傷肺忿怒傷肝醉以入房汗出當風則傷脾用

力過度入浴則傷腎此內外三部之所生病也故

難經中說五積各有其名如肝積曰肥氣在左脇

醫學正傳

卷之十一

七十

子

下如杯而臍左有動氣按之牢若痛者是無是非也餘積皆然治者當察其所痛以知其應有餘不足可補則補可瀉則瀉毋逆天時詳臍府之高下如寒者熱之結者散之客者除之留者行之堅者削之按之摩之醢以輒之苦以瀉之全其真氣而補益之隨其所利而行之節飲食慎起居和其中外可使必已不然徒以大毒之劑攻之積不能除反傷正氣終難復也可不慎與

脉法

醫學正傳

卷之三

三

脉經曰脉來細而附骨者積也在寸口積在胃中微出寸口積在喉中在關上積在臍傍上關上積在心下微下關積在小腸尺微積在氣衝脉出在右積在右脉出在左積在左脉兩出積在中央各以其部處之也

脉來小沉而實者脾胃中有積聚不下食食則吐

肺積脉浮而毛按之辟易

心積脉沉而芤上下無常處

肝積脉弦而細

腎積脉沉而急

脉沉重而中散者因寒食成積

脉左轉而沉重者氣癥積在胃中

脉右轉出不至寸口者內有肉癥也

方法

丹溪曰塊乃有形之物氣不能成形痰與食積死血也在中為痰飲在右為食積在左為死血大法醢以軟之堅以削之行氣開痰為主

○治積塊方用海石三稜莪朮香附以上俱用醋煮桃仁紅

花五靈脂之類為丸石礬白朮湯下

醫學正傳

卷之三

七十二

○黃蜀葵根煎湯入人參白朮青皮陳皮甘草稍牛

膝煎成膏入細研桃仁玄明粉各少許熱飲之

二服當見塊下病重者補接之後加減再行

○石礬去痰積食積洗滌垢膩有功

○瓦礬子能消血塊次消痰瓦礬子即礬石也移鎮鎮移鎮鎮即礬石也

蓋子以其殼上有稜如瓦屋故名之耳出嶺表異錄

○積塊不可專用下藥徒損其氣病亦不素養當

使之銕化其死血塊去須大補

○三聖膏貼積塊

用未化石灰半斤為末瓦上炒微紅提出候熱稍減入大黃末一兩炒熱仍提出入桂心末五錢畧炒以米醋熬成膏厚攤烘熱貼之

○琥珀膏 用大黃朴硝各一兩為末以大蒜搗膏貼之

○阿魏丸治肉積成塊

阿魏 山查各一兩 連喬五錢

黃連 六錢半

右以下三味為細末以阿魏用米醋煮糊為丸

醫學正傳

卷之三

七十三

如梧桐子大每服五十九脾胃虛者以白朮三

錢陳皮茯苓各一錢煎湯送下○一方加半夏

一兩以皂角同煮透晒乾用石鹽三錢○又一方以醋煮

神麴糊為丸無連翹○又一方既煎諸方而又

有瓜蒌貝母南星風化硝胡黃連萊菔子麥蘖

麴姜汁浸蒸餅為丸治諸般積聚用者更宜詳

之

○大溫中丸○小溫中丸俱以食積成痞塊面色痿

黃肌膚虛腫飲食無味等証一方俱見黃疸門

○凡婦人腹中有塊多屬死血

○一方治婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作雷

鳴嘈雜眩暈身熱時作時止

黃連 一兩半 一半以吳茱萸半兩同炒去茱萸

萊菔子 半兩 炒 台芎 梔子

三稜 莢朮 醋煮 麥麴炒

桃仁 各五錢 香附 童便浸 山查 各一兩

右為細末蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九

姜湯下

醫學正傳

卷之三

七十四

○一方治婦人血塊如盤有孕難服峻藥

香附 醋煮 桃仁 皮尖另研 海石 二兩醋煮

白朮 一兩

右為細末神麴糊丸服

○凡痞塊在皮裏膜外須用補氣藥及香附開之兼

二陳湯先須斷厚味為要

○倒倉法用肥嫩黃牝牛肉二三斤切成小片去

筋膜長流水煮糜爛以布濾去渣滓取淨汁再

入鍋中慢火熬至琥珀色則成劑矣令弱者預

先斷慾食淡前一日不食晚飯設密屋一間明
亮而不通風處行之置穢桶及木瓦盆貯吐下
之物一磁瓶盛所出之溺令病者入室以汁飲
一杯少時又飲一杯積數十杯寒月則重湯溫
而飲之任其吐利病在上者欲其吐多病在下
者欲其利多病在中者及在上復在下者欲其
吐利俱多全在活法而為之緩急多寡也視所
出之物必盡病根乃止吐利後必渴甚不得與
湯以所出之溺飲之名輪迴酒非惟可以止渴
抑且可以蕩滌餘垢行後倦睡覺饑先與稠米
飲次與淡稀粥三日後方可與小菜羹次與畧
厚粥軟飯調養半月或一月自覺精神渙發形
體輕健沉疴悉能痊矣其後須忌牛肉數年夫
牛坤土也黃土之色此以順為性而効法乎乾
以為功者牛之用也肉者胃之藥也熟而液無
形之物也橫散入肉絡由腸胃而滲透肌膚毛
竅爪甲無不入也積聚久則形質成依附腸胃
廻曲折處以為栖泊之窠臼阻碍氣血津液

薰蒸燔灼成病自非刮腸剖骨之神妙可以銖
兩九散窺犯其藩牆戶牖乎肉液之散溢腸胃
受之其厚皆倍於前有似乎腫其迴薄曲折處
肉液充滿流行有如洪水泛漲其浮槎陳朽皆
推逐蕩漾順流而不可停留在表者因吐而汗
其清道者自止而湧洩道者自泄而去凡屬滯
碍一洗而盡牛肉全重厚和順之性盎然渙然
潤澤枯槁補益虛損寧無精神渙發之樂乎正
似武王伐商散財發粟以賑殷人之仰望也其
方得於西域之至人凡人於中年後行一二次
亦卻疾養壽之一助也
夫倒倉法全藉自飲輪迴酒十數杯以祛逐餘垢
迎接調勻新布榮衛使藏氣育膜生意敷暢有
脫胎換骨之功也多嫌其穢因致中綴而功虧
一簣若非明物理通造化者其肯視為美醜良
味乎

此段乃丹溪與人書

前所論也

愚按內經謂脾胃者倉廩之官五味出焉大
腸者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官

化物出焉今詳此法名為倒倉療之陳腐也其論中反覆叮嚀之意無非只為腸胃中痰積膠固反化生諸般奇形之虫誠恐病疾難療愚嘗屢試明驗惟脾胃與大小腸有食積痰飲而為腹痛痞瘕食癯黃胖痞滿惡心噯氣嘈雜吞酸等証行之無不應手獲効其餘一應氣血虛損與夫反胃嘔噎腫脹癆瘵大風其病已成及肥白氣虛之人或一切証候脉虛軟無力者切不可輕試以自招咎愆也

○廣水漬堅湯治有積塊堅硬如石形大如盤令人坐卧不安

中滿腹脹方見腫脹門

○作厚朴湯治証同前方見腫脹門

○三因散聚湯治九氣積聚狀如癥瘕隨其上下左右作有時心腹痞滿攻刺腰脇小腹脹大小便不利

半夏 枳榔 川歸各四分

陳皮 杏仁去皮尖另研 桂心各一錢

茯苓一錢 甘草炙 附子泡

川芎各五分 枳殼麩炒 厚朴姜制

吳茱萸湯泡云梗焙乾 大黃酒拌濕蒸半錢或錢五分 右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞

溫服

○千金硝石止可磨塊不令人困須量虛實用之

硝石各二兩 大黃八兩另研 人參

甘草各三兩

右為細末以三年陳米醋三升置磁器中以竹片泝準入一升作一刻先入大黃不住手攪使微沸盡一刻乃下餘藥又盡一刻微火熬便可丸如雞子黃大每服一九白湯化下或丸如梧桐子大每服三五十九服後下如雞肝或如

米泔亦黑色等物乃効下後忌風冷宜軟粥

局方妙香散治久年陳積方見火門

導氣枳殼丸治氣結不散心胃痞痛逆氣上攻分
氣逐風功莫盡述

枳殼去穢麩炒木通炒青皮

陳皮並去白桑白皮炒萊菔子炒

白丑炒黑丑炒義術煨

茴香炒京三稜炮

右各等分為細末姜汁調麩煮糊為丸如梧桐

子大每服三十九煎橘皮湯下

○木香三稜丸治一切氣悶胃膈痞滿柴衛不和口

吐酸水嘔逆惡心飲食不化脇肋疼痛無問久

新並皆治之

青木香 破故紙 茴香

黑丑 茸遂 芫花

大戟 京三稜 蓬莪朮

川練子 胡芦芭 巴戟各一

巴荳不去油陳倉米三合與巴荳一處同炒黑

右細切用好米醋二升除砂仁木香外餘藥入

醋中浸一宿入鍋內煮醋盡乾為度同木香砂

仁為細末醋煮麩糊為丸如棗荳大每服五丸

或七丸食後服看虛實大小加減丸數隨湯水

任下

○東垣草荳蔻丸治酒積或傷寒冷之物胃脘痛咽

膈不通

草荳蔻麩裹煨白朮各一兩大麥蘖

神麩炒黃芩炒半夏各半兩湯泡七次

枳實炒二兩陳皮 青皮

乾生薑各二錢炒鹽半兩

右為極細末湯浸蒸餅為丸如棗荳大每服一

百丸熱水下

愚按此方乃飲酒過度恣食寒涼之物有痰

癖積飲在胃腹間作痛者之所宜也

○肥氣丸治肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有

頭足久不愈令人發欬逆連痰瘥連歲不已

厚朴姜製五錢黃連七錢柴胡一兩

川椒四錢炒巴豆霜五分乾姜炮五分

川烏炮二分皂角去皮弦炙白茯苓一錢半

廣朮炮二錢半人參炮二錢半甘草炙三錢

昆布酒洗二錢半

右件除茯苓皂角巴豆霜另研末外諸藥共為

極細末和勻煉蜜為丸如梧桐子大初服二九

日加一九二日加二九漸漸加至大便微溏再

醫學正傳卷之三

從二九起加服之周而復始積減大半勿服

○伏梁丸治心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至

心下久不愈令人煩心

黃連一兩半厚朴姜製人參各五錢

黃芩三錢桂枝一錢乾姜炮

菖蒲巴豆霜各五分紅葶藶二分

川烏頭炮五分茯苓丹參炒各一錢

右件除巴豆霜外為細末另研包巴豆霜旋入

末和勻煉蜜丸如梧桐子大服如上法淡黃連

湯下

○痞氣丸治脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久

不愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚

厚朴姜製四錢黃連八錢萊菔三錢

黃芩二錢白茯苓去皮人參去

澤瀉各一錢川烏炮五分川椒五分炒

茵陳酒炒乾姜炮砂仁各一錢半

白朮二分巴豆霜四分桂皮四分

右件除巴豆霜另研茯苓另末旋入外為細末

和勻煉蜜丸如梧桐子大服如上法淡甘草湯

下

○息奔丸治肺之積名曰息奔在右脇下大如覆杯

久不愈令人洒淅寒熱喘咳發肺壅

厚朴姜製八錢黃連炮一兩三乾姜炮

白茯苓去皮川椒炒去合口紫苑各一錢半

川烏炮桔梗去白葶藶去壳

陳皮去白京三稜醋煮天門冬去心

人參二錢青皮五分去白巴豆霜四分

右件除茯苓巴菰霜各另研旋入外為細末和勻煉蜜丸如梧桐子大服如上法淡姜湯送下已上四方秋冬加厚朴減黃連四分之一

○奔豚丸治腎之積名曰奔豚發於小腹上至心下若豚狀或上或下無時久不愈令人喘逆骨疼少氣及治男子內結七疝女人瘕聚帶下

厚朴姜制七分黃連五錢炒白茯苓去皮

澤瀉各二錢川烏炮

丁香各五分苦練酒煮三錢玄胡索炒一錢半

醫學正傳卷之三 全三

全蝎去毒尾附子炮獨活各一錢

肉桂一分去粗皮巴菰霜五分

右件除巴菰霜茯苓各另研為末旋入外為細末和勻煉蜜丸如梧桐子大淡鹽湯下服如上法

虛損二十六

論

內經曰飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重遠行汗出於胃疾走恐懼汗出於肝搖休勞

又立傷骨久行傷筋若夫七情五志之火飛越男

女青色之慾過滯是皆虛損之所由也機要曰虛

損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰

盛損自上而下一損損于肺皮聚而毛落二損損

于心血脉虛少不能榮于藏府婦人則月水不通

三損損于胃飲食不為肌膚治宜以辛甘淡過於

胃則不可治矣感熱則損陰陰虛則陽盛損自下

而上一損損于腎骨痿不能起于床二損損于肝

筋緩不能自收持三損損于脾飲食不能消尅治

宜以苦酸鹹過於脾則不可治矣又曰心肺損而

色弊腎肝損而形痿難經曰治損之法損其肺者

益其氣損其心者補其榮血損其脾者調其飲食

適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精是

脉法

脉經曰脉來軟者為虛緩者為虛微者為虛

弱者為虛弦者為中虛

醫學正傳卷之三 全四

脉來細而微者血氣俱虛 脉小者血氣俱少
要畧曰脉芤者為血虛 脉沉小遲者脫氣

又曰血虛脉大如葱管

又曰脉大而芤者脫血

方法

丹溪曰天為陽而運於地之外地為陰而居乎中
天之大氣舉之日實也屬陽而運於月之外月缺
也屬陰稟日之光以為明人受天地之氣以生天
之陽氣為氣地之陰氣為血故陽常有餘而陰常

醫學正傳

卷之三

五

大

不足氣常有餘而血常不足也又曰經曰精不足
者補之以味味陰也補精以陰求其本也然味乃
如穀菽菜果出於天賦自然中和之味故有食人
補陰之功非醢醬烹飪調和偏厚之味出於人為
者也經曰陰之所生本在五味非天賦之味乎曰
陰之五宮傷在五味非人為之味乎善攝生者不
可謂味以補精而遂恣於口腹以自速其禍也又
曰形不足者溫之以氣溫養也溫存以養使氣自
充氣充則形完矣曰補曰溫各有其旨方悉以

溫熱藥佐輔名曰溫補豈理也哉又曰人年老或
虛損精血俱耗陰不足以配陽孤陽幾於飛越天
生胃氣尚爾晉連又藉水穀之陰故羈而定耳局
方用溫劑劫虛蓋脾得溫而食進故亦暫可夫質
有厚薄病有淺深設或失手何以收效吾寧稍遲
計出萬全溫劑補虛決不敢用

○丹溪治老人虛損但覺小水短少即是病進宜以
人參白朮為君牛膝芍藥為臣陳皮茯苓為佐
春加川芎夏加黃芩麥門冬秋冬加當歸身倍

醫學正傳

卷之十

六

上

生薑一日或一貼或二貼小水之長若舊乃止
此老人養生之捷法也 此丹溪養母之方也
○四君子湯治氣虛

人參一錢半

白朮

茯苓各二錢

甘草一錢

右細切作一服水煎如自汗或小水利者去茯
苓加黃芪二錢無汗小水不利者只依本方

○四物湯治血虛

川歸二錢

川芎

芍藥各一錢半

熟地黃二錢

右細切作一服水煎服春倍川芎夏倍芍藥秋倍地黃冬倍當歸

○八物湯治氣血兩虛

四君子合四物湯共為一劑如上法加減煎服

六君子湯治氣虛挾痰方見飽逆門

○局方十全大補治氣血俱虛而挾寒暑

人參 黃芪 甘草

白茯苓 當歸 白朮

醫學正傳卷之三

白芍藥 肉桂 熟地黃

芎藭各等分

右細切每服一兩重加生薑三片大棗一枚水

二大盞煎至一盞溫服加減法宜詳前論

○大補陰丸降陰火補腎水

黃柏酒拌新瓦上炒知母去皮酒拌濕炒各

熟地黃酒洗焙乾用龜板酥炙黃各六兩

右細末猪脊骨髓和煉蜜為丸如梧桐子大每

服五丸空心姜湯下

○補陰丸一名虎潛丸

黃柏半斤如前知母去毛酒制熟地黃各三兩

龜板酥炙四兩白芍藥煨陳皮

牛膝各二兩虎脛骨一兩瑣陽酥炙

當歸各一兩半

右為細末酒煮羯羊肉為丸鹽湯下冬加乾姜

半兩

○加味虎潛丸

人參 黃芪 芍藥煨

黃柏酒洗當歸酒洗山藥各一兩

瑣陽酥炙枸杞子 虎脛骨酥炙

龜板酥炙鬼絲子鹽酒浸三宿細研焙乾

破故紙炒杜仲姜汁拌炒五味子各七錢

牛膝去芦酒洗熟地黃四兩

右為細末煉蜜和猪脊骨髓為丸如梧桐子大

每服五六十丸溫酒或姜湯下

○滋陰大補丸

川牛膝去芦山藥各一兩半

巴戟去心

山茱萸去核

肉從容酒浸洗新瓦土焙乾

五味子

白茯苓去皮

茴香炒

遠智

去心并草同煮各一兩

石菖蒲

枸杞子各五錢

熟地黄二兩

右為細末紅棗肉和煉蜜為丸如梧桐子大每

服七十九淡鹽湯或溫酒空心下與上虎潛丸

相間服之佳所謂補陰和陽生血益精潤肌膚

強筋骨性味清而不寒溫而不熱非達造化之

精微者未足以議於斯也

○補腎丸

黃柏

龜板各二兩

杜仲各依前制

牛膝

陳皮各二兩

乾姜五錢冬加

五味子二錢

右為細末姜汁糊或酒糊為丸服溫酒或白湯

空心下

○補天丸

紫河車

一具即產孩胞衣也古方不分男女世傳男用女胎女用男胎者候以初胎者

為勝似為有理若不可得但求肥盛無病婦人者俱可用初取得長流水洗淨去筋膜以

殘龍盛之外以紙糊使不泄氣焙乾要用時以米醋浸一宿焙乾用

右以前補腎丸藥為末同河車再研極細酒糊

為丸或新取紫河車蒸熟同前藥末搗爛為丸

亦可

○虛勞者當以骨蒸藥佐之一云氣虛加補氣藥

血虛加補血藥

○一方用側柏葉烏藥葉俱以酒浸九蒸九曝亦

同紫河車為丸名補腎丸

○六味地黃丸治腎經虛損久新憔悴盜汗發熱五

藏齊損瘦弱虛煩骨蒸痿弱下血咯血等証

乾山藥

山茱萸去核各四兩

牡丹皮

白茯苓各三兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九

白湯下

○人參固本丸

天門冬去心

麥門冬去心

生地黄各二兩

人參去芦二兩

熟地黄二兩

右各焙乾同磨為末勿犯鐵器煉為丸或只以

天門冬熟地黃二味量酒浸搗膏同三味末杵
千餘下丸如梧桐子大每服五七十九空心姜
益湯下忌蘿蔔

○人參膏

人參一味不拘多少去芦細切量水於銀石器
內慢火煎如稠錫磁器盛貯每服一二匙白湯
點服

○補中益氣湯治飲食失節勞役所傷暴傷元氣惡
寒發熱証似傷寒者方凡內傷門

醫學正傳

卷之十一

九十一

○益胃升陽湯血脫益氣古聖人之法也先補胃氣
以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先
務聚世皆以為補殊不知甘能生血從陽而引
陰也故先理胃氣益人之身最為寶也

柴胡

升麻各二分半炙甘草

當歸身酒洗

陳皮各五分人參少數不用

炒神麴

各六分黃芪一錢蜜炙白朮一錢半

主黃芩二分

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服。如腹

中痛每服加白芍藥五分中桂二分如渴或口
燥加葛根三分

○芪附湯治陽虛氣弱虛汗大出不止肢體倦怠

川附子炮

黃芪錢各二

右細切作一服加生薑三片大棗二枚水一盞
半煎至一盞溫服

○參附湯治真陽虛乏上氣喘急自汗盜汗短氣頭

旋眼花

人參半兩

川附子炮去皮臍一兩

醫學正傳

卷之三

九十二

右細切分作三服加姜水煎溫服

○茯神湯治六脉虛羸咳則心痛喉中介介或腫或

痛

茯神

人參遠志

通草

麥門冬去心黃芪蜜炙

桔梗各六分

甘草五味子各三分

右切作一服加生薑一片水煎服

○補氣湯治氣虛脉浮而軟怔忡無時

黃芪二分

人參

甘草各一錢

麥門冬去心 桔梗去芦各七分

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞
溫服

○千金延壽丹治諸虛百損怯弱欲成癆瘵及大病
後虛損不復凡人於中年後常服可以卻疾延
年

五味子 兔絲子煮爛 川牛膝

杜仲姜汁伴炒絲斷 川歸酒浸 山藥

天門冬 麥門冬去心 生地黃

醫學正傳卷之三 九十三

熟地黃各一兩 肉蓯蓉二兩 人參

白茯苓 大茴香 澤瀉

地骨皮 鹿茸 菖蒲九節者

花椒 巴戟去心 遠志去心

覆盆子炒去汗 枸杞子 柏子仁各五錢

右共磨為細末勿犯鐵器蒸搗煉蜜為丸如梧

桐子大每服一百丸空心溫酒或姜鹽湯下○

如大便溏小便不利加車前子二兩○如精滑

或夢遺加赤石脂山茱萸肉各五錢忌蘿蔔菜

○斑龍丸治真陰虛損及老人虛人常服延年益壽

鹿角膠炒成珠 鹿角霜 兔絲子酒浸

柏子仁取仁洗淨 熟地黃各半斤 白茯苓

補骨脂各四兩

右磨為細末酒煮米糊為丸或以鹿角膠入好

酒洋化為丸如梧桐子大每服五十丸空心姜

鹽湯下昔蜀中有一老人貨此藥於市自云壽

三百八十歲矣每歌曰尾閭不禁滄海竭九轉

金丹都謾說惟有龍班頂上珠能補玉堂關下

醫學正傳卷之三 九十四

血當時有學其道者傳得此方彼老人化為白

鶴飛去不知其所終

○桂枝加龍骨牡蠣湯治六脉亢動微緊男子失精

女人夢交及盜汗自汗等証

桂枝 白芍藥各三錢 甘草炙二錢

龍骨 牡蠣各三錢

右細切加姜棗水煎愚恐此証不可用姜

○祖傳經驗秘方治心虛手振

川歸身一兩半 川芎一兩 汾甘草一兩

生地黃 一兩半 遠志 六分 二兩 酸棗仁

柏子仁 各三兩 人參 一兩 辰砂 五錢 另研

金鉞 二十斤 射香 一錢 琥珀 三錢

茯神 七錢 膽南星 五錢 半夏 五錢

石菖蒲 六錢

右為極細末蒸餅為丸如棗豈大辰砂為衣每服七八十九津嚥下或姜湯送下

○本邑在城金儒元國子生也年五十餘身畧瘦十年前得內傷挾外感証一鑒用發表疎利之劑

醫學正傳 卷之五 九十五

十數日後熱雖退而虛未復胃中痞滿氣促眩暈召予治以補中益氣湯間與東垣消痞丸陳皮枳朮丸等藥調理而安但病根未盡除而往藥故眩運或時而舉不甚重來兌至此年因往杭城跋涉辛苦又兼色慾之過還家眩運大作歷數鑒皆與防風羌活荆芥南星半夏蒼朮等去風散濕消痰之劑病愈重一日十數次厥去片時復甦凡動或轉側即厥不知人事奉宗惶惶叫哭召予治診其六脈皆浮洪而濡

曰此氣血大虛証幸脉不數而身無大熱不死

但恐病愈後而有數年不眠下榻行動病者曰

只要有命卧亦甘心與大補氣血之藥倍人參

黃芪或加附子引經合大劑一日三貼又煎人

參膏及作紫河車丸補陰丸之類間服如此調

理二月餘服煎藥二百餘貼丸藥三五料用人

參五六斤其証漸不厭飲食如故但未敢行動

耳次年聞黃布政汝言往京師道經蘭溪以丹

載去彼俟候求診王公曰此証陰虛風痰上壅

醫學正傳 卷之五 九十六

因誤服參芪多故病久不愈立方以天麻菊花

荆芥川芎等清上之藥亦未見效往藥後越五

六年方得起而步履如初儒元不思昔日病劇

而藉參芪等藥之功遂以王公言語歸咎於予

用藥之誤噫彼時若非峻補何以得一儒元見

王公耶嗚呼此誠得魚忘筌得兔忘蹄也可勝

嘆哉

○東陽邑庠鄒掌教先生一証發大洋戰鼓慄振悼

片時許發燥熱身如火燒又片時許出大汗如

兩身體若水冷而就發寒戰如前寒後有熱
後有汗三病既作而晝夜不息卒生靈明夫與
作瘧証治不効召予診其右手陽脉數而浮洪
無力陰脉畧沉小而亦虛左三部比右差小而
亦浮軟乃曰此陽虛証也用補中益氣湯倍參
芪減升柴一半加尿浸生附子一錢半炒黃柏
三分乾姜薄桂各五分大棗一枚同煎服一服
而病去三分二服而減半四服寒熱止而身尚
有微汗減去桂附乾姜一半服二貼全愈

醫學正傳

卷之三

九十七

三百七十七

勞極二十七

論

內經曰陰虛生內熱又曰陰氣者靜則神藏躁則
消亡飲食自倍腸胃乃傷又曰有所勞倦形氣衰
少穀氣不盛上焦不行下脫不通而胃氣熱氣
薰胸中故內熱是故欲養陰而延生者心神而恬
靜而毋躁擾食宜適中而無過傷風寒暑濕之謹
避行立坐卧之有常何勞怯之有哉今也嗜慾無
節起居不時七情六慾之火時動乎中飲食勞倦

醫學正傳

卷之三

九十八

九十八

之過屢傷乎體漸而至于真水枯竭陰火上炎而
發蒸蒸之燥熱或寒熱進退似瘧非瘧古方名曰
蒸病或二十四種或三十六種名雖不同証亦少
異大抵不過咳嗽發熱咯血吐痰白濁白淫遺精
盜汗或心神恍惚夢與鬼交婦人則月閉不通日
漸羸弱漸成勞極之候夫病此者始多來允姑息
日久直至發熱不休形體瘦甚真元已脫然後求
鑿治療雖倉扁復生莫能救其萬一良可嘆哉雖
然一人未足憐也況其侍奉親密之人或同氣連
枝之屬薰陶日久受其惡氣多遭傳染名曰傳屍
又曰喪屍曰飛屍曰遁屍曰殍殍曰屍注曰鬼注
蓋表其傳注酷虐而神妙莫能以測之名也雖然
未有不由氣虛弱勞傷心腎而得之者初起於
一人不謹而後傳注數十百人甚而至於滅族滅
門者誠有之矣然此病最為可惡其熱毒鬱積之
久則生異物惡虫食人藏府精華變生諸般奇狀
誠可驚駭是以勞傷于肝膽者則為毛虫如刺蝟
瓦蛆之屬食人筋膜勞傷于心與小腸者則為羽

虫如灯蛾蚊蚋禽鳥之形食人血脉勞傷于脾胃者則為保虫如嬰孩蚯蚓之類食人肌肉勞傷于肺與大腸者則為介虫如龜鱉蝦蟹之狀食人膚膏勞傷于腎與膀胱者則為鱗虫如魚龍蛟鯉之形食人骨髓或挾相火之勢亦如羽虫之酷者鴟梟之類為狀不一不可勝紀凡人覺有此証便宜早治緩則不及事矣治之法一則殺其虫以絕其根本一則補其虛以復其真元分經用藥各有條理務如庖丁解牛動中肯綮無有不妥者也若待病勢已劇元氣已脫雖依古法取虫滋補患者不無一生但亦可絕後人之傳注耳學者詳之

脉法

脉經曰男子平人脉大為勞極 虛亦為勞

男子勞乏為病其脉浮大手足煩春夏劇秋冬瘥

陰寒精自出足廢軟不能行少陰虛滿

人年五十六十其病脉大者背俠背行痛苦腸鳴

馬刀挾腰者皆為勞之得

男子平人脉虛弱微細者喜盜汗出也

男子面色薄白主渴及亡血卒喘心悸其脉浮裏虛也

男子脉虛沉弦無寒熱短氣裏急小便不利面色

白時時目瞑此人喜衄小腹滿此為勞使之然

男子脉微弱而澁為無子精氣清冷也

夫夫精家小腹強急陰頭寒自眩痛一云月眩髮落脉

極虛芤遲為消穀亡血失精

脉得諸芤動微緊男子失精女人夢鬼交通

脉沉小遲者名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒

腹滿甚則溇泄食不消化

脉弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為

虛虛寒相搏 此名為革婦人則半產漏下男

子則亡血失精

方法 丹溪方法凡四條

丹溪曰此陰虛之極痰與血病多有虫者其傳屍

一証不可云無大法四物湯加重鹽瀝姜汁

○身瘦屬火因火燒爍也肉脫甚者難治

○氣血虛甚發熱成勞者補天九加骨蒸藥佐之

竹蒸藥知母黃柏地骨皮麥門冬秦
元青蒿驚甲石膏竹葉烏梅之類

○傳屍勞寒熱交攻久嗽咯血日益羸瘦先以三

湯次以蓮心散

○二十四味蓮心散

川歸

黃芪

甘草

驚節 醋炙黃

前胡

柴胡

獨活

姜活

防風

防己

茯苓

半夏

黃芩

陳皮

阿膠 炒成珠

醫學正傳

卷之三

一百一

士

官桂

芍藥

麻黃 不去根節

杏仁 另研

蓮肉 此味常用

南星

川芎

枳殼 半錢 麵炒各

芫花 醋炒黑色

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水二盞煎至一盞去粗溫服須待吐有異物芫花漸減少蓋芫花漸減少蓋芫花及甘草所以殺虫炒之所以斷熱去寒妙處在此

○青蒿飲子治勞瘵

青蒿 一斗五升 童便 三斗

右以文武火熬約童便減去二斗去蒿再熬至

一升入猪膽汁七箇或加辰砂枳榔末三五錢

再熬數沸甘草末收之每服抄一匙清湯點服

極妙

○白蠟塵一味大殺瘰癧可入丸藥散中用

○秘傳取傳屍勞虫鬼哭飲子

天靈蓋

醋炙黃驚甲 醋炙黃色

柴胡 去蘆各二錢半

木香 一錢二分

桃仁 二十一枚 去皮另研

鼓心 醋炙黃

青蒿 半握

阿魏 一錢

安息香 一錢

醫學正傳

卷之三

一百二

吉

貫衆

甘草 一錢生用

右十一味細切杵為麤末先以童子小便二升隔夜浸露星月至四更時煎至八分去粗分作三服每服調後散子一貼五更初溫服即穩卧至三點時又進一服至日出時覺腹中欲利如未利又進一服已利勿服散子方用枳榔二錢半 辰砂一錢一分射香 一錢另研 赤脚蜈蚣 乾以竹筒盛姜汁浸焙烏雞糞 二錢半 先將蜈蚣五日以前以火麻子紙之然後取其糞用

聞氣變化難取也

○治勞瘵取虫經驗天靈蓋散

天靈蓋 二指大用白檀香煎湯洗淨炙黃色 檳榔 五箇為末

阿魏 二錢 細研 射香 三分另細研 辰砂 一錢另研

甘遂 連珠者二錢為末 安息香 三分銅刀切細研

右七味各研極細和勻每服三錢後湯調下

雄白 二七莖 青蒿 二握 甘草 王可許

葱白 二七莖 桃枝 柳枝

桑枝 酸石榴枝 各七寸

梅枝 七寸已上玉枝俱取向東南者

右九味用童子小便四升於銀石器內以文武火煎至一升去粗分作三盞調前藥末服五更初服一盞服後如覺欲吐以白梅肉噙止之五更盡覺藏府鳴瀉轉下虫及惡物黃水若一服未下如人行五七里又進一服至天明又進一服如瀉不止用龍骨黃連等分為末熟水調下五錢或吃白粥補之此藥男病女煎女病男煎不可令患者知及不許孝子僧人雞犬見之

○射香散治男子婦人骨蒸發熱五勞七傷等証

天靈蓋 二錢半 柴胡 一兩 犀角屑 半兩

甘草 三寸 東引桃枝 東引柳枝

東引榴枝 青蒿 各一握 阿魏 一錢另研

雄白 葱白 各七寸 射香 二錢半

右細切杵為齏末用童便二升半浸藥一宿明日早煎至一升半去粗分作三服每服入檳榔細末三錢溫服五更初進一服約人行五七里再進一服若惡心兀兀欲吐嚼白梅止之三服

後瀉出惡物異虫或身如蠟行不可名狀後用

葱粥止之忌風一月及忌食油膩蒸麪酸餅

牛羊雞猪犬肉魚腥年遠重病不過二服全安

脩合此藥時男病女煎女病男煎忌猫犬雞鷄

鴨驢鵝尼孕婦孝子凡之凡取虫後須以後大

補茯神散補之

○取苑虫神仙秘方

青桑枝

柳枝

梅枝

桃枝

石榴枝

各七莖俱長七寸皆取

醫學正傳

卷之三

一百五

青蒿一握

葱白七莖

阿魏一錢另研

安息香一錢去石另研

右除阿魏安息香二味外餘藥用童小便一升

半煮去一半去粗將藥汁阿魏安息香細研再

煎十數沸分作二服調

辰砂末

檳榔末

各五分

射香少許另研

右三味亦分作二服入前湯五更初進一服三

點時又進一服至已午晚必取下虫其嘴紅者

可治青黑者不治但可絕後人之傳注耳取虫

後進軟粥溫和特息忌食生冷毒物仍服麻丸

子法凡合此藥不可令患者先知氣味亦不得

令猫犬孕婦孝子僧尼等不祥人見之

○神授散此方得之於河門邵王府濟世既久功不

可述也

川椒二斤擇去開口者

右一味為細末每服二錢空心米湯送下或用

酒米糊為丸如梧子大每服三十九丸漸加

至八九十九丸空心酒下或米湯下凡人得傳尸

醫學正傳

卷之三

一百六

勞病血未甚虛損元氣未及脫絕者不須多方

服食但能早用此藥無有不愈者直濟世之寶

也愚嘗治一婦人用花板二分苦練根一分九

○治勞極禁方無比丸一名紫河車丸石調方治傳屍等

勞怯之症服一月

紫河車一具初生者佳或無病壯年婦人者亦

得亦不必拘求病用男女病用男者若不可

草龍胆

半草各二錢紫甲酥炙半兩

桔梗

胡黃連

大黃酒拌溫蒸

苦參

黃柏一本黃藥知母去毛

秋石另研不必用煎煉者但取桶上凝結多年者亦可用又名人中白長流水洗淨用二上

錢半貝母各一錢半犀角屑蓬拔木製法如上

硝石各一錢半辰砂一兩敗鼓皮心一本

誤也本草謂鼓心通龍飛飛說計故用之米醋炙黃二錢半

右共為細末煉蜜為丸如梧桐子大辰砂為衣

每服二十九加至三十九溫酒送下腸熱食前

隔熱食後服

○秘傳取勞虫禁方

醫學正傳卷之三

琢木禽一隻右用硃砂四兩精猪肉四兩將肉

切作片子其硃砂杵如菴豆大塊二味拌勻饒

禽一晝夜食肉盡為度以鹽泥固濟其禽在內

剛火煨一夜來日不見大陽取出不得打破埋

入地中二尺許一晝夜取出去鹽泥銀石器內

研為細末以無灰酒入射香少許作一服調下

置患者在帳中四下緊閉用鉄鉗等候其虫必

從口鼻中出即以鉗鉗入沸油中煎殺之如虫

出之後更進局方嘉禾散一服軟粥將息

○紫河車丹治飛屍鬼注虛勞羸瘦喘嗽痰氣等証

其法取首生男子胞衣以皂角水洗淨次放銅

銚子內以米醋漂洗控乾做一小篋籠子盛之

圍以紙密糊之不令泄氣以烈火焙乾加入後

藥

人參一兩半白朮一兩

木香

白茯苓各半兩茯神

川歸

熟地黃各一兩乳香四錢另研沒藥四錢另研

硃砂二錢另研射香二分

醫學正傳卷之三

右為細末和勻酒糊為丸如梧桐子大每服五

十九煎人參湯送下日三服空腹服之煉蜜為

丸服亦可

○治虛勞柴胡散

柴胡去蘆三錢人參

茯苓去皮各一

桔梗芍藥酒浸炒川歸酒浸

青皮去白麥門冬各二分甘草一分

右細切作一服杵細末一盞煎七分溫服

○治虛勞驚甲散

柴胡去芦 川歸

甘草 桔梗 芍藥

人參各一兩 射香五分 杏仁去皮尖炒

胡黃連各二錢 官桂半兩去粗皮 地骨皮

宣黃連各二錢 真酥二兩 木香半兩

白沙蜜三兩

右為細末用青蒿一斤童便五升熬膏蒿汁約

二升濾去粗入酥蜜再熬成膏候冷入藥末搜

和為丸如梧桐子大每服十五丸溫酒送下米

醫學正傳卷之九 百九

飲亦可日進三服如秋冬時更入茱柳心七箇

與前柴胡散同煮間服之

○去三屍丸出貫衆丸

貫衆五分殺伏 白蘘葖三分殺 乾漆三分殺 白

厚朴三分殺肺 狼芽子四分殺 僵蚕四分殺 僵

雷丸六分殺赤 雄黃三分殺

右件焙乾炒令黃色研為細末煉蜜為丸如梧

桐子大新汲水下五丸三服後漸加至十九服

之二十日百病皆愈三屍丸出盡滅更無傳

之患耳

○治勞嗽輕骨散

烏梅 龍胆草 胡黃連

貝母 知母 驚甲酥炙

桔梗 秦艽 柴胡

甘草 梔子 人參

青蒿酒煮 阿膠炒皮成 杏仁去皮炒

右件各等分晒乾為末用好京墨一塊以井花

水磨調前藥末作餅子如大指頭大透風處陰

醫學正傳卷之九 百十

乾二七日每用一餅以井花水磨化又用沒藥

五分磨成一盞更加黃柏末二錢同煎數沸傾

入盞內頻打轉於五更時輕輕起服服後就

睡仰卧甚者不過三服

○治勞嗽蛤蚧散

白茯苓入肉去皮細切 桑白皮二兩以真酥

知母二兩去心用醋炙 杏仁六兩去皮尖及仁

甘草三兩去心用醋炙 貝母二兩用醋炙

蛤蚧油炒去腥一對入醋內浸透慢火乾再用醋

人參

不得焦 兩用 酥醋炙三五次令黃色

乳酥

真者四十兩切作骰子大塊入罐內添成
汁入極酸上好米醋半斤和勻用制前藥
醋不宜多多則稀不堪用

右為末每服二錢水一盞煎至七分和粗服忌

油膩生冷毒物如久患嗽者初服此藥必聞嗽

加甚須勤服久則可安須自保養為妙

○治勞熱蛤蚧飲子

蛤蚧

一對洗淨酒醋
浸炙黃色

黃芩 半兩

麻黃

不去根節 胡黃連

秦艽 去芦

甘草 生

生地黃 酒浸洗熟地黃 酒洗

青蒿

人參

柴胡 去芦

知母 去毛酒洗 貝母

杏仁

去皮尖及雙仁者炒另研驚甲一兩酒酥
炙

桔梗

草龍胆

木香 各二錢半

右為細末每服二錢 加烏梅姜棗煎服

附蒸病

○古今錄驗五蒸湯

人參

知母

黃芩 各一錢

竹葉 七片

生地黃

乾葛 一兩

茯苓 一錢

甘草 炙半錢

石膏 二錢半

梗米 一合

右細切先以水三盞煎小麥二合至二盞去麥

煎藥至一盞溫服隨証加減于後

實熱加黃芩

黃連

黃柏

大黃

虛熱加烏梅

秦艽

柴胡

蛤蚧

青蒿

牡丹皮

驚甲

○肺蒸鼻乾加

烏梅

天門冬

麥門冬

紫苑茸

大腸 右鼻孔乾

加大黃

芒硝

皮蒸 舌白咽血

加石膏

桑白皮

膚蒸 唇赤唇干

加牡丹皮

氣蒸 鼻乾喘促 通身氣熱 加人參

黃芩

梔子

○心蒸舌乾

加黃連

生地黃

小腸蒸 下唇焦

加赤茯苓

生地黃 木通

血蒸髮焦

加生地黃

當歸

桂心

童便

脉蒸

望白浪語脉的

加當歸

生地黃

○脾蒸唇焦

加白芍藥

木瓜

苦參

胃蒸舌下痛

加石膏

粳米

大黃

芒硝

乾葛

肉蒸

食無味而嘔煩燥

加白芍藥

○肝蒸眼黑

加川芎

當歸

前胡

膽蒸眼色白

加柴胡

括婁

筋蒸甲焦

加川歸

川芎

三焦蒸下熱乍寒

加石膏

竹葉

○腎蒸兩耳焦

加生地黃

石膏

知母

寒水石

膀胱蒸

右耳焦

加澤瀉

茯苓

滑石

腦蒸

頭眩熱悶 加生地黃

防風

羌活

髓蒸熱沸骨中

加生地黃

當歸

天門冬

骨蒸

虛黑腰痛足逆夜

加鱉甲

地骨皮

牡丹皮

當歸

生地黃

臂蒸

肢細肢腫

加石膏

黃柏

胞蒸

小便赤黃

加澤瀉

茯苓

生地黃

滑石

沉香

○丹溪活套云勞極之証五藏必歸重於一經假如

足脛痠疼腰背拘急遺精白濁面色黧黑耳輪

醫學正傳

卷之三

一百四

四

焦枯脉沉細數知其邪在腎也宜以四物湯加

知母黃柏五味子麥門冬天門冬澤瀉杜仲肉

桂之類煎入童便韭汁竹瀝服○其或心神驚

惕怔忡無時盜汗自汗心煩熱悶口舌生瘡咯

血面赤脉洪而數知其邪在心也宜以前方去

杜仲澤瀉肉桂加茯苓神胡黃連心遠志菖蒲硃

砂之類○其或咳嗽喘促衄血皮膚枯燥鼻塞

声沉時吐痰沫脉微虛而瀉數知其邪在肺也

宜以四物湯加沙參麥門冬五味子知母貝母

桔梗桑白皮地骨皮款冬花紫苑馬兜鈴百合
百部之類煎入童便竹瀝姜韭汁服○其或脇
痛目赤面青頰赤多怒虛陽不歛夢與鬼交甚
則邪縮筋急脉弦而數知其邪在肝也宜以四
物湯加竹茹草龍胆柴胡黃芩青皮竹葉之類
○其或面色萎黃唇焦燥飲食無味腹痛腸
鳴瀉利四肢倦怠脉虛濡而數知其邪在脾也
宜以四君子湯加酒炒白芍藥蓮肉薏苡乾山
藥猪苓澤瀉白扁豆之類○凡骨蒸勞熱元氣
未脫者灸崔氏四花六穴無有不安者也

○灸崔氏四花穴法

先二穴令患人平身正立取一細繩之勿令展縮於男左
女右脚底貼肉堅踏之其繩前頭與大姆指端
齊後頭循當脚根中心向後引繩從脚膈肚貼
因直上至曲脊中大橫紋截斷橫紋即委中穴又令患
人解髮分兩邊令見頭自顙門平分至腦後
却平身正坐取向所截繩一頭令與鼻端齊引
繩向上正分頭縫至腦後貼肉垂下循脊骨引

醫學正傳六

卷之三

一百十五

大

繩向下至絕盡處當脊骨中以墨點記之

又取一繩子令患人合口將繩子按於口上

兩頭至吻却鉤起繩子中心至鼻柱根下如人

此便齊兩吻截斷將此繩展令直於前量脊骨

上墨點處橫量取平勿令高下

記之却展開繩子橫量却以中指墨點記住按於脊骨中此點處兩頭是穴也

兩頭以白圈記之 以上是第一次點二穴

次二穴令患人平身正坐稍縮臂膊取一繩繞項向

前双垂頭與鳩尾齊

翻双繩頭向後以繩子中心按於喉嚨結骨上

其繩兩頭双垂循脊骨以墨點記之

取一繩子令患人合口橫量齊兩吻截斷還於

脊骨上墨點橫量如法繩子兩頭以白圈記之

白圈是灸處

以上是第二次點二穴通前共四穴同時灸

各三七壯累灸至一百餘壯候灸瘡將瘡又

依後法灸二穴

又次二穴以第二次量口吻繩子於第二次双繩頭

醫學正傳六

卷之三


一百十六

大

盡處墨點上當脊骨直上下監點其繩子中心
放在墨點上於上下繩頭盡處以白圈記之白
圈是灸處也

以上是第三次點二穴也通前共六穴也擇
取離日及火日灸之一應虛勞發熱疔癰等
証灸之立愈真濟世之妙法也

四花六穴人形圖式



白圈是穴黑點不是穴

醫學正傳卷之三

醫學正傳卷之四目錄

○眩運門二十九論 脉法 卅溪方九三條

防風通聖散 半夏白朮天麻湯

加味六君子湯 六合湯 濟生玉液湯

芳朮湯 川芎散 卅溪活套

○頭痛門二十九論 脉法 卅溪方九七條

選奇湯 肩骨痛方 清空膏

半夏白朮天麻湯安神湯 徹清膏

川芎散 白芷散 羌活清空膏

清上瀉火湯 細辛散 羌活湯

一粒金 羌活附子湯

麻黃附子細辛湯 吳茱萸湯 加味調中益氣湯

玉壺丸 川芎茶調散 元戎三陽頭痛方

如聖餅子 川芎神功散 三因芳辛散

小芩辛湯 寶鑑石膏散 三生丸

疾寒半夏丸 祖傳經驗方 又經驗敷貼方

卅溪活套

○胃脘痛門三十論 脉法 卅溪方九三條

黃連六一湯	連附六一湯	草薺薤九
林黃薺薤九	木香化滯湯	三因倉卒散
河間金鈴子散	神聖代鍼散	木附湯
丹溪活套	祖傳加味枳木丸	
已試醫驗一條		
○腰痛門三十一論	脈法	丹溪方法九一十條
高良姜湯	草薺薤湯	益胃散
厚朴溫中湯	六合散	沒藥散
東垣木香枳榔九	枳實導滯九	瓜蒂散
桂枝加芍藥湯	小建中湯	真武湯
霹靂散	酒煮當歸九	黃連湯
芍藥甘草湯	加減小柴胡湯	
四物苦練湯	增損當歸九	苦練九
一捏金散	丹溪活套	
已試醫驗二條		
○腰痛門三十二論	脈法	丹溪方法九七條
腎着湯	青娥九	立安九
補骨脂九	東垣獨活湯	摩腰丹

煨腎九	補腎九	蒼朮湯
川菟肉桂湯	地龍散	枯痛湯
蒼朮復煎散	一粒金丹	加味四物湯
三因安腎九	獨活寄生湯	五積散
丹溪活套		
○脇痛門三十三論		
當歸龍薈九	木氣實脇痛方	左金丸
破血行氣方	加味二陳湯	肝苦急方
左脇痛方	控涎丹	咳嗽脇痛方法
氣弱人脇痛方	去滯氣痛方	肥白人脇痛方
瘦黑人脇痛方	又丹溪方法九五條	推氣散
枳芎散	異香散	分氣紫蘇飲
芳葛湯	丹溪活套	
已試醫驗一條		
○諸氣門二十四論	脈法	丹溪方法九六條
清膈九	正氣天香湯	
子和木香枳榔九	蘇合香九	蘇子降氣九
異香散	沉香降氣湯	復元通氣散

木香流氣飲

丹溪活套

○疝氣門 三十五論

脉法

丹溪方法 九十三條

三因葱白散

又丹溪方法 九十四條

疝氣神方

又治疝方

五葉湯

肥人腫疝方

吳茱萸湯

茴香練實丸

痰藥湯

木香散

香鼓散

沉香桂附丸

一捻金散

丹溪活套

祖傳馬蘭花丸

○脚氣門 三十六論

脉法

丹溪方法 一條

治濕熱脚氣方

防已飲

健步丸

加味四物湯

治食積流注方

轉筋屬血熱方

羌活導滯湯

當歸粘痛湯

開結導引丸

麻黃左經湯

半夏左經湯

六物附子湯

換腿丸

五積散

導水丸

除濕丹

三花神祐丸

祖傳杉木鄧飲

又經驗勝濕餅子

○疝氣門 三十七論

丹溪方法 九十一條

加味四物湯

又丹溪方法 大條

治上中下痛方

大羌活湯

四妙散

飲酒濕痰痛風方

潛行散

肢節腫痛方

二妙散

治痛風神効方

手臂痛方

加味二陳湯

婦人膏背血走痛走注疼痛方

定痛丸

世用草藥獲効辨黃芪酒

獨活寄生湯

防風天麻散

舒筋湯

祖傳九藤酒

經驗加味二妙丸 經驗川木通湯

經驗薰洗痛風法

脉法 丹溪方法 九九條

○痰証門 三十八論

脉法

丹溪方法 九九條

濕痰加味二陳湯

血虛加味四物湯

氣虛加味四君子湯

又丹溪方法 二條

治痿加味四物湯

東垣健步丸

大防風湯

祖傳經驗方 經驗鹿角膠丸

○諸虫門 三十九論

脉法

丹溪方法 九二條

治愚桃仁湯

雄黃銳散

寶鑑化虫丸

集効丸

萬應丸

白臘麝丸

黑鉛換柳散

化虫丸

舌練湯

前胡湯

茱萸根湯

五膈下氣丸

千金散

三聖飲子

五鳳丸

雷公丸

廣濟療蛔虫方

又治蛔虫方

祖傳換柳丸

經驗陰蝕瘡方

附發砂論

醫學正傳卷之四

六

醫學正傳卷之四目錄終

醫學正傳卷之四

花溪醫集
卷之四
姪孫虞守愚惟明校正

眩運二十八

論

內經曰諸風掉眩皆屬肝木又曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減甚則忽忽善怒眩冒顛疾雖為氣化之所使然未必不由氣體之虛衰耳其為氣虛肥白之人濕痰滯於上陰火起於下是以痰挾虛火上衝頭目正氣不能勝敵故忽然眼黑生花若坐舟車而旋運也甚而至於卒倒無所知者有之丹溪所謂無痰不能作眩者正謂此也若夫黑瘦之人軀體薄弱真水虧欠或勞役過度相火上炎亦有時時眩運何濕痰之有哉大抵入肥白而作眩者治宜清痰降火為先而兼補氣之藥人黑瘦而作眩者治宜滋陰降火為要而帶抑肝之劑抑致內經有曰風勝則地動風木太過之歲亦有因其氣化而為外感風邪而眩者治

法宜祛風順氣伐肝降火為良策焉外有因區而
而眩冒者胃中有死血迷閉心竅而然其行血
清心自安醫者宜各類推而治之無有不痊者也

脉法

左手脉數熱多 脉澀而芤有死血

右手脉實有痰積 脉虛大必是久病

左手人迎脉緩而浮大者屬風

方法

肝溪方法
凡三條

丹溪曰痰在上火在下火炎上而動其痰也此証

醫學正傳

卷之四

八

七

屬痰者多蓋無痰不能作眩也雖有因風者亦

必有痰又曰火動其痰二陳湯加黃芩蒼朮菴

活挾氣虛者亦以治痰為主兼補氣降火藥

○去血過多而眩運者芎歸湯

○眩運不可當者以大黃酒炒為末茶清調下

標也

治其

○防風通聖散治風熱眩運

方見中風門

○半夏白朮天麻湯治風痰眩運

方見頭痛門

○加味六君子湯治氣虛痰盛兼挾風邪眩運不

者

陳皮 去白一錢 半夏 湯泡透一錢 茯苓一錢

甘草 半錢炙 荆芥穗 半錢

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水二盞

煎至一盞去粗入竹瀝一大匙溫服

○六合湯治風虛眩運

四物湯加秦艽菴活為佐水煎服之

○玉液湯治七情感動氣鬱生涎隨氣上衝頭目眩

運心嘈忪悸眉稜骨痛

醫學正傳

卷之四

九

火

大半夏 湯泡一錢

去皮

右以一味薄切成片每服四錢加生姜十片煎

入沉香磨水一呷服大効

○芎朮湯治胃雨中濕眩運嘔逆頭痛不食等証

川芎 半錢 白朮 各一錢

甘草 六分炙

右細切作一服加生姜七片水一盞半煎至一

盞溫服

川芎散治風眩運

山茱萸一兩去核 山藥

甘菊花

人參

茯苓

小茅薊各半兩

右為細末每服二錢溫酒調下

丹溪活套云眩運者中風之漸也如肥白人氣虛而挾痰者四君子湯倍蜜炙黃芪加半夏橘紅或少加川芎荊芥穗以清利頭目也○如痰盛而挾氣虛者二陳湯加人參白朮黃芪或少加炮附子煎入竹瀝姜汁服○如體瘦血虛而痰火熾盛者二陳湯合四物加片苓薄荷煎入竹瀝

醫學正傳卷之四

十

瀝姜汁童便服○如諸般眩運挾風則加防風

荊芥天麻秦艽等藥挾熱加片苓黃連梔子之類挾寒加乾姜官桂附子之屬無有不安者也

頭痛十九

論

內經曰心沐中風則為首風又曰首風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可以出內至其風日則病少愈東垣曰金匱真言論曰東風生於春病在肝肺在頸項故春氣者病在頭又諸

醫學正傳卷之四

十

陽會於頭而夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生氣虛頭痛也心煩頭痛者病在耳中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛癰疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如頭半寒痛者先取手少陽陽明後取足少陽陽明此偏頭痛也有其頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節者死不治有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛也凡頭痛皆以風藥治之者總其大体而言之也高巔之上惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異故太陽頭痛惡風脈浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為主陽明頭痛自汗發熱惡寒脈浮緩長實者升麻葛根石膏白芷為主太陰頭痛必有痰體虛或腹痛為痰癖其脈沉緩蒼朮半夏南星為主少陰經頭痛三陰三陽經

不流行而足寒氣逆為寒厥其脉沉細麻黃細辛
附子為主厥陰頭項痛或吐痰沫厥冷其脉浮緩
吳茱萸湯主之血虛頭痛川歸川芎為主氣虛頭
痛人參黃芪為主氣血俱虛頭痛調中益氣湯少
加川芎蔓荊子細辛其効如神白朮半夏天麻湯
治痰厥頭痛藥也清空膏乃風濕痰頭痛藥也羌
活附子湯治厥陰頭痛藥也如濕氣在頭者以若
藥吐之不可執方而治先師嘗病頭痛發時面頰
青黃暈眩目不欲開懶言身體沉重兀兀欲吐潔
醫學正傳卷之四

脉法

內經曰寸口脉中短者頭痛也

脉經曰陽弦則頭痛又曰寸口脉浮中風發熱頭
痛

脉緊頭痛是傷寒邪脉緊上寸口者傷風頭痛

脉訣云頭痛短瀋應瀕死浮滑風痰皆易除

方法丹溪方法
凡七條

丹溪曰頭痛多主於痰痛甚者火多宜清痰降火

○勞役下虛之人似傷寒發熱汗出兩太陽穴痛甚

此相火自下衝上宜補中益氣湯加川芎當歸

○諸經氣滯亦作頭痛宜分經理氣治

○偏頭風在右屬痰屬熱痰用蒼朮半夏熟用酒制

片黃芩在左屬風及血虛風用荊芥薄荷或云
荊芥

薄荷是頭痛要藥宜詳証加用血虛用芳歸芍藥酒黃柏諸家

不分所屬故藥多不効少陽偏頭痛者多大便

秘或可下之

○一方治風濕熱頭痛神効

片苓制一兩酒
各五錢 蒼朮 羌活

防風 蒼耳子 三錢 細辛 二錢

右為細末以生薑一片搗細和藥末三錢搗勻

茶清調下一方有生甘草酒連川芎
炒半夏麴元防風細辛

○一方治少年強壯人氣實有痰或頭暈而重痛立

効

大黃酒拌炒乾再拌三次

右為細末茶清調下

○一方治眉稜骨痛屬風熱與痰

白芷 片芩酒制炒

各等分為細末每服二錢茶清調下

○選奇湯治眉骨痛不可忍神効

羌活 防風各二錢 甘草一錢冬炒夏生

酒片芩一錢秋冬不用
甚者冬亦炒用

右細切作一服水一盞半煎至一盞食後服

醫學正傳天 卷之四 南

○又方因風寒眉骨痛不止者

川烏 草烏各一錢已上二味俱
用童便浸二宿炒用

細辛 羌活 片芩酒拌炒

甘草炙冬半分

右為細末分二服茶清調下

○清空膏治偏正頭痛年深久不愈者善療風濕熱

頭痛上壅頭目及腦痛不止者除血虛頭痛不

治

川芎五錢 柴胡七錢 黃連酒炒

防風去芦 羌活各一兩 甘草炙一兩半

片黃芩三兩切片酒拌濕
一半炒一半酒洗

右為細末每服二錢熱盞內入茶清少許湯調

如膏臨卧抹口內少川白湯送下如苦頭痛每

服加細辛二分如大陰脉緩有痰名痰厥頭痛

減羌活防風川芎甘草加半錢 一兩伍錢如

偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加

柴胡一倍如發熱惡熱而渴自陽明頭痛只服

白虎湯加 白芷立愈

醫學正傳天 卷之四 十五

○半夏白朮天麻湯治痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩

悶氣促上喘無力以言心神顛倒目不敢開如

在風雲中頭苦痛如破身重如山四肢厥冷不

得安卧

黃礬分半 乾姜二分 澤瀉

白茯苓 天麻 黃芪

人參 蒼朮各三分半 神麴炒

白朮各五分 麥蘖麴 半夏湯泡度勝

酒紅各七分半

右為細切作一服水二盞加生姜三片煎至一盞去粗稍熱服食前可一服而愈此頭痛若甚謂之足太陰痰厥頭痛非半夏不能除眼黑頭旋風虛內作非天麻不能療黃芪其溫瀉火補氣實表止汗人參其溫瀉火補中益氣二木俱其溫除濕補中澤瀉茯苓利小便導濕橘皮溫益氣調中神麴消食蕩胃中滯氣大麥蘖寬中助脾乾姜辛熱以滌中寒黃 苦辛以療冬天少吹在泉發躁也

醫學正傳

卷之四

十六

○安神湯治頭痛頭眩眼黑

生甘草

炙甘草各二分 柴胡

升麻

防風 二分半

生地黄酒浸洗

知母

酒浸炒

黃柏

酒拌炒

羌活各一錢

黃芪

一錢半

右細切作一服水二盞煎至一盞半加蔓荊子五分川芎三分再煎至一盞去粗臨卧稍熱服

○微青膏

蔓荊子

細辛各一錢

薄荷葉

川芎各三錢

生甘草

炙甘草各伍錢

藥太 一兩

右為細末每服二錢食後茶清調下

○川芎散治頭目不清利

川芎五錢

柴胡七錢

羌活

防風

藥本

生甘草

升麻各一兩

炙甘草

生地黄各一兩半

酒黃連炒

酒片苓各二兩

右為細末每服二錢食後茶清調下

醫學正傳

卷之四

十七

○白芷散一名紫金散治諸熱苦頭痛

舊金一錢

白芷

石膏各二錢

雄黃

芒硝

薄荷葉各三錢

右為細末口含水鼻內搐之

○羌活清空膏

蔓荊子一錢

黃連三錢

羌活

防風

甘草各四錢

片苓一兩

右為細末每服一錢茶清調下食後或臨卧服

清上瀉火湯昔有人年少時氣弱常於氣逆

穴節次灸之至年老成熱厥頭痛雖冬天大寒
喜寒風風吹之頭痛即愈暑來煖處或見煙火
其痛復作此灸之過也

荊芥穗 川芎各二分 蔓荊子

當歸身 蒼朮各三分 酒黃連

生地黃 藁本各四分 生甘草二分

升麻 防風各三分半 酒黃柏

炙甘草 黃芪各五分 酒黃芩

酒知母各七分 羌活八分 柴胡一錢

細辛二分 酒紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後稍
熱服

○細辛散治偏正頭痛

細辛 瓦粉各二分 生黃芩

芍藥各三分半 酒黃連 川芎各半錢

黃芩酒炒 甘草各八分 柴胡去芦一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞食後服

○羌活湯治風熱壅盛上攻頭目昏眩

炙甘草一分半 澤瀉三分 酒括萎根

白茯苓 酒黃柏各四分 柴胡五分

防風 酒黃芩 酒黃連

羌活各六分

右細切作一服水二盞煎至一盞食後或臨卧
服

○一粒金

華撥以猪胆汁拌勻入 玄胡索

青黛 白芷 川芎各一兩

右為細末無根水為丸每用一丸以無根水化

開搐鼻内外以銅錢咬口内出涎

○羌活附子湯治客寒犯腦痛及齒亦痛名曰腦風

麻黃不去節 附子炮 防風

白芷 殭蚕 黃柏各七分

羌活 蒼朮各半錢 升麻二分

黃芪三分 甘草二分 佛耳草三分無

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○麻黃附子細辛湯治三陰三陽經不流行而足寒

氣逆為寒厥頭痛其脉沉細

麻黃

細辛各六錢

附子

生用

右細切水三升三合先煮麻黃令沸減七合掠

去上沫納諸藥煎取一升去粗分三服

○吳茱萸湯治厥陰頭項強痛或吐痰沫厥冷其脉

浮緩

吳茱萸

熱水泡三五次

生薑各半兩

人參二錢半

右細切作一服水二盞大棗一枚煎至一盞去

粗溫服

醫學傳本

卷之四

二十

○加味調中益氣湯治氣血俱虛頭痛其効如神

陳皮

黃柏酒炒各三分

升麻去粗皮

柴胡

去芦各四分

人參

炙甘草

蒼朮

各六分

黃芪一錢

川芎六分

蔓荊子

三分

細辛二分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服一

万有木香二分無黃柏如大便虛坐不得或了

而不了腹中逼迫此血虛血泄也加當歸身五

分愚按東垣謂此方治氣血俱虛頭痛本方

加當歸一味雖無已上証亦恐不可缺也

○玉壺丸治風濕頭痛亦治痰患

雄黃

一錢研飛

南星煨裂

半夏湯泡七次去皮勝

天麻

酒浸

白朮各二錢

右為細末姜汁浸蒸餅為丸服二十九姜湯下

川芎茶調散治諸風上攻頭目昏痛鼻塞声重

薄荷

四兩去梗

荆芥穗

川芎各二兩

羌活

明照

白芷

甘草各一兩

細辛

半兩

防風二錢半

醫學傳本

卷之四

二十一

右為細末每服二錢食後茶清調下

○醫聖元戎治三陽頭痛方

羌活

防風

荆芥穗

升麻

去黑皮及

芍根去粗皮

白芷

石膏

火煨

柴胡去芦

川芎

芍藥

酒炒

細辛

葱白連須者

各等分細切五錢水二盞煎至一盞溫服

○如聖餅子治風寒伏留四經痰飲氣厥頭痛

防風

天麻各半兩

南星

乾姜

川芎

甘草 各一兩

半夏 半兩

川烏 去皮脂大塊

右為細末蒸餅糊調捻作餅子如錢樣每用五餅同荊芥末細嚼茶清送下

○川芎神功散治風熱上攻頭目令人偏正頭痛

川芎

川烏 如上同製白芷

南星 炮

麻黃 各一錢去甘草半錢

右細切作一服加生薑三片大棗一枚水一盞

半煎至一盞去粗食後溫服

醫學傳天 卷之四

○三因芳散治傷風寒生冷及氣虛痰厥頭痛如

破蕪眩運嘔吐

附子

去皮脂

烏頭 去皮

南星

乾姜

甘草 各一錢

川芎

細辛 各一錢

右細切作一服加生薑五片茶芽少許水二盞

煎至一盞去粗溫服

○小方辛湯治風寒在腦或感邪濕頭重而疼眩暈

嘔吐

川芎 二錢

細辛

白朮 各一錢

甘草 半錢

右細切作一服加生薑五片茶芽少許水煎服

○寶鑑石膏散治阳明經頭痛大効

川芎

石膏

白芷 各等分

右為細末每服四錢茶清調下

○三生丸治痰厥頭痛

半夏

白附子

南星 各等分

右為細末生薑自然汁浸蒸餅為丸如棗豆大

醫學傳天 卷之四

每服四五十丸食後姜湯送下

○扶苓半夏湯治風熱痰逆嘔吐頭痛

半夏 二錢

赤茯苓 一錢

片黃芩

甘草

橘紅 各半錢

右細切作一服加生薑三片水一盞半煎至一

盞溫服

○祖傳經驗治頭風熱痛不可忍者

片黃芩

二兩酒拌濕炒兩片再小川芎一兩

白芷 半兩

細茶芽 三錢

荊芥 各四錢

薄荷葉二錢半

右為細末每服二錢白湯或茶清調下

○又經驗敷貼頭風熱痛

朴硝 大黃各等分

右為細末用深井底泥和捏作餅子貼兩大陽穴神驗

○卅溪活套云凡治頭風必以二陳湯加川芎白芷

為主○如太陽經頭痛加羌活○陽明經加石

膏白芷○少陽經加柴胡黃芩○太陰經加蒼

醫學正傳六

卷之四

二十

木○少陰經加細辛○厥陰經加吳茱萸○如

肥人頭痛必是濕痰加半夏蒼白朮○如瘦人

頭痛是熱上壅多加酒洗片黃芩○如因感冒

而頭痛者宜加防風羌活藁本升麻柴胡葛根

之類○如氣虛而頭痛者宜加黃芪人參東垣

安神湯之類○如風熱在上而頭痛者加天麻

蔓荊子台芎酒片芩之類○如苦頭痛者宜用

細辛○如形瘦色弊而頭痛者是血虛宜用歸

芍藥酒黃柏之類○如頂顛痛者宜藁本酒

炒升柴

胃脘痛 俗呼為心痛 三十

論

內經曰木鬱之發民病胃脘當心而痛上支兩脇
痛膈噎不通食飲不下蓋木氣被鬱發則太過故
民病有土敗木賊之候也夫胃為脾之府陽先於
陰故藏未病而府先病也甚而至於脇下如刀割
之痛者已連及於藏矣古方名為脾疼者是也胃
之上口名曰賁門賁門於心相連故經所謂胃脘

醫學正傳六

卷之五

二十五

東

當心而痛今俗呼為心痛者未達此義耳雖曰運
氣之勝復未有不由清痰食積鬱于中七情九氣
觸于內之所致焉是以清陽不升濁陰不降而肝
木之邪得以乘機侵侮而為病矣更原厥初致病
之由多因縱容口腹喜好辛酸恣飲熱酒煎燂復
食寒涼生冷朝傷暮損日積月深自鬱成積自積
成痰痰火煎熬血亦妄行痰血相雜妨碍升降故
胃脘疼痛吞酸噯氣嘈雜惡心皆膈噎反胃之漸
者也俗醫不究其源例以辛香燥熱之劑治之以

火齊火遂成危劇良可痛哉古方九種心痛曰飲
曰食曰風口冷曰熱曰悸曰虫曰痺曰去來痛天
所謂冷者惟一耳豈可例以熱藥治之乎詳其所
由皆在胃脘而實不在於心也有其心痛者大寒
觸犯心君又曰汚血衝心手足青過節者旦發夕
死夕發旦死醫者宜區別諸証而治之無有不安
之理也

脉法

脉經曰陽微陰弦則胃痺而痛責其虛也

醫學正傳

卷之四

二十六

善

今陽虛知在上焦所以胃痺心痛者以其脉陰
弦故也

胃痺之病喘息欬唾胃痺痛短氣寸口脉沉而遲

關上小緊而數

心脉微急為痛微大為心痺引背痛

脉短而數者心痛 瀯者心痛

脉浮大弦長者死

方法

凡三十二法條

升溪曰心痛即胃脘痛須分久新若明知身犯寒

氣口得寒物而病於初得之時當用溫散溫利
之藥若病久則成鬱矣鬱則成熱原病式中倍
言之矣若欲行溫散溫利寧無助火添病耶由
是古方多用山梔子為君執藥為之嚮導則邪
易伏病易退病安之後若縱容不改前非病必
再作難治矣此病雖日久不食不死又曰中宮
有食積與痰而生病者胃氣亦賴所養卒不便
虛雖日數多不食不死若痛方止即吃物病必
復作勿歸咎於鹽也必須再服三五服藥後以
漸而少食方可獲全安

醫學正傳

卷之四

二十一

快

○心膈大痛攻走腰背發厥嘔吐諸藥不効者就吐

中以鵝翎探之出痰積破許而痛即止

○脉堅實不大便者下之亦可

○一方用黃荊子炒焦為末米飲調服一云上可治心痛下可治

白濁

○又方用藍葉搗細取汁合姜汁服

○又方用青黛以姜汁入湯調服

○又方用海粉佐以香附末以川芎山梔子煎湯入

姜汁調服

○又方無藥處以鹽置刀頭燒紅淬入水中乘熱飲之吐痰而愈此法治絞腸痧大痛幾死者立效

○又方治心痛輕者以麻黃桂枝之類散之或以韭汁開提之重者加石礮

○又方痛甚者脉必伏宜溫藥附子之類不可用人參白朮蓋諸痛不可補氣故也

○又方治氣痛者用牡蠣粉一二錢酒溫調下

○又方治溫痰作痛用白螺螄殼去泥沙火煨為細末每服方寸匕溫酒調下立止

○又方以物柱按而痛定者屬虛以二陳湯加炒乾姜求和之而愈

○又方山梔大者七枚或九枚炒焦黃用水一盞煎七分入生姜自然汁二三匙令辣熱飲之立止

○又方山梔子却止之後復發者前藥必不効用玄明粉一錢匕白湯送下立止

○又方治平日喜好熱物致死血流於胃口而作痛者以桃仁承氣湯下之安

○又方治死血作痛証用玄胡索一兩半桂心紅花

滑石紅麴各五錢桃仁三十箇蒸餅丸服効

○又方治虫痛者必而上有白班唇紅能食時作特止用二陳湯加苦練根煎服

○又方治痰積胃脘作痛白螺螄丸

白螺螄殼火煨滑石炒 蒼朮

山梔子 香附童便浸 南星煨梨各一兩

枳殼麩炒黃色 青皮 木香

半夏 砂仁 各五錢

醫學正傳 卷之四 二十九

右為末春加川芎夏加黃連秋冬加吳茱萸用

生姜汁浸蒸餅為丸如棗荳大每服五十丸

○黃連六一湯治多食煎炒或燒餅米胖等物致熱

鬱胃口而痛者甚効方見嘔吐門

○連附六一湯治胃脘痛甚諸藥不効者寒因熱用

方也

黃連六錢 附子炮去皮膽一錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞

半煎至一盞去粗稍熱服

○草薺薤丸治客寒犯胃作痛或因濕熱鬱結作痛

亦可劫而止之又治氣弱心痛亦妙

草薺薤一兩 麴橘紅 吳茱萸湯泡 乾

人參 白殭香 黃芪

益智仁各八錢 生甘草 炙甘草

當歸身 青皮各六錢 澤瀉小便多者 減半

半夏各一兩 桃仁去皮尖 七箇 麥蘖麴 一兩半 減半

神麴炒 微黃 柴胡脇不痛 減半 姜黃各四錢

右為細末桃仁另研如泥入諸藥中和勻再研

醫學正傳卷之四 三十

湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十九白湯

送下食遠

○麻黃薤薤丸治客寒犯胃心頭大痛不可忍

木香 青皮 紅花

厚朴姜制 各二錢 蘇木三分 華澄茄四分

升麻 半夏湯泡 七次 麥蘖麴

砂仁 黃芪 白朮

陳皮去白 柴胡 炙甘草

吳茱萸 當歸身各五分 益知仁 六分

神麴炒 一錢 麻黃不去節 二錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五

十九白湯下或細嚼白湯送下亦可

○木香化滯湯治因憂食溫麴結於胃脘腹皮抵痛

心下硬微滿不思飲食食之不散常常痞氣不

安方見痞滿門

○三因倉卒散治氣自腰腹間攻心痛不可忍腹中

冰冷自汗如洗手足掣急厥冷

山梔子大者四十枚 連皮槌碎 炒焦 附子一枚 泡去 皮 臍

醫學正傳卷之四 三十

右為末每服二錢酒一盞煎八分溫服

○金鈴子散治熱厥心痛

金鈴子 玄胡索各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下白湯亦可

○神聖代鍼散治心腹諸痛

乳香 沒藥 當歸

白芷 川芎各半兩 元青一兩 去麴 足炒

右為細末每服一分病甚者半錢先點好茶一

盞次搽藥末在茶上不得吹攪立地細嚼之

心痛欲死者服之立効小腸氣搐如角弓勝脫
腫硬一切氣刺虛痛作婦人血癖血迷血運血
刺痛衝心胎衣不下難產但是一切因血作痛
之疾服之大有神効

○木附湯治寒厥暴痛脉微氣弱

附子炮五分 白朮二錢 甘草一錢炙

右細切作一服水一盞半入生姜五片大棗二

枚煎至一盞去粗溫服此藥又治風濕相搏身

重煩疼不能轉側不嘔不渴大便堅實小便自

利及風虛頭目眩暈不知食味煖肌補中助陽

氣止有汗之聖藥也

○丹溪活套云草薢一味性溫能散滯氣利膈上

痰若胃脫果因寒而作痛用之如鼓應桴若溫

痰鬱結成痛者服之多効若因熱鬱而痛者理

固不當用此但宜以涼藥監製如芩連梔子之

屬其功尤速東垣草薢丸寒熱心痛俱獲奇

功但因熱者不可多服久服恐有積溫成熱之

患耳若久病鬱熱已膠固者斷不可用此味也

○胃中若有流飲清痰作痛腹中漉漉有声及

手足寒痛或腰膝脊脇抽掣作痛者用小胃丹

或三花神祐丸或控涎丹漸服之能微去病

根即亡

○祖傳經驗加味枳朮丸治清痰食積酒積茶積肉

積在胃脘當心而痛及痞滿惡心嘈雜噯氣吞

酸嘔吐脾疼等証其効如神

白朮三兩 枳實三錢炒 蒼朮三錢炒

猪苓去黑皮 麥蘖麴炒黃色 神麴炒微黃色

半夏湯泡透 澤瀉去毛 赤茯苓去皮

川芎 黃連去土 白螺蛸熬各錢

縮砂仁 草薢 黃芩陳壁土同

青皮去白 萊菔子炒 乾生薑各五錢

陳皮去白 香附米童便浸 瓜蒌子

厚朴姜汁制 檳榔各三錢 木香

甘草各二錢 吞酸加吳茱萸湯泡寒月五錢

熱月二錢半○久病挾虛加人參白扁豆石蓮

肉各伍錢○時常口吐清水加炒滑石一兩牡

蠲五錢

右為細末用青荷葉泡湯浸晚粳米研粉作
為丸如梧桐子大每服七十九多至一百九清
米飲送下

男子年三十五胃脘作痛久矣人形黃瘦食少
而胃中常若食飽來求治与加味枳朮丸服不
効而日漸大痛呼号声聞四隣别父母妻子囑
付後事欲自殺予与桃仁承氣湯作大剂与之
連二服大下瘀血四五碗許困倦不能言語者

醫學正傳卷之四

三十四

三日教以稀粥少食漸漸將理病全安復壯如
舊

腹痛三十一

論

內經曰寒氣入經而稽遲泣通而不行客於脉

外則血少客於脉中則氣不通故卒然而痛云

按內經舉痛論言寒邪外客而痛者甚為詳悉未

能盡述學者自宜檢閱外有因虛因實因傷寒因

痰火因食積因死血者種種不同亦當表而出之

後通其飲食失節中氣不足寒邪乘虛而客入之

故卒然而作大痛經云得炆則止此事難知集論

曰傷寒中脘痛大陰也理中湯黃芪建中湯之類

脐腹痛者少陰也四物湯真武湯附子湯之類小

腹痛厥陰也重則正陽散回陽丹輕則當歸四逆

湯之類太陰連少陰痛甚者當變為下利不止若

夫雜病腹痛四物苦練湯酒煮當歸丸之類夏月

腹痛肌熱惡熱脉洪數属手太陰足陽明黃芩芍

醫學正傳卷之四

三十五

藥湯主之秋月腹痛肌寒惡寒脉沉疾属足太陰

桂枝芍藥湯主之四時腹痛芍藥甘草湯主之原

病式曰熱鬱于內則腹滿堅結而痛不可例言為

寒也成無己曰陰寒為邪者則腹滿而吐食不下

自利益甚腹疔痛大陰証也發汗不解醫反下之

因而腹滿時痛者属太陽也桂枝加芍藥湯主之

大實而痛者加桂枝大黃湯主之又曰邪氣聚於

下焦則津液不得宣通血氣不得流行或溺澀而

血流滯於下而生脹滿硬痛也若從心下至小腹

皆硬滿而痛者是邪實也須以大脂膏湯下之若
但小腹硬滿而痛小便利者則是蓄血之証小便
不利者則為溺溢之証也其有血虛瘦弱之人
液枯涸傳送失常鬱火燥熱煎成結糞滯於大
腸之間阻氣不運而作痛者宜以枳實導滯丸
急大黃丸之類先通其滯止其痛然後用四物等
生血潤燥之劑以治其本外有卒然心腹太痛欲
吐不得吐欲瀉不得瀉唇青厥逆死在頃刻此內
因食積外感寒邪是名乾霍亂之候也宜急以鹽
湯灌之而以鵝翎探吐取涎而愈若夫清痰留滯
于胃腹之間食積鬱結於腸胃之內皆能令人腹
痛清痰作痛者控涎丹小胃丹之類食積為患者
保和九枳朮丸之類消之枳實導滯丸木香枳榔
丸之類下之濁氣在上者湯清氣在下者提之寒
者溫之熱者清之虛者補之實者瀉之結者散之
留者行之此治法之大要也學者詳之

脈法

脈經曰脈細小緊急病深也

刺痛

陰弦則腹痛 弦急小腹痛 尺脈緊臍下痛
尺脈伏小腹痛癥瘕 尺脈實小腹痛當利之
心腹痛不得息脈細小遲者生脈大而疾者死
腹痛脈反浮大而長者死

方法

丹溪方法
九十五條

丹溪曰腹痛有寒有積熱有食積有痰有死血脉
弦者多屬食宜溫散之蓋食得寒則滯得熱則
行更宜以行氣則氣若助之無不愈者○脉滑
者是痰痰因氣滯而聚阻礙道路氣不得宣通
而痛宜導痰鮮薤○凡痛必用溫散以其鬱結
不行阻氣不運故也○臍下忽大痛人中黑色
者多死○腹中水鳴乃火擊動其水也

戴氏曰痛甚便欲大便去後則痛減者是食積
也綿綿痛而無增減者是寒也時痛時止者是
熱也其痛有常處而不
移動者是死血也

○治腰痛用白芍蒼朮香附白芷為末姜汁入湯調
服

○白芍藥止能治血虛腹痛餘俱不治以其酸寒收
散之功

者也

○如飲食過傷而腹痛者宜木香枳榔下之

○如氣虛之人傷飲食而腹痛宜調補胃氣併消導

藥用人參白朮山查神麴枳實麥芽木香砂仁之類

○如腹中常有熱而痛此為積熱宜調胃承氣湯下之

○小腹實痛用青皮以行其氣

○小腹因寒而痛宜肉桂吳茱萸

○因寒而作痛者宜小建中湯加乾姜官桂台子蒼

醫學正傳卷之四

三十八

○因熱而痛者二陳湯加黃芩黃連梔子痛甚者加炒乾姜

○若腹痛不禁下者宜川芎蒼朮湯以治之川芎蒼朮香附白芷茯苓滑石加姜水煎服

○高良姜湯治因寒心腹疼痛

高良姜二錢 厚朴姜製 官桂各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗稍熱服

○草薢薤湯治臍腹虛脹作痛

澤瀉二錢

木香三分

神麴四分

半夏

枳實麴炒黃色

草薢仁麴炒

黃芩

春夏勿用

益智仁去壳

甘草炙各半錢

青皮

陳皮各六分

川歸七分

茯苓七分

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服

○益胃散治因服寒藥過多致痛不止

醫學正傳卷之四

三十九

人參

厚朴姜製

甘草炙

白芷麴去壳

姜黃

乾姜炮

砂仁

澤瀉已上各三分

知仁六分

陳皮七分

黃芩七分蜜炙

右細切作一服加姜水煎服

○厚朴溫中湯治胃虛寒脹滿疼痛用厚朴陳皮各錢

茯苓

草薢薤麴包煨

甘草炙

木香各半錢

乾姜三分半炮

加姜水煎服之

○六合散又名金鑰治一切燥熱鬱結汗後餘熱宣

轉不通并治小腸氣結心腹滿悶胃中痞結

注疼痛

大黃

一兩酒洗

白丑

半兩

黑丑

各炒

甘遂

各半兩

枳榔

三錢生

輕粉

一錢

右為細末每服一錢蜜水調下量虛實加減服

○沒藥散治一切心腹疼痛不可忍者

沒藥

另研

乳香

另研各一錢

穿山甲

五錢酒洗

木鱉子

四錢去壳

右為細末每服半錢或一錢酒大半盞煎三五

沸服

○水香檳榔九治食鬱氣滯作痛

水香

三錢

檳榔

三錢

青皮

五錢去白

陳皮

五錢去白

麥蘖麪

炒七錢

枳實

炒黃各

白朮

五錢

厚朴

姜制四錢

右為細末湯浸餅為丸如梧桐子大每服五十

丸溫水下食遠

○枳實導滯九治食傷溫熱之物不得施化腹痛滿

悶不安以利為度方見內傷門

○八芾散治食傷太陰填塞悶亂不快甚則心胃大

痛兀兀欲吐者方見中風門

○霹靂散治腹痛脈微欲絕

附子

一枚炮取山以酒

右以一味取五錢重入真臘茶一錢同研細為

末分作二服每服用水一盞煎七分去粗入蜜

一匙稍冷服

○酒煮當歸九治小腹寒痛及婦人白帶疝癰大寒

等証

茴香

五錢

黑附子

炮

良姜

各七錢

當歸

一兩

右四味細切以上好無灰酒一升半煮至酒乾

盡焙乾入後藥

炙甘草

生用

苦練

生用

丁香

各五錢

木香

升麻各一錢

柴胡

二錢

炒黃蘗

全竭各三錢

玄明索

四錢

右與前四味同研為細末酒煮麪糊為丸如梧

桐子大每服五七十丸空心淡醋湯下忌油膩

冷物及酒溫麪

○黃連湯治胃中有熱胃中有邪氣腹內痛甚特欲嘔吐此藥升降陰陽

黃連炒酒

甘草炙

乾姜

桂枝各五錢

人參二錢

半夏半合湯泡七次去沫

右細切入大棗二枚量水煎服

○芍藥甘草湯治四時腹痛

芍藥炒酒

甘草炙

各等分每服五錢細切入生姜三片水一斗半

煎至一盞溫服○醫聖元戎云腹痛脉弦傷氣

用本藥○脉洪傷金加黃芩○脉緩傷水加桂

枝○脉瀉傷血加當歸脉遲傷寒加乾姜

○加減小柴胡湯治寒熱脉弦腹痛本方去黃芩加

白芍藥

四物湯錢六加玄胡索各一錢半

○四物苦練湯治脐下虛冷腹痛

右細切水二盞煎至一盞溫服

○增損當歸丸治三陰受邪虛弱

○增損當歸丸治三陰受邪虛弱

四物湯五錢 防風

獨活

全蝎各五錢

續斷

茴香各一錢

苦練酒煮

玄胡索炒

木香

丁香各二錢

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九

白湯下

○苦練丸治奔豚小腹作痛方見疝氣門

○一捏金散治脐腹大痛及奔豚小腸氣等証

玄胡索

川練子酒煮

全蝎去毒炒

茴香

各等分

為細末每服二錢七熱酒調下神驗

○丹溪活套云凡腹痛多是血脉凝澁不行必用酒

炒白芍藥惡寒而痛加桂惡熱而痛加黃柏○

如腹痛欲以物柱按者屬虛用人參白朮乾姜

官桂之類○如腹痛手不可按者屬實宜用建

中湯加大黃或調胃承氣湯加桂枝類之而

愈○如因飲食過傷而作痛者必問因傷何物

如傷生冷硬物而作痛者東垣木香見晚九三

稜積丸之類如傷熱物而作痛者枳實導滯丸
三黃枳朮丸之類看強弱緩急用而下之。如
氣虛之人因飲食過傷而腹痛者宜補瀉兼施
用二陳湯加川芎白朮神麴麥芽人參蒼朮之
類或送下前堆積等九子以下之。如腹中常
覺有熱而暴痛者此為積熱宜調胃承氣湯之
類下之。如因跌撲損傷而作痛者此瘀血証
宜桃仁承氣湯抵當湯之類逐去其血即愈。
如因事損傷或酒後涉水血凝腹痛者大承氣
湯加桂

醫學正傳

卷之四

四十四

引

一黃氏婦年五十餘小腹有塊作痛二月餘一醫
作死血治與四物加桃仁等藥不効又以五靈
脂玄胡索乳香沒藥三稜義朮等作丸服又不
効召予治診其六脉皆沉伏兩尺絕無予曰乃
結糞在下焦作痛耳非死血也用金城稻蘖燒
灰淋濃汁一盞服之過一時許與枳實導滯丸
一百粒催之下黑糞如梅核者一碗許痛遂止
後身生血潤腸之藥十數貼調理平安

○一壯年男子寒月八水網魚鱗甚遇涼粥食之
大痛二晝夜不止一醫先與大黃丸不通又與
大承氣湯下糞水而痛愈甚召予治診其六脉
皆沉伏而實面青黑色予曰此大寒証及下焦
有燥屎作痛先與丁附治中湯一貼又與灸氣
海穴二十一壯痛減半繼以江子加陳香朮香
作丸如棗豈大生姜汁送下五粒下五七次平
安

腰痛三十二

論

醫學正傳

卷之四

四十五

引

內經曰足太陽脉令人腰痛引項脊尻背如腫壯
少陽腰痛如以針刺其皮中循々然不可以伸仰
明腰痛不可以顧々如有凡者善悲足少陰腰痛
痛引足內膝厥陰腰痛腰中如張弓弩弦太陰腰
痛下如有橫木居其中繼則遺洩又曰太陽所至
為腰痛巨陽虛則腰背頸項痛是動則病項如拔
俠脊痛腰似折髀不可以曲又曰腰者腎之府轉
搖不能腎將憊矣腰經曰腰者腎之所用力舉重者

房過月出知浴水則傷腎腎脹者腰滿引背
史然腰帶痛又有腎着之病從腰以下冷腰重如
帶五千錢若夫腰痛之証雖有六經見候之不同
然因腎之或異或瘀血或風寒或濕痰流注種種
不一原其所由未必不因房室過度負重勞傷之
所致也經曰邪之所湊其氣必虛是也治法虛者
補之杜仲黃柏肉桂當歸五味兔絲子天門冬熟
地黃之類風者散之麻黃防風羌活獨活之類寒
者溫之肉桂乾姜附子之類挫閃者行之當歸蘇
木乳香沒藥桃仁紅花之類瘀血者逐之大黃牽
牛桃仁水蛭蜜之類濕痰流注者消導之蒼朮蘇
芳香附白芷枳實橘紅半夏茯苓之類宜各類推
而治之不可執一論也

脈法

脈經曰尺脈沉腰背痛九腰痛時時失精飲食減
少其脈沉滑而遲此為可治

腰痛之脈皆沉弦而緊者為寒沉弦而浮者為
沉弦而濡細者為濕沉弦而實者為

丹溪曰脉必沉而弦沉為帶弦為虛瀉者是瘀血
緩者是濕滑者伏者是痰大者是腎虛也

方法

丹溪曰有腎虛有瘀血有溫熱有到閃有痰諸腰

痛不可用補氣藥亦不宜峻用寒涼藥

○腎虛腰痛用杜仲黃柏龜板知母枸杞子五味子
猪脊骨髓丸服

○瘀血宜行血順氣用補陰丸加桃仁紅花外用三
棱針於委中穴出血以其血滯於下也

醫學正傳

○濕宜燥濕行氣用黃柏杜仲蒼朮木川芎之類

戴氏曰痰之不已為腎虛也日輕夜重者
是瘀血也遇天陰及久坐而發者是濕也

○痰宜南星半夏加快氣藥佐之使痰隨氣運

○腰曲不能伸者針人中立愈

○腎着為病其体重腰冷如冰飲食如故小便自利

腰以下冷痛而重治宜流溫兼用溫藥

○腎着湯治腎着腰痛

乾姜炮 茯苓各一錢半 甘草炙半錢

白朮二錢半 右水煎服

○三白膏丸治腎虛腰痛常服壯筋骨虛

杜仲一斤炒 生薑十兩炒 破故紙一斤炒

右為細末用胡桃肉一百二十箇湯浸去皮膜

研為膏煉蜜些少丸如梧桐子大每服五十九

鹽湯下

○三因立安丸治五種腰痛常服溫補腎元壯健腰

脚 破故紙炒 乾木瓜各一兩半 牛膝酒洗一兩

草薢二兩 杜仲姜汁炒 續斷各一兩

醫學正傳卷之四 四十八

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九溫

酒下

○補骨脂丸治腎虛及寒濕一切腰痛

草薢四兩 用鹽湯浸一兩 童便浸一兩 用米泔浸一兩

杜仲絲新 補骨脂炒香

胡桃肉八兩浸去泥

右以前三味共為末不犯鐵器入胡桃肉用

木杵搗千餘下以糯米糊為丸秋冬以煉蜜為

丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒下

壓之

○獨活湯治勞後腰痛如折

羌活去片 防風去片 獨活去片

澤瀉去毛 肉桂各三錢 大黃酒浸煨熟

甘草各二錢 川歸五錢 連翹五錢

防已酒炒 黃柏酒炒各二錢 桃仁研三十箇

每服一兩酒水煎服

○摩腰丹治寒熱腰痛

附子尖 烏頭尖 天南星各二錢

硃砂炒 乾姜各一錢 雄黃

樟腦 丁香各一錢半 射香當門子五

右為末蜜丸如龍眼大每用一九生薑汁化開

如厚粥樣烘熱置掌中摩腰上冷盡粘着肉烘

綿衣縛定腰熱如火間三日用一九炒或加吳

茱萸桂皮

○煨腎丸治腎虛腰痛

杜仲三錢炒絲斷

右為細末以猪腰子一隻薄批作五七塊以椒

鹽淹去腥水摻藥末在內以荷葉包裹更加濕

紙二三重外包慢火煨 食之無灰酒送下去

○補腎丸治腎虛腰痛方見聖規門

○蒼朮湯治濕熱腰腿疼痛

防風

黃柏 各一錢

柴胡 二錢

蒼朮 卷錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

○川芎肉桂湯治瘀血在足太陽足少陰足少陽三

經腰痛酒

醫學正傳

卷之四

五十一

漢防已

防風

去芦 各三分

炒神麴

獨活 各四分

川芎

柴胡

肉桂

當歸稍

炙甘草

蒼朮 各一錢

羌活 一錢半

桃仁 五箇 去皮尖另研細

右細切作一服好酒三盞煎至一盞去粗稍熱

服食遠

○地龍散治腰脊痛或打撲損傷或從高墜下惡血

在太陽經令人腰脊痛或脾肢脛膈中痛不可

忍

當歸稍 二分

中桂

地龍 各四分 研細

麻黃 五分

蘇木 六分

獨活

黃柏 鹽酒炒

甘草 各八分

羌活 一錢二分

桃仁 六箇 去皮尖

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○拈痛湯治濕熱為病肩背沉重肢節腰脇疼痛曾

隔不利

白朮 四分

人參 去芦

升麻

苦參 酒炒

葛根

蒼朮 各五分

醫學正傳

卷之四

五十一

防風 去芦

知母 去毛酒洗 澤瀉

黃芩

猪苓 去皮

當歸 各六分

炙甘草

生黃芩 酒洗

茵陳 酒炒

羌活 各八分

右細切作一服水二盞煎至一煎去粗溫服

○蒼朮獨活散治寒濕相合腦後痛惡寒項筋骨骨

強肩背膝腰痛膝膕痛無力行步沉重

紅花 一分

黃柏 三分

柴胡 去芦

藥本

澤瀉

白朮

升麻各五分 羌活一錢 蒼朮四兩

右細切先以蒼朮一味用水二大盞煎至二盞去粗入前藥後煎至一盞去粗空心稍熱服取微汗為効忌酒及濕麵

○一粒金丹治腰膝走注疼痛如虎咬之狀不可忍

者 草烏頭炮裂 五灵脂各四兩 木鱉子一兩去

白膠香二兩 地龍去泥土 京墨二錢半

乳香二錢半 當歸五錢 沒藥五錢

射香二分半 卷之四 五十二

右為細末再研千餘下糯米糊丸如梧桐子大每服一九或二九多至三九溫酒下服藥後微

汗神驗

○元戎加味四物湯治瘀血腰痛

本方加桃仁泥酒紅花二味煎服

○三因安腎丸治腎虛腰痛

破故紙炒 胡芦巴炒 茴香炒

川苦練炒 續斷炒各三 桃仁炒

杏仁炒 山藥 茯苓各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九鹽湯下

○如神湯治到閃腰痛甚者不過三服平安

川歸 肉桂 玄胡索各等分

右為細末每服二錢熱酒調下或細切酒煎亦可

○獨活寄生湯治因腎虛坐卧冷濕當風所得

獨活一錢 桑寄生 杜仲炒

細辛 牛膝 秦艽

茯苓 白芍藥 桂心

川芎 防風 炙甘草

人參 熟地黃 當歸各五分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗空心溫

服

○五積散治寒濕及清痰流注經絡腰膝背脇疼痛

白芷 川芎 桔梗

芍藥 陳皮 厚朴姜製

茯苓去皮

甘草

麻黃

乾姜炮

官桂

川歸

半夏湯泡七次
去皮脂

蒼木米泔浸五
七日

枳殼各五分

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞

溫服

○丹溪活套云凡因房勞辛苦而腰痛者四物湯加知母黃柏五味子杜仲之類吞補腎丸或大補陰丸○因風寒溫流注經絡而作痛者二陳湯加麻黃蒼木川芎白芷防風羌活獨活之類○

醫學正傳

卷之四

五十五

水

因到閃跌撲致死血流于本經而作痛者四物湯加桃仁紅花蘇木之類脉實人壯盛者大承氣湯加桂下之安○有因醉飽入房太甚而酒食之積乘虛流入於本經致腰痛難以俛仰四物湯合二陳湯加麥蘗神麴杜仲黃柏官桂砂仁葛花枳梗之類

脇痛三十三

論

內經曰肝病者兩脇下痛引小腹令人善怒虛則

目眈眈無所見耳無所聞善恐如人將捕之又曰

怒則氣逆虛則嘔血及衄泄故氣上矣蓋心出血

肝納血因大怒而血不歸經或隨氣而上出於口

鼻或留於本經而為脇痛又或歲木太過而本氣

自甚或歲金有餘而木氣被鬱皆能令人脇痛經

曰病脇下滿氣逆二三歲不已病名曰息積是亦

肝木之餘之証也外有傷寒發寒熱而脇痛者足

少陽膽足厥陰肝二經病也治以小柴胡湯無有

不効者或有清痰食積流注脇下而為痛者或有

醫學正傳

卷之四

五十五

世

登高墜仆死血阻滯而為痛者又有飲食失節勞役過度以致脾土虛乏肝木得以乘其土位而為胃脘當心而痛上支兩脇痛膈噎不通食飲不下之証醫者宜於各類推而治之母認假以為真也

脈法

脉經曰肝脉搏堅而長色不清當病墜墮若搏因

血在脇下令人喘欬輒而散輒輻瀉軟古通用

其色澤者當病溢飲溢飲者暴渴多飲而溢入

於肌膚腸外也

肝脉沉之而急浮之亦然若脇下痛時小便

難苦目眩頭痛腰背痛是為逆寒時痛婦人月

水不來時無時有得之火時有所墜墮

脉双弦者肝氣有餘兩脇作痛

方法

丹溪曰屬肝木氣實因怒氣大逆肝氣鬱甚謀慮不決風中於肝皆使木氣大

實故火盛肝氣急也

有死血因患血停滯於肝搏於脇下而作痛病則自肝痛甚按之益甚也

痰流注因痰積流注於厥陰之經亦能使脇下痛病則咳嗽氣急引血痛

醫學正傳卷之四五十六

○當歸龍會丸瀉肝火大盛之要藥因內有濕熱兩

脇痛甚伐肝木之氣肝實宜之

當歸 龍胆草 梔子仁

黃連 大黃酒溫唐火 蘆薈

青代各五錢 木香二錢半 射香王分另研

右為細末神麴糊丸如梧桐子大每服二十九

生姜湯下

○一方加柴胡五錢青皮一兩熱甚者烘熱服

○一方木氣實者用川芎蒼朮青皮芍藥柴胡甘草

龍胆草各等分水煎服

○左金丸瀉肝火行濕為熱甚之反佐

黃連六錢 吳茱萸一錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如菉葢大每服三五

十九淡姜湯下

○一方破血行氣治死血作痛之証

桃仁去皮留尖另研 紅花酒拌焙乾 川芎

香附童便浸 青皮各等分

右細切水煎服之

醫學正傳卷之四五十七

○加味二陳湯治溫痰流注脇內作痛

本方加炮南星蒼朮川芎姜水煎

○肝苦急急食辛以散之用撫芩蒼朮或用小柴

湯蓋本方為脇痛發寒熱者必用之要藥也

○左脇痛以柴胡為君加佐使藥川芎青皮草龍胆之類

○兩脇走痛或用控涎丹因清痰流注作痛者可用蓋痰在脇下非白芥子不能達方在痰門

○治咳嗽脇痛者二陳湯加南星青皮香附各等分

一云四物湯加青皮等藥以疎肝氣

○氣弱之人脇下痛脈細紫或弦多從勞役怒氣得之八物湯加木香青皮或加桂心水煎服之

○去滯氣用青皮蓋青皮乃肝胆二經藥人多怒脇下有鬱積固宜以解二經之實者若二經氣血

不足先常補血氣少加青皮可也此承上條意思言也

○肥白人氣虛發寒熱而脇下痛用參芪補氣柴胡

黃芩退熱木香青皮調氣

○瘦弱人寒熱脇痛多怒脇必有瘀血宜桃仁紅花

柴胡青皮大黃之類行之醫學正傳卷之四 五十八

○發寒熱脇痛似覺有積塊必是飲食太飽勞力所致必用龍會丸治之

○解痛治標藥外用琥珀膏貼之○又方用芥菜子

水研付○又方以吳茱萸研水調付○又方以

韭菜葉搗細炒熱貼而以熨斗盛火熨之

○推氣散治右脇痛甚脹滿不食

片姜黃 枳殼 桂心 各五錢

甘草 炙三錢

右為細末每服二錢姜湯調下水煎亦可

○枳芩散治左脇疼痛不可忍

枳實 炙 川芎 各五錢 甘草 炙 一錢半

右為細末每服二錢姜棗湯或酒調下

○異香散治腹脇膨脹痞悶噎塞腹脇疼痛

蓬莪朮 煨 益智仁 甘草

京三稜 各一錢 青皮 陳皮 各五分

石蓮肉 厚朴 姜制 三分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚白鹽少

許水一盞半煎至一盞去粗溫服醫學正傳卷之四 五十九

○分氣紫蘇飲治腹脇疼痛氣促喘急

五味子 桔梗 去芦 紫蘇葉

桑白皮 炙 黃草 藥仁 陳皮 去白

大腹皮 酒洗淨 茯苓 甘草 炙 各半錢

右細切作一服加生姜三片白鹽少許水一大

盞煎七分去粗空心溫服

○芎藭湯治脇下疼痛不可忍

桂枝 川芎 細辛

乾葛

防風

去芦各八分

芍藥

枳殼

麻黃

人參

甘草各四分

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一

盞溫服

○丹溪活套云凡脇痛者多是肝木有餘也宜用小

柴胡加青皮川芎芍藥草龍胆甚者煎成正藥

入青代射香。痰流注者本方倍半夏加橘紅

南星蒼白朮茯苓川芎之類。瘀血作痛者小

醫學正傳

卷之四

六十一

居

柴胡合四物湯加桃仁紅花或乳香沒藥煎服

痛甚而元氣壯實者桃仁承氣湯下之而愈。

性急多怒之人時常腹脇作痛者小柴胡加川

芎芍藥青皮之類煎服甚者以煎藥送下當歸

龍會丸其効甚速

○金氏子年四十餘因騎馬跌撲次年左脇脹痛醫

與小柴胡湯加草龍胆青皮等藥不効來求治

診其脉左手寸尺皆弦數而瀋關脉托而急數

右三倍惟數而虛予曰明是死血証用抵當丸

一劑下黑血二升許後以四物湯加減調理而

安

論

內經曰百病皆生於氣也故怒則氣上喜則氣緩

悲則氣消恐則氣下寒則氣收溫則氣泄驚則氣

沉一口勞思則氣結夫人身之正氣與血為配行

脉中氣行脉外一呼脉行三寸一吸脉行三寸氣

血並行周流乎一身之中灌漑乎百骸之內循環

醫學正傳

卷之四

六十一

無端運氣不悖而為生生不息之妙用也經曰一

息不運則機緘窮一毫不續則窮壤判若內無七

情之所傷外無六淫之所感何氣病之有哉其不

善攝生者五志之火無時不起五味之偏無日而

不傷是以釀成膠痰固積留滯於六府鬱火邪氣

充塞乎三焦使氣血失其常候府藏不能傳導是

故外邪得以乘虛而奏襲矣以致清陽不升濁陰

不降而諸般氣痛朝輟暮作而為膠固之疾非良

工妙手莫易治焉若夫為脇痛為心腹痛為周身

刺痛甚則為反胃為膈噎等証即此之由也大抵男子屬陽得氣易散女人屬陰遇氣多鬱男子之氣病者常少女人之氣病者常多故治法曰婦人宜調其血以耗其氣男子宜調其氣以養其血此之謂也學者宜致思焉

脉法

脉經曰脉滑者多血少氣濇者少血多氣大者血氣俱多脉來大而堅者血氣俱實小者血氣俱少

醫學正傳

卷之四

六十二

脉來細而緩者血氣俱虛代者氣衰

細者氣少浮而絕者氣欲絕

辟大而滑中有短氣

尺脉濇而堅為血實氣虛尺脉細而微血氣俱不足也

劉立之曰下手脉沉便知是氣沉極則伏

濇弱難愈其或沉滑氣熱痰飲病也

方法

凡六條

丹溪曰周流乎一身以為生者氣也苟內無所傷

外無所感何氣病之有分冷氣滯氣逆氣上氣皆是肺受火邪氣得炎上之化有升無降薰蒸清道甚而轉成劇病局方例用辛香燥熱之劑以火濟火咎將誰執又曰氣無補法世俗之論也以其為病痞滿壅塞似難於補不思正氣虛者不能運行邪滯着而不出所以為病經曰壯

者氣行則愈怯者着而為病苟或氣怯不用補法氣何由行又曰冷生氣者出於高陽生之謬

言也病人自覺冷氣從下而上者非真冷也蓋

醫學正傳

卷之四

六十三

上升之氣自肝而出中挾相火自下而上其熱

為甚大極似水陽亢陰微又曰凡氣有餘便是

火是皆為治之正論也可不究與

○調氣用木香然木香味辛氣能上升如氣鬱而不

達固宜用之若陰火衝上而用之則反助火邪

而病甚矣故當用黃柏知母而少用木香佐之

○稟受素壯而氣刺痛當用枳殼烏藥若因氣不舒

而刺痛當用木香調達之

○若肥白人氣刺痛者宜於人參白朮加枳殼木香

一方鮮五藏諸氣益少陰經血用梔子炒令將黑
為末以生姜汁入湯同煎飲之其効甚捷

○清膈九治因溫熱氣滯

黃芩

黃連

錢各五

香附

錢一兩

蒼朮

二兩

右為細末新取紅熟瓜蒌去皮搗爛和丸如棗
豈大每服三五十九白湯下

○正氣天香湯治婦人一切諸氣作痛或上湊心胃
或攻築脇肋腹中結塊發渴刺痛月水因之而

醫學正傳

卷之四

六十四

六

不調或眩暈嘔吐往來寒熱無問胎前產後一
切氣候並皆治之

烏藥

一錢半

香附

六錢

陳皮

紫蘇

乾姜

各六分半

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗稍熱
服

○子和木香檳榔丸此藥流溫潤燥推陳致新滋陰
抑陽散鬱破結活血通經治男子婦人嘔吐酸
水痰涎不利頭目昏眩併一切酒毒食積及米

穀不化或下痢膿血大便秘塞風壅積熱口苦
煩渴涕唾稠粘膨脹氣滿等証

木香

檳榔

青皮

去穢

陳皮

去白

黃柏

莢木

煨

枳殼

炒

黃連

去毛

大黃

酒拌

紙

黑丑

取頭末

香附

童便

當歸

一兩半

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五七十

丸溫水以利為度

○蘇合香丸大能順氣化痰併治傳屍骨蒸勞瘵卒

醫學正傳

卷之四

六十五

見

暴心痛小兒驚搐大人中風卒屍等証

沉香

射香

另研

訶子

煨

去核丁

不香

安息香

另研

白檀香

各一兩

華撥

白木

薰陸香

另研

蘇合油

和入安

龍腦

另研各一

硃砂

另研

烏犀角

各五錢

右為細末研極勻入安息膏及煉蜜和勻丸如

梧桐子空心溫酒化下四九白湯亦可

○蘇子降氣湯治氣不升降痰涎壅塞氣滿氣痛等

証

川歸去頭酒浸甘草炙

前胡去苗

厚朴姜制各半肉桂去些皮

陳皮去白各七分半

半夏泡紫蘇子另研各一錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞

半煎一盞去粗不拘時服

○異香散治胃氣不和飲食不化腹脇膨脹一切冷

氣結聚作痛等証方見脇痛門

○沉香降氣湯治陰陽壅滯氣不升降胃膈痞悶意

醫學正傳卷之四

六十六

醋吞酸

沉香四錢砂仁五錢

甘草炙一兩二錢

香附童便浸一宿四兩

右為細末每服二錢入鹽少許白湯調下

○復元通氣散治跌撲損傷或負重倒閉致氣滯於

血分作痛併一切氣不宜通瘀血凝滯周身走

痛等証

舶上茴香炒川山甲煅火煨木香各一兩半

玄胡索碎炒白朮取頭末甘草炙

陳皮去白各一兩當歸一兩半今加乳香

沒藥

右為細末每服二錢熱酒調下不飲酒人白湯

下病在上食後病在下食前服

○木香流氣飲治諸氣痞塞不通胃膈膨脹面目虛

浮四肢腫滿口苦咽乾大小便不利

藿香葉洗木香不見火厚朴姜制

青皮去白香附去毛童便麥門冬去心

白芷各七分半甘草五分陳皮去白一錢

醫學正傳卷之四

六十七

大腹皮酒洗淨乾木瓜人參去芦

蓬莪術煨丁香皮不見火半夏湯泡各一分

赤茯苓去白石菖蒲各三分草薢仁五分

紫蘇葉檳榔白朮

肉桂木通各六分沉香七分半

右細切作二服每服加生姜三片大棗一枚水

一盞半煎至一盞去粗服

○丹溪活套云蒼天之氣貴乎清淨若浩然充塞乎

宇宙之間以為生生不息之運用者此一元之

正氣也彼為雲為霧為風雲為雷霆鼓舞於天地之間者皆山澤濕熱蒸蒸之氣也在人者亦由是焉其清純之元氣與血並行循環無端未嘗有盈虧也彼衝擊橫行于藏府之間而為痛為痞滿為積聚等証者亦由天地間雲雷之鼓舞因濕熱鬱蒸而發者也濕熱鬱蒸之久在天則為霖雨雹雪等物在人身者為積聚為痞癖為痰氣痞滿之類治之之法在膏臆之間而為痞滿刺痛伏梁等証者二陳湯加枳實黃連

醫學正傳

卷之四

六十八

東

桔梗瓜蒌仁木香之類在下焦而為奔豚七疝等証者本方加桃仁山查梔子枳核茴香川煉去核之類在兩脇攻築作痛者本方加青皮柴胡芍藥草龍胆之類在中焦而為痞滿脹急者本方加水香厚朴枳榔枳殼或用平胃散以平其敦阜之氣惟婦人胎前產後一切氣疾作楚者俱用四物湯為主治加疎通行氣之藥此治氣之大法也學者宜細詳之

疝氣三十五

論

內經曰肝脉大急沉皆為疝又曰三陽急為瘕三陰急為疝難經曰任脉之為病其內苦結男子為七疝夫所謂七疝者寒水筋血氣狐癩七者是也子和曰寒疝者囊冷結硬如石陰莖不舉或控睪丸而痛得之於坐卧濕地或寒月涉水或值雨雪或坐卧磚石或風冷處使內過房宜以溫劑下之久而無子水疝者其狀腎囊腫痛陰汗而出或囊腫狀如水晶或囊痒而搔出黃水或小腹按之作水聲得之於飲水醉酒使內也勞汗出而遇風寒濕之氣聚於囊中故冰冷令人為卒疝宜以逐水之劑下之外有漏針法恐誤不錄筋疝者其狀陰莖腫脹或潰而為膿裏急筋縮或莖中作痛痛極則痒或挺縱不收或出白物如精隨漫而下得之於房室勞傷及邪術所使宜以降心火之劑下之血疝者其狀如黃瓜在小腹兩傍橫骨兩端約紋中俗名便癰得之於重感春夏大熱勞於使內氣血流溢滲入脬囊留而不去結成癰腫膿少血多宜以和血

醫學正傳

卷之四

六十九

東

之劑下之氣疝者其狀上連腎臙下及陰囊多得於號哭忿怒則氣鬱之而脹號哭怒罷即氣散者是也有一治法以針出氣而愈蓋針有得失宜以散氣之藥下也或小兒亦有此疾俗名偏墜得之於父已年老或年少多病陰痿精怯強力入房因而有子稟胎病也此証難治惟築賓一穴有灸之而愈者穴法宜狐疝者其狀如仰瓦卧則入小腹行立則出腹入囊中如狐晝出穴而弱夜入穴而不溺此疝出入往來上下正與狐相類也亦與氣疝大同小異宜以逐氣流經之劑下之癰疝者其狀陰囊大如升斗不痒不痛者是也得之於地氣卑濕故江淮之間多有之宜以去濕之劑下之女子陰口凸出雖亦此類乃熱則不禁固也不可便認為虛寒而溫之補之本名曰瘕宜以苦藥下之以苦堅之愚按子和論七疝病源至為詳悉但其處方一以攻下之法為主治不能使人無疑耳既曰多由房勞致虛而作其可以例施之以攻下之法乎大抵七疝為病若非房勞所致即是遠行辛

脉法

苦涉水履冰熱血得寒而凝滯於小腸膀胱之分或濕熱乘虛而流入於足厥經之經古方一以為寒而純用烏附等熱藥為治我丹溪先生獨斷為濕熱此發古人之所未發者也夫熱鬱于中而寒束于外宜其有非常之痛故治法宜驅逐本經之濕熱消導下焦之瘀血而以寒因熱用之法立方處治即和易伏而病易退也其攻下之法愚故未敢試而行之以俟識者再論學者宜致思焉

內經曰肝脉大急沉皆為疝心脉滑搏急為心疝又三陽急為瘕三陰急為疝。又則病脾風疝陽明脉滑則病心風疝太陽脉浮則病腎風疝少陽脉浮則病肝風疝脉經曰寸口脉弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行則惡寒緊則不欲食弦緊相搏則為寒疝跌陽脉浮而遲浮則為風虛遲則為寒疝繞臍痛若發則自汗出手足厥寒其脉沉伏者為頭滿主之

方法 冊 吳方法

丹溪曰病氣者單九連小腹急痛也有痛在單九者有痛在玉樞穴邊者皆足厥陰之經也或無形或無聲或有形如瓜或有聲如蛙自素問而下皆以為寒蓋寒主收引經絡得寒則收而不行所以作痛然亦有踢水涉水終身不病此者無熱故也大抵此証始於濕熱在經鬱而久又得寒氣外束不得疎散所以作痛若只作寒論恐未備或曰厥陰經鬱積濕熱何由而致予

陳明正傳天 卷之四

七十二

曰大勞則火起於筋醉飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火起於肝積之久母能令子虛濕氣便盛濁液凝聚併入血緣流于厥陰厥陰屬木係于肝為將軍之官其性急速火性又暴為寒所束宜其痛之太暴也有以烏頭梔子作湯服之其効亦捷後用此方隨形証加減與之無不驗但濕熱又當分多少而治濕則腫多癰病是也又有快虛而發者當以參朮為君疎導藥佐之疎甚沉緊而謬大無力者是也其痛

亦輕但重墜牽引耳專主肝經與腎絕無相干

切不可下却藥神効蓋溫熱因寒鬱而作用梔

子以降濕熱烏頭以破寒鬱沉二物皆下焦之

藥而烏頭為梔子之所引其性急速不容胃中

停留也又謂按之不痛者屬虛須加肉桂以姜

汁丸服

○方定疝痛用海石香附為末姜汁調下

○又方治諸疝定痛速効用枳實梔子糖菹即山查

菜萸各炒溫盛者加荔枝核炒為末丸服或用

醫學正傳天 卷之四

七十三

長流水調末子空心服一二錢一本有川練子

○又方治食積與瘀血盛痛者一云火陽痛者有瘀血

梔子仁 桃仁 山查

枳實 菜萸各等分

右為末順流水入姜汁作湯調服

○又方治陽明經受溫熱傳入大腸惡寒發熱小腹

連心際結核悶痛不可忍用山梔桃仁枳核並炒

山查等分入姜汁煎熱服

○按之不痛者屬虛必用桂枝山梔子炒烏頭炮

右件為細末姜汁打糊丸為梧桐子大每服四

五十丸切痛効

○一方治癩腰痛者一本腰不痛者蒼朮南星白芷

山查半夏川芎枳實神麴糊丸服

○諸疝發時用海石香附二味為末姜汁入湯調服

亦治心痛因清痰而作痛者

○又治疝方橘核炒桃仁研梔子炒茱萸炒川烏炮

水煎服

○小腸氣腎核脹痛蒼朮陳皮川練子各二錢半甘草半錢

醫學正傳卷之四七十四

紫蘇一錢半細末酒水各一盞連鬚葱白五莖煎

服

○劫疝藥用烏頭梔子炒搗細順流水入姜汁調服

○陰囊腫脹大小便不通

白牽牛二兩桑白皮白朮

木通去節陳皮各半兩

右為細末每服二錢姜湯調下空心服

○凡疝氣按虛者必以參朮為君佐以疎道之藥如

川練子茴香枳實山查梔子之類

○三因葱白散治一切寒症作痛

川芎當歸枳殼炒

厚朴炒官桂乾姜

茴香炒茯苓川練

麥蘖炒神麴炒三稜炮

義朮炮熟地黃白芍藥

木香人參各等分

右細切每服五錢加葱白三莖鹽少許水煎空

心溫服

醫學正傳卷之四七十五

○又方桃仁十四箇枸杞子十四箇毛上炒山梔子

九枚去皮吳茱萸七粒山查子十四箇並炒生姜

一搯大搗細以順流水一鍾盪起煎數沸連粗

服

○又方治癩不痛用蒼朮神麴白芷山查川芎梔子

半夏入姜煎服

○凡癩証非痛斷房事與厚味不可用藥

○凡治疝須先灸大敦穴一名大頓任足大拇指

壯足厥陰

○治疝氣神方其病甚至氣上衝如有物築塞心腹

欲死手足冷者二三服除根

硫黃不拘多少火中溶化即投水中出毒研細

荔枝核為末炒焦黃色

陳皮

右三味各等分為末飯丸如梧桐子大每服十

四五丸酒下其痛立止自己覺疼甚不能支持

畧用五六丸再不可多也

○又治疝方

蒼朮

香附各鹽炒

黃柏酒炒已上為君

青皮去穢

玄胡索

益智

桃仁已上為臣

茴香

附子鹽炒

甘草為使已上

右細切每服五錢順流水煎服

○五藥湯洗疝痛立効

枇杷葉

野薺蘇葉

椒葉

蒼耳草葉

水晶蒲桃葉

右五味不拘多少量水煎湯浴洗

○一方肥人腫疝作痛發熱惡寒

五苓散加茴香煎服神驗

○吳茱萸湯治厥疝腹中冷痛積氣上逆致陰冷寒

寒

吳茱萸半錢湯泡七次川烏頭炮去

細辛各七分半

良姜

當歸

乾姜炮

官桂各二分半

右細切作一服水一盞煎七分溫服日進三服

不痛為度

○茴香練實丸治控睪小腸痛結上而不下痛衝心

疝

腸

茴香炒

練實去核

食茱萸泡

陳皮各一兩

馬蘭花醋炒

芫花醋炒

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服十九至

二十九空心溫酒下

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服十九至

二十九空心溫酒下

○蒺藜湯治陰疝牽引小腹痛諸厥疝即陰疝也毒

歎房勞痛不可忍

痰癰

去刺炒

附子

炮云

梔子仁

各一錢

右細切作一服水一盞煎至六分食前溫服亦治前控舉小腸痛

○木香散治心疝小腹痛悶絕不已

木香

陳皮 各半錢

良姜

訶子皮

赤芍藥

枳實

炒各二分

草薢

川芎

黑丑 各一分

右細切水一盞煎七分去粗溫服

○香散治小腸氣臍腹疝痛筋急陰股中痛悶暈

醫學正傳

卷之四

七十八

不省人事

舶上茴香

益炒

枳實

炒各一兩

沒藥 半兩

右為細末每服一錢溫酒調下不拘時併進二三服効

三服効

○香附沉香桂附丸治中氣虛弱甚脾胃虛寒藏府

積冷心腹疼痛手足厥逆冷便利無度七疝引

痛喜熱物熨證

沉香

附子

炮

川烏

炮

乾姜

炮

良姜

官桂

吳茱萸

湯炮去

茴香

炒各一兩

右為細末醋煮麴糊為丸如梧桐子大每服五十丸至七十九空心米飲下

○元戎加味五苓散治疝氣卒腹小便秘澀

本方加川練子一分

右為細末每服二錢空心米飲調下

○茴香練實丸治陰疝痛不可忍及小腸氣痛

川練子

炒

茴香

炒

山茱萸

食茱萸

吳茱萸

青皮

醫學正傳

卷之四

七十九

陳皮

芫花

醋煮前

馬蘭花 各等分

較之前方多吳茱萸青皮

右為細末醋糊丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒下

心溫酒下

○天台烏藥散治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

烏藥

木香

茴香

青皮

良姜

炙各半

檳榔 二枚

川練子 十枚

巴豆 七十枚

右先以巴豆微打破用川練子麴炒黑去麴及

已昔不用其餘藥同為細末每服一錢溫酒調下甚者姜酒調下

○濟生葵子湯治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥膀胱作痛

赤茯苓 猪苓 冬葵子

枳實 瞿麥 木通

黃芩 車前子 滑石 各半錢

甘草 二分半

右細切作一服加生姜三片水煎空心服

醫學正傳 卷之四

○香練實丸治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下皆任脈所主陰經病也乃腎肝受邪故治同法

當歸 附子 炮 茴香 炒

川練子 各一兩

右細切用好酒三升同煮酒盡為度焙乾為細末每味重一兩入

丁香 木香 各半錢 玄胡索 五錢

全蝎 十三箇 炒

右為末與前藥同半勻酒糊為丸如梧桐子大每服三十九加至一百九空心溫酒送下

○一捏金散治七疝及奔豚氣痛不可忍者神效方

門氣

○川溪活套云凡治七疝多用熱藥而獲効者即內經從治之法耳須用寒涼藥監制之不可純用大熱之劑如烏頭附子之類令人久服多服必變劇不可治矣但宜以二陳湯加枳實橘核梔子山查等藥煎入生姜汁熱辣飲之。恐有瘕

血作痛者本方加玄黃索桃仁泥。如有氣作痛者本方加木香茴香練實等藥。如六脉沉細手足厥冷者本方加附子乾姜肉桂之類以佐之。如羣丸痛甚者加荔枝核乳香沒藥為細末調入本方煎藥內或另用順流水調服亦可。如木腎腫大如升斗者本方去甘草加海藻昆布荔枝核茴香川練等藥為末順流水調服作九子亦可

醫學正傳 卷之四

○祖傳經驗馬蘭花丸治七疝癰氣及婦人陰癰墜

子 42-597

下小兒偏墜等証無有不効者

馬蘭花 醋炒 川練實 橘核

海藻 洗淨 海帶 洗淨 昆布 三味俱用 酒洗

桃仁 去皮尖 厚朴 姜制 木通

枳實 麸炒 玄胡索 并碎炒 肉桂 去粗皮

木香 檳榔 各半兩 脉沉細手足逆

冷者加川烏頭一箇 五錢

右為細末酒糊丸如梧桐子大每服五七十九

或酒或姜湯送下

醫學正傳 卷之四 八十二

脚氣三十六

論

內經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰傷于濕者下先受之蓋脾主四肢足居於下而多受其濕濕鬱成熱濕熱相搏其病作矣是以先從氣衝穴隱核痛起及兩足脛紅腫或惡寒發熱狀若傷寒筋掣掣痛是其候也或一旬或半月復作如故漸漸而致於足筋腫大如瓜瓠者多有之矣東南卑濕之地比比皆是西北高燥之方鮮或有之古方名為緩

風謂宋元以來呼為脚氣原其所由非止一端有從外感而得者有從內傷而致者所感雖有內外之殊其為濕熱之患則一也故異法方宜論云北方者其地高陵居風寒水冽俗飲醢醢而肉食皆以飲多速飲為能經曰因而大飲則氣逆夫乳酪醇酒者濕熱之物飲之屬也加以奉養太過又滋其濕水性順下氣不能向故下注於足艱久而為腫滿疼痛此飲食下流之所致也東南地勢卑下濕氣迷滿山澤行發坐卧無處不有若稟壯而氣實者不能受邪其氣虛血少之人或遇勞勞及負重遠行衝冒雨雪寒濕乘虛而客發於足而成此証是外感寒濕之所致也大抵病因有內外之殊而治法無表裏之異耳故為治者宜通用蒼朮白朮之類以治其濕知母黃柏條芩之類以去其熱當歸芍藥生地黃之類以調其血木瓜檳榔之類以行其氣羌活獨活以利關節而散風濕兼用木通防己川牛膝之類引藥下行及消腫去濕以為此証大法不過如此東垣曰濕滿所勝治以苦溫

醫學正傳 卷之四 八十三

以苦辛發之透關節勝濕為佐以苦寒泄之流濕
清熱為臣故以當歸粘痛湯以治之其効捷如影
響針經曰有道以來必有道以去治宜多以針灸
為佳以導引其濕熱之氣外出也學者宜詳究焉
脈法

脈弦者風濡弱者濕洪數者熱遲澁者寒微滑者
虛牢堅者實結則因氣散則因憂緊則因怒細
則因悲

方法

醫學正傳

卷之四

八十四

火

丹溪曰脚氣從濕從下須提起其濕在下之藥隨
氣血用入心則恍惚謬妄嘔吐食不入眠卧不
安左寸脉大右寸小或左有右無者死○入腎
則腰脚腫小便不通呻吟目與額皆黑氣衝胃
而喘左尺脉絕者死

○治濕熱脚氣方

紫蘇

黃柏

鹽酒
泔炒

芍藥

木瓜

澤瀉

去毛

木通

去皮

防已

桑柳

蒼朮
米泔浸

枳殼

麩炒
黃色

甘草炙

香附

童便浸炒

羌活

痛加木香腫甚加大腹皮發熱

加黃連大黃

右細切水煎服痛除腫退則住服

○防已飲

黃柏

酒炒

蒼朮

鹽水炒

白朮

防已

各七分

生地黃

槲柳

川芎各半錢

犀角屑

甘草節

木通

黃連各三分

醫學正傳

卷之四

八十五

火

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗食前
溫服○有熱加黃芩○熱甚及天令暄熱加石
膏○有痰加竹瀝姜汁或南星○便秘加桃仁
○小便秘澁加牛膝○如常腫者專主乎濕熱
肥人加痰藥

○健步丸

蒼朮

當歸尾

各一兩

生地黃

陳皮

芍藥

各一兩半

川牛膝

五錢

大腹子三錢

萊更

條芩各五錢

桂心一錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服一

百丸白木木通送下食前服

○加味四物湯治脚氣衝心

本方加炒黃柏煎服更於湯泉穴用附子末津調捏作餅子貼穴上以艾炷多灸以泄引其熱

下行

○一方治食積流注用

蒼木米泔浸炒防已

黃柏酒炒

醫學正傳卷之四

八十六

子

南星炮裂川芎

白芷

犀角鎔

檳榔各等分

血虛加川牛膝龜板酒糊為丸服

○轉筋屬血熱四物湯加酒芩紅花煎服○有筋動

於足大指上至大腿近腰結了此奉養厚因風

寒而作又當加蒼木南星

○羌活導滯湯治脚氣初發一身尽痛或肢節腫痛

便溺阻滯先以此藥導之後用當歸粘痛湯以

徹其邪

羌活

獨活各一錢二分防已

當歸尾各七分大黃二錢四分枳實五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗空心

溫服

○當歸粘痛湯治溫熱脚氣為病肢節煩疼有背沉

重胃腸不利兼遍身疼痛下注足脛腫腳膝生

瘡赤腫及裏外生瘡膿水不絕或痒或痛並宜

服之

羌活一錢

人參

苦參

醫學正傳卷之四

八十七

升麻

葛根

蒼木各四分

甘草炙

黃芩酒炒

茵陳酒炒各一錢

防風

當歸身酒洗

知母去毛酒制

澤瀉

猪苓去皮

白朮各半錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗空心溫

服臨卧再進一服

○開結導引丸治脚氣飲食不消心下痞悶

白朮

橘紅

澤瀉

茯苓

神麴炒

麥芽麵炒

半夏	炮七次 各一兩	枳實	麩炒	巴菝霜	各二錢 半
青皮		乾生薑	各五錢		
右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五					
十九或七八十九溫水下					
○麻黃左經湯治風寒濕流注足太陽經腰脚痠痺					
關節重痛增寒壯熱無汗惡寒或自汗惡風頭					
痛脚軟等証並皆治之					
麻黃		乾葛		細辛	
白水		茯苓		防己	
醫學正傳	卷之四	八十八			
肉桂		羌活	各半錢	甘草	
防風	去芦各 二分半				
右細切作一服加生薑三片大棗一枚水煎服					
○半夏左經湯治足少陽經為風寒濕流注發熱腰					
脇疼痛頭目眩暈嘔吐不食熱悶煩心腿髀緩					
緩不能行步					
半夏		乾葛		細辛	
白朮		麥門冬		茯苓	
肉桂		防風		乾姜	

黃芩	各半錢	小草	各心	甘草
柴胡	各三分			
右細切作一服加生薑三片大棗一枚水一盞半煎至一盞溫服如熱悶加竹瀝喘急加杏仁				
桑白皮				
○六物附子湯治四氣流注於足太陰經骨節煩疼				
四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫				
附子炮	肉桂	防己	各一錢	
甘草炙五分	白朮	茯苓	各七分半	
醫學正傳	卷之四	八十九		
右細切作一服加生薑三片水一盞半煎至一盞溫服				
○局方換腿丸治足三陰經為四氣所乘發為痠痺				
緩縱上攻胃脇肩背下注脚膝疼痛足心發熱行步艱難				
薏苡仁炒	南星炮	石南葉		
石斛	枳實	單解		
川牛膝酒洗	羌活	防風		
木瓜各四兩	黃芪	當歸尾		

天麻

續斷各一兩

右細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九粒
湯下

○五積散治寒濕流注經絡脚膝腫滿疼痛等証方
見

○導水丸治脚氣跗腫疼痛或發熱惡寒濕熱火盛
者

大黃

黃芩各二兩

黑丑取頭末

滑石各四兩

醫學正傳六卷

九十

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服四五十
丸溫水送下以利為度

○除濕丹治諸濕病腰膝腫痛足脛浮腫筋脉動急

津液凝澁便溺不利等証

枳榔

甘遂麩包水煮

威靈仙去芦

赤芍藥

澤瀉

葶藶子各二兩
酒浸炒

乳香

沒藥各一兩

黑丑半兩

大戟炒三兩

陳皮四兩

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服五十粒

溫水下以利為度

○三花神祐丸治濕熱流注足膝浮腫肢節煩疼行
步重墜等証方見發微門

○祖傳經驗杉水節飲治脚氣發作惡寒發熱兩足
腫大心煩体痛聖死者

杉木節

四兩

枳榔七箇

大腹皮酒洗兩

青橘葉

四十九片

右細切作一服用順流水三升煎至一升分作

三服一日服盡如大便通利黃水其病除根未

醫學正傳六卷

卷之四

九十一

愈過數日再煎一劑服之病根去為度外以杉
木橘葉不拘多少煎湯洗之神効

○又經驗勝濕餅子治遠年脚氣足脛腫如瓜瓠者

黑丑

一兩

取頭白丑

一兩

取頭

甘遂

連珠者五錢

右三味再同研極細外用蕎麥麩一兩半連藥

末和勻水調捏為餅子如折三錢大放飯上蒸

熟每服一餅空心爵茶清送下以利為度未利

又服一餅忌甘草菰菜生冷油膩魚腥等物

痛風

古名痛痺三十七

論

內經曰諸風掉眩強直支痛痲矣裏急筋縮皆足厥陰風木之位肝膽之氣也又曰風寒溫三氣雜至合而為痺其風氣勝者為行痺寒氣勝者為痛痺濕氣勝者為著痺以冬遇此為骨痺以春遇此為筋痺以夏遇此為脉痺以至陰六月也遇此為肌痺以秋遇此為皮痺夫古之所謂痛痺者即今之痛風也諸方書又謂之白虎歷節風以其走痛於四肢骨節如虎咬之狀而以其名之耳丹溪

醫學正傳卷之四

九十二

脉法

脉經曰脉澁而緊者痺 少陰脉浮而弱則血不足浮則為風風血相搏則疼痛如掣
或人脉瀦小短氣自汗出歷節疼不可屈伸此

飲酒汗出當風所致也

寸口脉沉而弦沉則主骨弦則主筋沉則為腎邪則為肝汗出入水中因水傷心歷節痛而黃汗出故曰歷節風也

味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄味鹹則傷骨亡傷則痿名曰枯枯泄相搏名曰泄榮氣不通衛不獨行榮衛俱微三焦無御四屬斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出脛冷假令發熱變為歷節風疼痛不可屈伸

醫學正傳卷之四

九十三

丹溪方法

丹溪曰因濕痰濁血流注為病以其在下焦道路遠非烏附氣壯不能行故用為引經若以為主治之非惟無益而有殺人之毒此病必行氣流濕舒風導滯血補新血降陽祛陰治有先後須明分腫與不腫可也不可食肉亡屬陽大能助火素有火盛者小水不能制若食肉厚味下有遺溺上有痞悶須將魚腥麴醬酒醋皆斷去之先以二陳湯加酒浸白芍藥少佐以黃連降心

又作何應之為區處也

○大活活蒼木南星川芎白芷當歸酒茶在上者加

羌活桂枝桔梗威靈仙在下者加牛膝防已木

通黃柏

○加味四物湯治白虎歷節風証本方加

桃仁

煮數次去

牛膝酒浸

陳皮

茯苓

甘草

白芷

草龍胆

各等分

如痛在上者屬風加羌活桂枝威靈仙。在下

醫學正傳

卷之四

九

者屬濕加牛膝防已木通黃柏。氣虛者加人

參白朮龜板。有痰者加南星半夏生薑。血

虛者倍川芎以桃仁紅花水煎服之

○因痰者二陳湯加酒洗黃芩羌活蒼木

○因濕者用蒼木白朮佐以竹瀝姜汁及行氣之藥

或曰有濕鬱而周身走痛或關節間痛遇陰寒

即發當作濕鬱治

或用白朮一味酒煎服之其痛立愈

○肥人多是濕与痰飲流注經絡

必消瘦人多生

血虛与熱

必

○下部有濕腫痛用防已龍胆草黃柏知母固是捷

藥若肥人病此宜蒼木白朮南星滑石茯苓之

類瘦人宜用當歸紅花龜仁牛膝槓榔等藥

○薄桂味淡者能橫行手臂領南星蒼木等藥至痛

處

○威靈仙治上体痛風人虛弱勿用

○一方治上中下痛風

黃連

酒炒

蒼木

米泔浸

南星

神麴

炒

川芎

各一兩

防已

醫學正傳

卷之四

九

三百廿五子

白芷

龜仁

各伍錢

威靈仙

酒炒

桂枝

橫行

羌活

各二錢

草龍膽

一錢

酒紅花

五錢

右為細末神麴糊丸如梧桐子大每服一百丸

空腹服

○大羌活湯治風濕相搏肢節疼痛

羌活

升麻

各一錢

獨活

七錢

蒼木

防已

威靈仙

川歸

茯苓

澤瀉

各五分

右細切作一服水一盞煎至一盞去粗空腹溫服

○四妙散治走注疼痛

威靈仙酒浸 五錢 獨活 三錢 蒼耳子 一錢半 白芥子 一錢炒

右為細末每服一錢匕姜湯調下

○一方治飲酒濕痰痛風

黃柏酒炒 威靈仙酒炒 各五錢 蒼朮米泔浸 羌活各三錢 甘草炙三錢 陳皮去白

醫學正傳六 卷之四 九十六 均藥各一錢

右為細末每服一錢匕生姜湯調下

○凡因久痢后兩脚痠軟疼痛或膝腫如鼓槌者此亡陰也宜以芎歸熟地黃等補血藥治之自愈挾氣虛者加參芪挾風濕者加羌活防風白朮之類切不可絕作風治反燥其血終不能愈

○氣血兩虛有痰濁陰火痛風

人參 山藥 海石 南星各一兩 白朮 熟地黃

黃柏酒炒 龜板酥炙各二兩 乾姜燒存性 瑣陽各五錢

右為末酒糊為丸服

○肢節腫痛痛屬火腫屬濕兼受風寒而發動於經絡之中溫流注於肢節之間而無已也

麻黃去根節 赤芍藥各一錢 防風 荊芥 羌活 獨活

白芷 蒼朮 威靈仙 片苓酒浸 枳實 桔梗

醫學正傳六 卷之四 九十七 葛根 川芎各半錢 甘草

當歸稍 升麻各三分 下焦加酒黃柏

婦人加酒紅花○腫多加枳柳大腹皮澤瀉更加沒藥一錢定痛尤妙○一云脉虛數有瘀血宜用薤仁紅花芎歸加大黃微利之

○二妙散治脚膝下焦溫熱成痛

黃柏酒浸焙 蒼朮米泔浸春秋二兩冬三兩夏一兩四兩 右為細末沸湯入姜汁調服或用蒸餅為丸姜鹽湯送下二味皆有雄壯之氣表實氣實者加

酒少許佐之有氣加氣藥血虛加補血藥痛者加生薑汁熱服

○潛行散用黃柏一味酒浸曝乾為細末每服

匕煎四物湯調下治血虛陰火痛風藥也多服貼數取効

○手臂痛是上焦濕痰橫行經絡中作痛也

半夏 酒芩 白朮

南星 香附各一錢 陳皮

茯苓各五分 蒼朮一錢半 威靈仙三錢

醫學正傳卷之四 九十九

甘草三分 右細切作一服加生薑五片水二盞煎至一盞

食後服

○加味二陳湯治臂痛

本方加酒芩羌活威靈仙入姜水煎食後溫服

○一方治痛風神効

赤芍藥 青皮各一錢半 紫威

台芎各七分半 威靈仙 木鱉子一錢半

防風七分半 甘草五分

右細切作一服酒煎服之

○治婦人背脇走痛

赤芍藥一錢 桂枝 蒼朮各半錢

香附 炒黃柏各一錢 威靈仙七錢半

甘草五分

右細切作一服水二盞煎至一盞服

○治走注疼痛方

威靈仙 蒼朮 桂枝

川歸酒洗 菴仁去皮尖 生菴仁七箇

醫學正傳卷之四 九十九

甘草二錢 川芎一錢半 右細切作一服加生薑五片水二盞煎至一盞

入童便竹瀝各半盞再煎至一盞熱服忌猪羊

雞肉魚腥濕麪

○定痛丸治風濕一切痛

乳香 沒藥 金星草

地龍去土炒 五靈脂 木鱉子去壳

右各等分為細末煉蜜為丸如彈子大每服一

丸溫酒磨化下或只作小丸溫酒送下亦可

○世俗有用草藥而獲速効者如用石絲以為之
過山龍等以為之佐皆性熱而燥者不能養筋
滋陰但能燥濕病之淺者濕痰得燥而開瘀血
得熱而行故有速効若病之深而血少者愈劫
愈虛而病愈深矣戒之戒之

○黃芪酒治風寒濕痺身體頑麻皮膚燥痒筋脉
急語言蹇澁手足不遂等証

黃芪 防風 桂枝

天麻 革薺 石斛

醫學年傳六 卷之四 一百一十五

虎脰骨 白芍藥 當歸

雲母粉 白朮 茵芋葉

木香 仙灵脾 甘草

川續斷 各一兩

右細切以生絹袋盛用無灰好酒一斗以麈尾

浸之包封罐口勿令泄氣春五夏三秋七冬十

日每服一盞溫飲之不拘時候

○獨活寄生湯治肝腎虛弱感冒風濕致痿痺兩足

緩縱軟弱不仁 方見腰痛門

○防風天麻散治風濕麻痺肢節走注疼痛中風偏

枯或暴瘡不語內外風熱壅滯昏眩

防風 天麻 川芎

羌活 白芷 草烏頭

白附子 荊芥穗 當歸

北草 各半兩 白滑石 二兩

右為細末每服半錢加至一錢熱酒化蜜少許

調下覺藥力運行微麻為度或煉蜜為丸如彈

子大每服半丸至一丸熱酒化下白湯亦可此

醫學年傳六 卷之四 一百一十五

藥散鬱開結宣風通氣之妙劑也

○舒筋湯治臂痛不能舉蓋是氣血凝滯經絡不行

圻致一名通氣飲子一名五痺湯其効如神

片子姜黃 甘草 羌活 各半錢

海桐皮 去外皮 當歸 去頭 赤芍藥

白朮 各一錢

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一

盞去粗磨沉香木少許入內溫服凡腰已上痛

食後腰以下痛食前服

○祖傳經驗九藤酒治遠年痛風及中風左癱右廢

筋脉拘急日夜作痛叫呼不已等証其功甚速

青藤

鉤鉤藤

紅藤

丁公藤

又名風柔絡藤

虎絲藤

天仙藤

即青木香也 治風濕名也 採取

五味子藤

忍冬藤

右細切以無灰老酒一大斗用磁罐一箇盛酒

其藥用真綿包裹放酒中浸之密封罐口不可

泄氣春秋七日冬十月夏五日每服一盞日三

醫學正傳

卷之四

一百一

子

服病在上食後臥後服病在下空心食前服

○經驗加味二妙丸治兩足濕痺疼痛或如火燎從

足跗熱起漸至腰膝或麻痺痿軟皆是濕為病

此藥主之

蒼朮

酒浸

黃柏

川牛膝

當歸尾

酒洗

草薢

防己

龜板

酥炙

右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服一

百丸空心姜湯送下

○木通湯一男子年四十歲因感風濕

濕節風証遍身抽掣疼痛足不能履地者三

年百方不効身體羸瘦骨立自分於死一日晝

與木通湯服愈遂以四物湯加木通服不効後

以木通二兩剉細長流水煎汁頓服服後一時

許變身痒甚上体發紅丹如小豈大粒舉家驚

惶隨手沒去出汗至腰而止上体不痛矣次日

又於前煎服下体又發紅丹方出汗至足底汗

乾後通身舒暢而無痛矣一月後人壯氣復步

醫學正傳

卷之四

一百三

金

履如初後以此法治數人皆驗故錄於此以示

後學

○經驗薰洗痛風法治手足冷痛如虎咬者

用樟木屑一斗以急流水一担熬沸以樟木屑

置於大桶內桶邊放 兀發用前沸湯泡之桶

內安一矮凳子令人坐桶邊放一脚在內外以

草薦一領圍之勿令湯氣入眼恐壞眼其功甚

捷

卷之三十八

內經曰肺熱葉焦五藏因而受之發為痿癱心氣熱為脉痿則經縱而不任地肝氣熱為筋痿故筋急而掌脾氣熱為肉痿則胃乾而渴肌肉不仁腎氣熱為骨痿則腰膝不舉骨枯而髓減又曰治痿者獨取陽明一經陽明者五藏六府之海主潤宗筋能束骨而利機關也衝脉者經脉之海也主滲灌谿谷與陽明合於宗筋陰陽總宗筋之會會於氣衝而陽明為之長皆屬於帶脉而絡於督脉故陽明虛則宗筋弛緩帶脉下引故足痿不用也治法各補其榮而通其腧調其虛實和其逆順筋脉筋脉骨肉各以其時受月言治諸痿宜調補各歲以待其旺月而病安也丹溪曰內經謂諸痿起於肺熱又謂治痿獨取陽明一經蓋肺金體燥居上而主氣畏火者也脾土性溫居中而主四肢畏木者也火性炎上若嗜慾無節則火失所養火寡于畏而侮所勝肺得火邪而熱矣木性剛急肺受熱則金失所養木寡于畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能治一

身脾傷則四肢不能為用而諸痿作矣馮南方則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿之法無出於此雖然天產作防厚味發熱凡病痿者若不淡薄食味吾必不能保其安全也又曰內經論風論痿各有篇目源流不同治法迥異曷方以治風之藥通治諸痿何其謬哉按丹溪此論一出掃盡千古之弊學者晚而不視則為瞶者之雷電瞶者之日月耳夫醫為人之司命其可不盡心於此乎

脉法

脉經曰肺痿脉必浮而弱其人欲欬不得欬次則出乾沫久久則小便不利

寸口脉不出反為發汗陽脉早泄陰脉不泄三焦踰入而不出陰脉不泄身體反冷其內反煩多唾唇燥小便反難此為肺痿傷于津液便如爛瓜亦如脉膏但因誤發汗故也

方法丹溪方法九條

丹溪曰有濕熱有痰有血虛有氣虛亦有死血者

有食積妨碍升降者盧氏曰上文論痰起於肺要也而此云然者蓋以其發而為病所因所挾或有不同而主治亦當各著其重也

○東垣取黃柏為君黃芪等補藥為輔佐以治諸痿

無一定之方有兼痰積者有濕多者有熱多者

有濕熱相半者有挾氣者臨病制方其善於治

痿者乎

○濕熱用東垣健步丸加燥濕降火之劑黃柏黃芩

蒼朮之類

醫學正傳卷之四 一百六

○濕熱用二陳湯加蒼朮白朮黃芩黃柏之類入竹

瀝姜汁

○血虛用四物湯加蒼朮黃柏下補陰丸

○氣虛用四君子湯加蒼朮黃芩黃柏

○黃柏蒼朮治痿之要藥也

○虎潛丸補腎丸皆可治痿

○加四物湯治諸痿四肢軟弱能舉動

當歸身一錢 熟地黃三錢 白芍藥

川芎各七分 五味子九枚 麥門冬一錢

人參半錢 黃柏一錢 黃連半錢

知母三分 杜仲七分半 牛膝三錢熟者不用

蒼朮一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服酒

糊為丸服亦可一云血虛者以四物湯加黃柏

蒼朮下補陰丸

○健步丸治膝中無力屈伸不捷脚沉重行步艱難

羌活 柴胡 滑石炒

甘草炙 瓜蒌根酒洗 肉桂各五分

醫學正傳卷之四 一百七

防風 澤瀉各三錢 防己酒洗一兩

川烏炮 苦參酒浸各三錢

右為細末湯煮麪糊為丸如梧桐子大每服七

十丸煎愈風湯下一云荊芥湯下按荊芥湯又為愈風湯也

○大防風治兩足痿弱或沉重麻痺不能行動兩膝

虛腫名曰鶴膝風等証方見中風門

○相傳經驗治兩足痿弱軟痛或如火焙從足踝下

上衝服膝等証因濕熱所成者

蒼朮米泔浸 黃柏酒浸各四兩 乾牛膝去土

龜板酥炙 虎脰骨酥炙 功已各一兩

當歸尾 二兩

右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服七十九
或一百九空心姜鹽湯下一方加炮附子五錢
○又經驗鹿角膠丸治血氣虛弱兩足痿軟不能行

動久卧床褥之証神効

鹿角膠一斤 鹿角霜 熟地黃各半斤

川牛膝 白茯苓 兔絲子

人參各二兩 當歸身四兩 白朮

醫學正傳天 卷之四 一百八

杜仲各二兩 虎脰骨酥炙 龜板酥炙各一

右為細末另將鹿角膠用無灰酒二盞烱化為

丸如梧桐子大每服一百九空心姜鹽湯下

諸虫附發破 三十九

論

內經曰腸胃為市無物不受無物不包又曰飲食
自倍腸胃乃傷若夫飲食不能謹節則朝損暮傷
自傷成績積久成熱濕熱相生而諸般奇形之虫
各從五行之氣而化生矣若腐草為螢之類是也

外臺秘要所謂凡虫者皆能食人府藏一口伏

長四寸許二曰蛔虫長尺許三曰白虫長四五尺

餘四曰肉虫狀若爛杏五曰肺虫其狀如蚕六曰

蝟虫狀如蝦蟇七曰弱虫又名膈虫狀如爪瓣八

曰赤虫狀如生肉九曰蛻虫狀如菜虫形至細微

其伏虫又為諸虫之主也蛔虫生虫生發多則貫

心即殺人白虫母子相生其形轉大而長亦能

人肉虫食人令人煩滿肺虫令人咳嗽蝟虫令人

嘔吐欬逆喜噦弱虫令人多唾赤虫令人腸鳴蛻

醫學正傳天 卷之四 一百九

虫居廣腸多則為痔劇則為癰因人瘡處以生諸

癰疽癰瘰瘰癧疥癬蝕若虫之類無所不為人亦

不必盡有亦不必甚多或偏有或偏無皆能為害

者也凡此諸虫依附腸胃之間若元氣尚實未為

大害稍有虛損遂能侵蝕隨其虫動而變生諸病

也若夫膈噎勞瘵癰風蠱脹疥或傷寒等証無不

生虫又如蝮鼠應聲虫之類未易悉舉醫者宜於

各類推而治之可也

六

脉沉實者生虛大者死

尺脉沉而滑者為寸口虫

懸蝕陰疔脉虛小者生動急者死

外臺云虫脉當沉弱而弦今反洪大即知蛔虫甚也

方法升溪方法

升溪曰濕熱之生虫藏府虛則侵蝕上半月虫頭

向上易治下半月虫頭向下難治已上二月字

字蓋虫無半月先以蜜或砂糖或炒吃引虫頭

醫學正傳卷之四 一百一

向上然後用殺虫藥

○腹內執腸胃虛虫行求食上唇有瘡曰惑虫食其

藏下唇有瘡曰狐虫食其肛

○治懸桃仁湯治狐惑唇口生瘡上唇虫食其藏下

唇虫食其肛

桃仁

梔子

艾各錢

大棗十五枚

用水二盞半煎至一盞半分二服

○雄黃銳散治前証

雄黃

青箱子

苦參

黃連各二錢

桃仁一錢

右為末搗新艾汁和捏如小指頭大納穀道中

治虫食其肛也

○寶鑑化虫丸治諸虫

鶴虱去土

檳榔

苦煉根東引不

胡粉炒各

明白礬拈二錢

右為細末米糊為丸如梧桐子大一歲兒服五

九量人大小加減丸數溫漿水入生麻油三四

點打勻送下清米飲亦可不拘時候其虫細小

者皆化為水大者自下

○集効丸

木香

鶴虱炒

檳榔

訶子炒

燕薹炒

附子炮去皮

乾姜各七錢半

大黃一兩半

烏梅去核

右為末煉蜜丸如麻子大陳皮湯或醋湯下一

方加黃連黃柏各七錢半

為應丸

檳榔 五兩

大黃 八兩

黑丑 四兩
三米為

皂莢 針 鍵不姓 苦練根皮 一斤

右先以皂莢苦練用水二大碗熬成膏一處

和藥末為丸如梧桐子大又以沉香木香搗

各一兩為末為衣先以沉香衣次用雷丸衣

次用木香衣每服三九四更時用砂糖水送下

一方用雞子炒白臘塵酒糊丸服治寸白虫

一方黑鉛炒成灰檳榔末等分和勻末飲調下

化虫丸能化虫為水

硫黃 一兩 木香 五錢 蜜陀僧

附子 一枚炮 另為末

右先以附子末醋一盞熬膏餘藥研為細末以

附子膏和勻丸如菉荳大每服二十九荊芥茶

清下

一方用苦樹根檳榔鶴虱三味濃煎湯飲之

○前胡湯治脾勞身熱內有白虫在脾為病令人好

嘔而胃中咳嘔而不出

前胡 白朮 赤茯苓

細辛

杏仁 去皮尖

草龍胆

常山 各一錢

枳實

松蘿 各七分

旋覆花 五分

竹葉 七片

右細切作一服水二大盞煎至一盞去粗溫服

如腹中熱滿悶加芒硝半錢梔子黃芩苦參各

半錢加煎忌桃李雀肉醋生葱菜等物

○茱萸根湯治脾勞熱內有白虫食脾為病与前証

同

茱萸 東引者 火麻子 八錢 陳皮 一兩半

右三味細切水煎服或下虫或下黃汁凡合此

藥禁聲勿語重竟便無効此方治虫甚驗

○五膈下氣丸治肺勞熱瘦損內有肺虫在肺為病

令人咳逆氣喘或謂憂忿氣膈寒熱皆從勞之

所生名曰膏肓疾針灸不着

麥門冬 五兩 蜀椒 炒出汗 遠志肉

附子 各半兩 乾生姜 半兩 甘草 炙半兩

人參 七錢半 桂心 二錢半 百部

白朮 黃芪 各七錢 本仁 去皮尖

細辛 半兩

右為細末煉蜜九如彈子大每服一九徐徐噙化燕汁忌猪肉冷水海藻松菜生慈桃李雀肉等物

○千金散療腎勞熱四肢腫急蟻生於腎中為病

貫衆 三兩 乾漆 二兩 煨 蕪荑

胡粉

槐白皮 各一兩 吳茱萸 五十粒

杏仁 四十五粒 去皮尖炒

右為細末平旦以井花調服方寸匕增之以

醫學正傳六

卷之四

十有兩

東

病瘥止

○三聖飲子治勞熱生虫在肺為病

萊菔根 五兩

東引者狼毒子 三兩

桑白皮 東引者 一升

右三味細切以酒七升煮取一升半平旦服盡

○五鳳丸治肝勞熱生長虫在肝為病令人恐懼不

安眠中亦壅

烏雞卵 五枚 去黃

東引吳茱萸根 切三升

黃臘 三兩

乾漆 四兩 煨 粳米粉 半升

右五味以萊菔根乾漆為細末和入銅銚中大

煉可丸如小豈大隔宿勿食後飯清晨以米飲

下一百二十九小兒五十九虫即爛盡

○雷公丸治心勞發熱心 有長虫名曰蠱虫長一

尺許貫心即死

雷丸 五枚

陳皮

貫衆

蕪荑

青箱子

乾漆 一兩 煨 各

亂髮 如雞子大塊飛

殭蚕 十四枚

右為細末煉蜜九如小豈大空心溫酒送下二

醫學正傳六

卷之四

百十五

火

十九日三服自前胡湯以下七分治五歲勞虫

○廣濟療蛔虫方

酸石榴根 東引者 切二升

檳榔 十枚 切

右二味以水七升煮取二升半去粗以粳米煮

稀粥平旦空腹食之少間虫並死快利神効

○又治蛔虫方

用苦練根 生干者東引 不出土者

刮去外塵皮取內

白皮二兩以水三碗煮取一碗半去粗用晚粳

米三合煮糜粥空心先以炒肉一二片吃引虫

向上然後進藥粥一二口少頃又吃一二口
漸加至一碗或二碗其虫盡下而愈

○祖傳經驗換榔九治小兒疳積氣塊痛腹大有
虫等証

三棱細切醋 義术細切醋 換榔 一兩

陳皮去穢麩炒 陳皮去白各 蕪荑錢半

雷丸五錢 鶴虱三錢 乾漆五錢炒

木香三錢不見火 良姜二錢陳 砂仁一錢去壳

麥蘖麩炒半兩 胡黃連三錢 甘草炙三錢

神麴五錢炒黃色

右為細末醋米糊為丸如菡豆大每服三五十

丸空心淡姜湯下今加史均子肉五錢尤妙

○又經驗治婦人陰蝕瘡陰戶中有細虫其痒不可

飲食入臟腑即死令人發寒熱與勞証相似

先用蛇床子煎湯洗淨搥乾付後藥 梓樹皮

不拘

右焙乾為末入枯礬四分之一射香少許付之

立効

○予曾治一婦人因採桑見桑有金蚕如蚕者彼其
毒謂之金蚕毒腹中疼痛欲死召予治予以樟
木屑濃煎湯與之大吐吐出有金絲如亂髮者
一塊腹痛減十分之七八又與甘草湯連進二
三盞而安

新編醫學正傳卷之四終

子 42-615

醫學正傳卷之五目錄

卷之五

○麻木門四十論

脉法

丹溪方法一條

人參益氣湯

導氣湯

天麻黃芪湯

補氣升麻和中湯

麻黃桂枝升麻湯

神効黃芪湯

補氣湯

冲和補氣湯

祖傳三妙丸

○耳病門四十論

脉法

丹溪方法九條

東垣滋腎丸

柴胡聰耳湯

蔓荊子散

黍粘子湯

祖傳經驗方

○目病門四十論

脉法

丹溪方法九條

滋陰地黃丸

撥雲退翳丸

羊肝丸

春雪膏

爛翳驗方

神効明目湯

明目細辛湯

復明湯

助陽和血湯

歸葵湯

救苦湯

益陰腎氣丸

當歸龍膽湯

瀉陰火丸

療本滋腎丸

加味滋腎丸

退翳膏

龍膽飲子

還睛紫金丹

重明散

石膏羌活散

黃連膏

滌疥膏

金絲膏

地芝丸

眼睫方

點眼光明丹

丹溪活套

祖傳固本還睛丸

經驗復明膏

○口病門四十論

脉法

丹溪方法九條

益膽湯

柴胡地骨皮湯

又丹溪方法四條

鵬砂散

碧雪

祖傳經驗方

丹溪活套

○喉痺門四十論

脉法

丹溪方法九條

通關散

又治喉痺方

普濟消毒飲子

桔梗湯

又治喉痺方

吹喉散

聖煙筒

祖傳方

又祖傳方

○齒病門五十論

脉法

丹溪方法九條

灸牙疼法

治虫牙痛方

走馬牙疳神方

小兒走馬牙疳方

東垣麝香散

草薢散

羌活散

白牙散

獨聖散

立効散

牢牙散

清胃散

神功散

祖傳方

又祖傳方

擦牙止痛方

祖傳灸法

○鼻病門四十論

脉法

丹溪方法九七

鼻淵防風湯

麗澤通氣湯

溫肺湯

禦寒湯

祖傳經驗方

又祖傳驗方

○血證門四十論

脉法

丹溪方法九七

人參飲子

痰雜血出方

三黃補血湯

痰嗽吐血方

黃芪散

痰帶血咳出方

雞蘇散

薏苡仁散

又丹溪方法九八

犀角地黄湯

四生丸

聖餅子

宜明地榆湯

結陰丹

椿皮散

烏梅丸

槐花散

加減四物湯

當歸和血散

枳殼散

酒煮黃連丸

秘方殼湯

槐角丸

升陽去熱和血湯

升陽補胃湯

生地黃散

玉屑膏

龍骨散

射香散

經驗瀉血方

又方洽前証

桃仁承氣湯

抵當湯

丹溪活套

祖傳經驗方

髮灰丸

大便下血經驗方

已試醫驗一條

醫學正傳卷之五目錄

○痔漏門四十八論

脉法

丹溪方法九七

秦艽羌活湯

秦艽蒼朮湯

秦艽當歸湯

秦艽防風湯

當歸郁李仁湯

紅花桃仁湯

七聖丸

秦艽白朮丸

脫疔方三條

祖傳七花丸

又經驗祖傳方

○汗証門四十九論

脉法

丹溪方法九四

麥煎湯

調衛湯

當歸六黃湯

黃芪建中湯

四制白朮散

正氣湯

河間白朮散

丹溪活套

祖傳經驗方

○瘥証門五十論

脉法

丹溪方法九二

瓜蒌桂枝湯

葛根湯

麻黃葛根湯

大承氣湯

桂枝葛根湯

桂枝瓜蒌根湯

小續命湯


防風當歸湯

當歸補血湯

舉卿舉敗散

丹溪活套

已試醫驗一條



○厥証門 五十一論 脉法 丹溪方法 一條

活人書方法 五味子湯 桂枝麻黃各半湯

茯苓甘草湯 通脉四逆湯 當歸四逆湯

吳茱萸湯 蘇合香丸 丹溪活套

○癲狂癇門 五十二論 脉法 丹溪方法 九條

龍腦安神丸 神應丹 錢氏五色丸

元戎二白丸 拔萃妙香丸 硃砂滾涎丸

碧霞丹 控涎丹 牛黃瀉心湯

牛黃清心丸 丹溪活套 祖傳秘方

○邪祟門 五十三論 脉法 丹溪方法 一條

素問五邪証 五邪刺法 丹溪治婦人方法

秦承祖灸鬼法 還魂丹 桃奴丸

蘇合香丸 治魘死方法 祖傳辟邪丹

已試鑒驗 一條

○怔忡驚悸門 五十四論 脉法 丹溪方法 九條

治勞役心跳方 驚悸養心湯 東垣安神丸

溫膽湯 定志丸 朱雀丸

八物定志丸 歸脾湯 祖傳經驗方

又祖傳經驗方

○三消門 五十五論 脉法 丹溪方法 九條

猪肚丸 又丹溪方法 二條 和血益氣湯

當歸潤燥湯 生津甘露湯 二條 辛潤緩肌湯

生津甘露飲 黃芪飲 人參白朮湯

絳雪散 人參散 六味地黃丸

大黃甘草飲子 麥門冬飲子 丹溪活套

祖傳經驗方 原蚕蠶湯

醫學正傳 卷之五

醫學正傳 卷之三 目錄終

麻木四十

論

內經曰風寒濕三氣合而為痺故寒氣勝者為痛痺濕氣勝者為著痺河間曰留著不去四肢麻木拘攣也經又曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深榮衛之行溢經絡時疎故不痛皮膚不榮故為不仁夫所謂不仁者或周身或

醫學正傳卷之五

乙

甲

四肢唧唧然麻木不知痛痒如繩扎縛初解之狀古方名為麻痺者是也丹溪曰麻是氣虛木是濕痰死血然則曰麻曰木者以不仁中而分為二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有虛而感濕麻木兼作者又有因虛而風寒濕三氣乘之故周身掣痛兼麻木併作者古方謂之周痺治法宜先汗而後補也醫者宜各以類推而治之不可執一見也

脉法

脉浮而濡屬氣虛關前得之麻在上體關後得之麻在下體也

脉浮而緩屬濕為麻痺脉緊而浮屬寒為痛痺脉濡而芤屬死血為木不知痛痒

方法

丹溪曰十指麻木是胃中有濕痰死血宜二陳湯

加蒼朮白朮桃仁紅花少加附子行經

○人參益氣湯治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜卧

熱傷元氣也

醫學正傳卷之五

二

乙

黃芪二錢 炙甘草

升麻各半錢 桑寄生

柴胡六分 生甘草

人參各一分半

白芍藥七分 右細切作一服水二盞煎至一盞去粗服

○導氣湯治兩腿麻木沉重

黃芪二錢 甘草一錢半 青皮一錢

升麻 柴胡 當歸稍

澤瀉各半錢 陳皮 紅花少許

五味子三十粒

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○天麻黃芪湯治表有風證因連日醉飲其證復來

右口角併眼牽引側視及左手脚腿麻木疼痛

天麻 芍藥 神麴炒

羌活 如支節不用 茯苓 各三分 人參

黃連 各四分 川歸 各五分 黃芪

甘草 升麻 葛根

黃蘗 蒼朮 各六分 澤瀉 七分

柴胡 或加猪苓 六分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

醫學正傳 卷之五 三

○補氣升陽和中湯一婦人病診得六脉俱中得弦

洪緩相合按之無力弦在上是風熱下陷入陰

中陽道不行其證閉日則渾身麻木晝減而夜

甚覺而開目則麻木漸退久則絕止常開目則

此證不作是以不敢合眼致不得卧身體皆重

時有痰嗽覺胃中不利煩燥氣短喘促肌膚充

盛飲食不減大小便如常此非風邪乃氣不行

也治宜補益肺氣自愈如經脉中陰火乘上陽

分火動為麻木者當蕪去其陰火則安矣

生甘草 去腎 黃蘗 酒炒除 白茯苓 除濕

澤瀉 除濕 升麻 經行濕助 柴胡 已上各

蒼朮 除濕 草薢 益陽辟外 陳皮

歸身 白朮 各四分 白芍藥

人參 各六分 佛耳草 炙甘草 各八分

黃芪

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服

○麻黃桂枝升麻湯治婦人先患渾身麻木睡寤則

少減開目則已其證愈後又因心中煩惱遍身

骨節疼痛身休沉重飲食減少腹中氣不轉運

木香 生薑 各二分 桂枝

半夏 陳皮 草薢 薢

厚朴 姜汁 黑附子 炮去 黃蘗 各三分

炙甘草 升麻 白朮

茯苓 澤瀉 各四分 黃芪

麻黃 不去節 人參 各五分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服

○神効黃芪湯治渾身麻木不仁或頭面手足肘臂

醫學正傳 卷之五 四

腿脚麻木並皆治之及兩目羞明畏日隱澁難開視物昏花睛痛亦皆治之

蔓荊子二分 陳皮半錢 人參八分

炙甘草 白芍藥一錢 黃芪二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗臨卧稍熱服如麻木不仁雖有熱不加黃芪只加黃芪一錢通三錢如麻木甚者加芍藥一錢通二錢如小便淋澁加澤瀉五分一服去則止如有大熱證加酒洗黃蘗二分

熱證加酒洗黃蘗二分

○補氣湯治皮膚麻木神効

黃芪 陳皮 甘草各一錢二

澤瀉六分 芍藥八分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○沖和補氣湯治合眼則麻木開則不麻四肢無力

痿厥醋心目昏頭眩神効

羌活七分 獨活 川歸

黃蘗各三分 柴胡 神麴

木香 草薢各二分 人參

白朮 澤瀉 猪苓各一錢

甘草 升麻各半錢 芍藥一錢

黃芪二錢 蒼朮 陳皮各一錢

黃連 麻黃不去節 二分

右細切分作二服每服用水一盞半煎至一盞溫服

○祖傳經驗三妙丸治濕熱下流兩腿麻木或如火

烙之熱

黃蘗 酒四兩切片 蒼朮 六兩半浸 一二

川牛膝 二兩 去蘆

右為細末麴糊為丸如梧桐子大每服五七十

丸空心姜塩湯下忌魚腥蕎麥熱麴煎炒等物

醫學正傳卷之五

耳病四十二

論

內經曰腎者作強之官技巧出焉又曰耳為腎之外候一曰腎通竅于耳一曰心通竅于耳夫腎之為藏水藏也天一生水故有生之初先生二腎而一陰藏焉而又有相火存乎命門之中也每挾君火之勢而侮所不勝經所謂一水不能勝二火是矣其或嗜慾無節勞役過度或中年之後大病之餘腎水枯涸陰火上炎故耳痒耳鳴無日而不作也或如蟬噪之聲或如鍾鼓之響甚為可惡早而不治漸而至於龍鍾良可嘆哉治法宜瀉南方之火補北方之水無有不安者焉錢仲陽曰腎有補而無瀉厥有旨哉

脉法

兩寸脉浮洪上魚為溢兩尺脉短而微或大而數皆屬陰虛法當補陰抑陽

左寸洪數心火上炎兩尺脉洪者或數者相火上炎

其人必遺精夢交與鬼交兩耳蟬鳴或聾

方法丹溪方法九條

丹溪曰大病後耳聾及陰虛火動而聾者宜補陰

降火四物湯加黃蘗主之

○耳鳴宜當歸龍薈丸多飲酒人宜木香枳榔丸

○耳聾以茱萸烏頭尖大黃三味為末津調貼湧泉

穴以引火下行

○又方治耳痛以白礬枯吹入耳中及青礬燒灰吹之皆効

○又方治耳痛及聾耳用桑螵蛸炙黃為末加麝少

許吹入耳中極効或用臘脂旺子蛀竹末加射

香少許吹入妙

○又方治諸虫入耳用香油滴入耳中其虫即出或

死於耳內或用野牛乳或雞冠血滴入皆好

○又方治諸虫入耳用桃葉捲作角子切齊其頭納

入耳中其虫從角中走出

○大補丸治耳鳴欲聾用黃蘗一味不拘多少細切

鹽酒拌新瓦上炒褐色為細末滴水丸如梧桐

子大每服一百丸如氣虛以四君子煎湯下血

虛以四物湯下

○凡耳鳴耳聾皆是陰虛火動或補腎丸或虎潛丸或滋陰大補丸皆好

○滋腎丸治耳鳴耳聾

黃藥酒炒 知母去毛酒 肉桂半錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九淡鹽湯下

○柴胡聰耳湯治耳中乾結耳鳴而聾

連翹四錢 柴胡三錢 炙甘草少許

當歸身 人參錢一 水蛭五分炒

蚩虫三箇去翅另研 麝香少許

右除後三味別研外其餘細切作一服加生薑三片水二盞煎至一盞去粗一三味末子再煎

一二沸食遠服

○蔓荊子散治上焦熱耳鳴而聾及出膿汁

炙甘草 升麻 木通

赤芍藥 桑白皮蜜製 麥門冬

生地黃 前胡

赤茯苓 蔓荊子各半錢

右細切作一服加生薑三片大棗一枚水一盞半煎至一盞去粗食後服

○黍粘子湯治耳痛生瘡

昆布 蘇木 生甘草

蒲黃 草龍胆各二分 黍粘子

連翹 生地黃 當歸稍

黃芩 炙甘草 黃連各三分

柴胡 黃芪各四分 桔梗一錢半

桃仁三箇去皮另研 紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞稍熟食後服

忌寒藥利大便

○祖傳經驗秘方治耳內忽大痛如有虫在內奔走

或有血水流或乾痛不可忍者用蛇退皮燒

存性細研以鵝翎管吹入耳中立愈

目病此十一

論

東垣曰按陰陽應象論云諸脉者皆屬於目又曰

目得血而能視五藏六府之精氣皆上注於目而為之睛睛之窠為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為目窠之總絡氣之精為白眼肌肉之精則為約束裏賴筋骨血氣之精而與脉併而為系上屬於腦後出於項是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脉法於陽故陰陽合德而為睛明也是以五藏六府十二經脉三百六十五絡其血氣皆稟受於脾上而上貫於目而為明故目者心之使也心者神之舍也故精神亂而不守卒然見非常之怪

醫學正傳六 卷之五 十一

若邪中其睛則精散精散則視岐觀一物為兩也因事煩擾飲食失節勞後過度致脾胃虛弱心火大旺則百脉沸騰血脉逆行經曰天明則日月不明邪害空竅是也夫脾者諸陰之首目者血脉之宗也故脾虛則五藏之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主藏神明宜靜而安相火化行其令相火乃包絡之火主百脉皆榮於目既勞後妄動又因邪氣所併而損血脉是故諸病生焉醫目者若不先理脾胃及養血安神乃治標不治

本是不明至理者也學者其可不用心乎

脉法

左寸脉洪數心火炎也關弦而洪肝火盛也

右寸關俱弦洪肝木挾相火之勢而來侮所不勝

之金而制已所勝之土也

方法

丹溪方法

丹溪曰目病屬風熱血少神勞腎虛

○河間曰在府則為表當除風散熱在藏則為裏當

養血安神如暴失明昏澁翳膜淚班入眼皆

醫學正傳六 卷之五 十二

風熱也一云班入眼此肝氣盛而發在標也宜

表散以去之如昏弱不欲視物內障見黑花瞳

子散大皆裏也血少神勞腎虛也宜養血補水

安神以調之

○瞳子散大皆辛熱所為也辛主散熱乘之當除風

熱涼血益血以收耗散之氣芩連苦寒除邪氣

之盛為君當歸身生地黃養血涼血為臣五味

子酸寒體浮收瞳子散大地骨皮天門冬瀉熱

補氣或用滋陰地黃丸最妙

久病昏指以熟地黃當歸根為君羌活防風牛膝
花之類佐之

○暴發赤腫以黃芩防風為君以瀉之黃連當歸為
臣以養血羌活柴胡升麻白芷甘草為使白睛
紅加白荳蔻少許

○又方治血熱壅痛四物湯加草龍胆防已防風羌
活一云實熱上衝眼痛用黃連瀉火當歸補血
○勞後飲食不節內障昏暗蔓荊子湯

蔓荊子 人參 甘草炙

黃芪 黃蘗 白芍藥酒炒各一錢

右細切水煎服

○又方治眼痛用生地黃酒浸搗爛盒眼上又用草
烏南星乾姜桂枝為末醋調貼兩足心時用牛
膝膏洗眼

○肥人風熱上壅眼目疼痛

防風 羌活 荊芥

酒芩各二分 水煎服

○瘦人目痛乃是血少無熱須用養血藥少加風藥

當歸 生地黃酒洗 玄參

防風 荊芥 菊花冬手小

細切水煎服之

○滋陰地黃丸

熟地黃一兩 生地黃一兩半 柴胡八錢

天門冬 炙甘草 枳殼

地骨皮 黃連 五味子各三錢

人參二錢 當歸身酒浸洗黃芩各五錢

右為細末煉蜜為丸如棗豆大每服一百丸茶

○清下

秘傳撥雲退翳丸又名神仙治一切內外障膜遮

睛昏暗大効

芎藭根 枳實 甘草炙

蔓荊子 薄荷各五錢 木賊童便浸一宿

蜜蒙花 荊芥穗 地骨皮

甘菊花 白蒺藜 羌活各一兩

蛇蛻 蟬蛻 黃連各三錢

川椒七錢半 當歸酒浸洗 草決明五錢炒

右為細末煉蜜為丸每兩分作十九每服一丸

食後臨卧服日進三服翳障米飲下睛暗當歸

湯下內障木香湯下黃一兩無雙荆子各半兩微情

昏睛宜當歸湯下有氣木香湯下

○羊肝丸治一切目疾不論內外翳障青盲等証

白乳羊肝刀去膜黃連一兩 甘菊花

防風 薄合去梗 荊芥穗

羌活 當歸川芎各三錢

右為細末將羊肝熬熟同藥末杵爛為丸漿水

醫學主傳卷之五 十五

下

○春聖膏點赤眼効

朴硝不拘多少 置豈腐上蒸化待流下以篋器盛

之

○爛翳驗方

用諸草根燒灰以燈心點之須臾大痛以

刮之

○神効明目湯治眼楞緊急致倒睫拳毛及上下瞼

皆赤爛睛疼昏暗晝則冷淚常流夜則眼澁難

開

細辛二分 蔓荊子半錢 防風一錢

葛根一錢半 甘草二錢 一方加黃芪

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗臨卧

服

○明目細辛湯治兩目發赤微痛羞明畏日怯風寒

怕火光眼睫成紐眵糊多隱澁難開有攢腫悶

鼻塞涕唾稠粘大便微硬

川芎二分 生地黃酒浸 蔓荊子各三分

醫學主傳卷之五 十六

當歸身稍 白茯苓 米本各四分

荊芥穗五分 防風 小黃根

羌活各八分 細辛少許 紅花少許

川椒四粒 桃仁七箇去皮

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗臨卧

稍熱服忌酒醋濕麪

○復明散治內障

青皮去穢二分 陳皮去白 川芎

蒼朮各半兩 炙甘草 生薑

連翹

柴胡 各一錢

黃芪 一錢半

當歸身 二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱服

忌酒醋濕麪辛熱大料物之類

○助陽和血湯治眼發之後微有上熱白睛紅隱澁

難開睡多眵淚

蔓荊子 一分

香白芷 三分

柴胡

黃芪

炙甘草

當歸身 酒洗

防風 各半錢

升麻 七分

醫學正傳 卷之五

十七

子

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗稍熱

服

○歸葵湯

一名連翹

治目中溜火惡日與火光隱澁難

開小角緊視物昏花迎風有淚

柴胡 三分

生甘草

蔓荊子

連翹

生地黃

當歸身

紅葵花

人參 各四分半

黃芪

酒黃芩

防風

羌活 各七分半

升麻 一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後服

○救苦湯治眼暴發赤腫瞋高苦疼不可忍者

桔梗

連翹

紅花

細辛 各一分

當歸身 各半

甘草 各一錢

蒼朮

草龍胆 各四分

羌活 太陽

升麻 陽明

柴胡 少陽

防風

藜蘆

黃連 各二錢

生地黃

黃檗

黃芩

知母 各三分

川芎 六分

醫學正傳 卷之五

十八

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後服

若苦疼則多用苦寒藥煎治本經之藥再行加

減如睛昏加知母黃檗

○益陰腎氣丸此壯水之主以鎮陽光

澤瀉

茯苓 各二錢半

生地黃 酒洗

牡丹皮

山茱萸

當歸稍 酒洗

五味子

乾山藥

柴胡 各五錢

熟地黃 二兩

右為細末勿犯鐵器蒸搗煉蜜丸如梧桐子大

每服五十丸空心淡鹽湯下

○當歸龍胆湯治眼中白翳

防風

石膏 各二分

柴胡

羌活

五味子

升麻 各三分

甘草

酒黃連

黃芪 各四分半

黃芩 酒炒

黃蘗 酒炒

當歸身 酒洗

草龍胆 酒洗

芍藥 各七分半

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗入酒少

許熱服

醫學正傳 卷之五

十九

○瀉陰火丸 一名連藥益陰丸

石決明 三錢 煨

獨活

甘草

當歸稍

五味子

防風 各五錢

草決明

條黃芩

黃連 酒炒

黃蘗 酒炒

知母 各一兩

右為細末煉蜜為丸如棗大每服五十丸茶

清下

○療本滋腎丸

黃蘗 酒炒

知母 酒炒

各等分為細末滴水為丸如梧桐子大每服一

百丸至一百五十丸空心淡鹽湯下

○加味滋腎丸

肉桂 三分

黃連 一錢

姜黃 一錢

苦參 三錢

苦葶藶 酒洗炒

石膏 煨 勿用

黃蘗 酒炒

知母 各五錢

右為細末麝香為丸如梧桐子大每服一百丸

白湯送下空心服以食壓之

○退翳膏治黑白翳

醫學正傳 卷之五

二十

麝仁

升麻 各三分

連翹

防風

青皮 各四分

甘草

柴胡 各半錢

當歸身 六分

荊芥穗 水半 浸

生地黃 一錢半 黃連 三錢

右細末水一碗煎至半碗去粗更上火煎半盞

入荊芥水兩匙入蜜少許再上火熬勻磁器盛

貯頻點之

○龍胆飲子治疳眼流膿生疳翳濕熱為病

穀精草

川鬱金

蛇蛻

炙甘草 各半錢 麻黃 一錢半 升麻 二錢

青蛤粉 草龍胆 黃芩 炒

羌活 各一錢

右為細末每服二錢溫茶清調下

○還睛紫金丹治日暈歲久赤爛俗呼為赤睛是也

當以三稜針刺日暈外以瀉濕熱如眼生倒睫

拳毛兩目緊蓋內伏火熱而致陰氣法當去其

熱內火邪眼皮緩則毛立出翳膜亦退用手法

攀出內瞼向外以針刺之出血

醫學正傳 卷之五 二一

白砂蜜 二十兩 煨甘石 一十兩火煨七次淬

黃丹 六兩水飛 烏賊骨 二錢 硃砂 入盞內放

麝香 各一錢 白丁香 五分

輕粉 一字

右將白砂蜜按砂石器內慢火熬掠去沫下甘

石次下丹以柳枝攪次下餘藥以不粘手為度

作丸如雞頭實大每用一九溫水化開洗之

○重明散治一切風熱內外障膜眼疾

川獨活 川羌活 川芎

吳射干 仙靈脾 防風

甘草 井泉石 蒼朮 各半兩

丹參 白朮 石決明

草決明 各三錢

右為細末每服二錢水一盞半煎至一盞溫服

日三服

○石膏羌活散治久患双目不明遠年近日內外翳

障風熱昏暗倒睫拳毛一切眼疾頭風並甘治

之

醫學正傳 卷之五 二十二

羌活 治腦熱 蜜蒙花 治羞明 木賊 退翳障

白芷 清利頭目 細辛 乾菜子 二味起

麻子 起拳毛 川芎 治頭風 蒼朮 明目煖水

黃芩 洗心退熱 甘菊花 荊芥穗 治目生

石膏 治頭痛退 藁本 治偏頭痛

甘草 解藥毒

右各等分為細末每服一錢至二錢食後臨卧

用蜜水調下茶清亦可日進三服服至十日漸

明二十日平安

○黃連膏治一切眼目疼痛癢肉扳睛風痒淚落不

已

朴硝一斗以水淘淨去土

白丁香五升以水一斗

黃連半斤

右量水入硝香釜內熬至七分淘出令經宿水

而浮芽者取出控乾以紙袋子盛風中懸至風

化將黃連細末熬清汁晒乾入風硝更加猪羊

膽和蜜令勻點眼極妙

○滌昏膏治一切風壅眼目疼痛不可忍者

醫學正傳

卷之五

二十三

七

白砂蜜一斤

黃連一兩

沒藥半兩

黃丹一兩妙

右以蜜同黃丹熬黑以水二大盞煎黃連成稠

汁去粗入前丹蜜內煎熬稠更入沒藥末同煎

數沸濾去粗洗眼甚妙

○金絲膏治一切目疾昏暗視物如絲蘿所遮或痒

或痛

宣黃連半兩細切水一盞浸一宿取汁再添水

白砂蜜一斤

白礬一字

井鹽一分如無

之

山梔子

二錢槌碎入煎黃連汁內加水同煎五七上沸

右用銀篦煎藥十餘沸用上細生絹加紙數

重再濾過銀篦子盛貯時常點眼

○地芝丸治不能遠視而能近視以此除風熱

生地黃天門冬各四兩

甘菊花各半兩

右為末煉蜜丸茶酒任下

○眼睫方即倒睫拳毛也

木鱉子一箇去殼為末綿裹塞鼻中左目塞右

醫學正傳

卷之五

二十四

卯

右目塞左二夜其睫自正

○點眼光明丹治一切風熱上壅兩目赤腫澁痛風

弦爛眼及內外翳障等証

白灼耳石一兩以黃連半兩煎濃汁濾去粗用炭火煨耳石通紅淬黃連汁內如

此者七次研辰砂一錢鵬砂二錢

輕粉五分片腦三分多麝香一分

如赤眼腫痛加乳香沒藥各五分內外翳障加

珍珠半錢鴨膽膽礬二分熊膽二分爛弦風眼

加銅青半錢飛丹半錢或以諸藥總合為一以

治諸般眼疾右各研極細末一處和勻再研
一二日無聲銀瓶盛貯密封口不可令泄氣點
眼極妙

○丹溪活套云東垣謂目能遠視不能近視火盛而
水虧也法當補腎六味地黃丸主之目能近視
而不能遠視有水而無火也法當補心定志丸
加茯苓主之又曰不能近視服地黃丸不能
遠視服定志丸是皆通手足少陰經也是以
知不能近視者腎水虧欠也不能遠視者心血

醫學正傳

卷之五

二十五

三

不足也○凡目暴發赤腫宜用羌活防風柴胡
白芷升麻酒制木連非草生地黃當歸身白睛
紅少加白芷菟又曰凡眼暴發赤腫須以防風
黃芩爲君當歸生地黃黃連和血瀉火藥爲臣
使○凡目久痛或內障昏暗須以熟地黃當歸
根爲君以羌活防風菊花荆芥穗生甘草之類
爲佐使也

○祖傳經驗固本還睛凡治遠年一切目疾內外翳
膜遮睛風弦爛眼及老弱人目眇多糊迎風冷

淚視物昏花等証悉皆治之

天門冬去皮心酒浸一宿另拌如泥

麥門冬去心焙乾

生地黃酒浸焙乾犯鐵熟地黃犯鐵已上各三兩

人參一兩白茯苓一兩乾山藥一兩

枸杞子一兩

川牛膝一兩

石斛一兩

草決明一兩

杏仁一兩

甘菊花一兩

兔絲子一兩

五倍子一兩

甘草七錢

烏犀角八錢

五味子七錢

枳殼一兩

白蒺藜七錢

黃連七錢

枳殼一兩

川芎七錢

青箱子八錢

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服五七十丸

鹽湯下

○經驗復明膏去翳膜立効

人參一錢半

川歸一錢半

鵬砂一錢半

青鹽一錢

乳香一錢

沒藥一錢

芎藭一錢

玢珠半錢

麝香半錢

黃丹一兩

海螵蛸五錢

黃連四錢

黃礬六錢

赤砂半斤

赤砂半斤

黃礬六錢

赤砂半斤

赤砂半斤

黃礬六錢

赤砂半斤

赤砂半斤

黃礬六錢

赤砂半斤

赤砂半斤

梨仁一錢 白欬一錢 右件各研為極細

末先將白蜜煎沸掠去上沫再熬滴水中沉砂

底方散可用然後入前藥末畧沸攪勻磁罐收

貯廿三五次點之効

口病 四十三

內經曰中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾

故病在舌夫口之為病或為重舌或為糜

爛生瘡或見酸苦甘辛鹹味原其所因未有不

醫學正傳卷之五 二十七

由七情煩擾五味過傷之所致也經曰陰之五

宮本在五味陰之五宮傷在五味是也是以肝

熱則口酸心熱則口苦脾熱則口甘肺熱則口

辛腎熱則口鹹有口淡者知胃熱也外有謀慮

不決肝移熱於膽而口苦者亦有脾胃氣弱水

乘土位而口酸者或膀胱移熱於小腸腸腸不

便上為口糜生瘡潰爛則傷寒狐惑之証上唇

生瘡重食其藏下唇生瘡重食其壯其為口之

為病種種不同醫者各懸壺而治之無有不安

者也

脈法

經曰左寸洪數心熱口苦 右寸浮數肺熱口辛

左關弦數而虛膽虛口苦甚洪而實肝熱口酸

右關沉實脾胃有實熱口甘兼洪數者口瘡或

為重舌木舌

脈虛者中氣不足口瘡若服涼藥不愈宜理

中湯

方法 冊溪方法 九三條

醫學正傳卷之五 二十八

丹溪曰脾熱口甘三黃丸主之

三黃丸兼治五勞七傷消渴不生肌肉

黃芩 春四夏秋 六冬三兩 黃連 春四夏五 秋三冬二 大黃 春三秋二 夏一冬五

兩

右三味煉蜜為丸如梧桐子大每服五丸未愈

加至七丸日三服一月病愈久服行及奔馬按

此方惟實熱者 可用虛者勿用

○瘡熱口苦謀慮不決所致小柴胡湯加麥門冬酸

棗仁地骨皮遠志煎服

○益膽湯治謀慮不決肝胆虛氣上溢則口苦証

黃芩 去朽 甘草 炙 人參 各一錢

官桂 半錢 苦參 茯苓 各一錢

遠志 取肉去

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

○柴胡地骨皮湯治膀胱移熱於小腸腸膈不便上

為口糜生瘡潰爛心胃壅熱水穀不化等証

柴胡 去芳 地骨皮 各等分

右細切每服五錢水一盞半煎至一盞食後溫

服如病人大便實者加大黃朴硝以利之

○治口瘡用西瓜漿水徐徐飲之無瓜時以瓜皮燒

灰付之

○又方細辛黃檗 炒 各等分為末搽舌上吐涎乃愈

○又方用煇硝鵬砂含口勿開外以南星為末醋調

貼足心湧泉穴上神効

○又方用好酒煮黃連成汁呷下即愈

○又方用五倍子一兩黃檗蜜炙滑石各半切綵錄

半兩麝香一字為末搽之極効

○凡口瘡服涼藥不愈者乃中氣不足虛火泛上無

制用理中湯反治之而愈甚者加附子或用官

桂嚙之亦妙

○又方治赤口瘡

白礬 枯 沒藥 另研 乳香 另研各一錢

銅綠 另研

右為細末搽之

○又方治白口瘡

雄黃 沒藥 乳香 各一錢

輕粉 巴豆霜 少許 右為細末搽之

○治實熱口中生瘡用 涼膈散

其和湯皆効

○一小兒口瘡不下食穀以狐惑治之必死後以礬

湯於脚上浸半日煩寬更以黃檗蜜炙彊 蚕炒

為末付之而愈

○又方治唇緊燥裂生瘡用青皮燒灰付之立愈

○又方治唇緊以皮紙燃於刀上薰取瀝付立効

○又方治口糜用野薔薇花根煎湯漱之一云白薔薇根作汁

之付

○又方治口内生瘡用

明礬

枯

黃丹

炒

鹽白梅

燒存性
各一錢

人中白

半一錢

麝香

少許
另研

右爲細末乾摻口內甚者加鵬砂半錢片腦一

分

○鵬砂散治口舌生瘡及咽喉腫痛皆効

鵬砂

馬牙硝

滑石

寒水石

白礬

各二錢

片腦

二分

○

右爲細末每服半錢許食後新汲水調下

卷之五

三十一

水

○

碧雪治口瘡及咽喉腫痛神効

蒲黃

青黛

鵬砂

煇硝

生甘草

各等分爲細末

付之咽喉腫痛搗管吹入

○祖傳經驗方

治腫大塞口不通飲食者

真蒲黃

末

頻刷舌上自退若能藥即以黃

連一味煎濃汁細細呷之以瀉心經之火則愈

○卅溪活套云肝膽有實熱令人口酸而苦小柴胡

湯加甘草龍胆青皮之類甚者當歸龍會丸若

謀慮不決肝膽虛而苦者人參遠志茯神甘草

爲君柴胡草龍胆爲佐使甚者錢氏地黃丸虛

者補其母也○心熱而口苦或口舌生瘡黃連

瀉心湯牛黃清心丸涼膈散之類○脾熱而口

甘者三黃丸平胃散之類○肺熱而口辛者甘

桔湯瀉白散金沸草散之類○腎熱而口鹹者

滋腎丸大補陰丸滋陰大補丸之類

喉痺

四十四

○

卷之五

三十二

論

○

內經曰一陰一陽結謂之喉痺王註謂陰即厥陰

肝與胞絡是也一陽即少陽膽與三焦是也四經

皆有相火存焉子和曰膽與三焦尋火治肝和胞

絡都無異東垣曰火與元氣不兩立一勝則一負

蓋元氣一虛則相火隨起而喉痺等暴病作矣夫

喉之爲會厭者經謂之吸門是也以其司呼吸主

升降爲人身緊關之橐籥門戶也若夫卒然腫痛

水漿不入言語不通死在頃刻誠可驚駭其會厭

之兩傍腫者俗謂雙乳蛾易治會厭之一邊腫者
 俗謂之單乳蛾難治古方通謂之喉痺皆相火之
 所衝逆耳經曰一水不能勝二火又曰一水不能
 勝五火甚言其真水之易虧而相火之易動也如
 大怒則火起於肝房勞則火起於腎飲食失節則
 火起於脾胃之類是故知火者痰之本痰者火之
 標火性急速故病發則暴悍治之之法必先大湧
 其痰或以鉞鍼刺其腫處此急則治標之法也用
 藥者必須以內經從治之法而以桔梗甘草玄參
 升麻防風羌活荊芥人參白朮茯苓之類少加乾
 姜附子等藥為嚮道徐徐頻與不可頓服此為治
 之大法也切不可驟服寒涼之藥非徒無益而且
 促其死耳俗人未諳此理而峻用芩連梔檳之類
 而止治之又甚者雜進以大寒草藥頻與頓服但
 覺腫勢稍退語音畧通而鑒者病者皆為獲効而
 喜殊不知上熱未除中寒復生其毒氣乘虛而入
 腹漸而至於發喘不休不可治矣良可嘆哉外有
 天行一種名曰大頭病俗呼為捏頓瘟其証甚為

凶惡染此者十死八九宜推運氣治之治法亦不
 甚相遠也東垣普濟消毒飲子甚妙實為百發百
 中之劑學者再宜詳究而擴充之務活人於斯世
 也幸甚

脈法

兩寸脈浮洪而溢者喉痺也 脈微而伏者死

方法

冊溪方法
九十一條

冊溪曰喉痺多屬痰宜用吐法或只以桐油灯脚
 用鴨翎探吐之病輕者新取園中李實根檣之更

醫學正傳

卷之五

三十四

研水於項上付之

盧氏曰按本草靈實根即馬蘭草根也能治喉痺
此方多有之也又曰園中李實根未知孰是

○經喉風屬痰熱亦宜吐之

○又方用遠志去心為末水調付項上

○又方用燈心草燒灰吹入喉中

○一方治咽喉腫

荊芥穗

當歸身

桔梗

甘草 各等分

右細切水煎放溫漱而服之有熱加黃芩枳殼

宜刺少滴出血立愈

○又方治喉乾燥痛用四物湯加桔梗荊芥黃蘗知母立已

○又方治喉瘡痛者多屬虛火遊行無制用人參黃蘗蜜炙荊芥

○又方治用搽 虛火用人參竹瀝血虛用四物加竹瀝 根俗名 入好酒少許研汁滴入

喉中愈

○又方以燈籠草炒焦爲末酒調付喉中

醫學正傳

卷之五

三十五

東

瀉實熱火黃連荊芥薄荷硝石爲末姜汁蜜調噙化

○喉舌之疾皆屬火熱雖有數種之名輕重之異乃

大之微甚故也微而輕者可以緩治甚而急者

惟用砭針刺血最爲上策

○通關飲治喉痺腫痛不能語言者但可進藥無不

愈者此從治之法也

一方有黍粘子無白朮換乾姜附子名利隔湯治

一切咽喉生瘡腫痛

人參

白朮

茯苓

各一錢

炙甘草 一錢半 桔梗 去芦二錢 防風 去芦七分

荊芥 半錢 薄荷 半錢 乾姜 炮半錢

或加附子 炮半錢

右細切作一服水二盞煎七分徐徐與之

○又方治喉痺用鴨嘴磨三分或半錢吹入喉中

吐痰愈

○音濟消毒飲子治天行喉痛等証方見瘟疫門

○桔梗湯治咽喉微覺腫痛聲破難語

當歸身 馬勃 各一錢 白殭蚕 炒

醫學正傳

卷之五

三十六

東

黃芩 各三分 麻黃 去節五分 桔梗 去芦

甘草 炙各一錢 桂枝 少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○又治喉痺方新取青艾葉杵汁灌入喉中即愈

○又方治蛇床子於有嘴瓶中燒令病者以瓶嘴布

口中吸煙入喉內立愈

○吹喉散治咽喉一切腫痛

綠礬 半兩別用青魚膽一箇 巴豆 七粒

朴硝 二錢半 銅青 一錢 輕粉 五分

上卷 少另研

右將膽礬同巴豆肉於銅銚內飛過去巴豆全
朴硝已下四味再加麝香少許研勻每用一字
吹入喉中吐出痰血立愈

○聖煙筒治喉痺麻子取肉槌碎紙捲作筒燒煙
吸之

○祖傳經驗秘方治喉痺神効

馬蘭草

五介龍草

車前草

各一握
俗名野薺菜

右以三物杵汁徐徐飲之

醫學正傳 卷之五

三十七

齒

○又方治喉痺及喉中熱痛等証用上好消梨杵汁
頻頻飲之如患者能自嚙嚥下亦可多食為良

大解熱毒惟金瘡產婦及諸脫血証不可食以
其破血故也其餘一應癰疽發背等証多食極

妙

齒病 四十五

內經曰百病之起有生於本者有生於標者夫齒
者腎之標骨之餘也足陽明胃之脉貫絡於齒上

齦手陽明大腸之脉貫絡於齒下齦手陽明惡寒

飲而喜熱飲足陽明惡熱飲而喜寒飲故其為痛

有惡寒惡熱之不同也有開口呬風則痛者胃

胃中有風邪也有開口則穢臭不可近者腸胃中

有積熱也或謂痛而齒動搖或謂痛而齒侵蝕又

有齒縫疎豁飲食不使者比比是也大抵齒齦宣

露而動搖者腎元虛也治宜滋陰補腎為要憎寒

惡熱而口臭穢者胃氣熱也治宜安胃瀉火為良

其所謂風邪虫蝕之証蓋因熱生風而風生虫也

醫學正傳 卷之五

三十八

齒

腸胃之火既平更加以擦牙誅虫之藥以治其標
無有不妥之理也學者詳之

脉法

右寸關脉洪數或弦而洪腸胃中有風熱齒痛

尺脉洪大而虛者腎虛主齒動搖疎豁相火上炎

而痛

方法 冊溪方法

二條

冊溪曰牙疼或出血屬熱胃中有熱有風寒有虫
有濕熱實熱腫痛謂胃承氣加黃連入用升麻白

芷防風荊芥薄荷甘草桔梗之類外用胡桐淚麝

香擦之

○灸法上片痛灸足三里二炷在足陽明經膝下三寸胫骨外大筋內筋

中灸七壯

下片痛灸手三間二炷在手大指次指本節後內側腕中手陽明大腸

經灸七壯

○治垂牙痛用韭菜子以黃蠟包之外以瓦片燒紅

將韭子蠟丸置於其上又別糊一紙袋如巨螺

樣上以小竹管為袋嘴將袋覆於蠟丸上以竹

管拄於齒竅中接煙薰之其虫即死而愈

○治走馬牙疳方其効如神

乾姜

南棗

各燒存性

枯白礬

右件各等分為末付之即愈

○小兒走馬牙疳床一齊腐爛即死此方神効

婦人尿桶中白垢火煨一錢入銅綠三分麝香

一分半付之立愈

○麝香散治熱多寒少牙齦露肉脫血出齒動欲落

疼痛妨食惡寒少惡熱多

熟地黃二分 益智仁二分半 當歸身

生地黃 麻黃根 酒漢防已

人參各半錢 升麻一錢 草薺

黃連各半錢 羊脛骨灰二錢 麝香少許

右為末先用溫水漱口爭擦之

○草薺散治寒多熱少牙齒疼痛

細辛葉 防風各二分 羊脛骨灰

熟地黃各半錢 當歸六分 草薺

黃連各一錢 升麻二錢半

右為細末如前法擦之

○羌活散治客寒犯腦及風寒鼻塞腦痛項筋急牙

齒痛動搖肉齦袒脫疼痛

桑本 香白芷 桂枝各三分

蒼朮 升麻各半錢 當歸身六分

草薺一錢 羌活一錢半 羊脛骨灰二錢

麻黃去根節 防風去蘆各三錢 柴胡五錢

細辛少許

右為細末如前法擦之立愈

○白牙散

白芷 七分 升麻 一錢 石膏 一錢半

羊脰骨灰 二錢 麝香 少許

右為細末如前法擦之立効

○獨聖散治一切牙痛風痺等証

北地蕤荊 不洵多 少陰乾

右為細末每用刷牙以熱漿水漱牙外用

末熬漿水刷牙大有神効

○立効散治牙齒痛不可忍微惡寒飲大惡熱飲其

醫學正傳 卷之五

四十三

脉上中下三部陰盛陽虛是五藏內盛六府陽

道脉微小小便滑數

細辛 三分 炙甘草 半錢 升麻 七分

防風 一錢 草龍胆 酒洗 二錢

右為細末作壹服水一盞煎至七分去粗以匙

抄在口中痛處待少時則止○如多惡熱飲

更加草龍胆一錢此法不定隨寒熱多少臨時

加減○若更惡風作痛加荳蔻黃連 各五分 勿

加草龍胆

牙散治牙齦肉綻有根牙疳腫痛牙齒動搖

落牙齒不長牙黃口臭

羌活 一兩 草龍胆 酒洗 一兩半 羊脰骨灰 二兩

升麻 四兩

右為細末臨時貼牙齦上

○清胃散治因服熱藥或食辛熱之物致使上下牙

疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛足陽明

之別絡入腦喜寒惡熱乃是手陽明經中熱盛

而作也其齒喜冷惡熱

醫學正傳 卷之五

四十三

當歸身 黃連 酒洗 三錢 生地黃 酒製 各

牡丹皮 半錢 升麻 一錢

右為細末作一服水一盞半煎至一盞瀝去粗

帶涼服

○神功丸治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕牙齦

肉將脫牙齒落血不止

蘭香葉 無糖 香代之 當歸身 麝香葉

木香 各一錢 升麻 一錢 生地黃 酒洗

甘草 炙各 三錢 黃連 酒洗 縮砂仁 各一錢

右共為細末湯浸蒸餅為丸如菴荳大每服一百丸或加至二百丸止白湯下食遠服○此藥兼治血痢及血崩及血下不止血下褐色或紫色或黑色及腸澀下血空心服米湯下其脉洪大而緩者及治麻木血氣上衝逆氣上行妄聞妄見者皆効

○祖傳經驗秘方治胃有實熱齒痛或上片痛尤甚者用京膈散以大黄酒蒸為君加知母石膏升麻為佐頻頻含嚥即愈

○又方治胃熱齒痛口臭穢不可近者用大黃荆條

醫學正傳六

卷之五

四十三

火

一二十斤於火上煮漚入姜汁六分之一時時含嚥甚効

○又擦牙止痛方

用黃蘗蜂窠一箇以川椒填滿其竅更以白鹽一錢封口燒存性入香白芷手脛骨灰各一錢同研為細末先以清茶漱口淨然後以此藥擦之及付痛處如有虫蛀孔作痛以少許塞於孔中立愈

○又灸法亦妙

列缺二穴在手太陰肺經與陽明經相連又手取穴中指盡處又著其浮脉丁义之間灸七壯其痛立止永不復發

鼻病 內子七

論

內經曰西方白色入通於肺開竅于鼻又曰鼻者肺之外候丹溪曰肺之為藏其位高其體脆性惡寒又惡熱是故好飲熱酒者始則傷于肺藏鬱熱久則見於外而為鼻鼈準赤之候得熱愈紅得寒則黑此謂熱極似水之象亢則害承運制也其或觸冒風寒始則傷于皮毛而成鼻塞不通之候或為濁涕或流清汁久而不已名曰鼻淵此為外寒束內熱之証也原病式曰肺熱則出涕是也又有膽移熱於腦則為辛頰鼻淵鼻中濁涕如湧泉下滲而下久而不已則為鼻鼈衄血塞肉鼻癰等証鑒者宜各以類推而治之無忽也

脉法

右寸脉浮洪而數為鼻衄鼻鼈

左寸脉浮緩為傷風鼻塞鼻流清涕

方法 丹溪方法
一條

丹溪曰鼻為肺之竅因心肺上病而不利也有寒有熱寒邪傷于皮毛氣不利而壅塞熱壅清道氣不宜通寒則表之麻黃桂枝之類熱則清之芩連梔子之類

○面鼻紫黑面為陽中之陽鼻居面之中一身之血運到面鼻皆為至清至精之血多酒之人酒氣薰蒸面鼻得酒血為極熱熱血得寒汚濁凝結

醫學正傳 卷之五
四十五

而不行故色紫黑治宜化滯血生新血四物加

片芩 酒炒 紅花 酒浸 茯苓 陳皮 耳草 生薑 煎調五靈

脂末服氣弱者加黃芪 酒浸

○酒齋鼻乃熱血入肺 治用前方 用梧桐子桐油入黃連

以天吊藤燒油熱付之

○又方用山硫黃 入蘿蔔內煨 乳香 輕粉 烏頭 大酥 調付

或用膽礬付之

○又方用山梔為末蜜蠟丸如彈子大空心嚼一丸

白湯下

○癰鼻 塞肉乃肺氣盛用枯礬研為末面貼綿裹

塞鼻中數日自消

○又方木通細辛附子炮蜜和綿裹塞鼻中又用防風通聖散加京三稜山茱萸肉海藻並用酒浸炒為末每服一錢半酒調服之

○鼻淵膽移熱於腦則辛額鼻淵防風通聖散一兩加薄荷黃連各二錢半水煎服

○宜明防風湯治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必成衄血之疾

醫學正傳 卷之五
四十六

黃芩 人參 甘草 炙

川芎 麥門冬 去心各一兩 防風 去芦一兩半

右為細末每服二錢沸湯調服食後服日三服

麝澤通氣湯治鼻不聞香臭

黃芪 八分 蒼朮 羌活

獨活 防風 升麻

葛根 各六分 炙甘草 四分 麻黃 不去節冬月加

川椒 白芷 各二分

右細切作一服加生薑三片棗三枚葱白三寸

水二盞煎至一盞溫服食遠忌一切冷物及風

寒涼處坐卧

○溫肺湯治鼻不聞香臭多眵淚

丁香 二分

防風

炙甘草

葛根

羌活 各半錢

升麻

黃芪 各七分半

麻黃 不去節一錢半

右細切作一服水二盞葱白三根煎至一盞食

後溫服

○禦寒湯治寒氣風邪傷于皮毛令鼻塞塞咳嗽上

醫學正傳

卷之五

四十七

喘

黃連

黃礬

羌活 各二分

炙甘草

佛耳草

欬冬花

白芷

防風 各三分

升麻

人參

陳皮 各半錢

蒼朮 七分

黃芪 一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後服

○祖傳經驗秘方治鼻中時時流血臭黃水甚者腦亦

時痛俗名控腦砂有虫食腦中用絲瓜藤近根

三五寸許燒存性為細末酒調服之即愈

○又方用治白牛毛根葉

如白楊木葉香辣者是

焙乾為末吹

入鼻中立愈

血証 四十七

論

內經曰大怒則形氣絕而血菀於上又曰怒則氣

逆甚則吐血又曰陽明厥逆喘欬身熱善驚衄

吐血又曰濕淫汗出為軌衄又曰脾移熱于肝

則為驚衄胞移熱于膀胱則癰而溺血又曰結

醫學正傳

卷之五

四十八

陰者便血一升再結二升三結三升又曰卧則

血歸肝肝受血而能視 一云目得血而能視云肝者蓋目為肝之外

候足受血而能步掌受血而能握指受血而能

攝又曰心出血肝納血肺出氣腎納氣夫人身

之氣血者情性之所依附並行不悖循環無端

經曰一息不運則機絨窮一毫不續則窮壞判

若夫暴喜傷心則氣緩而心不出血故肝無所

受或暴怒傷肝則氣逆而肝不納血故其血無

所歸又若房勞過度以致陰火沸騰血從火起

故錯經而妄行也是以從肺而上溢于鼻者曰衄血從胃而上溢于口者曰嘔血夫所謂咯血嘔血者出于腎也咳血嗽血者出于肺也又有痰帶血絲出者或從腎或從肺來也其血出于小便者曰溺血曰血淋出于大便者曰腸風痔血糞前來者曰近血糞後來者曰遠血流結于腸胃之間而成積者曰血瘕血蠟大抵血從下流者為順易治血從上溢者為逆難治丹溪曰口鼻出血皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經又曰諸見血為熱証正經所謂知其要者一言而終不知其要者流散無窮此之謂也

脉法

內經曰脉來如懸鉤為衄血常脉至而搏血衄身熱者死腸辟下膿血脉弦絕則死滑大則生血溫身熱者死

脉經曰脉得諸澁濡弱為亡血○脉來輕輕在肌肉尺中自浮日晴暈黃衄血未止

太陽脉大而浮必衄吐血 病人面無血色無寒熱脉沉弦者衄也

脉浮弱手按之絕者下血煩數者必吐血

脉極虛芤遲為清穀亡血失精

脉芤為失血 瀉為少血 脉弦而緊脇痛肝藏傷主有瘀血 吐血嘔血脉滑小弱者生實

大者死

大者死

唾血脉堅强者死滑濡者生

方法

丹溪方法

丹溪曰口鼻血出皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經

氣上越出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經

按此語雖見前論蓋一草

之旨故重以示學者

○衄血涼血行血為主犀角地黄湯入鬱金

○一方用荊芥穗研服或用蘿蔔上半段杵汁服又

以汁滴入鼻竅中或灸大椎及啞門穴二三壯

俱可止之

○本草衍義以萱草葉洗淨研汁一盞入生姜汁三

分之一細細呷之治熱衄血

○吐血是火載血上錯經妄行脉必大而乾大則奔熱血失

○大法四物湯加炒梔子童便姜汁竹瀝

○一方用此汁一云九血逆行或吐血或嘔血或見血腥氣川此汁服之最妙童便

姜汁磨入鬱金飲之其血自清如無鬱金以山

茶花代之一云川鬱金末以姜汁童便和好酒調服

調服

○吐血大全良方四生丸甚妙亦治衄血

○又方童便調姜附末服之

醫學正傳大卷之五

五十一

○又方童便二分酒一分搗側柏葉溫飲之

○吐血亦有因怒而得者經曰怒則氣逆甚則嘔血

○一方治吐血不止用乾姜炮為末童便調服

○山梔子最能清胃脫之血

○有先吐血後有痰者是陰虛火盛四物湯為主加

痰火藥若先吐痰而後血多者是積熱降痰火

為急

○有暴吐血成塊者是熱傷血結于中吐出為好

用四物湯加清熱等藥調之

○唾血鮮血隨唾而出出于腎亦有瘀血內積肺氣壅遏不

能下降用天門冬麥門冬知母貝母桔梗黃蘗

熱地黃遠志或加乾姜

○咳血嗽出痰痰盛心熱多是血虛用青黛梔子

訶子貝母海石山梔子為末姜汁蜜丸嚥化嗽

盛者加杏仁後以八物湯加咸調理痰盛者宜更加涼藥

○咯血用姜汁童便青黛血藥中用四物湯地黃

膏牛膝膏之類有咯血痰帶血絲出者用治但宜加痰藥

○舌上無故出血如線用槐花炒為末搽之一方用

醫學正傳大卷之五

五十二

蒲黃炒焦為末付之極妙

○大便下血有熱有虛熱用四物湯加炒山梔子小

麻秦艽阿膠虛用四物湯加乾姜炮升麻

○便血用白芷五倍子為丸服効

○便血有風邪下陷者蓋風傷肝肝生血故也宜升

提之四物湯加防風荆芥升麻柴胡秦艽槐花

條芩地榆枳殼煎服

○有濕傷血者宜行濕清熱蒼朮白朮黃連黃蘗當

歸川芎為藥地榆槐花水煎服之

○因積熱下血用蒼朮陳皮各一兩半連翹五錢黃

連黃芩黃檗各七錢半炒為末生地黄膏丸服

○腸風下血獨在胃與大腸出用黃芩秦艽槐角青

黛升麻

○一方用大黃煨桃仁去尖另研各三錢當歸枳榔皂角

仁黃檗荊芥穗枳殼各五錢蝟皮黃黃連炒秦

芫槐角子各一兩

右為末麩糊為丸如梧桐子大每服五十丸白

湯送下如鮮血下甚者櫻櫚灰蓮房灰各五錢

醫學正傳六 卷之五 五十三

○凡經血逆行或血腥或吐血嘔血用韭汁服自清

○人參飲子治衄血

麥門冬一錢 當歸身一錢 人參

黃芪各一錢半 白芍藥 甘草各一錢

五味子九枚

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○痰涎雜血出于脾胃根黃芪芍藥黃連川歸沉香

末甘草水煎服

○三黃補血湯治吐血

黃芪 川歸 柴胡

熟地黄 川芎錢各一 芍藥

生地黄錢各二 牡丹皮 升麻各半錢

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

○一方治痰嗽吐血

紅花 杏仁去皮尖另研 枇杷葉拭去毛姜汁塗

木通各一兩 紫苑茸 鹿茸炙

右為細末蜜丸龍眼大噙化

醫學正傳六 卷之五 五十四

○黃芪散治咳血成勞

黃芪 麥門冬 熟地黄

桔梗 白芍藥錢各一 甘草半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

○一方治痰帶血咳出

白木一錢 川歸 芍藥

牡丹皮錢各一 桃仁半錢 梔子七分半

甘草三分 麥門冬半錢 右細切水一盞半煎至一盞去粗溫服

○雞蘇散治勞傷肺經咳嗽有血

雞蘇即薄荷

黃芪

生地黃

阿膠珠

貝母

白茅根各一錢

桔梗

麥門冬

蒲黃炒黑色

甘草各半錢

細切水煎服

○薏苡仁散治肺損嗽血

薏苡仁不拘多少

右一味研為細末以猪肺一箇

煮熟蘸藥食之

○又方用猪心一箇竹刀批開入沉香末一錢重大

醫學正傳卷之五

半夏七箇入在心中紙包數重外以童子小便

沃濕漉火煨熟取去半夏吃之嗽血吐血皆効

○一方治溺血山梔子飲

梔子不拘多少炒黑色

右為細末水煎連粗服之

○一方用小蘗根琥珀二味為末水煎服之蓋二物

能治下焦熱結血淋

○又方治溺血神効

生地黃四錢二分 小蘗根

滑石

通草炒

蒲黃炒

淡竹葉

藕節

當歸酒洗

山梔子炒黑色

甘草各七分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○治溺血因血虛者用四物湯加牛膝膏服

○一方治溺血用五苓散合四物湯煎服効

○凡用血藥不可單行單止又不可純用寒涼藥必

加辛溫升藥如加涼藥用酒煮酒炒之類乃寒

因熱用之法也

醫學正傳卷之五

○一方治小兒尿血用甘草升麻煎湯調益元散

○犀角地黃湯治衄血及吐紅

犀角錢

赤芍藥

牡丹皮

生地黃各一錢

右細末切作一服水煎食後服

○四生丸治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行

生荷葉

生艾葉

生地黃

生側柏葉

右各等分細研為丸如彈子大每服一丸水煎

或搗湯化下

○聖餅子治咯血

青黛一錢

杏仁四十箇以黃
菁煎炒黃色

右研杏仁細入青黛捏作餅子用時以柿餅一箇破開以藥餅置於柿中合宜濕紙包炮煨連柿研細米飲調下

○地榆湯治結陰便血不止漸而極多

地榆四錢

生甘草一錢半炙甘草一錢

宿砂七枚
另研

醫學正傳卷之五

五十七

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○結陰丹治結陰腸風藏毒下血等証

枳殼炒

威靈仙 黃芪

陳皮

樗根皮 何首烏

荊芥穗各等分

右細末酒糊為丸如梧桐子大每服五七十丸

清米飲入醋少許送下

○椿皮散治血痢及腸風下血神驗

樗根白皮二兩

槐角仁四兩

枯白礬二兩

炙甘草一兩

右為細末 每服三錢清米飲調下

○烏梅丸治大便秘下血如神

殭蠶一兩炒

烏梅肉一兩半

右為細末醋糊為丸醋湯下三五十丸空心服

○槐花散治腸風藏毒下血

槐花炒

側柏葉

荊芥穗

枳殼炒
黃色

右各等分為末每服二錢空心米飲調下

醫學正傳卷之五

五十八

○加減四物湯治腸風下血

側柏葉

生地黃

當歸

川芎各八分

枳殼炒

荊芥穗

槐花炒

甘草炙各四分

地榆

條黃芩

防風各六分

烏梅大者一箇

右細切作一服加生姜三片煎至一盞去粗空

心溫服

○當歸和血散治腸澼濕毒下血

槐花炒

青皮各六分

當歸身

升麻 各一錢 川芎 四分 荊芥穗

熟地黃 白朮 各六分

右為細末每服三錢米飲調下

○枳殼散東垣曰血清而色鮮者腸風血濁而黯者為臟毒糞前來者為近血糞後者為遠血此藥並皆治之

枳殼 十兩 麸炒黃色 甘草 三錢 炙

右為細末每服一錢空心米飲調送下酒煮苦連丸

醫學正傳 卷之五 五十九 花
○酒煮黃連丸

黃連 去鬚十兩 好酒 五升

右將黃連細切以銀石器盛酒煮黃待乾尺為度焙乾為末麪糊為丸如梧桐子大每服三十九空心服

○秘方枳殼湯治大便腸風下血

枳殼 一兩 麸炒黃色 黃連 二兩 以槐花四兩同炒去槐花不用

右二味量水煎濃汁食前溫服

○槐角丸治五種腸風下血痔漏脫肛並皆治之

槐角 二兩 地榆 黃芩

當歸 防風 枳殼 麸

右各等分為細末酒麪糊為丸如梧桐子大每服五十九空心清米飲送下

○升陽去熱和血湯治腸澼下血另作一派其唧唧然出者有力而遠四散如篩腸腹中作痛熱毒所作也

陳皮 二分 熟地黃 當歸身

蒼朮 秦艽 肉桂 各三分

醫學正傳 卷之五 六十
生地黃 牡丹皮 生甘草 各五分

升麻 七分 炙甘草 黃芪 各一錢

白芍藥 一錢半

右細切作一服水二盞煎至一盞食前稍熱服

○生地黃散治鬱熱衄血咯血吐血等証

枸杞子 柴胡 黃連

地骨皮 天門冬 白芍藥

甘草 黃芩 黃芪

生地黃 熟地黃 各半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○玉屑膏治熱血

黃芪

人參

右二味各等分為末用蘿蔔大者切厚一指許四五片蜜淹少時蘸蜜炙乾盡蜜二兩為度勿令焦點藥末吃不拘時仍用鹽湯送下

○龍骨散治衄血不止凡九竅出血皆可止之

龍骨

不拘多少

右一味細研吹入鼻中即止

○麝香散治鼻衄不止

白礬

龍骨

各五錢

麝香

一分半

右各另研和勻每用時先以冷水洗鼻乳淨然後用藥吹入乳內或以濕紙燃蘸入亦妙

○經驗方治瀉血

百藥煎

一兩以半兩燒灰存性

右共研細飯丸如梧桐子大每服三四十九或以米湯調下末子二三錢亦可

○又方治前証用乾柿餅燒灰存性清米飲調下二三錢立止

○桃仁承氣湯治男子婦人血結脅手不可近及中

焦畜血妄言見鬼昏迷如狂及久病胃脘疼痛

畜血等証

○抵當湯治下部蓄血臍下結痛滿硬等証

二方並見傷寒門

○卅溪活套云凡諸見血証皆是陽盛陰虛君相二

火亢甚煎迫其血而出諸竅也悉宜四物湯加

知母黃蘗補陰降火之劑為主治○如衄血咳

血或痰帶血絲出者皆從肺中來也本方加酒

洗蒲黃黃芩茅花等藥以瀉肺火如嘔血吐血此

從胃中來也本方加石膏知母等藥以瀉胃火

○唾血咯血及潮熱咳血此血從腎中來也本

方用槐櫟皆當以鹽酒炒更加肉桂一分許以

瀉腎火如小便血於溺竅中出澀數成淋作痛

或雜尿而出者此從膀胱中來也本方加梔子

仁瞿麥牛膝滑石之類以瀉膀胱之火○如小

便出血不痛者此心移熱於小腸故曰血從精

竅中出也本方加黃連梔子條芩之類以瀉本

經之火○大便未糞而血先來者謂之近血知

其從大腸中来也本方加枳櫚枳實槐花條茶之類以瀉大腸之火○如大便秘而血來者謂之遠血知其從小腸中来也本方加木通黃炒黃連之類以瀉小腸之火○夫血出於口鼻者或加犀角芩連之類以清之或加茅花藕節櫻櫚灰炒蒲黃之類以止之或加韭汁童便山茶花牡丹皮之類以清之○其血出於大便秘者或加槐花側柏葉條茶之類以清之或加地榆荆芥白芷茅根之類以止之○其血出於小便者或加瞿麥麥門冬梔子仁之類以清之或加滑石木通大小蓳之類以行之或行之或清之或止之皆當視其症緩急而施治之俱以四物為君主之藥也

○祖傳經驗秘方

治小便溺血用車前草葉金陵草葉俗名墨斗草二味搗取自然汁一盞空腹飲之立止

○又髮灰丸

用小兒胎髮如無以壯年無病人頭髮下者

為上白落者次之燒灰細研別用新取明礬搗汁調糯米粉打糊為丸如梧桐子大每服五十九丸白湯送下或與四物湯送下尤妙空心服之

○又方治大便下血用篋竹葉燒灰存性米糊為丸如梧桐子大每服七八十九空心米飲送下一男婦四十余素飲酒無度得大便下血証一日入廁二三次每次便血一升許予以四物湯加條芩防風荆芥白芷槐花等藥連日與服不效後用橡斗燒灰二錢七分調入前藥汁內服之又與灸脊中對臍一穴血遂止而平安其病自此不發

痔漏 四十八

論

經曰因而飽食筋脉橫解腸癖為痔又曰脾胃者倉廩之官五味出焉大腸者傳道之官變化出焉若夫飽食太過則脾氣倦甚不能運化精微用務莽損清濁混淆故食積下流於大腸之間而為痔

心蓋脾胃一虛肺氣亦乏而大腸之氣亦行
其肝木得以乘虛下流而為腸風病則是肺金生
所養木寡于畏之所為耳其為變見名狀種種不
同曰牛妳曰鼠妳曰雞心曰雞冠曰蓮花曰翻花
曰蜂巢曰穿腸曰外痔 雖為狀不一而其因則
同焉治法以苦寒瀉火芩連梔子槐花之類以辛
溫和血川歸川芎桃仁之類風邪在下以秦艽防
風升麻之類提之燥熱拂鬱以大黃枳殼麻仁之
類潤之達此疾者自宜慎口節欲依法調治無有
不安者也

醫學正傳

卷之五

六十五

脈法

脈沉小實者易治 浮洪而懦弱難愈

方法

冊溪方法
九十條

○一冊溪曰痔病因風熱燥歸于大腸也治血為主

大法用芩涼大腸入參黃連生地黃槐角涼血

生血當歸和血川芎升麻枳殼寬腸

○漏瘡先須用補藥以養氣血

外以附子為末水浸洗之如瘡學以艾

多灸之漏大者艾炷亦大漏小者艾炷亦小灸
令微熱不可令痛餅乾即易之再和再灸又以
補氣血藥作膏藥貼之

○一方治痔瘡腫痛用蝸牛一名蝸陰乾為末付之即

愈或用香油浸蝸牛月餘而以其油沫付亦効

○洗藥用五倍子朴硝桑寄生蓮房煎湯先薰後洗

○又方治痔瘡風腫疼痛用胡麻子煎湯洗之其腫

即消

○又方用木鱉子五倍子共為細末調付

醫學正傳

卷之五

六十六

○塞藥用炉耳石煨以童子尿淬之牡蛎煨共為末

付之

○又方用馬蘭草根研細付上片時看肉平藥稍去

遲恐肉反出

○腸風獨在胃與大腸出用黃芩秦艽槐角青黛升

麻

○一方用大黃煨桃仁去尖各三錢蛸皮炙黃連秦

芩槐角子各一兩當歸檳榔皂角仁黃蘗炒荊芥

枳殼各五錢為末麝香為丸如梧桐子大每服

五十丸白湯下如下鮮血者加攪攪反逆升

○秦朮羌活湯治痔漏成塊下垂不任其痒

羌活一錢二分 秦朮 黃芪 各一錢

防風去芦二分 升麻 炙甘草

麻黃 柴胡 各五分 藻本 三分

細辛 紅花 各少許

右為細切作一服水煎服忌寒風慶大小便

○秦朮蒼朮湯治痔核已破謂之痔漏大便秘澀必

作大痛此濕熱風燥四氣合而為病故大腸頭

醫學正傳卷之五 六十七

成塊者濕也作大痛者風也大便燥結者熱也

火邪也其西方肺金主氣其體收下亦助病為

邪須當用破氣藥兼之其効如神

秦朮去芦 桃仁去皮尖 皂角仁燒存性

蒼朮未泮浸 防風各七分 黃蘗酒洗五分

當歸稍酒洗 澤瀉各三分 枳榔二分另研

大黃少許雖大便過澀亦不可多用

右件除枳榔桃仁皂角仁三味另研外餘藥細

切作一服水三盞煎至一盞二分去粗入枳榔

等三味末子再上火煎至一盞空心熱服待少

時以羹膳壓之不犯胃氣也服藥日忌生冷硬

物及酒濕麪大料椒姜等物若犯之其藥無効

如有白臘加白葵花頭五朶去萼心青皮半錢

入正藥中同煎木香三分為細末同枳榔等三

味依前煎服餌古人治此疾多以歲月待除之

惟此藥一服即愈

○秦朮當歸湯治痔漏大便秘結燥疼痛

大黃煨四錢 秦朮去芦 枳實 各一錢

醫學正傳卷之五 六十八

澤瀉 當歸稍 皂角仁

白朮各五分 紅花少許 桃仁二十箇去尖研細

右細切作一服水三盞煎至一盞食前服 忌

如前

○秦朮防風湯治痔漏每日大便時發疼痛如無疼

痛者非痔漏也此藥主之

秦朮 防風 當歸身

白朮 各一錢 炙甘草 澤瀉 各六分

黃蘗酒洗五分 大黃煨 陳皮 各三分

柴胡

升麻 各二分

桃仁 三十箇去
尖另研

紅花 少許

右細切作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱空心服之避風寒忌房事酒濕麪大辛熱之物

○當歸郁李仁湯治痔漏大便硬努出大腸頭下血

苦痛

郁李仁

皂角仁 各二錢 枳實 七分

秦艽 去芦

麻仁 當歸稍

生地黄

蒼木 各半錢 大黃 煨

醫學正傳 卷之五

六十九

澤瀉 各三分

右細切作一服除皂角仁為末用水三盞煎至一盞去粗入皂角仁末和勻空心服忌如前

○紅花桃仁湯治痔漏經年因而飽食筋脉橫解腸

澀為痔治法當補北方瀉中央

黃蘗 一錢半

生地黄 一錢 澤瀉 八分

蒼木 六分

當歸稍 漢防已

防風稍

猪苓 各半錢 麻仁 二分

紅花 少許

桃仁 十箇

右細切作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱服忌如前

○七聖丸治大腸疼痛不可忍脉訣云積氣生於脾

藏傍大腸疼痛陣難當但令稍瀉三焦火莫慢

多方立紀綱

羌活 一兩

郁李仁 湯浸去皮尖另

大黃 八錢煨

枳實 桂心

木香

川芎 各五錢

右除郁李仁另研旋入外其餘共為細末煉蜜

醫學正傳 卷之五

七十一

為丸如梧桐子大每服三五十丸白湯下食前

服取微利一服而愈切禁不得多利大便秘痛

滋甚

○秦艽白朮丸治痔疾并漏有膿血大便燥硬疼痛

不可忍

秦艽 去芦

桃仁 去尖研

皂角仁 燒存性

當歸稍 酒浸

澤瀉

枳實 麩炒黃色

白朮 各五錢

地榆 三錢

右為細末和桃仁泥再研勻麩糊為丸如雞頭

實大令藥光滑焙乾每服五七十丸白湯空心

下待少時以美膳壓之忌生冷硬物冷水生菜

之類并酒濕麪及辛辣大料熱物犯之則藥無

驗也

○脫症證症音工下部病也俗作肛非

屬氣血虛與熱氣虛參芪升麻川芎血虛四物

湯熱加黃檗外以五倍子為末托而上之一次

未收至五次七次必收

○又方以陳壁土炮湯先薰後洗

醫學正傳

卷之五

七十一

○又方以驚頭燒存性為末真麻油調付即收龜頭

亦可

○祖傳經驗秘方七花丸治腸風下血久痔皆効

山茶花

芙蓉花

石榴花

榆漆花

松花

白茅花

劉各一兩俱燒

存性

槐花

二兩炒焦黑

枳殼

一兩麪炒黃色

甘草

炙半兩

地榆

一錢

檳榔

二錢半

右為細末醋調麪糊為丸梧桐子大每服七八

十九煎烏梅湯下

○又方治腸風下血等証

乾柿餅燒存性如灰二兩

酒瓶箒何酒過一年者

或二三年者猶甚煨存性

烏梅燒存性已上各二兩

百藥煎無以五兩如

倍子炙焦

槐花

半兩炒焦黑

枳殼半兩麪炒黃色

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服七八十

丸醋湯下或加檳榔半兩

汗証四十九

論

內經曰心之液為汗原病式曰心熱則出汗東垣

醫學正傳

卷之五

七十二

論

曰西南坤上也在人則為脾胃夫人之汗猶天地

之兩陰滋其濕則為霧露為雨也據內經獨主於

心而東垣又指脾胃而言何也蓋心為君火主熱

脾胃屬土主濕濕熱相搏為汗明矣亦如地之濕

氣為雲霧而上升其天氣若不下降則不能成霖

雨也又如甑中燒酒若非湯火蒸淘則不能成汗

液也夫各藏皆能令人出汗獨心與脾胃主濕熱

乃總司耳故內經又曰飲食飽甚汗出於胃驚而

奪精汗出於心持重遠行汗出於腎疾走恐懼汗

出於肝推體勞苦汗出於脾若夫自汗與盜汗者
病似而實不同也其自汗者無時而戰戰然出動
則為甚屬陽虛胃氣之所司也盜汗者寐中而通
身如浴覺來方知屬陰虛榮血之所主也大抵自
汗宜補陽調衛盜汗宜補陰降火 大法心虛冷
汗自出者理宜補肝益火之原以消陰翳也陰虛
火炎者法當補腎壯水之主以制陽光也醫者宜
詳辨之毋錯

脈法

醫學正傳

卷之五

七十一

古

脈大而虛浮而濡者汗

在寸為自汗在尺為盜

汗

傷寒脈陰陽俱緊當無汗若自汗者曰亡陽不治

方法

丹溪萬法
九四條

丹溪曰自汗屬氣虛屬濕與熱盜汗屬火與陰虛

○火氣上蒸胃中之濕亦能作汗涼膈散主之

○治自汗用人參黃芪少佐以桂枝陽虛者附子亦

可用

○痰病亦有汗者

○麥煎湯治諸虛不足及新病暴虛津液斷欠體常

自汗夜卧則甚久而不止體瘦心忪驚惕短氣

疲倦

牡蛎

黃芪

麻黃根 各一錢

右細切作一服入小麥百餘粒水煎服

○調衛湯治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任風寒

証

黃芪

麻黃根 各一錢

羌活 二分

生甘草

當歸稍 各五分

生地黃

醫學正傳

卷之五

七十四

火

麥門冬 各三分

生黃芩

半夏 各五分

猪苓 二分

蘇木

紅花 各一分

五味子

粒七

愚恐自汗陽虛之証不應下羌活
半夏生薑三味辛散發表之劑恐

傳寫之誤
姑存之

右細切作一服加生薑三片水二盞煎至一盞

去粗稍熱服

○當歸六黃湯盜汗之聖藥也

當歸一錢

生地黃

熟地黃

黃芪 各七分

黃芪 一錢

黃連 七分

黃芩 七分

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服小

兒減半又曰小兒不須治小兒雖能自愈然不治病恐日甚治之尤妙

○黃芪建中湯治自汗及盜汗皆効方見傷寒門桂枝湯或加小浮

麥一兩

○四制白朮散治盜汗

白朮四兩內一兩以黃芪同炒一兩以石斛同炒一兩以牡蠣同炒一兩以麩皮同炒九

同炒者皆去之

右取白朮一味為末每服三錢粟米湯調下

醫學正傳 卷之五 七十五

○正氣湯治盜汗

黃蘗

知母各一錢半

甘草炙半錢

右細切水煎服之

○白朮散治飲酒中風多汗食即汗出如油漏久不

治必成消渴

牡蠣三錢

白朮一兩二錢半

防風二兩半

右為細末每服一錢溫水調下不計時候如惡

風倍防風白朮如多汗面腫倍牡蠣

○丹溪活套云仲景桂枝湯治外感風邪自汗之聖

藥也黃芪建中湯治外感挾氣虛自汗之劑也

東垣補中益氣湯治傷寒氣虛自汗之妙劑

也甚者六脉浮濡而虛本方加附子以治陽虛

其効如鼓應桴○如左寸脉浮洪而自汗者心

火炎也本方倍參芪加麥門冬五味子黃連各

半錢○如左關脉浮弦而自汗者挾風邪也本

方加桂枝芍藥各半錢若不陰虛只有桂枝湯

可用也○右關脉浮洪無力而自汗者只宜本

方倍參芪而自愈○右尺脉洪數無力而自汗

者或盜汗相火挾君火之勢而尅伐肺金也本

方加黃連黃芩黃蘗各半錢只用當歸六黃湯

○左尺脉浮洪無力而自汗者水虧火盛也本

方加知母黃蘗各半錢熟地黃一錢壯水之主

以制陽光也○凡內傷及一切虛損之証自汗

不休者總用補中益氣湯少加附子麻黃根浮

小麥其効捷如影響但升麻柴胡俱用蜜水製

炒以殺其升發勇悍之性又欲其引參芪等藥

至肌表故不可缺也○凡上所云皆指內傷虛

損自汗之証故皆以補中益氣為主治之藥也

○上湖呂俊文得內傷虛証發熱自汗如雨不止服

補中益氣湯十數貼不効予以前方加減每貼

用蜜制黃芪一錢半人參一錢白朮甘草陳皮

各七分當歸白芍藥各一錢升麻柴胡各一分

加桂枝三分麻黃根七分浮小麥一撮炮附子

三分三貼而汗止熱亦退而安

瘧病 五十

論

醫學正傳卷之五

內經曰諸瘧滑氏曰瘧當作瘧項強皆屬於濕王注云太陽濕也

又曰諸暴強直皆屬於風王注云陽明驚而陰行於外也原病式

曰筋勁強直而不柔也夫肝木屬風而主筋經

曰諸暴強直屬風理宜然也其所謂諸瘧項強而

屬於濕者何與蓋太陽經濕甚則蕪風化亢則害

承運制也是故知瘧之為病濕為本風為標耳故

仲景有剛柔二瘧之分不可不辨蓋剛為陽瘧而

柔為陰瘧也昔夫太陽發惡熱無汗惡寒脈弦長

脈急實滿口噤手足攣急咬牙甚則搖擗角弓反

張此為剛瘧太陽微熱多汗不惡寒脈遲濡弦細

四體不收時時搖擗閉目合口此為柔瘧大抵因

風濕二氣襲於太陽之經亦有輕重之分其風氣

勝者為剛瘧風性剛急故也濕氣勝者為柔瘧濕

性柔和故也外有諸虛之候表虛不任風寒亦能

成瘧是以或產後或金瘡或跌仆撲傷癰疽潰膿

之後一切去血過多之証皆能成此疾也是乃虛

為本而風為標耳亦有絕無風邪而亦能使人筋

脈挛急而為角弓反張之候者血脫無以養筋故

醫學正傳卷之五

也丹溪甚言不可作風治而用風藥恐反燥其陰

血而致不救也可不慎與

脈法

脈經曰太陽病發熱其脈沉而細者為瘧

瘧來按之築築然而弦直上下行

瘧家其脈伏堅直上下

瘧病發其汗已其脈發發然而暴腹脹大為

欲解脈如故反伏弦者必瘧此瘧字恐當作死

太陽脈其証備身體強凡凡然脈沉遲此為瘧

桂枝湯主之

方法
凡二條

川溪曰大率與痼相似比痼為虛切不可作風治而純用風藥多屬氣血虛有火有痰宜補蕪降痰火參芪芎歸竹瀝之類

○一方治少年痘瘡後成痼口噤不開四肢強直時或逆膈腹痛一陣則冷汗如雨痛定汗止脉

極強緊如真弦先因勞倦傷血瘡後血愈虛而又感風寒當用溫藥養血辛涼散風芎歸當歸

醫學正傳卷之五 七十九

為君川芎青皮鈞鉤藤為臣白朮甘草為佐桂

枝木香黃連為使更加紅花少許水煎服愈

○桂枝湯治太陽傷寒成痼

桂枝根

甘草

各三兩

桂枝

芍藥

生薑

各三兩

大棗

十二枚

右六味細切作一服以水九升煮取三升作三

服連飲取微汗如汗不出少頃熱粥湯發之

○為根湯治太陽病無汗而小便反少氣上衝口

噤不得語欲作剛痼

方見傷寒門

芎歸根湯治剛痼汗惡寒

麻黃

赤芍藥

各三錢

乾薑 四錢半

黃芩

右細切作一服水二大盞葱白三莖煎八分稍

熱服

○大承氣湯治剛痼大便實熱方見傷寒門

○桂枝為根湯治柔痼有汗不惡寒方見傷寒門

○桂枝芍藥根湯治柔痼通用方見中風門

○小續命湯治剛柔二痼通用方見中風門

醫學正傳卷之五

○防風當歸散治發汗過多發熱頭搖口噤背反張

者宜去風養血

防風

當歸

川芎

生地黃

各二錢半

右細切作一服水煎服

○當歸補血湯治一切去血過多因無血養筋令人

四肢掣急口噤如痼

黃芪

一兩

當歸

五錢酒浸洗淨

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服○如寒

風或蕪破傷風者加防風羌活各一錢荊芥穗一錢半甘草半錢減去黃芪一半煎服

○活人舉卿舉敗散治新進血虛發瘧者汗後中風發熱亦然

荊芥穗不拘多少微炒

右為末每服三五錢外以大豈黃卷以熱酒沃之去黃卷用汁調下其効如神

○丹溪活套云昔之所謂剛柔二瘧者當以虛實論之是也一屬外感一屬內傷屬外感者為剛瘧

醫學正傳

卷之五

八十一

上

宜用麻黃葛根湯祛暑桂枝湯小續命湯在裏者大承氣湯之類○屬內傷者為柔瘧宜用補中益氣湯八物湯四物湯之類如以風濕二事分剛柔而治恐誤醫者不勝其多今以虛實分治其理昭然無疑矣

○陶氏婦年三十餘身材小瑣形瘦弱月經後忽一日發瘧口噤手足攣縮角弓張予知其去血過多風邪乘虛而入用四物湯加防風羌活荊芥少加附子行經二貼病減半六貼病全安

論

厥証 五十

內經曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥又曰寒厥者此人質壯以秋冬奪於所用下氣上爭不能復精氣溢下邪氣因從之而上也氣因於中由陽衰不能滲營其經絡陽氣日損陰氣獨在故手足為之寒也熱厥者此人必醉飽入房精氣中虛酒入於胃則絡脉滿而經脉虛脾主為胃行其津液者也陰氣虛則陽氣入陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不能滲營其四肢也氣聚於脾中不得散酒氣與穀氣相薄熱盛於中故熱遍於身內熱而溺赤也胃氣日衰陽氣獨盛故手足為之熱也又陰氣盛於上則下虛下虛則腹脹滿則下氣重上而邪氣厥厥則陽氣亂陽氣亂則令人暴仆不知人或至半日遠至一日乃知人也名曰尸厥考之張仲景傷寒論陰陽二厥之証皆指手足逆冷而言也河間原病式曰陰厥者原病脉候皆為陰証身涼不渴脉遲而微陽

醫學正傳

卷之五

八十二

東

厥者原病脉候皆為陽証煩渴譫妄身熱而脉數
若陽厥極深或失下而至於身冷久見陰証脉微
欲絕而死者止為極熱而然俗醫妄謂變成陰証
急用熱藥助其陽氣以致十無一生也愚按內經
曰寒熱二厥者皆常病虛損証也並宜補益之法
但熱厥補陰寒厥常補陽耳正經所謂壯水之主
以鎮陽光益火之原以消陰翳也若大傷寒論所
謂陰陽厥者冰炭殊途治法亦異診察之間死生
反掌鑒者其可不盡心乎

醫學正傳 卷之五 八十一 三百七十五
脉法

脉經曰寸口沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣
相搏血氣入於藏則死入於府則愈此為卒厥不
知人唇青身冷為入藏即死如身溫而汗自出為
入府而後自愈

活人書云陽厥脉滑而沉實陰厥脉細而沉伏
方法

○叶溪曰厥因氣虛血虛者多氣虛脉細血虛脉大
如葱管熱厥脉數外感脉浮而實有痰者脉弦

熱用承氣湯痰用白木竹瀝外感宜解散藥中
加姜汁服

○活人書曰初得病身熱頭痛大便秘小便赤或畏
熱或飲水或揚手擲足煩燥不得安卧譫語昏
憤而厥此陽厥也大柴胡湯大小承氣湯治之
渴者白虎湯妙○手足厥冷脉乍熱結此邪氣
結在胃心下煩滿飢不能食瓜蒂散吐之○寒
熱而厥面色不澤胃味兩手忽無脉或一手無
脉必是有正汗也多用綿衣包手足急服五味
湯或蕪與桂枝麻黃各半湯須臾大汗而解○
傷寒厥逆心下怔忡者宜先治水茯苓甘草湯
主之○如得病後四肢逆冷脉沉而細足牽卧
而惡寒引衣蓋覆不欲水或下利清穀而厥逆
者陰厥也四逆湯白湯厥逆脉不至者通脉
四逆湯手足指頭微寒者謂之清理中湯無熱
証而厥當歸四逆加茱萸生薑湯喘促脉伏而
厥五味子湯吐利手足厥冷煩燥欲死吳茱萸
湯

○五味子湯治陽厥脉伏手足逆冷

五味子 一兩 人參

麥門冬

杏仁

陳皮 已上各半兩

右細切用水三盞生姜十片棗二枚煎至一盞

半去粗分作二服

○桂枝麻黃各半湯方見傷寒門

○茯苓甘草湯治陽厥怔忡手足厥逆心下有水氣

茯苓

桂枝 各二錢

甘草 一錢

生姜 三兩

醫學正傳

卷之五

八十五

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

○通脉四逆湯治陰厥下利清穀四肢逆冷脉微

甘草 六錢半

附子 一枚 生用

乾姜 一兩炮

如面赤者加葱九莖嘔者加生姜咽痛加桔梗

利止脉不出加人參用水三大盞煎至一盞半

去粗分作二服

○當歸四逆加茱萸生姜湯治無熱証而厥

當歸

芍藥

桂枝

細辛 各一兩

甘草

通草 各六錢半

茱萸 三錢

生姜 六錢

右細切水三升煮至一升半分三服

○吳茱萸湯治陰厥吐利手足逆冷煩躁欲死

吳茱萸

生姜 各五錢

人參 三錢半

右細切作一服水二盞煎至一盞半溫服忌生

冷物

○蘇合香丸治卒厥不知人未詳風痰氣厥先與此

藥極妙每用一九以湯調化灌之即醒醒後察

脉後而用他藥

醫學正傳

卷之五

八十六

○升麻活套云熱厥四肢煩熱蓋濕熱鬱于脾土之

中治用東垣升陽散火湯火鬱湯之類寒厥手

足逆冷者多是氣血不足補氣血藥加附子飲

酒人或體肥盛人手足熱者濕痰鬱火盛也二

陳湯加芩連梔子之類若忽然手足逆冷卒厥

不知人者多屬痰火亦有陰先虧而陽暴熱者

宜多用參膏燕竹瀝姜汁與之人瘦弱者雖無

痰而火亦盛也服竹瀝亦能養血而降火

癲狂癰証 五十二

論

內經曰巨陽之厥則腫首頭重足不維

其目而暴仆也是蓋陽氣逆亂故令人卒然暴仆而不知

人氣復則甦此則癇之類也又曰陽明之厥則顛

疾欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見妄言又曰

甚則棄衣而走登高而歌踰垣上屋罵詈不避親

疎是蓋得之於陽氣太盛胃與大腸實熱燥火鬱

結于中而為之耳此則顛狂之候也曰顛曰狂分

而言之亦有異乎難經謂重陰者顛重陽者狂素

醫學正傳夫卷之五

問註云多喜為顛多怒為狂然則喜屬於心而怒

屬於肝乃二藏相火有餘之証難經陰陽之說恐

非理也大抵狂為痰火實盛顛為心血不足多為

求望高遠不得志者有之癇病獨主乎痰因火動

之所作也治法癇宜乎吐狂宜乎下顛則宜乎安

神養血兼降痰火雖然此三証者若神脫而目瞪

如愚痴者縱有千金我酬吾未如之何也已矣

脉法
脉大堅疾者顛狂 脉虛弦為驚為風癇

脉沉數為痰熱

脉大滑者自已

沉小急疾者死

虛而弦急者死

寸口沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏入藏

則死入府則愈 丹溪曰癲狂脉虛易治實者難

治

方法 丹溪方法

丹溪曰癇証大率屬痰與火不必分五等大法行

痰為主藥用黃連南星梔薑半夏尋火尋痰分

多少治無不愈者有熱者用涼藥以清心有痰

者必用吐吐後用東垣安神丸及平肝之藥青

黛柴胡川芎之類

○癲狂原病式所論甚精蓋以世以重陰為癲重陽

為狂誤也大槩皆是熱耳 盧氏曰重陰重陽之

謂素問註云多喜為顛多怒為狂然則喜屬於心而怒

屬於肝實而多怒也又發熱于中則多汗陽明經謂

陽明之厥則顛疾又謂服膏粱芳甘石藥則熱

氣熾悍發為顛狂此原病式本素問之論以明

○大率多因痰結於心胃間宜開痰順心神亦有中

邪者以治邪法治之

○神不守舍狂言妄動經年不愈如心經蓄熱

心除熱如痰迷心竅當去痰寧心宜大吐大下愈

○一方治癇証用大蝙蝠一箇以硃砂三錢填入腹內以新瓦盛火炙令熱酥為度候冷為細末每一箇分作四服氣弱及年幼者作五服空心白湯調下

○龍腦安神丸治男女五般顛癇無問遠近發作無時

隋學正傳卷之五 八十九 木

茯神 三兩 人參 地骨皮

甘草 麥門冬 桑白皮 各二兩

馬牙硝 二錢 龍腦 麝香 各三分

牛黃 五錢 硃砂 二錢半 烏犀角 一兩

金鉞 三十五片

右為細末煉蜜為丸如彈子大金鉞為衣如風癇病冬月溫水化下夏月涼水化下不拘時二三歲者日進一服大人每服一丸小兒一分作二丸服虛勞發熱咳嗽漸減下化下

○神應用治諸癇

辰砂不拘多少研細

右以猪心血和得所以蒸餅褻劑蒸熟取出就丸如梧桐子大每服一九食後臨卧煎人參湯下

○錢氏五色丸治諸癇

硃砂 半兩 水銀 二錢半 雄黃 一兩

珍珠 另研 鉛 三兩用

右和勻再研極細麪糊為丸如麻子大每服三

隋學正傳卷之五 九十一 木

四九別煎金銀薄荷湯送下

○元戎二白丸治痰涎為病患以致癲癇狂妄驚悸等証

白礬 一兩 輕粉 一字或半錢量虛實加減

右用生蒸餅劑褻蒸熟去皮可丸入輕粉丸如梧桐子大每服二三十丸生姜湯下小兒如黍米大

○拔萃妙香丸治時毒傷寒解五毒潮熱積熱及小兒驚癇等証

兒驚癇等証

辰砂 九兩 另研	龍腦	賦粉
麝香 五錢 研各	牛黃 五錢	金箔 九十片 研
巴豆 二百二十五粒 去皮心及油		
右各研勻煉蜜為丸每兩分作三十九粒米飲下		
○子和硃砂滾涎丸治五癇等証		
硃砂	白礬 生用	赤石脂
硝石 各等分		
右為細末研蒜膏為丸如菰豆大每服三十九		
食後荊芥湯下		
醫學正傳卷之五	九十一	
○局方碧霞丹治痰涎壅塞牙關緊急目睛上視癲		
癲狂妄等証		
石綠 半兩 九度飛	附子尖	烏頭尖
蝎梢 各二十箇		
右為末入石綠令勻麪糊為丸如鷄頭實大每		
服一丸薄荷湯化下更以溫酒半合飲之須臾		
吐出痰涎然後隨証以他藥治之如口噤者搦		
開灌之		
○控涎丹治痰迷心竅狂言謔語如有所見		
方見痰		

○牛黃瀉心湯治心經邪熱狂言妄語心神不		
腦子 另研	牛黃 另研	硃砂 一錢 另研
大黃 生一兩		
右各研為細末和勻再研每服三錢煎生姜蜜		
水調下		
○牛黃清心丸治心氣不足神志不定驚恐顛狂語		
言謔妄虛煩少睡甚至棄衣而走登高而歌踰		
垣上屋等証		
羚羊角末 一兩	人參 去芦二兩半	白茯苓 二兩
川芎 二錢	防風 去芦一兩半	阿膠 炒七錢
乾姜 炒七錢	白朮 一兩半	牛黃 研一兩
麝香 研一兩	犀角末 二兩	雄黃 研一兩
龍腦 研一兩	金箔 一千四百片 內條置湯中	白芍藥 一兩
柴胡 去芦一兩	甘草 剉炒五兩	乾山藥 七兩
麥門冬 去心一兩	桔梗 去芦一兩	杏仁 去尖及
炒黃色一兩	黃芩 一兩半	神麴 炒二兩
大棗 一百箇 皮核研成膏	黃芩 一兩半	白欬 七錢半
蒲黃 炒二兩	大黃 黃卷 一兩七錢半	

常歸

去頭一兩

肉桂

去皮一兩
七錢半

右除棗杏仁金箔外牛黃龍腦麝香雄黃四

研為細末入餘藥和勻煉蜜入棗膏為丸每兩

作十九金為衣每服一丸食後溫水化下

○丹溪活套云五志之火因七情而起鬱而成痰故

為顛癇狂妄之証宜以人事制之非藥石所能

療也須診察其由以平之怒傷於肝者為狂為

癇以憂勝之以恐解之喜傷于心者為顛為癇

以恐勝之以怒解之憂傷于肺者為癇為顛以

喜勝之以怒解之思傷于脾者為癇為顛為狂

以怒勝之以喜解之恐傷于腎者為顛為癇以

思勝之以憂解之驚傷于膽者為顛以憂勝之

以恐解之悲傷于心胞者為顛以恐勝之以怒

解之此法惟賢者能之耳

○祖傳經驗秘方治癲癇神効

九節菖蒲一味

不拘多少不聞雞犬聲者
去毛焙乾

右以木臼杵為細末不可犯鐵器用黑豬心

以竹刀批開摻末煮湯送下每日空心服二三

錢

邪崇 五十三

論

內經曰邪氣盛則實正氣奪則虛夫經之所謂邪

者風寒暑濕爆火有餘之淫邪耳非若世俗所謂

鬼神之妖怪也病有心虛驚惕如醉如痴如為邪

邪所附或陽明內實以致登高而歌棄衣而走皆

痰火之所為實非妖邪崇之所迷也古雖有禁呪

一科及龍樹呪法之治皆移精變氣之術但可解

疑釋惑以使心神之歸正耳何邪崇之可祛哉丹

溪曰血氣者心之神也神既衰乏邪因而入理或

有之

按此恐指山谷
間狐魅而言

若夫血氣兩虛痰客心竅妨礙升降不得運行以

致十二官各失其職視聽言動皆為虛妄以邪治

之其人必死可不審乎

脉法

脉乍疎乍數大乍小或促或結皆邪脉也

脉緊而急者遁屍

方法

丹溪曰俗云衝惡者謂衝斥邪惡鬼崇而病也如病此者未有不因氣血先虧而致者焉

○素問遺篇曰人憂愁思慮則傷心又驚而奪汗出於心或遇少陰司天火所不及因而三虛神明失守蓋心為君主之官神明出焉神既失守神先不聚却遇火不及歲有黑屍鬼見之令人暴亡治可刺手少陽之所過陽池穴也復刺心膺即生○人飲食勞倦則勞脾又飲食飽甚汗出於胃醉飽入房汗出於脾或遇太陰司天天數不及因而三虛脾神不守蓋脾胃諫議之官志意出焉神既失守神光不聚却遇土不及歲有青尸鬼見之令人暴亡可刺足陽明之所過衝陽穴也復刺脾膺即生○人久坐濕地強力入水則傷腎又遇持重遠行汗出於腎或遇太陽司天天數不及因而三虛腎神不守蓋腎為作強之官伎巧出焉神既失守神光不聚却遇水不及歲有黃屍鬼見之令人暴亡可刺足太陽

醫學正傳

卷之五

九十五

之所過京骨穴也復刺腎膺即生○人暴怒氣

逆則傷肝又遇疾走恐懼汗出於肝或遇厥陰司天天數不及因而三虛肝神不守蓋肝為將軍之官謀慮出焉神既失守神光不聚却遇木不及歲有白屍鬼見之令人暴亡可刺足少陽之所過丘墟穴也復刺肝膺即生○人形寒飲冷則傷肺復登高疾走喘出於肺或遇陽明司天天數不及因而三虛肺神不守蓋肺為相傳之官治節出焉神既失守神光不聚却遇金不及歲有赤屍鬼見之令人暴亡可刺手陽明之所過合谷穴也復刺肺膺即生愚按人見五色已精神不守神光不完故耳實非外邪所侮乃元氣極虛之候也因患者眼目所視故實信真為邪鬼所迷但當推其同行同坐者不見有物足可以決此疑耳

五邪刺法

○肝虛見白屍鬼而後暴厥不知人名曰卒屍五邪並目中神彩不變四肢雖冷心腹尚溫口中無涎舌不卷外不縮者可刺之復甦丘墟二穴在足外踝下下如前陷中去臨泣穴五

醫學正傳

卷之五

九十六

寸足少陽之原也以毫鍼刺入三分得氣則補
留三呼徐徐出鍼按口中閉氣腹中鳴者可治
更刺肝膈

肝膈二穴在背第九椎下兩傍各一寸半以毫鍼
刺三分得氣則補留三呼次進二分留三呼復
取計至三分留一呼徐徐出鍼氣及即甦

○心虛見黑屍鬼而後暴厥不知人四肢雖冷日中
精彩不變氣雖閉絕舌不卷矧不縮未出一時
可治刺之復甦陽池也二穴在手表腕陷中手

醫學正傳

卷之五

九十七

花

少陽之原也用毫鍼刺入二分得氣則補留七
呼次進一分留三呼復退留一呼徐徐出鍼手
捫其穴更刺心膈

○心膈二穴在背第五椎下兩傍各一寸半用毫鍼
刺入七分得氣則補留一呼次進一分留一呼
退至二分留三呼徐徐出鍼以手捫其穴即甦

○脾虛見青屍鬼而後暴厥不知人四肢冷而身溫
唇溫不出一時可治

衝陽二穴在足趺上骨間動脈去陷谷三寸足

陽明之原以毫鍼刺入三分得氣則補留三呼
次進二分留一呼徐徐退鍼以手捫之復刺脾
膈

脾膈二穴在背第十椎下兩傍各一寸半以毫
鍼針刺入三分得氣則補留二呼進二分動氣
至徐徐出鍼即甦

○肺虛見赤屍鬼而後暴厥不知人雖無氣手足冷
心腹溫鼻微溫目中精彩不變口中無涎舌不
卷矧不縮者未出一時可治

醫學正傳

卷之五

九十八

合谷二穴在手大指次指兩歧骨間手陽明之
原也用毫鍼刺入三分得氣則補留三呼復退
一分留一呼徐徐出鍼以手捫其穴復刺肺膈
肺膈二穴在背第三椎下各一寸半用毫鍼刺
入一寸半得氣則補留三呼次進二分留一呼
徐徐出鍼以手捫其穴即甦

○腎虛見黃屍鬼而後暴厥不知人氣絕四肢厥冷
心腹微溫目中精彩不變唇舌不黑口中無涎
可救

京骨二穴在足外側大骨下赤白肉際陷中足大陽之原用毫鍼刺入一分半得氣則補留三呼進至三分留一呼徐徐出鍼以手捫穴復刺足少陽之脰

足少陽之脰在背第十二椎下兩傍各一寸半用毫針刺入三分得氣則補留三呼次又進五分留三呼徐徐出針以手捫其穴即甦九以上刺法必先以口含鍼緩而刺之則經脉之氣無拒逆也

醫學正傳六卷之五 九十九

○丹溪治一婦人如癰或作或輟恍惚不省人事一日晷蘇醒診視問忽聞床上有香氣繼又無所知識丹溪曰氣因血虛亦從而虛邪因虛入理或有之遂以秦承祖灸鬼法灸治病者哀告曰我自去我自去即愈

○秦承祖灸鬼法治一切驚狂譫妄踰垣上屋罵詈不避親疎等証

以病者两手大拇指用細麻繩扎縛定以大艾炷置於其中兩介甲及兩指角肉四處着火一

燎不着即無効灸七壯神驗

還魂丹治中惡已死

麻黃 三兩 桂枝 二錢 杏仁 十二粒

右作一服水煎灌下即醒

○桃奴丸治心氣虛怯有熱死注魘夢驚癇等証

桃奴 十二兩 桃木 上落乾桃 辰砂 半兩

桃仁 十四箇 玳瑁 一錢 琥珀 三錢

烏犀角 五錢 石牛黃 一錢 龍腦 二錢

麝香 一錢 另研 雄黃 桃葉 各三錢

醫學正傳六卷之五 一百

安息香 一兩 以無

右以安息香同桃仁琥珀共搗成膏和諸藥末

為丸如雞頭實太陰乾每服一丸人參湯化下

○蘇合香丸治諸般怪疾 方見氣門

○一方治魘死不還用半夏末不拘多少吹入鼻中

即醒

○祖傳經驗辟邪丹治衝惡怪疾及山谷間九尾狐

精為患

人參 茯神 遠志

鬼箭羽

九節菖蒲

白朮

蒼朮

米泔浸

當歸

各一兩

桃奴

焙乾五錢

雄黃

另研

辰砂

各三錢

牛黃

一錢另研

金

二十葉

或加礬石

一錢

右件以桃仁奴已上諸藥為細末入雄黃辰砂

牛黃三味末子和勻以酒調米粉打糊為丸如

龍眼大金為衣臨卧以木香湯化下一丸諸

邪不敢近體更以絳紗囊盛五七丸懸床帳中

尤妙

醫學正傳

卷之五

十一

水

○一婦人年二十七美貌得一証如醉如癡頰赤面

青晷有潮熱飲食不美其脉乍疎乍數而虛每

夜見白衣少年與睡一鑿與八物湯服數十貼

不効召予治之見其家有白大卧梳戶闔予曰

必此大作怪命殺大取其心血及膽汁丸安神

定志之藥以八物湯吞下服藥十數貼丸藥一

料以安其神藥用遠志石菖蒲川歸黃連茯神

硃砂側柏葉草龍胆等藥

怔忡驚悸健忘証

論

內經曰心者君主之官神明出焉夫怔忡驚悸之

候或因怒氣傷肝或因驚氣入膽母能令子虛明

而心血為之不足又或遇事繁冗思想無窮則心

君亦為之不寧故神明不安而怔忡驚悸之証作

矣夫所謂怔忡者心中惕惕然動搖而不得安靜

無時而作者是也驚悸者驚然而跳躍驚動而有

欲厥之狀有時而作者是也若夫二証之因亦有

清痰積飲留結於心胞胃口而為之者又不可固

執以為心虛而治鑒者自宜以脉証參究其的而

藥之母認非以為是也慎之慎之

脉法

寸口脉動而弱動為驚弱為悸

跌陽脉微而浮

浮為胃氣虛微則不能食此恐懼之脉憂迫所致也

寸口脉緊跌陽脉浮胃氣則虛是以悸

肝脉動暴有所驚駭

方法

丹溪方法

丹溪曰蜀血虛有慮便動驚虛時作時止者

火動瘦人多血少肥人只是痰多特覺心跳者亦是血虛怔忡無時驚悸有時而作

○大法四物湯安神丸之類有痰者用痰藥

○驚悸者屬血虛用硃砂安神丸最好或有痰迷心竅者宜用治痰藥

○一方治勞役大虛心跳

硃砂另研

白芍藥

當歸身酒浸

側柏葉各三錢

川芎

甘草

陳皮各一錢

炒黃連一錢半

醫學正傳大

卷之五

一百三

金

右為細末猪心血為丸如黍米大每服五六十

九津嚼嚥下或少用白湯一口送下食後臨卧

服

○驚悸養心湯治肥人因痰火而心驚然跳動驚起

黃芪

茯神

半夏麴

川芎各半錢

遠志去心山

草水浸

桂心

柏子仁

酸棗仁

五味子

人參各一分半

草四分

右細切作一服生薑三片大棗一枚水一盞煎

至七分服如停水加茯神換掉各三分同煎

○安神丸

黃連一錢半

硃砂一錢

另研

生地黃

酒洗

當歸身酒洗

甘草各半錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如黍米大每服十五

丸食後津嚼嚥下方硃砂安神丸無地黃當歸

用生甘草

○溫膽湯治心膽怯怔忡易驚

半夏湯泡七次

竹茹

枳殼實各二錢

生薑三錢

陳皮三錢

甘草一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後溫

服

○定志丸治心氣不足恍惚多忘及怔忡驚悸等証

人參

白茯苓各三兩

遠志去心

石菖蒲各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每

服五十丸食後白湯下

○朱雀丸治怔忡驚悸等証

茯神 二兩

沉香 半兩

硃砂 半兩另研

右為細末蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九

人參湯下

○八物定志丸平補心氣安神鎮驚除膈間痰熱等証

遠志 去皮心

石菖蒲

麥門冬 去心

茯神 去皮

白茯苓 各一兩

白朮 半兩

人參 一兩半

牛黃 二錢另研

煉蜜丸如梧桐子大硃砂為衣每服二十九白

湯送下

○婦脾湯治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白朮

茯神

黃芪 蜜炙

龍眼肉

酸棗仁 炒各一錢

人參

木香 各半錢

甘草 炙二分半

右細作一服水二盞加生姜三片大棗一枚煎

至一盞去粗溫服

○祖傳經驗秘方治憂愁思慮傷心令人惕然心跳

動驚悸不安之証

川歸 酒洗

生地黄 酒洗

遠志 去心

茯神 各五錢

石菖蒲 九節

黃連 各二錢

牛黃 一錢另研辰砂二錢另研金箔十五片

右以前六味研細入牛黃辰砂二味末子猪心

血丸如黍米大金箔為衣每服五十九煎湯送

下

三消 五十五

論

內經曰二陽結謂之消又曰瘕成為消中東垣曰

二陽者陽明也手陽明大腸主津液若消則目黃

口乾乃津液不足也足陽明胃主血若熱則消穀

善飢血中伏火乃血不足也結者津液不足結而

不潤皆燥熱為病也此因數食甘美而多肥故其

氣上溢轉為消渴治當以蘭除陳氣也不可服膏

柔芳草石藥其氣慄悍能助燁熱也岐伯曰脉實

病久可治脉弦小病久不可治當分三消而治之

高消者舌上赤裂大渴引飲經云心移熱於肺傳

為膈消者是也以白虎加人參湯治之中消者善

食而瘦自汗大便硬小便數叔和云口乾飲水多
肌虛痺成為消中者是也。以調胃承氣湯三黃丸
治之下消者煩渴引飲耳輪焦乾小便如膏叔和
云下焦煩水易虧此腎消也以六味地黃丸治之
總錄所謂末傳能食者必發腦疽背癰不能食者
必傳中滿鼓脹皆為不治之証也。張潔古分而治
之能食而渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢
氏白朮散倍加葛根治之上中既平不復傳下消
矣。先用藥厥有肯哉。然臟府有遠近亦宜斟酌
醫學正傳卷之五 一百七

脉法

脉經曰厥陰之為病消渴氣上衝心中疼熱飢
而不欲食食則吐下之不能止寸口脉浮而遲
浮則為虛遲則為虛勞則衛氣不足遲則榮氣
竭

跌陽脉浮而數浮則為氣數則消穀而緊要器作

消渴

氣盛則洩數洩數則緊則緊數相搏則為消

渴男子消渴小便反多以致一斗小便一斗

氣九主之

心脉滑為渴滑者陽氣多心脉微小為消痺消痺

脉實大病久可治懸小堅急病久不可治

脉數大者生沉小者生實而堅大者死細而浮短

者死

方法用溪方法

醫學正傳卷之五 一百八

肝溪曰養肺降火生血為主分上中下治

上焦者肺也多飲水而少食小便如常

中消者胃也多飲食而小便赤黃

下消者腎也小便濁淋如膏之狀

○大法黃連天花粉二味為末藕汁人乳汁生地黃

汁佐以蜜姜汁為膏和二味留舌上徐徐以白

湯少許送下能食者加石膏

○猪肚丸

黃連五兩 麥門冬去心 知母去

括麩根 各四兩

右為細末入雄猪肚內縫 乘熱於石臼中搗

爛如乾加煉蜜丸如梧桐子大每服一百丸食

後米飲下可以清心止渴

○天花粉治消渴之聖藥也 凡消渴藥中大禁半

夏及不可發汗

○三消者瓊玉膏最妙方見咳嗽門

○和血益氣湯治口乾舌乾小便數舌上赤脉此藥

生津液除乾燥生肌肉

醫學正傳 卷之五 一百九

柴胡 炙甘草 生甘草

麻黃根 各三分 當歸稍 酒洗 知母 酒洗

漢防已 酒洗 羌活 各半錢 石膏 六分另研

生地黃 酒洗 黃連 酒洗八分 黃檗 酒洗

升麻 各一錢 杏仁 去皮另研六分 紅花 少許

桃仁 去皮另研六分

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服忌酒醋

熱濕麩

○當歸潤燥湯治小便多大便秘澁乾燥枯結燥渴

喜好溫飲陰頭退縮舌燥口乾眼澁難開及於
黑處見浮雲

細辛 各一分 生甘草 炙甘草

熟地黃 各三分 柴胡 去尖七分 黃檗 酒洗

知母 酒洗 石膏 桃仁泥

當歸身 麻仁 防風

荊芥穗 各一錢 升麻 一錢半 紅花 少許

杏仁 七箇另研 小椒 三粒炒出汗

右細切作一服水二盞煎至一盞熱服食遠忌

醫學正傳 卷之五 一百十

辛熱物

○生津甘露湯一名清涼飲子治消中能食而瘦口

舌乾自汗大便結燥小便頻數

升麻 四分 防風 去芦 生甘草

漢防已 生地黃 各三分 當歸身 六分

柴胡 羌活 炙甘草

黃芪 酒知母 酒黃芩 各二錢

酒草龍胆 右膏 黃檗 各一錢半

紅花 少許 桃仁 五錢 杏仁 十箇

右細切作一服水二盞煎至一盞加蜜一匙稍

熟服

○辛潤緩肌湯一名清神補氣湯前消渴症絕愈止有口乾

腹不能舒此藥主之

生地黃

細辛 各一分

熟地黃

石膏 四分

黃蘗 酒洗

黃連

生甘草

知母 各半錢

柴胡 去芦

當歸身

荊芥穗 各一錢

升麻 一錢半

桃仁泥

防風 各一錢

紅花 少許

醫學正傳卷之五

杏仁 六箇 另研

小椒 一粒炒出汗

右細切作一服水二盞煎至一盞稍熱服食遠

○生津甘露飲子治消渴上下齒皆麻舌根強硬腫

痛食不能下時有腹脹或泄黃如糜名曰殄泄

渾身色黃目睛黃甚四肢痿弱前陰如水尻臀

腰背寒面生蠶色脇下急痛涕唾喜怒不常健

忘

藿香 二分

柴胡

黃連

木香 各三分

白葵花

麥門冬 去心

當歸身 酒洗 蘭香 各五分 薑澄茄

生甘草

山梔子

白豆仁

白芷

連翹

姜黃 各一錢

石膏 一錢 二分

杏仁 去皮

酒黃蘗 各一錢 半

炙甘草

酒知母

升麻

人參 各二錢

桔梗 三錢

全蝎 五箇 去毒

右為細末湯浸蒸餅和勻成劑捏作片子日中

晒半乾擦碎如黍米顆大每服一錢津嚥下或

白湯送下遠服

醫學正傳卷之五

○黃芪飲治三消

黃芪 六兩

炙甘草 一兩

每服二錢水煎服

六味地黃丸 方見虛損門

人參白朮湯治胃膈痺熱煩滿飢不欲食瘧成為

消中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲水而

小便數無療一切陰虛陽實風熱燥鬱頭目昏

眩中風偏枯酒過積毒腸胃燥澀併傷寒雜病

產後煩渴氣液不得宣通

人參

白朮

當歸

考藥	大黃 <small>酒浸絲綆</small>	梔子 <small>炒</small>
荊芥穗	薄荷	桔梗
知母	澤瀉 <small>各五錢</small>	茯苓 <small>去皮</small>
連翹	結菱根	乾葛 <small>各一兩</small>
甘草 <small>三兩</small>	藿香葉	青木香
官桂 <small>各一錢</small>	石膏 <small>四兩</small>	寒水石 <small>二兩</small>
白滑石 <small>半斤</small>		
石為細末每服抄五錢水一盞入盆硝半兩生 姜三片煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至		
一餘錢得臟府流利取効如常服以意加減如		
腸胃鬱結溫熱內甚自利者去大黃芒硝服		
○絳雪散治消渴飲水無度小便數者大有神効		
黃芩 <small>酒炒</small>	黃州 <small>炒飛</small>	漢防已
結菱實 <small>各等分</small>		
右為細末每服二錢溫漿水調下臨卧時併進		
三服即止		
○人參散治腎消善飲而食小便頻數白濁如膏		
人參 <small>一分</small>	白朮	澤瀉

結菱根	桔梗	梔子
連翹 <small>各二分</small>	葛根	黃芩
大黃 <small>酒浸絲綆</small>	薄荷	白茯苓 <small>各五分</small>
甘草 <small>七分</small>	石膏 <small>一錢</small>	滑石
寒水石 <small>各一錢半</small>	縮砂 <small>少許</small>	
右細切作一服為末水一盞半煎至一盞入蜜 少許再煎至三兩沸腎消食前服上消食後服		
○大黃甘草飲子治男子婦人一切消渴不能止者		
大豆 <small>五升先煮二三沸</small>	大黃 <small>一分</small>	
甘草 <small>四兩長四指段槌碎</small>		
右用井水一桶將前藥同煮三五時如稠粘更 添水煮豆軟為度盛於盆中放冷令病人食 豈渴飲湯汁無時候食盡如燥渴止罷藥未止 依前再煮食之不過三劑其病悉愈		
○麥門冬飲子治心移熱於肺名曰膈消心膈有熱 久則引飲為消渴		
麥門冬 <small>去心</small>	結菱根	知母
甘草	五味子	生地黃

人參

葛根

扶神各一錢半

右細切作一服加竹葉七片用水一盞煎至七分溫服

○丹溪活套云三消者多屬血虛不生津液俱宜四

物湯為主治上消者本方加人參五味子麥門

冬天花粉煎入生藕汁生地黃汁人乳飲酒人

加生薑汁○中消者本方加知母石膏滑石寒

水石以降胃火○下消者本方加黃蘗知母熟

地黃五味子之類以滋腎水又間當飲繅絲湯

為上策

○經驗原蚕蠶湯治腎消白濁及上中二消飢渴不

生肌肉其効如神蓋此物燭火有陰之用大能

瀉膀胱中相火引陰水上潮于口而不渴也

原蚕

即再養脫蚕也其繅絲湯極効如無繅絲湯以蠶殼絲綿煎湯皆可代之

醫學正傳卷之五

醫學正傳卷之六目錄

○便濁門五十六

論

脉法

丹溪方法

九條

治便濁九藥方

二陳加升提藥方

珍珠粉丸

半苓丸

虛癆便濁方

張子元氣血兩虛

燥濕痰白濁方

妙香散

秘真丸

草薢分清散

治濁固本丸

九龍丹

水陸二仙丹

定志珍珠粉丸

丹溪活套

祖傳經驗秘真丹

已試醫驗一條

○淋閉門五十七

附關格

論

脉法

丹溪方法

九條

參苓琥珀湯

琥珀散

傷寒後脫陽方

老人氣虛淋閉方

小便黃澁方

下焦無血小便澁方

通關丸

即滋腎丸

清肺飲子

尊氣除燥湯

腎疸湯

小蓴湯

八正散

牛膝膏

茯苓湯

倒換散

葵子散

濟生葵子湯

琥珀散

鐵脚丸

廣濟維蘇飲子

又方治小便不通 集驗治小便淋瀝方

石膏散 祖傳經驗方

治小便溺血方 又治溺血方

治沙淋整痛方 孕婦轉胞方

又治血淋方

附丹溪關格方法 九三條 祖傳經驗方

關格難經法語 已試醫驗一條

○秘結門 五十八 論 脉法 丹溪方法 九二條

脾約丸 通幽湯 潤燥湯

潤腸丸 脉黃白木湯

升陽瀉熱湯 活血潤燥丸

潤腸湯 潤體丸 備急大黃丸

枳殼丸 不實導滯丸

已試醫驗二條

○黃疸門 五十九 論 脉法 丹溪方法 五條

治黃疸方 又治氣實黃疸方

小溫中丸 大溫中丸 調胃承氣湯

治黃疸法語 九四條 大黃柏梔芒硝湯

又治疸法語 九四條 硝石礬石散

治酒疸方 扶苓湯 治穀疸方

胃苓湯 腎疸湯 茵陳五苓散

茵陳茯苓湯 梔子大黃湯

半濕半熱湯 茵陳蒿湯 茵陳大黃湯

梔子柏皮湯 扶苓滲濕湯

小茵陳湯 茵陳四逆湯

葶藶苦參散 當歸白木湯

抵當湯 見傷寒門 針砂丸 綠礬丸

棗礬丸 祖傳經驗褪金丸

已試醫驗一條

○瘡瘍門 六十 論 脉法 丹溪方法 二十條

取剩骨方 升陽益胃散 治背疽

當歸羌活湯 治背疽 扶柳散 敷瘡口

千金托裏散 治背疽 丹溪治背疽方

丹溪治附骨疽法 羌活防已湯 治附骨疽

托裏黃芪酒煎湯 黃連消毒飲 治附骨疽

黃芪柴胡湯 治附骨疽 丹溪治臂癰方法

內托羗活湯	治癰	丹溪治內疽方法
丹溪治肺癰方法	又治肺癰方法	
黃昏湯	治肺癰	葶藶大棗瀉肺湯
葶藶湯	治肺癰	桔梗湯
又治肺癰方	又治肺癰方法一條	
吐膿血如肺癰方	丹溪治腸癰方法	
千金論腸癰法語	要畧治腸癰方	
腸癰灸法	薏苡附子敗醬散	
大黃牡丹湯	已試醫驗一條	
丹溪治乳硬方法	治乳癰方	又治乳癰方法
升麻托裏湯	程石香治疔岩法	
十六味流氣飲	單煮青皮湯	
橘葉散	丁香散	治疔頭破裂
丹溪治囊癰方法	野紫蘇	治囊癰方
丹溪治便毒方法	又治便毒方	
又便毒成膿方	石香程氏便毒方法	
蘇方木散	治便毒	玉燭散
治便毒		
牡蛎大黃湯	治便毒	丹溪治瘰癧方法

又治瘰癧方法	又丹溪治瘰癧法	
治血少馬刀瘡方	程石香論治瘰癧方法	
蟾酥膏	治瘰癧	綠雲膏
龍珠膏	治瘰癧	救苦化堅湯
柴胡連翹湯	消腫湯	柴胡通經湯
散腫潰堅湯	升陽調經湯	
連翹散堅湯	龍泉散	三聖丸
立驗大聖散	玉屑妙靈散	
六丁神散	以上十一方	濟生破結散
南星散	治癰	又治癰方法
龍珠膏	見前條	流氣飲
丹溪治癰氣方法	丹溪治結核方法	
又治臂核方	耳後頂門有核方法	
程石香論疔腫方法	返魂丹	
拔疔法	奪命丹	雄黃丸
化毒丸	獨蟾丸	雄射湯
二活散	取疔散	解毒丸
賀藍先生解毒丸	萬病解毒丸	

千金漏蘆湯	取疔腫方	破毒散
灸疔腫法	祖傳經驗秘方	
活菟丹 <small>治惡瘡</small>	治諸惡瘡方	
又治諸惡瘡方	又治惡瘡方	
天泡瘡方 <small>凡二條</small>	脚上沙瘡方	
裏外腫瘡方 <small>凡四條</small>	桃花散 <small>生肌長肉</small>	
火燒湯泡瘡方	又治火燒湯泡瘡方	
下疳瘡方 <small>凡二條</small>	頭瘡方	金絲瘡方
手癰瘡方	沙瘡方	瘡痛不可忍方
疥瘡方	白癬風癬方	
風瘡乾瘡方	癬瘡方	身虛痒方
又通身虛痒方	秘傳一擦光方	
又治疥瘡及癩頭方	五香連翹湯	
內托復更散	白芷升麻湯	
托裏散	又托裏散	烏金散
黃芪六一湯	治一切瘡癰方	
內托護心散	小五香湯	復元通氣散
金銀白芷散	玉鐵籬散	大鐵籬散

三消散	雲母膏	太乙膏
神異膏	祖傳萬應青雲膏	
又經驗治癰腫方	稀魚散	
又治諸般癰腫神効方		
○癩風門 <small>六十一</small>	論	脉法
換肌散	醉仙散	通天再造散
愈風丹	一家治癩疾法	
又一家治癩疾法	又治手指牽曲法	
加減通聖散	神仙紫花丸	
治跌撲傷損方	治骨損方	元戎接骨丹
論損傷宜補氣血	治金瘡方	又治金瘡方
治損傷腹痛方	當歸導滯湯	
雞鳴散	沒藥乳香散	
杖丹膏藥方	河間沒藥散	
○破傷風門 <small>六十</small>	論	脉法
活活防風湯	白木防風湯	
小芎黃湯	大芎黃湯	發表雄黃散
大蜈蚣散	大羌活湯	

防風湯治破傷風

小蜈蚣散 左龍丸

小菟活湯

養血當歸地黃湯

雄黃散治表藥

地榆防風散

白朮湯

江鰾丸

祖傳經驗秘方

附翻花瘡

醫學正傳卷之六

八

醫學正傳卷之六目錄終

醫學正傳卷之六

論

經孫虞守愚惟明校正

便濁遺精五十六

論

內經曰諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱夫便濁之証因脾胃之濕熱下流滲入膀胱故使便溲或白或赤而渾濁不清也原病式曰如夏月天氣熱甚則水液渾濁林木流津是也血虛而熱甚者則為赤濁此心與小腸主病屬火故也氣虛而熱微者則為白濁肺與大腸主病屬金故也丹溪曰大率多是濕痰流注宜燥中官之濕又曰治宜燥濕降火兼升舉之法此皆至要之語也外有遺精滑泄之候與濁相類不可一例而推夫遺精者多夢與鬼交而泄名曰夢遺或隨洩溺而出謂之精滑亦有思想無窮所願不遂而得之者治宜安心神以降火又有因好色太過房勞致虛而得之者治法宜滋水藏以復真陰是皆千古不易之定論也學

者詳之

脉法

兩尺脉洪數必便濁失精

女人尺脉瀦而弱者或洪數而促者皆為便濁白

帶

心脉短小因心虛所致必遺精便濁

方法
用淡方法
凡十九條

丹溪曰便濁屬濕熱有痰有虛赤屬血由小腸屬

火故也

醫學正傳卷之六

白屬氣由大腸屬金故也

大率皆是濕痰流注宜燥中宮之濕赤者乃是濕

傷血

○胃中濁氣下流滲入膀胱

○肥白人多痰

○治宜燥濕降火兼升提之大法二陳湯加二朮升

柴赤者加白芍藥煎服

○一人便濁嘗有半年或時變遺形瘦作心虛主

以珍珠粉丸和定志丸服效見怔忡門

○夢遺主熱精滑主濕熱熱則流通故也

○內傷氣血虛不能固守當補以八物湯加減吞樗

木根丸

○大法用青代海石黃柏

○精滑用知母黃柏降火牡蠣蛤粉燥濕白濁同法

治

○一方用良姜三錢芍藥黃柏炒焦各二錢樗根白

皮一兩五錢為末糊丸每服三十丸

醫學正傳卷之六

○思想而得病在心治當安心神以帶補一法用溫

膽湯去竹茹加人參遠志蓮肉酸棗仁茯神煎

服

○一方治便毒丸藥

樗白皮

黃柏炒

青代

乾姜炒

滑石

蛤粉炒

神麴糊為丸服之各等分

戴氏曰黃柏治溫熱青代鮮熱蛤粉酸寒入
滑石利簾炒干姜味苦飲肺氣下降使陰

血生且
能監制

○二陳湯治濁加提升之藥使大便潤而小便下

○玢珠粉凡治精滑白濁等証

黃柏

真蛤粉各一

玢珠三兩一方無此味而

有青

右為末水和丸如梧桐子大每服一百丸空心

溫酒下或加樗根白皮滑石青代等藥

○半苓丸治白濁

神麴

半夏煨

猪苓各

麴糊丸服

醫學正傳

卷之六

十一

○虛勞者用補陰藥胃弱者兼用人參及升麻柴胡

升胃中之清氣

○張子元氣血兩虛有痰濁陰火痛風

人參一兩

白朮半兩

熟地黃

黃柏炒黑色

山藥

海石

瑣陽各半兩

乾姜半兩燒存性

南星一兩煨裂

龜板酥炙

右為細末酒麴糊為丸如梧桐子大每服一百

丸姜鹽湯下

○燥濕痰治白濁方如肝脉弦者須以青代瀉肝

藥不可純涼藥盧氏曰病因濕熱藥的戾然亦不可專用寒涼藥故用炒柏之

額又以干姜之

○妙香散治心虛遺精白濁

射香一錢另研

人參半錢

木香二錢半煨

茯苓

茯神

黃芪

遠志去心炒各一兩

桔梗

甘草各五錢

辰砂二錢另研

山藥二兩姜汁炙

右為細末每服二錢溫酒調服不拘時

醫學正傳

卷之六

十二

○秘真丸治思想無窮所願不遂意淫于外入房太

甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫及白物隨洩

而下或夢與陰人通泄耳

白龍骨一兩另研

訶子皮大者五枚

縮砂仁半兩去殼

硃砂一兩另研以分為衣

右為細末麴糊為丸如菉豆大每服一九空心

溫酒下冷水亦不可多服大 或用葱白茶湯

下

○草薢分清飲治真元不足下焦虛寒小便白濁

數無度澱面如油光彩不定凝脚澄下凝結如膏糊之狀

石菖蒲

烏藥

益智仁

川草薢

曰扶苓各一錢

甘草半錢

右細切作一服水一盞半入鹽一錢煎至一盞空心服

○治濁固本丸

蓮花鬚

黃連炒各二兩

白茯苓

砂仁

益智

半夏湯泡七次去皮

黃柏炒各一兩

甘草各三兩

猪苓二兩五錢

為末蒸餅為丸空心溫酒下五十九

○九龍丹治精滑

枸杞子

金櫻子

山果子又名山查

蓮肉

佛座鬚蓮花心也

熟地黃

芡實

白茯苓

川歸各等分

右為末酒麪糊為丸如梧桐子大每服五十九或酒或鹽湯送下如精滑便濁者服三三三三三清如水飲食倍常行步輕健婦人厭產者二三

服便生孕如仍欲產

○水陸二仙丹治遺精白濁夢泄脫精等証

金櫻子

芡實二斤

右以芡實去殼杵為細末取金櫻子黃熟者用藍盛於水中杵去刺又於石臼中杵碎去核淨再杵細絞取自然汁煎熬成飴糖和芡實末為丸如梧桐子大每服五七十九空心姜鹽湯送下

○定志珍珠粉丸治心虛夢泄

人參

白茯苓各三兩

遠志去心

石菖蒲

各二兩

海蛤粉

黃柏炒焦色各三兩

樗根皮

二兩

青代二兩

右為細末麪糊為丸青代為衣如梧桐子大每服五十九空心姜鹽湯下

○丹溪活套云赤白濁乃胃中痰積下流滲入膀胱宜用二陳湯加升麻柴胡防風之類以提之肥

白人屬濕熱加蒼朮白朮炒黃柏黃荊子之類或有挾寒者本方加炒乾姜肉桂甚者加附子

○有心虛不能固守及平素虛寒之人本方加黃蘗石菖蒲益智炒乾姜牡蠣龍骨之類○氣虛者本方加黃芪白朮人參或加附子之類○赤者多有血虛瘦弱之人得之宜四物湯加酒知母酒炒黃柏煎湯送下珍珠粉丸○赤白濁小腹疼痛不可忍者宜作寒治東垣酒煮當歸丸最妙方見婦人門

○祖傳經驗秘真丹治好色腎虛遺精夢泄白淫白濁等証

醫學正傳

卷之六

十一

兔絲子酒浸炒各一兩 韭子炒 柏子仁各一兩

龍骨煨 牡蠣煨醋汁 山茱萸去核取皮

赤石脂各半兩 補骨脂炒 遠志去心

巴戟去心 覆盆子 枸杞子

黃柏鹽酒炒 山藥各七錢半 芡實去壳

杜仲姜汁炒斷 金櫻子半青黃者去刺核

乾姜炒黑色 鹿角膠一兩半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸

空心姜鹽湯下

○蓮塘朱頭二里病遺精潮熱不起床三月矣召予治脉之左右寸關皆浮虛無力兩尺洪大而軟與補中益氣湯加熟地黃知母黃柏地骨皮煎吞下珍珠粉丸外做小筏龍一箇以龍陰莖勿使搭肉服藥三十餘貼一月平安

論

淋閉門附開格五十七

醫學正傳

卷之六

十六

內經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱夫膀胱者主足太陽寒水之化其體有下口而無上口者也長生在中是故西方肺金以為之母而資其化也肺金清肅則水道通調而滲營於下耳然肺金又藉脾土健旺以資化源而清氣得以上升而歸於肺以運行也故經又曰清陽出上竅濁陰出下竅故清陽不升則濁陰不降而成淋閉之患矣先哲以滴水之器譬之上竅閉則下竅不出此理甚明故東垣使灸百會穴丹溪使吐以提其氣之橫格是皆開上竅之法也原其為病之由皆膏粱之味濕熱之

物或燒酒炙肉之類鬱遏成疾以致脾土受害乏力不能運化精微清濁相混故使肺金無助而水道不清漸成淋閉之候或謂用心太過房勞無節以致心腎不交水火無制清陽不升濁陰不降而成天地不交之否皆先哲之法言也古方有五淋之別氣砂血膏勞是也若夫氣淋為病小便澀滯常有餘瀝不盡砂淋為病陰莖中有砂石而痛溺不得卒出砂出痛止膏淋為病溺濁如膏勞淋為病遇房勞即發痛引氣衝血淋為病遇熱則發甚則溺血候其鼻準色黃者知其為小便難也東垣分在氣在血而治之以渴與不渴而辨之耳如渴而小便不利者熱在上焦氣分肺金主之宜用淡滲之藥茯苓澤瀉琥珀燈心通草車前子葵麥篇蓄之類以清肺金之氣瀉其火以滋水之上源也不渴而小便不利者熱在下焦血分腎與膀胱主之宜用氣味俱陰之藥知母黃柏之類滋腎丸是也除其熱泄其閉塞以滋膀胱腎水之下元也治淋之法無越於此學者不可不知

脉法

脉經曰少陰脉數婦人則陰中生瘡男子則為氣淋脉細而數。脉盛大而實者生虛細而澀者死方法 丹溪方法九條

丹溪曰淋雖有五皆屬於熱宜鮮熱利小水山梔子之類不可發汗汗之必便血

老人氣虛淋閉參朮中帶木通梔子之屬

有腎虛極而淋者當補腎精而利小便不可獨用利水藥

利水藥

有死血作淋者用牛膝膏一云牛膝膏能損胃不宜斟酌用之

一方治淋用益元散加梔子仁水通或用梔子一合炒為末白湯調下夏月以苗香煎湯調益元散服效

散服效

痰熱隔滯中焦淋澀不通二陳湯煎大碗頓服探吐之以提其氣

淋澀有血因火燥下焦無血氣不得降而滲泄之令不行也宜補陰降火以四物湯加知母黃柏或用四物湯煎下滋腎丸

○陰莖痛乃厥陰氣滯熱用甘草稍蓋欲緩其氣耳

○小便因熱澀成淋不通用赤茯苓黃芩澤瀉車前子麥門冬肉桂滑石木通甘草稍氣虛者加黃芪米香淋痛加黃柏生地黃夏月煎調益元散
○參苓琥珀湯治小便淋澀莖中痛相引脇下痛不可忍者

人參

茯苓

各半錢

川練子去核

生甘草稍

玄胡索

各七

琥珀

柴胡

川歸尾

澤瀉各三分

右細切作一服水一盞半加燈心十數莖煎至一盞服

○琥珀散治五種淋澀疼痛小便有膿血出証

琥珀

沒藥

海金沙

蒲黃各一兩

右為細末每服三錢空心煎薑草湯調下

○傷寒後脫陽小便不通用生薑自然汁調香末敷貼小腹上又復益智齒香丸調益元散送下

○老人氣虛而小便不通四物湯加黃芪人參吞滋腎丸下焦血氣乾者死

○小便黃用黃柏如澀數加澤瀉若濕熱流注下焦而小便黃赤澀數用梔子澤瀉切當溫者宜用滑石利之

○下焦無血小便澀數而黃者用四物湯加黃柏知母牛膝甘草稍

○通關丸

即滋腎丸

治不渴而小便閉熱在下焦血

分

黃柏

酒洗

焙乾

知母

酒洗

焙乾

肉桂半錢

右為細末熟九如梧桐子大每服一百丸空心白湯下服後須頓兩足令藥易下行也如小便

已利莖中如刀刺痛當有惡物下為驗

○清肺飲子治渴而小便閉澀不利邪熱在上焦氣

分

燈心一分

通草一分

澤瀉

瞿麥

琥珀各半錢

篇蓄

木通

各七錢

車前子

炒另

茯苓去皮

猪苓 去皮各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞空心稍熱服

○導氣除燥湯治小便閉塞不通乃血澁致氣不運而竅澁也

茯苓 去皮 滑石 各一錢 知母 去毛酒浸炒

澤瀉 各一錢半 黃柏 酒炒

右細切作一服水二盞煎至一盞空心稍熱服

○腎疸湯治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤

羌活 防風 藁本

獨活 柴胡 各五分 升麻 一錢已上

黃芩 白茯苓 二分 澤瀉 三分

猪苓 四分 白朮 五分 蒼朮 一錢已上

黃柏 二分 人參 三分

葛根 五分 神麴 六分 甘草 五分

右細切作一服水二盞煎至一盞食前稍熱服

○小薊湯治下焦熱結血淋

生地黃 小薊根 通草

滑石 梔子仁 蒲黃 炒

淡竹葉 當歸稍 生藕節

甘草 稍各五分

右細切作一服水煎空心服

○八正散治大小便俱閉

大黃 瞿麥 木通

滑石 篇蓄 車前子

梔子仁 甘草 各等分

右細切每服五錢重入燈心七莖水煎服

○牛膝膏用川牛膝一合細切以新汲水五大盞煎

耗其四入射香少許空心服或單以酒煮亦可

○茯苓湯治胃疸陽明積熱食已輒飢面色黃瘦

滿脇脹小便閉澁

赤茯苓 陳皮 去白 澤瀉

桑白皮 各三分 赤芍藥 白朮

人參 官桂 各二分 石膏 八分

病甚者加大黃朴硝各一錢

右細切作一服加生姜五片水一盞半煎服

盡溫服

倒換散治無問久新癰閉大小便不通小腹急痛肛

門腫痛

大黃

小便不通減半

荊芥穗

大便不通減半各等分

右各別研為細末每服二錢溫水調下臨時加

戒服

葵子散治小便不通

黃蜀葵子

細研

赤茯苓

各二錢

右作一服水一盞煎二三沸食前服

醫學正傳

卷之六

二十三

云

濟生葵子散治膀胱實熱小便不通方見疝氣門

琥珀散治五淋

滑石 二錢

木通

當歸

木香

蔚金

篇蓄

各一錢

琥珀

分研

右作一服為末用蘆薈葉同煎水一盞半煎數

沸食前溫服

鐵服丸治大小便不通神效

大皂角

燒存性

右一味不拘多少煉蜜為丸如梧桐子大每服

七十九白湯下

廣濟雞蘇飲子治小便不通

雞蘇 一握

生地黃

通草

各四兩

滑石

杏仁

去皮尖各二兩

冬葵子

一兩半

石葦

炙去毛一兩

右七味細切以水六升煎至二升半去粗分三

服空心進一服如人行四五里又進一服必通

○又方治小便不通

醫學正傳

卷之六

二十四

云

冬葵子

滑石

各三兩

通草

赤茯苓

各一兩

茅根

二兩半

芒硝

一兩半

右細切以水六升煎取二升去粗納芒硝分作

三服連進即通

○集驗方治小便淋瀝不通

滑石

半斤

石葦

三兩

通草

四兩

榆莢

冬葵子

各一升

一方加黃芩

三兩

右細切以水一斗煎取三升分作三服頓飲

○石葦散治小便不利莖中作痛

石葦去毛

瞿麥兩

滑石五兩

車前子三兩

冬葵子兩

右為細末每服方寸匕日三服

○祖傳經驗秘方治小便淋閉莖中作痛神效

石葦去毛

滑石

瞿麥

篇蓄

冬葵子

木通

王不留行

地膚草各等分

右為細末每服三錢白湯調下

○又經驗治小便溺血立效

醫學正傳

卷之六

二十五

附

金陵草

一名旱蓮草一名墨斗草

車前草

俗名蝦蟆衣

右二物各等分杵自然汁每服半茶盞空腹服

○又方治前証用壯年無病人頭髮不拘多少燒灰

存性以側柏葉搗汁入糯米糊為丸如梧桐子

大每服一百丸白湯下或四物湯下尤妙

○又方治沙淋乃莖中有砂作痛

石首魚腦骨

五對火煨出火毒即白熬腦中骨也

滑石半兩

右共研為細末分作二服粟米通湯調下未愈

再服數劑必待砂出盡乃安

○又方治孕婦轉胞小便不通及男子小便不通皆效

冬葵子兩半

山梔子

半兩炒研

木通三錢

滑石半兩

右作一服水一盞半煎八分溫服外以冬葵子

滑石梔子為末田螺肉搗膏或生葱汁調膏貼

臍中立通

○又方治血淋

一側柏葉

藕節

車前草

各等分

醫學正傳

卷之六

二十六

中

右三味同搗取真汁調益元散神效

附關格証

難經曰關則不得小便格則吐逆○脉兩寸俱盛

曰關格其証嘔逆而小便不通者是也

按素問謂人迎大四倍於氣口名曰格氣口大

四倍於人迎名曰關乃二証也蓋有格而不關

者亦有關而不格者又或有人迎氣口俱盛而

吐逆不便者故丹溪總而言之曰關格者是也

○丹溪曰寒在上而熱在下故多死法當吐以提其

氣之橫格不必在出痰也用二陳湯探而吐之

○有氣虛不運者補氣藥中升降用補中益氣湯加
枳櫛使清氣升而濁氣降也

○治關格証吐逆而小便不利急宜先灸氣海天樞
等穴各三七壯其吐必止然後以益元散等藥
以利小便

○祖傳經驗秘方治關格吐逆小便不通用霍香平
胃散合五苓散加姜棗煎服立效

予長兄脩德翁年七十秋間患小便不通二

十餘日百方不效後得一方取地膚草搗

醫學正傳卷之六 二十七

自然汁服之遂通雖至微之物而有迴生

起死之功故錄於此以為濟利之一助云

地膚草一云白地膚是也

秘結五十八

論

內經曰北方黑色入通於腎開竅於二陰藏精於

腎夫腎主五液故腎實則津液足而大便滋潤腎

虛則津液竭而大便結燥原其所由皆房勞過度

飲食失節或恣飲酒漿過食辛熱飲食之火起於

脾胃淫慾之火起於命門以致火盛水虧津液不

生故傳道失常漸成結燥之証是故有風燥有熱

燥有陽結有陰結有氣滯結又有年高血少津液

枯涸或因有所脫血津液暴竭種種不同困難一

例而推焉經云腎惡燥急食辛以潤之以苦泄之

陽結者散之陰結者溫之大法治燥者潤之以大

黃當歸桃仁麻子仁郁李仁之類風燥者加以防

風羌活秦艽皂莢之類為丸以煉蜜取其潤燥以

助傳道之勢故結散而疎通矣仍多服補血生津

醫學正傳卷之六 二十八

之劑助其真陰固其根本庶無再結之患切勿以

巴豆牽牛等峻劑攻下雖暫得通快必致再結愈

甚反釀成病根膠固卒難調治或有血虛脉大如

蔥管發熱而大便結燥者慎不可發汗汗之則重

亡津液閉結而死此醫殺之耳活人書有脾約証

謂胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱故小

便數而大便難制脾約丸以下脾之結燥使腸潤

結化津流入胃而愈丹溪曰然既曰脾約必陰血

枯槁內火燔灼熱傷元氣故肺受火邪而津竭必

竊母氣以自救夫金耗則土受水傷脾失轉輸
失傳化宜其大便閉而難小便數而無藏蓄也
宜滋養陰血使陽火不熾金行清化脾土健旺
液入胃大小腸潤而通矣今以此丸用之陰熱
而氣實與西北人稟賦壯實者無有不妥若用之
於東南南方人與熱雖盛而氣血不實者雖得暫通
將見脾愈燥而腸愈在西北以開結為上在東南
以潤燥為要學者其可不知此乎

脈法

醫學正傳

卷之六

二十九

三月五日

脈多沉伏而結 陽結脈沉實而數 陰結脈伏
而遲或結老人虛人便結脈雀啄者不治

方法

丹溪方法九二條

丹溪曰有虛有風有濕有火有津液不足者有寒
者有氣結者切不可例用芒硝大黃及巴豆牽
牛等利藥

○久病腹中有實熱大便不通宜用潤腸丸微利之
不宜用峻利之劑

○脾約丸

麻仁一兩半用生絹袋盛百沸湯連袋泡浸
粒皆完金匱并與水而煮一宿次日曬乾之
芍藥各二兩 大黃四兩酒蒸 杏仁去皮尖炒別
右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九溫
水下

○通幽湯治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞
不便燥閉氣不得下治在幽門以辛潤之

炙甘草

紅花各一分

生地黃

熟地黃各半錢

升麻

桃仁泥

醫學正傳

卷之六

三十

花

當歸身各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗調槐
柳細末半錢食前稍熱服

○潤燥湯

升麻二分

生地黃二分

熟地黃

當歸稍

大黃酒濕煨

生甘草

桃仁泥

麻仁各一錢

紅花五分

右除桃仁麻仁另研細外餘細切作一服水一
盞半入桃仁麻仁煎至一盞去粗空心稍熱服

○潤腸丸治脾胃中伏火大便閉澀或乾燥閉塞不

通全不思食及風結血閉皆能治之

桃仁湯泡去

麻仁去殼各

當歸稍

大黃酒浸燥

羌活各半兩

右除桃仁麻仁另研如泥外其餘杵為極細末

煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十丸空心白

湯下○如風濕而大便不行加煨皂角仁大黃

秦艽以利之○如脉澀覺身有氣澀而大便結

者加郁李仁大黃以除氣澀燥

醫學正傳卷之六

三十一

○麻黃白木湯治大便不通五日一次小便黃赤渾

身腫面上及腹尤甚其色黃麻木身重如山沉

困無力四肢痿軟不能舉動喘促不安

青皮去穢

酒黃連各二

黃芪

人參

桂枝

白木

厚朴姜製

柴胡

蒼朮

猪苓各四

酒黃柏

陳皮去白

甘草半炙

升麻各三

吳茱萸去核

白茯苓

澤瀉各五

白豆蔻

炒神曲各六

麻黃一錢不

杏仁四

右細切分作二服每服水二盞先煎麻黃去

掠去沫入諸藥同煎至一盞去粗稍熱服

○升陽瀉熱湯治膈噎不通逆氣裏急大便不行

青皮

槐子各二分

生地黃

熟地黃

黃柏各三分

當歸身

甘草稍各四

蒼朮五分

升麻七分

黃芪一錢

桃仁十箇去皮另研

右細切作一服入桃仁泥水二盞煎至一盞食

醫學正傳卷之六

三十二

前熱服

○活血潤燥丸治大便風秘血秘常常燥結

當歸稍五錢

防風三錢

大黃酒煨

羌活各一兩

皂角仁燒存性一兩五錢

桃仁二兩去

麻仁二兩半去

右除桃仁麻仁另研外共為細末煉蜜為丸如

梧桐子大每服五十九白湯下三兩服後須以

麻子仁煮粥每日早晚食之大便溲日久再不

結燥也此丸藥以磁罐盛之紙包封母令見風

○潤腸湯治大便結燥不通

生地黃

生甘草 各三分 大黃 煨

熟地黃

當歸稍 各半錢 升麻

桃仁

麻子仁 各一錢 紅花 三分

右細切作一服水二盞剪至二盞去粗空心服

○潤體丸能潤血燥治大便不通

麻仁

當歸稍 生地黃

桃仁

枳殼 各等分

右為細末煉蜜為丸服

醫學正傳卷之六

三十三

○備急大黃丸治胃中停滯寒涼之物大便不通腹

痛

方見內傷門

○河間枳殼丸治三焦約大小便不通穀氣不得下

行

枳殼 二兩

陳皮 一兩

枳實 半兩

木香 二錢半

黑丑

枳殼 各半錢 升麻 各半錢 升麻 各半錢 升麻 各半錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸

姜湯下

○枳實導滯丸治傷熱物大便不行氣滯胃腹作痛

方見內傷門

○本邑趙德秀才之母年五十餘身材瘦小得大

便燥結不通飲食少進小腹作痛召予診治

六脉皆沉伏而結澁予作血虛治用四物湯

加桃仁麻仁煨大黃等藥數服不通反加滿

悶與東垣枳實導滯丸及備急大黃丸等藥

下咽片時即吐出蓋胃氣虛而不能久留性

速之藥耳遂以備急大黃丸外以黃蠟包之

又以細針穿一竅令服三九蓋以蠟置者制

其不犯胃氣故得出幽門達大小腸取效也

明日下燥屎一升許繼以四物湯加減作湯

使吞潤腸丸如此調理月餘得大便如常飲

食進而平安

子族姪百一通判之子因出痘大便閉結不通

兒醫云便實為佳兆自病至痘瘡愈後不入

廁者凡二十五日肛門連大腸不勝其痛叫

號聲達四鄰外醫兩予二三人議藥調治用

皂角末及蜜煎導法服以大小承氣湯及枳

實導滯九備急凡皆不效計無所出予曰此
痘瘡餘毒鬱熱結滯於大小腸之間而然以
香油一大盞令飲自朝至暮亦不效予畫一
計令侍婢口含香油以小竹筒一箇套入肛
門以油吹入肛內過半時許病者自云其油
入腸內如蚯蚓漸漸上行再過片時許下黑
糞一二升止困睡而安

黃疸

五十九

論

醫學正傳

卷之六

三十五

內經曰中央黃色入通於脾又曰諸濕腫滿皆屬
脾土夫黃疸為病肌肉必虛腫而色黃蓋濕熱鬱
積於脾胃之中久而不散故其土色形于面與肌
膚也蓋脾主肌肉肺主皮毛母能令子虛母病子
亦病矣是故有諸中者必形諸外耳其証有五曰
黃汗曰黃疸曰酒疸曰穀疸曰女勞疸雖有五者
之分終無寒熱之異丹溪曰不必分五種同是濕
熱如蠶曲相似正經所謂知其要者一言而終是
也外有傷寒熱病陽明內實當下而不得下當汗

而不得汗當分利而不得分利故使濕熱怫鬱內
甚皆能令人發黃病也先哲制茵陳五苓散茵陳
湯茯苓滲濕湯之類無不應手獲效故曰治濕不
利小便非其治也又曰濕在上宜發汗濕在下宜
利小便或二法同用使上下分消其濕則病無有
不安者也學者詳之

脈法

脈經曰凡黃候寸口脈近掌無脈口鼻黑色並不

可治

醫學正傳

卷之六

三十六

脈沉渴飲飲水小便不利者必發黃也

酒疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮

者先吐之沉弦者先下之

酒疸下之久久為黑疸目青面黑心頭如噉蒜韭

之狀大便正黑皮膚四肢不仁其脈浮弱顏黑

微黃故知難治

穀疸寸口脈微而弱微則惡寒弱則發熱當發不

發骨節疼痛當煩不煩而黃汗出濕傷脈緩而

遲胃氣友強飽則煩滿滿則發熱客熱消穀食

已則飢穀強肌瘦名曰穀疸

陽明病脈遲者食難用飽飽則發寒熱頭眩者必

小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故

跌陽脈緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食

則滿也

尺脈浮為傷腎跌陽脈緊為傷脾風寒相搏食已

則眩穀氣不消胃中若濁濁氣下流小便不通

陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸

方法 丹溪方法九五條

醫學正傳六

卷之六

三十七

丹溪曰不必分五同是濕熱如蠶麴相似輕者小

溫中丸重者大溫中丸熱多加黃連濕多者茵

陳五苓散加食積藥

戴氏曰食積者重其虛實下之其餘但利
小便清利則黃自退或曰黃疸宜用
同舍法又曰黃疸倦怠脾胃不和食少胃
苓湯小便赤加滑石

○一方治黃疸

黃芩

茵陳

蒼朮

青皮

黃連

猪苓

草龍胆

梔子

澤瀉

各五分

穀疸加三稜義木縮砂陳皮神麴

右細切作一服水煎服之

又方治氣實傷濕渾身發黃宜吐法

撫芎

梔子

枯梗各二錢

右細切作一服加姜煎入薑汁服搽吐之

○小溫中丸治黃疸與食積又可制肝燥脾脾虛者

須以白木作湯傳下

針砂十兩醋炒七次冷通紅另研

苦參夏加冬減山查各二兩

柴萸一兩夏減

醫學正傳六

卷之六

三十八

蒼朮半斤

白木五兩

川芎夏減

神麴各半斤

香附米一斤童便浸一宿

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服七八十

丸食前鹽湯下一方無白木山查苦參柴萸

有梔子

○大溫中丸

針砂十兩如

陳皮

蒼朮

青皮

厚朴姜汁

三稜醋煮

義木同上

黃連

苦參

白朮 各五兩

生甘草 二兩

香附 一升黃連苦參白朮一

右為細末醋糊為丸

方又無甘草名溫中丸

○調胃承氣湯

方見傷寒門

叔和曰腹滿舌痿煩燥不得睡屬黃家又曰病

黃疸發熱煩喘胞滿口燥者以發病時火劫其

汗兩熱相搏然黃家所得從濕故一身盡發熱

面黃如壯熱者熱在裏也當下之安用調胃承

氣湯

○又曰黃疸之病當以十八日為期治之十日以上

醫學正傳

卷之六

三十九

花

為差又劇者為難治○又曰病疸而渴者其病

難治疸而不渴者其病易治發於陰部其人必

嘔發於陽部其人振寒而發熱也師曰諸黃家

病但宜利小便假令脉浮當以汗解之宜桂枝

加芪湯又名黃芪建中湯方見傷寒門

○又曰男子黃小便利自當與小建中湯○又曰黃

疸腹滿小便不利而利自汗出此為表和裏實

當下之用大黃黃柏梔子芒硝湯

黃黃柏梔子芒硝湯

黃柏

芒硝

大黃 各四兩

梔子 三枚

右細切作一服大一盞半煎至一盞溫服

○又曰黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可

除熱熱除必臧臧者宜服小半夏湯方見傷寒

○又曰夫病酒發黃疸必小便不利其候心中熱足

下熱是其証也又心中懊憹而熱不能食時欲

吐名曰酒疸又曰酒疸心中熱欲嘔者吐之即

愈又曰酒疸黃色心中實熱而煩

醫學正傳

卷之六

四

○又曰額上黑微汗出手足心熱薄暮則發膀胱急

小便自利名曰女勞疸腹如水狀不治

○又曰黃家日晡所當發熱而反惡寒此為女勞得

之膀胱急小腹滿一身盡黃額上黑足下熱因

作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溲此女勞

之病非水也腹滿者難治硝石礬石散主之

○硝石礬石散

右以二石各等分燒燉為末每服二錢以大麥

粥湯和服日三服取汗愈若小腸滿急小便下

利用滑石石膏各二錢入粳一撮同煎服之

○治酒疸用小柴胡湯加茵陳豉大黃黃連蒿梔煎服效

○茯苓湯治胃疸消穀善飢面色痿黃心中煩熱腎

脇脹滿小便赤澀方見淋秘門

○一方治穀疸以柴胡枳實厚朴梔子大黃等分水煎服效

○胃苓湯治脾胃不和黃腫如小便赤澀加滑石五

散合平胃散是也

醫學正傳六 卷之六

四十一

虎

○腎疸湯治腎疸目黃或渾身黃小便赤澀

升麻 羌活 防風

藁本 獨活 柴胡各半錢

蒼朮一錢 猪苓四分 葛根五分

澤瀉三分 黃芩二分 甘草三分

神麴炒三分 黃柏二分 白朮五分

人參三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

○茵陳五苓散治傷寒或伏暑發黃小便不利煩渴

等証

本方倍加茵陳入姜棗煎服之

○茵陳茯苓湯發黃脉沉細數四肢冷小便澀煩躁

而渴

茯苓 桂枝 猪苓各一錢

滑石一錢半 茵陳二錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞服如脉未

出加當歸一錢半

○梔子大黃湯治酒疸心中懊懣或熱而痛

醫學正傳六 卷之六

四十二

水

梔子十四 大黃一兩 枳實五枚

豉一升

右作一服用水五升煎至二升分三服

○半溫半熱湯治酒疸身黃無熱靖言了了腹滿欲

嘔心煩足熱或有癥瘕心中懊懣其脉沉弦緊

細

半夏 茯苓 白朮各七分

前胡 枳殼麸炒黃色 甘草炙

大戟各五分 黃芩 茵陳

當歸 各三分

右細切作一服入生姜三片水二盞煎至一盞溫服

茵陳蒿湯治身熱鼻乾汗出陽氣上奔小便赤澀不利濕熱發黃

茵陳蒿 一兩 六梔子 三枚 大黃 三錢半

右細切作一服水三盞半溫服

茵陳大黃湯治傷寒大熱發黃面目俱黃小便赤澀

茵陳蒿 梔子 柴胡

黃柏 黃芩 升麻

大黃 各七分 草龍膽 三分半

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

梔子柏皮湯治身熱不去大便利而煩熱身黃

梔子 黃柏 黃連 各二錢半

右細切一服水一盞半煎至一盞溫服

茯苓瀲濕湯治黃疸寒熱嘔吐而渴飲飲冷水身

目俱黃小便不利不思飲食方見濕証門

○小茵陳湯治發黃脉沉細而遲遍身冷

附子 一枚作八片炮 甘草 炙一兩 茵陳 二兩

右細切作三服每服用水二盞煎至一盞溫服

茵陳四逆湯治發黃脉沉細而遲肢體逆冷腰以上自汗

甘草 炙一兩 乾姜 炮一兩半 附子 一枚作八片炮

茵陳 二錢

右細切分作四服水煎服

○葶藶苦參散治濕熱內甚小便赤澀大便時秘飲

食少進諸藥不效因為久黃

苦參 黃連 瓜蒂

黃柏 大黃 各一兩 葶藶子 二兩

右為細末每服壹錢匕清米飲調下以吐利為

度隨時看虛實消息加減

○當歸白朮湯治酒疸發黃心下有痞癰堅滿身體

沉重妨害飲食小便赤黃此因內虛飲食生冷

脾胃痰結所致

白朮 茯苓 各一錢 當歸

黃芩

茵陳 各三分半 前胡

枳實

甘草 各一分

杏仁 各六分

半夏 八分

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一

盞溫服

○抵當湯治傷寒熱鬱於血內結身黃脉沉細狂言

譫語小便自利大便黑方見傷寒門

○針砂丸治穀疸酒疸溫熱發黃等証

針砂 半斤 醋炒

蒼朮 四兩 米泔浸 香附 四兩 童便浸

醫學正傳 卷之六

四十五

神麴 炒微黃

茵陳 姜汁炒

麥蘖 各二兩 麴炒

芍藥

當歸 酒洗去頭 生地黃

川芎

青皮 去穢炒各 陳皮 去白

義水 醋煮

三稜 醋煮各

梔子 去殼炒

姜黃

升麻

乾漆 各半兩 炒煙盡

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服六七十

九姜湯送下

○綠礬丸治黃腫病最捷

五倍子 半斤 炒黑

綠礬 四兩 姜汁洗

針砂 四兩 醋炒

神麴 半斤 炒微黃色

右為細末生薑汁煮紅棗肉為丸如梧桐子大

每服六七十丸溫酒下不能飲酒米湯亦可終

身忌食蒼麥麴犯之再發難治

○素礬丸治食勞身目俱黃

綠礬 半斤 火煨通紅

右研細紅棗肉為丸如梧桐子大每服五十丸

或酒或姜湯下

○祖傳經驗退金丸治黃腫絕妙

醫學正傳 卷之六

四十六

蒼朮 米泔洗

白朮 各二兩 半

甘草 炙半

厚朴 姜汁伴

陳皮 去白一兩 半

針砂 紅炒

香附 童便浸

神麴 炒黃色

麥蘖 各二兩 炒微黃

有塊加三稜 醋煮

義水 醋煮各

右為細末麴糊為丸服忌魚腥溫麴生冷水菓

等物

○男子年三十餘得穀疸症求予治以胃熱湯去

桂加茵陳數十貼黃退自以為安不服藥十數

日後至晚目盲不見物予曰此名雀目蓋溫痰

瘡瘍六十

論

內經曰諸痛痺瘡瘍屬心火又曰膏粱之變足生大疔榮氣不從逆於肉理乃生癰腫東垣謂榮

醫學正傳
卷之六

四十七

三十四年

氣即胃氣也蓋胃氣調和則榮衛之氣皆順流而無逆於肉理耳若夫飲食失節肥甘過傷以致濕熱蘊積于腸胃之間燒爍府藏煎熬真陰此經之所謂陰之五宮傷在五味味傷發熱久而增氣故濕熱之氣聚於下焦陰火熾盛蓄於八脉八脉沸騰逆於經緣氣凝血滯故其滋養精微之氣不能如常榮於肉理是以結聚而成癰腫矣經曰熱勝則肉腐是也法當視其所發之地各從其經而處治焉夫發於身之表者其名一十有七曰腦發督脉

足太
陽經曰背發中屬腎脉
手足少陽經曰頤發手是陽
手足太陽經曰顙領發手陽
明經曰腋發手太
表是三陰曰穿當發三督衝任
陽曰乳癰內陽明經外少陽
明經曰腎癰足太
陰經曰驂馬
內疽曰肺癰陰經曰腸癰手太陽經曰胃脘癰足
經夫十二經有氣血多少之不同癰疽淺深之有
異是故為治之法或疎散或消毒或針烙或內托
或外消或瀉利或補益是故腫瘍為實宜瀉利潰
瘍為虛宜補益浮露而淺者為癰宜外消藏伏而
深者為疽宜內托此千古不易之定議也雖然其
証有善而易治者為順惡而難消者為逆其為眼
白睛黑目緊小者一逆也不能飲食納藥而嘔食
不知味二逆也傷痛渴甚三逆也臍項轉動不便
四肢沉重四逆也聲嘶色脫唇口青黑面目四肢
浮腫五逆也煩燥時咳腹痛甚泄利無度小便如
淋六逆也膿血大洩愀腫尤甚膿水臭敗莫片心

逆也喘促氣短恍惚者八逆也未潰先黑而下
青唇黑便汚九逆也又如噫氣痞塞喘咳身冷自
汗目暈耳聾恍惚驚悸語言錯亂皆是惡証若夫
動息自寧飲食知味一順也便利調勻二順也神
彩精明語聲清朗三順也膿潰腫消色鮮不臭四
順也體氣和平五順也九五順見三則吉九逆見
六則危矣先哲垂訓班班可攷學者其可不詳察
乎

脉法

醫學正傳卷之六

四九

脉經曰脉数身無熱內有癰也一云腹無積聚身
無熱脉数此為腸中有膿薏苡附子敗醬湯主
之

諸浮数脉應當發熱而反洒淅惡寒若有痛處當
發癰膿脉微而遲反發熱弱而数反振寒當發
癰腫

脉浮而数身體無熱形嘿嘿胃中微燥不知痛之
所在此人當發癰腫

脉滑而数数則為熱滑則為實滑則主榮数則主

衛榮衛相逢則結為癰熱之所過則為膿也

羽林婦病醫者脉之知婦人腸中有膿為下之即

愈盖寸口脉滑而数滑則為實数則為熱滑則

為榮数則為衛衛数下降榮滑上升榮衛相干

血為濁敗小腹痞堅小便或澀或時汗出或復

惡寒膿為已成設脉遲緊聚為瘀血下之則愈

腸癰之為病其身體甲錯腹皮急按之軟如腫狀

夫腸癰者小腹腫按之則痛小便数如淋時時發

熱自汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之

當有血脉洪数者膿已成不可下也大黃牡丹

湯主之

丹溪方注九

丹溪曰癰疽因陰陽相滯而生盖氣陽也血陰也

血行脉內氣行脉外相並周流寒與濕搏之則

凝泣而行遲為不及熱與火搏之則沸騰而行

速為太過氣得邪而鬱津液稠粘為痰為飲積

久滲入脉中血為之濁此陰滯於陽也血滯而

而鬱遂道阻滯或溢或結積久滲出脉外氣

之亂此陽滯於陰也百病皆由於此又不止癰疽而已

○癰疽因積毒在藏府當先助胃壯氣使根本堅固而以行經活血藥為佐參以經絡時令使毒氣外發施治之早可以內消此內托之意也

○或問內托之法予曰河間治腫爛于外根盤不深形証在表其脉多浮病在皮肉非氣盛則必侵于內急瀉內托宜復煎散除濕散鬱使胃氣和平如或末已再煎半料飲之如大便閉及寒熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却與復煎散如此使榮衛俱行邪氣不能內傷也

○外科精要謂排膿肉補十宣散治未成者速散已成者速潰誠哉是言也若用之於小瘡癰與冬用亦可轉重就輕移居淺若潰瘍與夏月用之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難為倚仗比見世人用此不分輕重時令經絡前後正若盲人騎瞎馬半夜臨深池危哉

○諸經惟少陽厥陰二經生癰疽宜預防之以其多

氣少血也血少而肌肉難長瘡久未合必成死証苟不知此遽用驅逐利藥以伐其陰分之血禍不旋踵

○腫瘍內外皆壅宜以托裏表散為主如欲用大黃者宜戒猛浪之非

○潰瘍內外皆虛宜以補接為主如欲用香散者宜戒虛虛之失

○外科精要一書惟務紀錄舊方應酬輕小証候耳

○癰疽始發即以艾多灸之可使輕淺騎竹馬灸法

醫學正傳卷之六

五十五

最妙蓋艾火暢達拔引鬱毒此從治之意惟頭

為諸陽所聚艾炷宜小而少若身上必痛灸至

不痛不痛灸至痛亦有因艾而死者蓋虛甚孤

陰將絕其脉必浮數而大且不鼓精神必短而

昏無以抵當火氣宜其危也○按河間灸刺法

曰凡瘡瘍潰分經絡部分血氣多少腧穴遠近

從背出者當從太陽經五穴選用至陰通谷束

骨崑崙委中是也從髤出者當從少陽經五穴

選用竅陰夾谿臨泣陽輔陽陵泉是也從髤出

者當從陽明經五穴選用厲兌內庭陷谷衝陽

解谿是也從腦出者則以絕骨一穴治之各穴點法

俱見銅人針灸經疏不再具

蟬針之法可施於輕小証候吃出惡血若積毒在

藏府者徒竭其血於外無益也

外施貼藥亦發表之意精要謂貼冷藥有神効夫

氣得熱則散得冷則斂何謂神効經曰發表不

遠熱是也貼冷藥惟輕小痼毒可也

外科用針烙得膿後服神仙追毒丸此藥能下積

醫學正傳卷之六

取毒無取膿之功若血氣壯實則膿自出當以

和氣活血藥佐參芪補劑服之

○腫瘍用手按之熱則有膿不熱則無膿

○膿出而反痛者此為虛也宜補之亦有穢氣所触

而作痛者宜和鮮之風冷所逼者宜溫養之

○疽發深不痛者胃氣大虛必死肉多而不知痛也

○腫瘍時嘔者當作毒氣上攻治之潰後當作陰虛

補之若年老潰後發嘔不食又宜參芪白朮膏

峻補隨証加佐使藥河間謂瘡瘍嘔者濕氣侵

于胃也宜倍白朮

○癰疽發渴乃血氣兩虛用生芪以補氣當歸地黃

以養血或忍冬九黃芪六一湯皆効

○加味十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食實

為切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有迴生起

死之功但不分經絡不載時令醫者觸類而長

之可也或見腫平痛寬遂以為安慢不知省無

補接調養之功愈後虛証復見因而轉為他病

而危劇者多矣

醫學正傳卷之六

○蒲公英化熱毒消惡腫散結核有奇功田間路側

皆有之三四月開黃花似菊花味甘衍義補遺

云四時常花花罷飛絮節葉間折之有白汁出

者是能鮮食毒散滯氣可入陽明太陰二經同

忍冬藤煎以少酒佐而服之搗爛盒之亦妙

○白蠟屬金稟收斂堅凝之氣外科之要藥也生肌

止血定痛接骨續筋補虛當與合歡皮同入長

肉膏藥用之有神効但未試其可服否若合歡

皮常服之驗矣

○華蘇子性善收能追膿取毒亦要藥也

○癰疽已破未破用皂角刺能鑽引至痛處

取刺骨法

○取久疽久痔漏中朽骨俗名刺骨川烏骨雞脛骨以信

砒實之鹽泥固濟火煨通紅地上出火毒用骨

研細飯丸如粟米大以皮紙撚送入竅内外以

拔毒膏藥封之其骨自出

惡瘡發背腦疽等証方法

○升陽益胃散治一切惡瘡發背腦疽等証

醫學正傳卷之六

五十五

羌活 一錢半

獨活 五分

防風 五分

藁本 一錢半

知母 一錢

生地黃 一錢

黃芩 一錢

黃連 半錢

黃柏 半錢

當歸 三錢

防風 稍半錢

連翹 一錢

人參 半錢

黃芪 一錢半

生甘草 一錢

陳皮 半錢

當歸 稍半錢

蘇木 半錢

炙甘草 一錢半

酒防已 半錢

澤瀉 七分

桔梗 一錢

右細切分作二服每服用水二大盞浸半日煎

至一盞滴酒數十點去相臨卧溫服忌飲水再

作膿効遲初患二三日者服之立消作膿者立

潰隨病上下食前後服一人患腦疽第八日腫

硬如拳即日脫服此藥一劑次日便平復腫勢

消更不疼痛又服半劑七日全愈如常明之言

凡瘡皆陰中之陽陽中之陰二証而已我治此

瘡陽藥七分陰藥三分名曰升陽益胃散勝十

宣也老人宜之亦名復煎散或加乳香沒藥各

一錢尤妙

醫學正傳卷之六

五十六

○當歸羌活湯治腦疽証

黃芩 酒炒

黃連 酒炒各二錢

黃柏 酒炒一錢

澤瀉 半錢

連翹 一錢

當歸 身二錢

防風

羌活 各一錢

甘草 炙一錢

山梔子 一錢

獨活 七分

藁本 七分

右細切作一服水二盞先浸一時許入酒一匙

煎至八分去粗食後稍熱服日進二服三日進

六服俱將藥清汁調下後項栴柳散

○栴柳散大斂瘡口

栴柳

木香 各三錢

右為細末用煎湯調下或飲瘡口用之決無疼痛以蠟油調塗瘡口生肌歛肉甚速別無惡肉瘡口易合平復膏藥熱瘡所宜用也貧人寒地及寒濕外來之寒瘡禁不可多用

背疽方法

○千金托裏散治背疽併諸惡瘡如三日以裏未針

灸及利大便秘者則可消矣

羌活 一錢半

防風 酒洗 半錢

防風稍 半錢

醫學正傳 卷之六

五十七

大

藁本 一錢半

當歸身 三錢

當歸稍 半錢

連翹 一錢半

黃芪 三錢

黃芩 一錢半 生

人參 一錢半

炙甘草 一錢半

生甘草 半錢

陳皮 半錢

蘇木

五味子

酒黃柏

酒防已 各半

桔梗

梔子

生地黃 酒洗 各一錢

酒大黃 三錢

酒黃連 一錢

木猪苓 一錢

麥門冬 二錢

右細切分作二服每服用水三大盞浸半日煎至一盞稍熱服後一服如前併相再煎服忌食

水此方如覺病即便忙服無不効者若瘡勢已發三四日或成膿則不消也崔經歷二次發背疽皆得此方而愈

○丹溪治背疽方用大黃防風羌活甘草節生地黃當歸身貝母白芷赤芍藥皂角刺黃芩作大劑煎服氣虛加人參黃芪瘡潰後亦宜加之

附骨疽方法

○丹溪曰附骨疽者皆因久得厚味及勞役與酒後涉水得此陽滯於陰之証也又曰環跳穴痛不

醫學正傳 卷之六

五十八

止防生附骨疽以蒼朮為君佐以黃柏之辛行以青皮冬加桂枝夏加條芩體虛者加杜仲牛膝以生甘草為使作大料煎入姜汁食前飲之痛甚者恐前藥十數貼發不動少加麻黃一二貼又不動者恐疽將成急掘地坑以火煨坑通紅沃以小便令患赤休坐於坑中以蓆或綿衣圍抱下体使熱氣薰蒸膜理開氣血通暢而愈

○羌活防已湯治附骨疽初發於太陽厥陰太陰分者

羌活

川芎

蒼朮

防已

木香

連翹

射干

甘草

白芍藥

木通

當歸尾

蘇木 各七分

右細切水酒各一大盞煎至七分食前服美膳

壓之

○托裏黃芪湯治骨疽初發於足少陽陽明分者

柴胡 一錢二分

連翹 八分

肉桂 八分

黍粘子 八分

黃芪 八分

當歸尾 一錢半

醫學正傳 卷之六

辛卯

木

黃柏 四分

升麻 四分

甘草炙 四分

白芷 一錢

右細切作一服酒一盞水一盞半煎至一大盞

空心服美膳壓之

○內托黃芪酒煎湯治瘡生腿外側或因寒濕得附

骨疽於足少陽經分微侵足陽明經堅破漫腫

行步作痛或不能行

柴胡 六錢半

連翹 八分

肉桂 八分

大力子 炒

黃芪 各四錢

當歸尾 八錢

黃柏 五分

升麻 七分

甘草炙 五分

白芪 二錢

右細切水酒各一盞煎至一盞食前溫服

○黃連消毒飲治附骨疽

黃連 一錢

黃芩

黃柏 各半錢

生地黃 四分

知母 四分

羌活 一錢

獨活 四分

防風 四分

藜蘆 五分

當歸尾 四分

桔梗 五分

黃芪 二分

人參 二分

甘草 三分

連翹 四分

醫學正傳 卷之六

大十

水

蘇木 二分

防已 五分

澤瀉 二分

陳皮 三分

右細切作一服水煎服一老人年七十因寒濕

地氣得附骨疽於左腿外側少陽經之分微

侵足陽明經分潤六七寸長一小及緊硬漫腫

不辨肉色皮澤但行步作痛以指按至骨大痛

與此藥一服即止次日堅軟腫消而愈

○內托黃芪柴胡湯治附骨疽

生地黃 一分

黃柏 二分

肉桂 二分

羌活 五分

當歸 七分

土瓜根 酒洗

柴胡 各一錢

連翹 一錢

黃芪 二錢

右細切作一服酒一盞水二盞煎至一盞去粗

空心熱服賈德茂小男於大腿近膝股內出附

骨疽不辨肉色漫腫光澤木硬瘡勢甚又其左

腳乃肝之髀上也更在足厥陰肝經之分少侵

足太陰脾經之分其脉左二部細而弦按之洪

緩緩微有力與此藥而安

腎癰方法

醫學正傳

卷之六

六十一

○丹溪曰腎癰者腎居小腹之後在下此陰中之陰

道遠位僻雖曰太陽多血然氣運不到血亦罕

來中年後尤慮患此緣有腫痛癰之証証但見

虛弱便與滋補血氣可保終吉若無稍補之功

其禍多在結痂之後或半年已來乃病多致失

手慎之慎之

○內托羌活湯治足太陽經中左右尺脉俱緊按之

無力死腎生癰堅硬腫痛大作

羌活

黃柏

酒炒各一錢

防風

藥本

當歸尾 各一錢

肉桂 三分

連翹

甘草 炙

蒼朮

陳皮 各五分

黃芪 一錢半

右細切作一服水二盞酒一盞煎至一盞去粗

稍熱空心服以衣覆蓋癰上使藥力行去衣

內疽方法

○丹溪曰內疽者皆因飲食之火挾七情之火相鬱

而發飲食者陰受之七情者藏府受之宜其發

在腔子而頭向內非于腸胃胃膜也宜以內托

之藥托出于外以針開之而愈先用四物湯加

桔梗香附生姜煎服膿出後亦用四物湯調理

而安

肺癰方法

○丹溪肺癰先須發表千金方曰病咳唾膿血其脉

數實或口中咳胃中隱隱痛脉反滑數者為肺

癰其脉緊數為膿未成緊去而但數者膿已成

也

○要畧治肺癰先以小青龍湯一貼以解表之風寒

邪氣然後以葶藶大棗瀉肺湯桔梗湯葶藶湯

隨証用之以取膿血治腫瘍之例也終以宇宙

獨行方名黃以補裏之陰氣此治潰瘍之例也

○黃昏湯治胸中甲錯隱痛知為肺癰

合歡木皮一掌大

右以水三盞煮取一盞半分二服

○葶藶大棗瀉肺湯治肺癰或肺脹喘促不得卧

葶藶一兩妙黃研為細末大棗十枚

右以水三盞煎大棗至二盞去棗入葶力一丸

醫學正傳卷之六 六十三

再煎至一盞攪勻服之

○葶藶湯治有微熱煩燥胃心甲錯出千金方

葶藶二升 薏苡仁半斤 桃仁五十箇

瓜瓣半升

右以水一斗先煮葶藶至五升去粗入諸藥煮

取二升分溫再服當吐痰如粥而愈

○桔梗湯治肺癰心氣壅咳嗽膿血心神煩悶咽

乾多渴兩脚腫滿小便赤黃大便多澁

桔梗 貝母各一錢 當歸

瓜蒌子各八分 枳殼炒五分 薏苡仁八分

桑白皮五分 防己五分 甘草節三分

黃芪五分 杏仁去皮炒 百合各三分

右細切作一服水一盞半加生姜五片煎至八

分去粗溫服不拘時若大便秘者加大黃小便

澀者加木通

○又方治前証

瓜蒌子 當歸 桔梗

貝母 白芷 甘草各一錢

醫學正傳卷之六 六十四

右細切作一服水一盞食後服一方無貝母白

芷有葶藶子

○肺癰已破入風者不治或用太乙膏丸服以搜風

湯吐之

○有吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜消風散

入無病男子髮灰清米飲調下可二服而愈

○祖傳經驗秘方治肺癰未成膿者立消已成膿者

立潰其効如神用章蔞樹葉一名按骨林又名

野黃揚田畔路側皆有之右一味細研畧入瀉

過以湯調服下飲酒入入生薑研服

腸癰方法

○丹溪曰腸癰當作濕熱積治入風難治

○千金謂腸癰妄治必殺人其病小腹腫強按之則

痛小便數淋時時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮

急如腫狀脉數者微有膿也脉若洪數已有膿

脉若遲緊者未有膿甚者腹脹大轉側有水聲

或逸癰生瘡或膿自臍出或大便膿血証具前

脉法下

醫學正傳卷之六

六十五

○腸癰治法要畧以薏苡附子敗醬散千金以大黃

牡丹湯

○灸法屈兩肘正肘頭銳骨端灸一百壯下膿血而

安

○薏苡附子敗醬散

薏苡仁一錢 炮附子一分 敗醬三分

右為細末每服方寸匕水二盞煎至一盞連粗

頓服之小便當下膿血而愈

○大黃牡丹湯

大黃 四分

芒硝 三合

右細切用水六升煎取一升去粗入芒硝再煎

一沸分三服頓服之有膿即下膿無膿即下血

○東陽呂俊文得潮熱症以瘡狀小腹右邊有一塊

大如雞卵作痛右脚不能伸縮一醫作臍脉氣

治十餘日不驗召予診候其脉左寸芤而帶濇

右寸芤而洪實兩尺兩關俱洪數予曰此大小

腸之間欲作癰耳幸膿未成猶可治療與五香

連翹湯加減與之間以蜈蚣灸黃酒調服之三

日內平安

乳梗方法

○丹溪曰乳梗多因乳母不知調養所致蓋乳房陽

明所經乳頭厥陰所屬忿怒所逆鬱悶所遏厚

味所釀以致厥陰之氣不行故竅閉而汗不通

陽明之血沸騰故熱甚而化為膿或因所乳之

子膈有滯痰含乳而睡口氣熾熱所炊而成結

核初便忍疼揉令核軟吮令汁透可散否則結

成矣治法以青皮疎厥陰之滯石膏清陽明之熱生甘草節行汚濁之血瓜蒌子消導腫毒或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸身或湯或散須以少酒佐之若加艾火二三炷於痛處灸之尤妙彼粗工使用針刀必成拙病

○乳癰用蒲公英同忍冬藤入少酒煎服即欲睡是其効也

乳癰未潰以青皮瓜蒌桃仁連翹川芎橘葉皂角刺甘草節隨証加減煎服已潰以人參黃芪川芎當歸白芍藥青皮連翹瓜蒌甘草節煎服

○東垣升脉托裏湯治婦人兩乳間出黑頭瘡上頂陷下作黑眼子其脉弦洪按之細小

黃柏 二分 肉桂 二分 黍粘子 五分

黃芪 炙甘草 當歸身 各一錢

連翹 升麻 葛根 各一錢半

右細切作一服水一盞酒半盞同煎至一盞食後熱服

妙岩方法

○石香程氏曰妳岩始有核腫結如驚甚子大不痛不痒五七年方成瘡初便宜多服疎氣行血之藥須情思如意則可愈如成瘡之後則如岩穴之凹或如人口有唇赤汁膿水浸淫胸脇氣攻疼痛用五寶膏金寶膏去其蠹肉生新肉漸漸收斂此疾多生於憂鬱積怒中年婦人未破者尚可治成瘡者終不可治

○十六味流氣飲治妳岩

人參 黃芪 川歸 各一錢

川芎 肉桂 厚朴

白芷 甘草 各半錢 桔梗 三分

防風 烏藥 檳榔

芍藥 枳殼 木香 各半錢

紫蘇 一錢半

右細切作一服或加青皮一錢水二大盞煎至一盞服

○單煮青皮湯治婦人百不如意久積憂鬱乳房內有核如驚甚子

每服用青皮四錢細切以水一盞半煎至一
日二服已上二方間服至核消住藥

○橘葉散治証如前

青皮

石膏

甘草節各半錢

瓜蒌子一錢

當歸頭五分

皂角刺一錢半
去尖畧

炒出

金銀花五分

沒藥

蒲公英各五分

右細切作一服加青橘葉一小握以酒一盞半

煎至一淺盞食後或卧時服

醫學正傳

卷之六

六十九

卯

○丁香散治乳頭破裂或因小兒吹乳血乾自裂開

多痛

丁香不拘多少

右一味為末乾付裂處如燥嚙津調付

囊癰方法

○丹溪曰囊癰者濕熱下注也有作膿者此濁氣順

下將流入滲道因陰道或虧水道不利而然膿

盡自安不藥可也惟在善於調攝耳又有因腹

腫漸流入囊腫甚而囊自裂開罩九懸掛水出

以輔炭末付之外以紫蘇葉包裹仰卧養之

○癰疽入囊者曾治數人悉由濕熱入肝經處治而

用補陰藥佐之雖膿潰皮脫罩九懸掛者皆不

死

○一方用野紫蘇葉面青背紅者是也焙乾為細末付之如

燥以香油調付囊脫無皮者外以青荷葉包之

其皮自生

丹溪便毒方法

○便毒是厥陰經濕熱因勞倦而發用射干三寸同

醫學正傳

卷之六

七十

火

生薑煎食前服得利二三行効射干開紫花者

是紅花者勿用

○一方用破故紙黍粘子微炒黑牽牛炒大黃酒蒸

焙乾各等分為末每服一兩酒調下

○文方已結成膿者用大黃

酒蒸

連翹各五錢

枳實三錢

厚朴

甘草節各二錢

桃仁二十箇

生薑三片分三服水煎服之

○石香程氏曰便毒一名驕馬癰此奇經衝任為病

而癰見於厥陰經之分野其經多血又名血疔

或先有疳瘡而發或卒然起核疼痛而發
鬱血聚而成也初發宜疎利之即散變膿後如
常用托裏內補之藥

蘇方散治便毒

木鱉子去殼 當歸尾 酒浸 芍藥

白芷 粉甘草 川芎

射干 忍冬藤即金 大黃控碎酒浸

川山甲唐火煨 沒藥另研 蘇木各六分

右細切作一服水酒各一盞煎至一盞食前服

醫學正傳 卷之六 七十一

○玉燭散

川芎 當歸 生地黄

赤芍藥 朴硝 大黃依前製

甘草各八分

右細切作一服水煎食前服

○牡蠣大黃湯

大黃依前製 牡蠣各三錢半火煨 甘草一錢

瓜蒌一箇去皮

右細切作一服水二盞煎至一盞服

療癰方法

○丹溪曰癰癰必起於少陽一經不守禁忌延及陽
明大抵食味之厚鬱氣之積曰風曰熱皆此二
端拓引交換須分虛實實者易治虛者可慮以
其屬膽經主決斷有相火且氣多血少婦人見
此若月經不作寒熱便生稍久轉為潮熱危矣
自非斷慾食淡神仙不治也

○治癰癰用立效散與瓜蒌散相間服神効

○本草云夏枯草大治癰癰散結氣有補養厥陰血

醫學正傳 卷之六 七十二

脈之功而經不言觀其能退寒熱虛者可伏若

實者以行散之藥佐之外以艾灸亦漸取効

○治血少馬刀癰瘡腫泄以四物湯倍酒炒芍藥牡

蠣粉陳皮柴胡甘草黃連玄參炒神麴桑椹膏

○石香程氏曰癰癰之証內經謂之結核者是也結

核有大小如大豆銀杏連串而生者形大如馬

刀者謂之馬刀瘡經別為火類夫火亢之甚必

兼水化制之其核故堅也凡癰癰之起始生於

耳後足陽明少陽二經浸淫于太陽之經漸隨

經流注于腋脇手足皆有也治法以火針刺入核中不可透底納蟾酥膏于中外用綠雲膏貼之三日後取去核中稠膿膿盡取去核外薄膜先破初起之核一枚以絕其源服藥後出者皆愈或不肯收如銀杏者及皆開了用藥取之其自潰者猶如木菓之腐熟肉雖潰而核猶存故膿水淋漓久難得愈治者用鉄烙燒赤烙去其破核猶存者併肉潰處以用金寶膏龍珠膏等藥追去蠹惡之根遂能長肉而愈隨經絡証候服除風熱蕪引經之藥以除根本可獲全功也

○蟾酥膏

蟾酥如大

白丁香枚五

寒水石少

巴豆五粒

寒食麪少

右各另研和作一處再研煉蜜為丸如菓豆大每用一丸或二三丸納入針竅中如膿未盡再用數丸以膿盡為度

○綠雲膏

黃連

大黃

黃芩

玄參

黃柏

木鱉子去

右細切用香油一兩同煎焦色去藥入淨松香五兩再煎成膏濾入水中扯拔令金色入銚再熬放溫入後藥

猪膽汁三

銅綠三錢

右用竹筴帶溫攪勻然後如常攤貼兼治瘡口不乾加乳香沒藥輕粉尤妙

○金寶膏去腐肉不傷良肉新肉

桑柴灰

五兩用沸湯十碗淋汁用草紙一層皮紙二層放羅底次置灰其上淋之

穿山甲二兩

信砒二錢

杏仁七枚

山甲研細

生地黃二兩

辰砂一錢

粉霜另研

射香各半錢

右將灰汁瀝澄清下鍋煎濃下甲末候焦乾一半下射香次下粉霜乾及九分下辰砂候成膏下炒石灰末以成塊子即收入小罐子內勿見風

○龍珠膏

龍牙草五兩

棘棗根半

海藻二錢

蘇木 半四

右細切量水二十碗煎至十二三碗濾去粗又

用

桑柴灰二碗 石灰二碗 蒼耳草灰二碗

以草紙二層皮紙二層放羅底次置灰於上用

煎湯熱淋取灰汁十碗許澄清入鍋內煎成膏

用巴豆霜白丁香膏射香輕粉磁罐子收貯

每用取付核上再付即去舊藥併腐肉上新藥

其核自潰而愈根小者但只塗藥於根上其核

醫學正傳末 卷之十 七十五

自潰

○拔苦化堅湯治瘰癧馬刀挾癰在耳下或耳後下

頸至肩上或入缺盆中乃手足少陽之經分其

瘰癧在頰下或至頰車乃陽明之經分受心脾

之邪而作也今將二証合而治之

黃芪 一錢 護皮毛間腫脹虛及活血氣為家

人參 二錢 補元氣之妙劑也

炙甘草 半錢 能調中和諸藥去火益胃氣亦兼

真漏芦 各一錢 葛根 半錢 此三

明本經 連翹 一錢 此藥不可無也散諸

血結氣聚此瘡 牡丹皮 三分 去腸胃中滯宿

當歸身 三分 生地黃 三分 熟地黃 三分 此

經中補血生 白芍藥 三分 如夏月倍之其味

之冬寒不可用 肉桂 二分 大辛熱能散結積陰

陰寒之氣如用有煩燥者去之 黍粘子 三分 無

柴胡 八分 同連翹如瘰癧不 防風 半錢 已上

兔活 一錢 獨活 防風 半錢 已上

手足太陽証脊痛項不可回頭腰似折項以

醫學正傳末 卷之十 七十六

無下足太陽証証亦當用之為能散結去上部

昆布 二分 其味太陽若堅硬者 荊三稜 炮二分

廣木 炮三分 此一味若瘰癧堅硬甚者用之如不

益智 二錢 如唾多者胃不消也或病人吐沫吐

麥藥 二錢 腹中氣急 利曲 炒二分 食

用 黃連 三分 治 厚朴 二錢 如腹

之 黃柏 炒三分 如有熱或腹脹去

加之 衣者腎中有伏火也更

右件共為細末湯浸熟餅作餅子日乾搗如

令在上焦加黃芩

半酒洗

在中焦加黃連

半酒洗

在下焦則加酒制黃柏知母防己之類選而

用之○如大便不通而滋其邪盛者加酒制大

黃以利之○如血燥而大便乾燥者加桃仁泥

酒制大黃二味○如風結燥不行者加麻仁大

黃以潤之○如風澁而大便不行加煨皂角仁

大黃秦朮以利之○如脈澁覺身有氣澁而大

便不通者加郁李仁大黃以除風燥也○如陰

寒之病為寒結秘而大便不通以為方中半硫

米粒大每服三錢白湯送下○如氣不順加橘

紅甚者加木香少許量病人虛實臨時斟酌與

之母令藥多妨其飲食此為大治之法也○如

止在陽明分者去柴胡秦朮子二味餘皆用之

○如在少陽分為馬刀瘡者去獨活漏芦升

麻葛根更加瞿麥三分○如本人素氣弱其病

勢來時氣盛而不短促者不可用考其平素宜

作氣盛而從病變之權也宜加黃芩黃連黃柏

知母防己之類視邪氣在上中下而用之○假

右細切作一服水二盞稍熱服

○消腫湯治馬刀瘡

黍粘子炒一錢

黃連各五分

當歸稍

甘草各七分

瓜蒌根

黃芪各一錢

生黃芩

柴胡去芦各一錢二分

連翹二錢

紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱服

○柴胡通經湯治小兒項側有核堅而不潰名曰馬

刀瘡

丸或加炮附子干姜煎水冷服之○大抵用藥

之法不惟瘡瘍一家諸疾病重人素氣弱者當

去苦寒之藥多加人參黃芪甘草之類瀉火而

先補其元氣餘皆倣此

○柴胡連翹湯治男子婦人馬刀瘡

中桂一分

當歸稍三分

黍粘子炒另研

炙甘草

酒黃柏

生地黃各一錢

柴胡一錢

黃芩炒

酒知母

連翹各一錢半

瞿麥二錢

柴胡 去芦 連翹

當歸稍

生甘草 黃芩

黍粘子 炒

荆三稜 醋炒

桔梗 各二分

黃連 五分

紅花 少許

右細切作一服水二盞煎至一盞云相食後稍

熱服忌苦寒泄大便

○散腫潰堅湯治馬刀瘡結硬如石或在耳下至跌

盆中或肩上有或脇下皆手足少陽經中及癰癰

遍於頰或至頸車堅而不潰在足陽明經中所

醫學正傳

卷之六

七十九

水

出或二証瘡已破流膿水並治之

黃芩 八分酒洗

草龍膽 酒洗

瓜蒌根 酒洗

黃柏 酒制炒

知母 酒炒

桔梗 去芦

昆布 酒洗各五分

柴胡 四分

炙甘草

荆三稜 酒洗

廣木 酒拌炒

連翹 各三分

葛根 二分

白芍藥 二分

當歸稍 二分

黃連 一分

升麻 一分

右細切作一服水二盞先浸日煎至一盞去

粗食後稍熱服於臥處仰臥

含一口作十次嚥下服畢少頃依當安卧

在隔上停蓄故也另攢一料作細末煉蜜為丸

如葦豆大每服百餘丸以煎藥送下或加海藻

五分炒入亦妙

以海藻反其性此東垣用藥妙處世醫莫曉也

○升陽調經湯治癰癰或至頸車此皆出足陽

明胃經中來若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎

經中來乃戊脾傳於癸腎是夫傳與妻俱作塊

子堅硬大小不等並皆治之或作丸亦可

升麻 八分

葛根

草龍膽 酒洗

黃芩

廣木

荆三稜 酒洗

炙甘草 四分

當歸稍

芍藥 各三分

黃柏 酒炒

知母 酒炒

桔梗 去芦

右細切作一服水二盞先浸半日煎至一盞去

粗食後稍熱服外另稱十貼之數為細末煉蜜

丸如葦豆大每服一百丸服藥時足高去枕仰

卧嚥一口作十次嚥之晉一口在後送下丸藥

服畢寢卧如常

○連翹散堅湯治耳下或至缺盆或肩上有生瘡堅硬

如石動之無根名曰馬刀瘡從手足少陽經中
來也或生兩脇下或已流膿作瘡未破並皆治
之

柴胡 一錢 二分 草龍膽 酒制 四次 土瓜根 酒制 炒 各一錢

黃芩 酒炒 二分 當歸稍 生黃芩

廣木 荆三稜 酒炒 連翹

白芍藥 各五 分 炙甘草 三分 黃連 酒炒 二分

蒼木 米泔浸 各二分

右細切作一服外另秤十貼之數為細末煉蜜

丸如葦苴大每服百餘丸煎者用水二盞先剪

大半再剪至一盞去粗臨卧稍熱服去枕仰卧

每口作十次嚥之畱入口送下丸藥服畢如常

安卧更以後藥塗之

○龍泉散

龍泉粉 炒即磨刀 石上粉也 瓦粉

廣木 荆三稜 酒浸 昆布 各五錢

右同為細末煎熱水調塗之用此藥去疾尤速

○三聖丸治癰癰神効却藥

丁香 五十粒 斑蝥 十箇去翅 及頭足炒 射香 一錢

石為末用鹽鼓五十粒湯浸爛研如泥和前藥

末丸如葦苴大每服七丸食前溫酒送下日三

服至五七日覺小便淋瀝是藥之効便如服或

小便下如青筋膜之狀乃病之根也忌濕麪毒

食

○立驗大聖散治癰癰却藥

斑蝥 大者三十箇去頭及翅足用糯米一合同

白姜 系紫炒 黑牽牛 半生半炒 共三錢取頭

荆芥穗 一錢

右為細末每服一錢空心無灰老酒下服此藥

須忌魚肉酒醋鹽醃及發風動氣等物止可吃

菜蔬白粥且如次早服藥隔夜不吃夜粥黃昏

煎川木通湯調下至五更妙靈散二錢重次日五

更酒調立驗大聖散一貼如不能飲酒用燈心

木通湯調下至日中覺小腹攻痛小便澀痛又

用燈心湯調下琥珀末一錢或玉屑妙靈散亦

可當利惡物從小便中出如蒲萄肉狀中有發

血一點或米下三日後可再服至日中前用六
丁神散一服催之必然自下五六日後再催一
服以病根除盡為度如項上有癰一枚取下惡
物十枚則病根如有小腹攻急莖中澁痛之
惱不必驚恐過後便自平復無事

○玉屑妙藥散

滑石細研為末每服一錢煎川木通湯調下

○六丁神散

苦丁香 六枚或秤半錢重 白丁香 一錢

醫學正傳 卷之六

苦參末 五分 赤小豆 一錢 磨刀泥 青石者 一名

龍泉粉 大斑猪 十箇去 頭足炒 白姜蚕 去系紫 炒各一錢

右共為細末每服一錢重空心無灰酒調下

瘰癧方法

○破結散治石瘰氣筋瘰肉瘰馬刀瘰癧等証

海藻 酒洗淨 龍胆草 酒洗 海蛤粉

通草 貝母 去心 昆布 酒洗淨

礬石 枯 松蘿 各三錢今以 桑寄生代效

麥麴 炒四錢 半夏 炒二錢

右為細末每服二錢熱酒調食後服忌甘草鯽
魚雞肉五辛生菜○有人於項上生癰大如茄
子潮熱不食形瘦日久百方不效後得此方去
松蘿加真桑寄生一倍服三五日後其瘡軟而
散熱退而愈發醫數人皆效

○南星散治皮膚頸項面上瘡大者如拳小者如粟
或軟或硬不痒不痛宜用此藥切不可輒用針
灸多致不救

生南星 大者一枚

醫學正傳 卷之六

右細研爛入好醋五七點杵如膏如無生者即

以乾者為末醋調如膏先以細針刺患處令氣

透却以膏藥攤貼覺痒則頻換貼取效

○瘡者氣血凝滯結聚而成或如桃李或如瓜瓠其

名有六曰骨瘡曰脂瘡曰膿瘡曰血瘡曰筋瘡

曰風瘡以其中各有此物而名之也已上諸瘡

通用龍珠膏治之

○龍珠膏 方見前瘰癧條下

○瘡宜服十六味流氣飲 方見前疔毒條下

○九癭氣先須斷厚味用海藻一兩黃柏二兩為末置掌中時時舐之以津嚥下待消三分之二止藥

結核方法

丹溪曰但九結核在項在臂在身如腫毒不紅不痛不作膿者多是痰注不散名曰痰核用二陳湯加酒炒大黃連翹桔梗柴胡煎服

○又方治臂核作痛用二陳湯加連翹川芎皂角刺防風黃芩酒炒蒼朮煎服

醫學正傳天卷之六

○治耳後頂門各有一核用炒姜蚕酒蒸大黃青代牛膽南星為末蜜丸嚥化

疔腫方法

○石香程氏曰疔腫之証皆蓄熱毒之深而成者也近者多見因食炙牛疫馬之肉而成此証其形有十三種皆以形而名之耳一曰麻子疔二曰石疔三曰雄疔四曰雌疔五曰火疔六曰爛疔七曰三十六種疔八曰蛇眼疔九曰盞膚疔十曰水洗疔十一曰刀鐮疔十二曰浮鷗疔十三

曰牛狗疔惟三十六種疔最為可畏其狀頭黑浮起形如黑豆四畔大赤色今日生一明日生二後日生三乃至十數尤為可治若滿三十六則為不治之証也夫十三種疔其形狀雖各不同而其所由皆熱毒之甚也治法並急用奪命丹下之去其毒之銳勢次服化毒丸及內托散二活散雄雞湯隨証經絡病勢緩急用引經藥斟酌施治如無他証有熱即退熱有腫則退腫如身冷自汗嘔逆燥喘狂喝妄語直視者皆毒氣入內不可治矣如疔已拔去用金銀白芷散加減十宣散調之方獲全安也

今將十三種疔証候開列于後

○一曰麻子疔其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多痒忌食麻子近油衣布衣并入麻田中行
○二曰石疔其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入肉微痛惡藥磚石之屬
○三曰雄疔其狀炮頭黑腐四畔仰炮漿起有水出色黃大如錢孔形高者忌房事

醫學正傳天卷之六

○四曰雌疔其狀瘡稍黃向裏膿赤似灸瘡四面蛇

漿起心凹色赤如錢孔者忌房室

○五曰火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑靨四邊有煙
焰又如赤粟米者忌火燒烙

○六曰爛疔其狀色稍黑有白斑瘡中潰有膿水流
出瘡形大小如匙面者忌沸熱食爛物

○七曰三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起

赤色今日生一明日生二及至十數未滿三十
六猶可施治若滿三十六藥所不能治也忌噴

醫學正傳天 卷之六 怒蓄積怨恨

八十七

○八曰蛇眼疔其狀瘡頭黑皮浮生形如小豎狀似
蛇眼大体硬忌惡眼人看并嫉妬人見忌毒藥

○九曰塩膚丁其狀大如是面四邊皆亦有黑粟粒
起大忌食塩味

○十曰水洗疔其狀大如錢形中如錢孔瘡頭裏黑
靨汁出中硬忌飲漿水水洗渡河

○十一曰刀鏹疔其狀闊狹如薤葉大長一寸左側
肉黑如燒烙忌刺及刀鏹切割鉄刃所傷可以

藥治不可亂攻

○十二曰浮瀉疔其狀瘡体曲圓少許不合長而狹
如薤葉大肉黃外黑黑處刺之不痛黃處刺之
痛

○十三曰牛狗疔其狀肉色炮起搥不破

右十三種疔瘡初起瘡心先痒後痛先寒後熱
熱定則寒多四肢沉重心驚眼花若大重者則
嘔逆嘔逆者難治其麻子疔一種始末惟痒初
錄忌者不得觸犯觸犯者發作難治其浮瀉疔

醫學正傳天 卷之六

八十八

牛狗疔兩種無所禁忌緩不療亦不能殺人其
狀寒熱與諸疔不同皆宜將護依法治療禁忌
不得觸犯若或觸犯脊強瘡痛極甚不可忍者
是也又云疔腫初發時突起如釘故謂之疔令
人惡心惡寒四肢強痛一日瘡變為焦黑色腫
大光起根硬刺之不覺痛皆其候也在手足頭
面胞背骨節間最急其餘處則可治毒入腹則
煩悶恍惚似醉如此者三二日間死矣皆不可
不速治也

○迄竟用經云汗之則瘡愈必用此藥汗之

乳香

沒藥

辰砂

雄黃

輕粉

片腦

射香

海羊

蟾酥

青代

粉草

朋砂

右為細末用海羊搗膏為丸如難丸加酒麪糊

步少丸如彈子大每服一九燕生葱頭二三箇

細嚼嚥下疔腫及癰腫毒氣入膈者得微汗即

解○一方加銅綠寒水石輕粉枯礬各一錢重

○拔疔法以黑牯牛牽於石塔上必撒糞候糞上生

菌取焙乾與菴葦草葉等分為細末先用竹筒

兩頭去節一頭鮮十字路將不解頭套在疔上

以線緊縛竹筒入肉內為度以前藥末一匙

滴水和之放於筒內少時藥漲起則疔自拔起

若一次未效漸加度数其疔必拔也

○奪命丹

巴豆

黃丹

硃砂

雄黃

乳香

鬱金

大黃

輕粉

蟾酥

飛羅

三

右為細末蠟水糊為丸如菴葦大隨身年分虛

實加減丸數服之以下其毒如無奪命丹雄黃

丸代之亦效

○雄黃丸

雄黃

鬱金

巴豆

射香

皂角

全

右為細末滴水為丸如菴葦大每服二十九清

茶送下亦看大小虛實斟酌加減丸數

○化毒丸

片腦

射香

硃砂

硃砂

雄黃

輕粉

蟾蛇

洗去土

右為細末新取蟾酥為丸如菴葦大每用一九

放於舌上取涎而愈

○獨蟾丸

併取蟾酥法

拿取活蟾即大壯蟾通身有靨聖者俗名瘡蟾又各風難大者重五六兩不拘幾個

捉住後脚以大桑葉或油單紙包捲其頭用鉄釘一箇括取肩間白汁澣於葉上凝結如濕真粉就丸如葉寬大一蟾或作一九多者作二九懸當風處陰乾如患疔腫者即以一二九置舌尖上仰卧片時其苦水滿口就此水嚥下或以鉞鍼刺開疔腫頭上納藥一九於中外以薄皮紙貼護之勿令藥脫落背癰及一切癰腫初起時亦可依此法治之神效已上取蟾酥法切防酥汁入眼入人眼即瞎

醫學正傳卷之六 九十二

○雄射湯解疔毒如神凡解毒不可無雄黃硃砂

雄黃 <small>另研一錢</small>	硃砂 <small>另研一錢</small>	真葦莖粉 <small>二錢</small>
射香 <small>另研一錢</small>	乳香 <small>另研各一錢</small>	白芷
茜草根	地丁草 <small>各二錢</small>	牡蠣
姜蚕	牛旁子 <small>炒</small>	大黃
金銀花	青木香	梔子
荆芥穗	朴硝	甘草 <small>各一錢</small>

胡桃二箇去核膜

右以白芷以後一十四味細切用無灰酒一碗浸少時搗細又加水一碗同煎至一碗去粗及濁脚入前雄黃等五味調勻作一服更審患處經絡分野依東垣引經瀉火藥加之尤妙欲利倍加大黃朴硝二味臨後下○茜草即過山龍地疔即大薊也一云剪刀草開黃花者名黃花地丁開紫花者名紫花地丁

○二活散

兔活 獨活 當歸

醫學正傳卷之六 九十三

烏藥 赤芍藥 金銀花酒洗

連翹 天花粉 甘草節

白芷各四錢半 紅花 蘇木

荆芥 蟬蛻 乾葛各三錢

檀香二錢

右為細末每服三錢煎蒼耳湯調下

○取疔散

雄黃	硃砂	蟾酥
信石 <small>各一錢</small>	巴豆 <small>十粒</small>	輕粉 <small>十盞</small>

右將疔四畔用針刺破醋調塗付疔落後用長
肉拔毒膏藥貼之

○鮮毒丸

白芷

十兩

木香

五兩

薤白

去壳炒另
研末四兩

貫衆

軀乾特末研四兩
取新者去皮切

朴硝

四兩

硃砂

一錢六分

京墨

八錢各
另研

右和勻糯米糊丸如龍眼大青代為衣陰乾每

服一九無灰酒磨化下

○賀藍先生鮮毒丸鮮諸藥毒及山嵐瘴氣災牛馬

醫學正傳

卷之六

九十三

猪羊肉毒魚腥菜毒暑熱濕毒傷寒濕毒小

兒斑疹喉痺等証紅赤癰腫及諸般無名腫毒

黃柏

貫衆

茯苓

藍根

葛根

生地黄

雄黑豆

甘草

滑石

宿砂

塌地藤

薄荷

益智

大黃

寒水石

紫河

印金線
重樓

馬勃

草龍胆

姜盞

炒

百藥煎

山枝子 各一兩

右為細末煉蜜丸每一兩分作十九細嚼新汲
水送下小兒驚風薄荷汁下蜜水浸蒸餅為丸
亦可或加黃連白芷

○萬病鮮毒丸

射干

文蛤

倍子

杏仁

石膏

續隨子

去殼
去油

蚤休

印金線
重樓

上珠

大戟

山豆根

山茨菰

白藥子

大黃 酒蒸各
二兩

射香 二錢

青代

威靈仙

醫學正傳

卷之六

九十四

白芷

一兩

黃連

風化硝

各半兩

右為末糯米糊為丸如彈子大青代滑石細研

為衣陰乾此藥鮮一切毒蠱毒 鼠莽豚毒魚

毒菌毒疫死牛馬肉毒喉痺骨鯁竹鯁刺毒並

用急流水磨下癰疽發背疔腫瘡瘍毒蛇大蛇

蜈蚣蜂蝎蠱毒刀斧湯火傷並用井花水磨下

併塗傷處婦人胎胎惡氣積塊虫積心腎痞滿

肚腹膨脹並用好酒磨下

○千金漏芦湯治疔腫神効

漏蘆

連翹

黃芩

白欬

枳殼

升麻

麻黃

去根節

朴硝

各一兩

大黃

地丁

金銀花

各半兩

右除朴硝外為細末後入硝和勻每服三錢水

一盞半姜三片薄荷三葉煎至七分空心溫服

利下惡物止藥

○取疔腫方

青木香根

錢五

木香

雄黃

醫學正傳入卷之六

九十五

疔瘡五虎

甘草各一錢

右為末湯調下以利去毒氣四五行即愈

○破毒散

信石

礪砂

黃丹

雄黃

乳香

各一字

班貓

五箇去翅足炒

射香

少許

右為末取新蟾酥和丸如菉豆大以鍍針破開

疔頭納藥一丸在內外以膏藥護之如無蟾酥

加麝糊些少

○灸法以大蒜爛搗成膏塗於四圍瘡頂以艾炷

灸之以爆為度如不爆稍難愈宜多灸百餘壯

無不愈者

○祖傳經驗秘方治食災牛馬肉成疔腫欲死者以

柏油木葉搗絞取真汁一二碗頓服之得大瀉

毒氣而愈如冬月無葉時取嫩根研水服之亦

效未利再服以利為度

諸瘡方法

○活魂丹治一切惡瘡大有神效

醫學正傳入卷之六

九十六

卯

血竭

乳香

沒藥

銅綠

枯白礬

黃丹

穿山甲

煨胖錢

輕粉

蟾酥各五分

射香

少許

右為細末用蝸牛搗膏為丸如菉豆大每服一

丸重者二丸又用葱白一寸嚼爛裹藥熱酒送

下食前服

○又方用真姜蚕蟬蛻二味等分為末香油調付拔

疔効

○治諸般惡瘡

經霜芭蕉葉為末香油調付先用忍冬藤葱椒
蒼耳草煎湯洗瘡淨拖乾付藥外以油紙掩之

○又方治諸般惡瘡用松木上白泥黃丹各等分炒
黑香油調付用油紙夾上日易後用龍骨沒藥
飲瘡口收肉

○又方治惡瘡用黃丹入香油煎入朴硝抹之

○天泡瘡服防風通聖散及用蚯蚓糞炒蜜調付之
從肚皮上起者乘熱發外還用通聖散藥妙

○又方治天泡瘡用野菊花棗木根煎湯洗黃柏滑
石末付

○治脚上沙瘡清水出者用紫燕窠泥畧炒黃柏二

珠璣為末香油調付
○治腫瘡用白膠香一兩黃柏石脂各一兩青代五錢龍骨半錢為末香油調

○治腫瘡方以香油一兩入胎髮如梅大煎焦燂去

粗入白膠香黃蠟各一兩燂化入生龍骨赤石

脂血竭炒各一兩攪勻候冷磁器盛捏作薄片

貼瘡上外以竹箬包之三日後番過藥再貼以

活血藥煎湯洗之

○又治腫瘡方用箭箬剪去兩頭以黃柏煮汁令調

和白膠香草麻子同搗成膏攤箬糙面折縛光
面貼之先以清茶放溫洗拖乾貼之

○又方治外腫脚瘡用竈心黃土研極細入黃柏赤
石脂黃丹各半兩輕粉乳香沒藥各一錢細研

和勻以清油調如膏以油絹攤藥將絹面貼於
瘡上外以油紙掩之札縛定縱痒不可開視數

日後未愈再換藥緊縛直待結痂去藥先必以
茶清洗瘡淨付藥

○桃花散治一切瘡生肌藥

白芨 白欬 黃柏

黃連 乳香 射香

黃丹 各等分

右為細末搽於瘡上二三日生肌平滿如故

○治火燒及湯泡瘡用經霜桑葉焙乾燒存性為細

末香油調付或乾付二三日結痂平復

○又方治火燒湯泡瘡時取黃蜀葵花以香油浸之
其花日漸燂於油中以此油付瘡即愈

花燭乾為末香油調付亦妙

○下疳瘡用青代海蛤粉蜜陀僧黃連為末付之

○又方以雞內金燒存性為末付之

○又方治下疳瘡用鳳凰退燒存性研極細香油調付外看瘡大小剪亮中白膜貼之須靜坐一日不動即結痂矣

○頭瘡用猪油二錢半生雄黃水銀各二錢五分和勻付之

○金絲瘡其狀如繩線巨細不一上下行至心即死可於瘡頭上截經刺之以出血後罨澤草根付之立愈

○手瘡瘡用皂角枯礬粉黃連黃柏為末付之

○砂瘡用搗地藤燒灰付之

○諸瘡痛不可忍者用苦寒藥可施於資稟厚者若稟氣薄者宜於楠中益氣湯中加苦寒藥也若血熱之人瘡痛宜四物湯加黃芩鼠粘子連翹在下加黃柏若肥人濕熱瘡痛宜防風羌活獨活白芷蓋風能勝濕故也

○疥瘡併馬疥瘡用馬鞭草不犯鐵器搗取自然汁

半盞飲盡十日內愈神効

○白廐風癬以小麥麴石上以鐵器燒紅壓出油搽之立效

○治風癬疥瘡用梓樹葉木綿子鷄羊屎鼠屎盒漚付之

○治癬瘡用浮萍末一兩蒼耳子蒼木各二兩苦參一兩半香附二錢半黃芩五錢水煎洗之

○身上虛痒用四物湯加黃芩煎調浮萍末一錢服○又方治通身痒用凌霄花為末酒調服一錢○秘傳一擦光治疥瘡及婦人陰蝕瘡漆瘡天火丹諸般惡瘡神效

蛇床子 苦參 蕪荑 各一兩

雄黃 半兩 枯凡 二兩 硫黃 五錢

輕粉 二錢 樟腦 二錢 大風子 五錢

川椒 五錢

右為細末生猪油調付

○又方治証如前燕小兒癩頭瘡治之

蛇床子 一兩	雄黃 五錢	硫黃 一兩
枯凡 二兩	大楓子 半兩	川椒 半兩
黃柏 一兩	輕粉 二兩	牛皮片 半兩
如無以香炒	黃丹 一兩	煙片也
右為細末生豬油調付		
○凡先哲治癰疽要方俱採摭于後以備選用		
○五香連翹湯治癰疽未成膿者服之可散但當看時令及資稟加減用之		
乳香	木香	沉香
丁香	連翹	射干
升麻	木通	桑寄生
射香	獨活	大黃 各等分
右細切每服三錢水一大盞煎七分去粗溫服		
○內托復煎散托裏健胃		
地骨皮	黃芩	茯苓
芍藥	人參	黃芪
白朮	桂心	甘草
防已	當歸 各半兩	防風 一兩

蒼朮 半斤		
右細切先以蒼朮用水五升煎至三升去木入		
前十二味再煎至三四盞取清汁作三四次終		
日飲之又煎蒼朮如前再煎諸藥相服之		
○白芷升麻湯治手陽明經分臂上生癰左右寸部		
脈皆短促之俱弦按之洪緩有力此得之八風		
之變者		
白芷 一錢半	升麻	桔梗 各一錢
甘草 各半錢	黃芪 四錢	酒黃芩 四錢
生黃芩 三錢	紅花 五分	
右細切分二服水酒各一盞煎至一盞溫服		
○托裏散治一切惡瘍發背疔腫便毒始發脈洪數		
弦實腫甚將作膿者三服消盡		
大黃	牡蠣	瓜蒌根
皂角刺	朴硝	連翹 各八分
金銀花	當歸 各二錢	赤芍藥
黃芩 各四分		
右細切作一服水酒各一盞煎至一盞四分服		

○又托裏散

黃芪

當歸

金銀花

甘草各等分

右細切每服一兩酒水合煎更詳部位各加引

經藥尤妙

○烏金散治癰疽疔腫時毒附骨疽諸惡瘡等証若

瘡黑陷如石堅四肢冷脉細或時昏冒譫語循

衣煩渴危篤服此汗之即落起

蒼耳頭五月五日午時收

草烏頭

醫學正傳卷之六

火麻頭秋上

木賊去節

蝦蟆頭

梓皮節酥炙

麻黃去根

右晒乾各等分同入磁器內鹽泥固濟烈火煨

從早至申時如黑煤色為度研為末每服二錢

病重者三錢熱酒調下朱汗再進一服如汗已

乾却服解毒疎利之藥如脩合此藥必選天時

清明好日於靜室中合勿令雞犬猫畜及陰人

孝子見之

○黃芪六一湯治癰疽發渴

黃芪六兩

甘草一兩

甘草一兩

右細切水煎不拘時服

○一方治一切瘡癰疽疔發背殊効亦能下瘀血

大黃三錢

甘草

辰砂

血竭各一錢

右為細末酒調服

○內托護心散

乳香一兩

真桑葉粉

四兩一方用二兩

右為細末每服二三錢煎甘草湯或新汲水調

醫學正傳卷之六

下

○小五香湯

木香

沉香

乳香

藿香

連翹各二錢

射香少許

右為細末每服二錢水一盞煎七分溫服

復元通氣散

當歸

穿山甲煨脫

川芎

天花粉炒各

青皮

陳皮各一兩

大黃

甘草

黑丑頭末各

右為細末每服二錢溫酒調

○金銀白芷散

黃芪

當歸 各一錢

枳榔

川芎

各五分

甘草 一錢

天花粉 五分

乳香

沒藥 各三分

皂角刺 去火炒

金銀花

各一錢半

防風 三分

白芷 一錢

右為細末分三服每服水酒各半盞煎連粗服

○正鉄箍散

貝母

各二兩

白芷

蒼耳草灰

醋拌

或加龍骨二錢尤妙

○大鉄箍散

右為細末水調或香油調貼瘡上

○大鉄箍散

芙蓉

猪卷皮

木鱉子 各四兩

白芷

黃柏

寒水石 各二兩

大黃

紫荊皮 各一兩

赤荳

白欬

各二兩

白芨 一兩

防風 半兩

貝母

二兩

真地青

羌活 各一兩

右為細末凉水調圍攤四畔如肉脆去白芨白

欬加生地黃地榆用芭焦油調付熱甚者用三

消散

○三消散退極熱証赤腫炊開者

朴硝

礞硝

大黃

梔子 炒黑色

寒水石

南星 各半分

右為末生地黃汁調塗貼芙蓉葉汁調亦可

○雲母膏治一切癰疽瘡癤折傷等証

蜀椒

去目及開口者畧炒

白芷

沒藥

赤芍藥

肉桂

當歸

鹽花

菖蒲

麒麟竭

○三消散

卷之六

一百六

大

黃芪

白芨

芎藭

水香

龍胆草

白欬

防風

厚朴

射香

桔梗

柴胡

松脂

人參

蒼朮

黃芩

乳香

附子

茯苓

良姜

合歡皮 各五錢

硝石

甘草

雲母 各四兩

柏葉

桑白皮

槐枝

柳枝

水銀

以錫另包待膏成以手細彈在上名養膏

陳皮

各二兩

清油

四十兩

黃丹

二十兩

右除雲母硝石麒麟竭乳香沒藥射香黃丹益

花八味另研外餘藥並細切入油浸七日文火

煎以柳枝不住手攪候匝沸乃下火沸定又上

火如此者三次以藥黑色為度去粗再熬後入

丹與八味末仍不住手以槐柳枝攪滴水中成

珠不軟不硬為度磁器收貯候溫將水銀彈上

用時先刮去水銀或服或貼隨宜用之其功甚

大也

○太乙膏治一切癰疽瘡癤貼之神效亦可內服須

詳証經絡作湯使送下

玄參

白芷

當歸

肉桂

大黃

赤芍藥

生地黄

各一兩

黃丹

真麻油

二斤

右細切入油浸夏三日冬十日春秋七日文火

煎黑色去粗入黃丹再熬以槐柳枝不住手攪

滴水中成珠不軟不硬磁器收貯

神異膏治諸般癰腫癰毒殊效

露蜂房

有蜂兒多者佳一兩

玄參

半兩

黃芪

七錢半

金蛇退

半兩用水盪洗淨研乾

杏仁

一兩去

黃丹

五兩飛

香油

十兩

亂髮

如雞子大一塊無病少年男子者佳皂水

右先將香油入亂髮於銚中文火熬候髮焦煇

盡以杏仁投入候杏仁黑色用真綿瀝出粗再

將油入銚內然後下黃芪玄參二味文火熬一

二時久住火候片時火力稍息旋入露蜂房蛇

退二味以柳枝不住手攪慢火熬至紫黑色又

再用綿瀝過去粗入爐中文火熬下丹急攪

千餘轉滴水中成珠子膏即成矣冬月暑嫩步

夏月暑硬步磁器盛貯隨意難貼

○萬槌青雲膏治諸般癰腫未成膿者貼散已成膿

者按毒追膿腹中痞塊上瘡疾貼大椎及身柱

其效如神

白松香

一斤去

革麻子

三百粒

杏仁

三百粒去

銅青

三兩

乳香

一兩半

沒藥

一兩半

輕粉二錢

右共作一處用鉄槌木砧於日中搗成膏如燥少加香油杵之或用石臼木杵搗亦可用磁器盛緋帛攤貼湯中燉不見火

○一方治背癰附骨疽乳癰及一切癰腫未成膿者發散極效

槐花一兩炒焦色 胡桃十箇新鮮不油者連殼湯火煨熟去殼

右二味於沙盆內研爛如泥熱酒調和粗溫服如能飲酒人多飲愈效一醉後而癰腫散矣

○薤葉散治癰疽發背及一切癰毒等証效如神

薤葉草其葉長如牛舌其氣如諸臭者

小薊根 五瓜龍即五葉藤 生大蒜

右四味各等分細研用酒和勻濾去粗服一碗得大汗通身而愈

○又方治諸般癰腫神效已上並祖傳方

新掘天門冬一味約三五兩洗淨入沙盆內研細以好酒溫起濾去粗頓服未效再服一二服必愈

疔風 疔與癰通六二

內經曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癰風又曰癰者因榮衛熱腐其氣不清故使其鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客於脉而不去名曰厲風丹溪曰是受天地間殺物之風故也然近見病此者原其所由多是熱血得寒所致或夏月勞甚而入寒泉澡浴或冬月酒後而乃踢水履霜及入水取魚由是濕熱鬱于內而不散風寒

醫學正傳六 卷之六

一百一

客于外而不行內外拂鬱既久而漸成肌內之敗腐矣經所謂熱勝則肉腐是也大抵此証肺歸重於手足陽明之經蓋手足陽明者胃與大腸主之脾肺二經之府也脾三肌肉而肺主皮毛乃府及於藏病也經又曰腸胃為市無物不受無物不包故其熱毒積于中而形於外耳故治法必先取陽明而後及於太陰亦本而標之義也又濕熱其必生風風甚則生虫如腐草為螢之類又治法必先殺其虫瀉其火然後生血涼血祛風導滯

升陰皆為治之急務也治雖多門大畧不越乎此也學者詳之

脉法

脉兩寸浮而緊

或浮而洪

陽脉浮弦陰脉實大

脉浮緩者易治

洪大而數者難愈

沉實者難愈

脉溢者病在上

脉浮者病在下皆為不治之証也

丹溪曰大風病是受天地間殺物之風古人謂之

醫學正傳

卷之六

一百一十

三

七

丹溪曰大風病是受天地間殺物之風古人謂之

反風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之分在上

在下氣受之則在上血受之則在下氣血俱受

則在上復在下然皆不外乎陽明一經陽明者

胃與大腸也無物不受治之者須致意看其疔

瘡與瘡上体先見者多者在上也下体先見者

多者在下也在上者以醉仙散取涎血於齒縫

中出在下者以通天再造散取惡物虫積於穀

道中出后用防風通聖散調之更用三稜針於

委中出血夫上下同得者甚重自非醫者神手

病者鉄心罕能免此天從上或從下以漸而來

者皆是可治之證人見其病勢之緩多忽之以

法治之雖已全愈若不絕味斷慾皆不免再發

而終於不救也予治五人矣其不死者惟一婦

人因貧甚無物可食耳餘皆三四年後再發孫

真人云嘗治四五百人終無一人免於死非真

人不能治蓋無一人能守禁忌耳其婦於本病

外又服百餘貼加戒四物湯半年之上月經行

十分安愈

醫學正傳

卷之六

一百一十

七

醉仙散須量人大小虛實與之証候重而急者須

先以再造散下之候補養得完復與此藥須斷

塩醋醋諸魚椒菓煎炒燒炙等物止可淡粥及

淡煮熟時菜雖茄亦不可食惟烏稍蛇菜花蛇

淡酒熬熟食之可以助藥力也

○外科精要為諸瘡立法而不及癘風蓋風為百病

之長以其殘害膚体去死不遠一有染此鮮能

免者比之瘡瘍治法為難乃不言及夫八方之

風起因於八方應其時則物生違其時則殺物
人之稟受有殺氣者則感而受之如持虛受物
後又因起居飲食男女漸成鬱氣二氣積于厥
躬脾先受之乃為濕病濕積之久火氣出焉火
氣滋蔓氣濁血汚云血熱凝結其氣不清化生諸虫以次
傳歷臟腑必死之病而有可生之理其始病者
胃氣微傷脾主肌肉流行甚緩傳變以漸或可
藉醫藥之功而免謂之必死非惟醫不知藥悉
是不能禁慾可哀也夫

醫學正傳卷之六

百五十一

○近見粗工用藥佐以大楓子油殊不知此藥性熱
有燥痰之功而傷血至有病將愈而先失明者
○宋洞虛云大風有五黑色不治餘皆可治虫食肝
腎落食肺鼻崩食脾聲啞食心足底穿膝虛腫
食腎耳鳴啞耳弦生瘡或痒或痛如針刺狀
食身則皮痒如虫行自頭面來為順風自足起
者為逆風多因感寒熱與痰濁雜氣而成治法
先以雷公散即再造散下之以稀粥養半月勿妄動
作勞後以醉仙散中開或吐或利不必怕怯但

顯喉頭面腫吞不得下旋出惡水或齒縫中出
臭水血絲或言不得或悶而死難以飲食只以
稀粥用管灌入或一旬或半月一月而漸白而
安重者又與換肌散

○換肌散治大風年深不愈者以致眉毛脫落鼻梁

崩損服此藥不踰月取効如神

黑花蛇

白花蛇

甘肅黃米者可酒浸一宿

地龍

去土各三兩

當歸

細辛

白芷

天麻

蔓荊子

醫學正傳卷之六

百五十四

威靈仙

荊芥穗

甘菊花

苦參

紫參

沙參

木賊

不灰木

炙甘草

白茯苓

天門冬

赤芍藥

定風草

按本草即天麻也今皆用野天麻即益母草未知可否再宜審之

何首烏

石菖蒲

胡麻子

草烏頭

去皮

蒼朮

米泔浸去皮

川芎

木鱉子

各一兩

右為細末每服五錢溫酒調下酒多為妙

○醉仙散

胡麻子

牛旁子

蔓荊子

枸杞子

四味俱炒紫色

白蒺藜

苦參

瓜蒌根

防風

各五錢實見前四味各一兩

右為細末每一兩半入輕粉一錢拌勻每服一錢茶清調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫內出臭涎渾身疼痛昏悶如醉後利下膿血惡臭尿為效

○通天再造散

醫學正傳卷之六

百十五

鬱金

半兩

皂角刺

黑色者炒去尖

大黃

炮各一兩

白丑

頭末六錢半生半炒

右為末每服五錢日未出時以無灰酒調面敷服之當日必利下惡物或臭膿或虫如虫口黑色乃是多年赤色乃是近者數日後又進一服無虫積乃止

○愈風丹治癩疾手足麻木毛落眉脫遍身瘡疹及

膚癢痒爬之成瘡及一切疥癬風疾皆效

苦參

一斤研取頭末四兩

上挑蛇

一條酒浸二三日去骨

烏梢蛇

白花蛇

各一條並同上制

右為細末以皂角一斤剉長寸許段無灰酒浸一宿去酒以新水一碗搗取濃汁去粗銀石器內熬膏和前末丸如梧桐子大每服六七十丸煎防風通聖散送下粥飯壓之三日服三日浴以大汗出為應再三又浴取大汗三浴乃安浴法見後條

○一法用挑柳桑槐楮五般枝濃煎湯大缸浸坐沒

頸一日俟湯如油安矣○本草治惡疾遍身生

醫學正傳卷之六

百十六

瘡濃煎萍湯浴浸半日大效此神方也○又以

荊芥穗大黃梔子蔚金地黃杜仲防風羌活獨

活白疾藜等分為細末以大楓子油入熟蜜丸

如梧桐子大每服茶清送下四五十九一日三

服須守戒三五年日誦觀音千萬聲以攝其心

禁其慾乃安也

○一法以苦參五斤好酒三斗漬一月每服一合日

三服常與不絕覺脾既安細末服之亦良尤治

癰疹方出圖經陶隱居以酒漬飲治惡瘡久服

輕身日華子以為殺虫本草除伏熱養肝膽氣

予常以蒼耳葉為君以此物為佐更以酒煮烏

蠡魚代補養之或搗研細糊九如梧桐子大每

服五六十丸加至七八十丸熱茶清送下日三

服一二月而安若入紫萍尤捷紫萍多水蛭須

寒月於山沼取之淨洗去泥畧蒸透乾用

○一法治手指彎曲節間痛甚漸至斬落用草麻子

去殼黃連剉如豌豆大各一兩水一升小瓶浸

春夏三三秋冬五日取草麻子破平旦時面東

以浸藥水服一粒漸加至四五粒微利不妨忌

猪肉魚腥宜茹淡累獲神效

○一法先服加減通聖散大瀉惡毒穢積又用三稜

針着肉黑處及委中紫脉刺出死血不可令出

太過恐損真氣後服神仙紫花九

防風五錢連翹三錢川芎五錢

白芍藥三錢當歸三錢薄荷二錢

荊芥穗五錢麻黃三錢梔子三錢

桔梗五錢枳殼五錢石膏各五錢

甘草三錢滑石三錢黃芩三錢

紫胡五錢黃連五錢黃柏三錢

生地黃三錢菟活五錢熟地黃三錢

錦大黃六兩芒硝一兩皂角刺一兩

右細切分八服每服用水一碗半煎至一碗空

心服日進二服五六日後又進二服待補養完

又行二次然後服後九藥

○神仙紫花九治癰風及諸般惡瘡風瘡其效如神

但要藥真無有不效者輕者一料可愈重者二

三料除根

白花蛇一具出蕪黃州黑質白皎龍頭虎口背

新鮮者佳二十四箇方勝一箇尾一箇各四寸并

何首烏一錢荊芥穗一錢藏靈仙各四錢

麻黃一錢胡麻子一錢蛇床子二錢

右六味細切同蛇用無灰酒一大碗浸一宿去

蛇皮骨通晒乾仍還原酒內再浸再晒酒盡為

度待晒極乾共為細末另包

水香各二錢沉香各二錢人參一兩

當歸 七錢半 胡天麻

猪牙皂角 各五錢

射香 一錢半 重者倍之

乳香

沒藥 各一錢 明雄黃

辰砂 各五分 大塊者佳

肉苳蔻 一枚

定風草 二錢半 即天麻 還瞳子 即草决明 一兩

右射至辰砂五味各另研極細不見火其餘草

木味亦另研細羅過連前五味和勻另包

防風 去芦

羌活 甘草

細辛

川芎 獨活

蒼朮 米泔浸

批把葉 去毛筋 炙干 白芍藥

白蒺藜

金銀花 五加皮

香白芷

苦參 各五錢 胡麻子

白附子 米泔浸

麻黃 川牛膝

草烏頭 米泔浸

川烏 米泔浸 炒 石菖蒲 各二錢半

右為細末另包

搃合法治用大風子三斤 新鮮者佳 去油黃以磁色者不堪用 去殼

確一箇盛之少入無灰酒以皮紙竹箬重重包

口勿令泄氣槌滾湯中勿令沒確口外以物蓋

鍋口密封固文武火熬候黑爛為度杵無渣滓

炭油分作三分每一分入第二號藥八錢

一號藥六錢重第三號藥一兩五錢重和勻

糯米飯搗極膠粘如梧桐子大晒乾勿見火每

服二十九漸加至五六十雞鳴時午時臨卧

時各一服茶清送下忌房勞鹹酸酒醋糟滷猪

羊雞馬驢肉魚腥煎燂水菓五辛姜椒大料辛

辣熱物蕎麥葷宜之類若不忍口斷慾則藥無

功雖愈再發其餘肉味病愈後一年可食但猪

羊雞肉終身用忌此法乃治癩之神方也不可

輕忽

跌傷方法

○治跌撲損傷用蘇木以活血黃連以降火白朮以

和中童便煎為妙在下者可下瘀血但先須補

托在上者宜飲韭汁或和粥吃切不可飲冷水

盖血得寒則凝但一絲血入心即死

○骨損者用古文錢五分醋浸乳香沒藥各一錢酒

研服或用接骨散

○元戎接骨丹

沒藥

乳香

當歸

川椒

自然銅

火煨

赤芍藥

骨碎補

酒炙

敗龜板

醋炙

虎脰骨

酥炙

白芷

千金藤

即郁李仁已上各等分

右為細末化蠟五錢九如彈子大每服一丸好

酒半升化開煎用向東南柳枝攪散熱服○一

方加龍骨川芎

○凡治損傷妙在補氣血俗工不知惟在速効多用

自然銅以接骨然此藥必煅煉方可服新出火

醫學正傳卷之六

一百廿一

者其火毒與金毒相扇挾香熱藥毒雖有接骨

之功其燥散之禍甚於刀劍戒之戒之

○治金瘡急以石灰厚傳裹之如瘡深不宜速合者

加滑石末付之

○又方老杉木皮為末付之

○凡跌撲損傷腹痛者知有瘀血用桃仁承氣湯加

蘇木紅花下之

○當歸導滯湯治跌撲損傷瘀滯不行等証

大黃

當歸

在上用頭在中用身在下用尾通身痛者全用酒浸

洗焙乾

右細切等分每服一兩重煎服

○雞鳴散治從高墜下及水石所壓一切損傷瘀血

凝積痛不可忍並以此藥推陳致新

大黃

一兩

杏仁

二十一粒去皮尖另研

右研為末酒大碗煎七分濾去粗雞鳴時服至

曉必取下瘀血即愈

愚按此方用杏仁而不用桃仁者蓋因乃血入氣分

改用杏仁以行氣中之血矣

○沒藥乳香散治跌撲損傷痛不可忍

醫學正傳卷之六

一百廿二

白木

炒五兩

當歸

焙

甘草

白芷

沒藥

另研各一兩半

肉桂

去塵皮

乳香

另研各一兩

右為末和勻再研極細每服二錢溫酒調下

○杖瘡膏藥方治受杖責後如死血癰腫宜先刺出

惡血然後以此膏貼之三四日平復或早失調

理成癰者貼之即散及治諸般癰疽瘡癰毒已

潰未潰貼之無不神效

甘草

肉桂

蛇蛻

蟬蛻	露蜂房	連翹
白芷	白芨	白欒
白木	蒼木	人參
玄參	苦參	芍藥
南星	升麻	厚朴
拖子	百合	金銀花
天花粉	川歸	川芎
穿山甲 <small>炒用另末</small>	羌活	獨活
黃連	黃芩	黃柏
大黃	生地黃	紅花
蘇木	柴胡	鱉甲 <small>酥炙為末</small>
青木香	何首烏	防風
荊芥穗	藿香	雲母石
花蘆石 <small>各一兩</small>	亂髮 <small>壯年無病男子者一塊</small>	乾蟾 <small>一隻即風雞</small>
鳳凰胎 <small>一隻即殼中不轉頭雞黃也陰干用</small>	桃柳桑枝 <small>各五莖</small>	
右各細切用香油六斤重浸藥三五日入鍋內熬色去粗入黃州三斤別用桃柳枝不住手攪膏成候溫入後藥末		

乳香	沒藥	龍骨 <small>各一兩</small>
輕粉	血竭 <small>一兩</small>	射香 <small>二錢</small>
右攪勻磁器收貯臨期看瘡大小攤貼		
○沒藥散治刀箭傷止血止痛		
定粉	風化石灰 <small>各一兩</small>	枯白礬 <small>二錢另研</small>
乳香 <small>五分另研</small>	沒藥 <small>五分另研</small>	
右各研為細末同和勻再研乾糝之		
破傷風 <small>六十一</small>		
論		
<p>醫學正傳卷之六 一百四</p> <p>內經曰風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風奇毒而弗能為害也若夫破傷風証因事擊破皮肉往往視為尋常殊不知風邪乘虛而客襲之漸而變為惡候又諸瘡不合口風邪亦能內襲或用湯淋洗或着艾焚灸其湯火之毒氣亦與破傷風邪無異其為証也皆能傳播經絡燒爍真氣是以寒熱間作甚則口噤目斜身軀強直如角弓反張之狀死在旦夕誠可哀憫治之之法當同傷寒邊治因其有在表在裏半表半裏三者之不同</p>		

故不離乎汗下和三法也是故在表汗之在裏者下之在表裏之間者宜和解之又不可過其法也間閭野人多不識此証殺人之易早不求鑒治療而袖手待斃衰哉

脉法

表脉浮而無力太陽也 脉長有力陽明也

脉浮而弦小者少陽也

河間曰太陽宜汗陽明宜下少陽宜和解若能明此

三法而治不中病者未之有也愚按河間先生論破傷風脉症詳明

醫學正傳卷之六 百廿五
甚矣何其但云三陽而不及三陰蓋風邪在於三陽之經便宜按法早治而愈若得傳入三陰其証已危或腹滿自利口燥咽乾舌卷外縮皆無可生之証故置而弗論也

方法

丹溪曰破傷風同傷寒壞証治看有何經而用本經藥驅逐之誤則殺人劉河間有法有方宜選而用之

○羌活防風湯治破傷風邪初傳在表

羌活 防風 川芎

藁本 當歸 芍藥 各一錢

甘草 地榆 細辛 各五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗熱服不拘時候量緊慢加減用之熱則加大黃一錢大便秘只加大黃五分緩緩令通

○白朮防風湯若服前藥太過令自汗者宜服此藥

白朮 一錢 防風 二錢 黃芪 一錢半

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘

時藏府和而有自汗可用此藥破傷風藏府秘

小便赤白汗不止者因服熱藥汗出不休者故

醫學正傳卷之六 百廿六
知無寒也宜速下之先用小芍黃湯二三服後

用大芍黃湯下之

○小芍黃湯

川芎 二錢 黃芩 一錢半 甘草 五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘

時候三服即止再用後藥

○大芍黃湯

川芎 一錢 羌活 黃芩

大黃 各一錢半

右細切作一服水一盞溫服宜和為度

○發表雄黃散

雄黃一錢

防風二錢

草烏一錢炮裂

右為細末每服二字溫酒調下裏和至愈可服裏末和不可服

○蜈蚣散

蜈蚣黃赤足各一條

江漂五錢即魚膠炒

左蟠龍五錢炒

右為細末每服一錢清酒調下治法依前用裏

醫學正傳

卷之六

一百廿七

東

和至愈可服但有表証不可服次當下之用蜈

蚣散四錢巴豆霜半錢飯九如葉豈大每服一

丸漸加至六七丸清酒調蜈蚣散少許送下宜

利為度內外風去可服羗活湯緩緩而治不拘

時候服之羗活湯者治半在表半在裏之藥也

○大羗活湯

羗活

菊花

麻黃

川芎

石膏煨另研

防風

前胡

黃芩

細辛

甘草

枳殼

白茯苓

蔓荊子各四分

薄荷

白芷各二分

右細切作一服入生姜五片水一盞半煎至一盞稍熱服不拘時日進二服

○防風湯治破傷風同傷寒表証未傳入裏宜服此藥

藥

防風

羗活

獨活

川芎各一錢二分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

醫學正傳

卷之六

一百廿八

大

○小蜈蚣散

蜈蚣黃赤足各一條

江漂三錢

右為細末用防風湯調下如前藥解未不已覺

轉入表當服左龍丸漸漸看大便硬軟加巴豈

霜服之

○左龍丸

左蟠龍五錢炒

白殭蚕五錢炒

江漂半兩炒

雄黃

右同為細末飯九如梧桐子大每服十五丸溫

酒下如裏証不已當於左龍丸末一半內入
宜霜半錢飯丸如梧桐子大每服一丸漸加至
以利為度若利後更服後藥若搗搦不已亦宜
服後藥羌活湯也

○小羌活湯

羌活

獨活

防風

地榆

各一錢
二分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服如有
熱加黃芩有痰加半夏若病日久氣血漸虛邪

○養血常歸地黃湯

氣入胃全在養血為度

○養血常歸地黃湯

當歸

地黃

芍藥

川芎

藁本

防風

白芷 各一錢

細辛 半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞服

○雄黃散治表藥

南星

二錢炮

半夏

五錢泡七
次去肺

天麻

五錢

雄黃 二錢半

右為細末每服一錢溫酒調下如有延控此藥
中加大黃為下藥

○地榆防風散治破傷風中風半在表半在裏頭微
汗身無汗不可發汗宜以表藥治之

地榆

防風

地丁草

馬齒莧

各等分

右為細末每服三錢溫米飲調下

○白朮湯治破傷風大汗不止筋事手足搦搦

白朮

葛根 各二錢

升麻

黃芩

各酒洗

芍藥

四錢

甘草

半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘

時候

○江鯀丸治破傷風驚而發搐藏府秘澁知病在裏

宜以此藥下之

江鯀

剉炒

半錢

野鴿糞

炒半

桂黃

一錢

白僵蚕

炒半兩

蜈蚣

黃赤足

天麻

一錢

右為細末分作三分用二分以燒飯為丸如梧

桐子大硃砂為衣用一分入巴豆霜一錢同和

亦以燒飯為丸如梧桐子大不用硃砂為衣每服以前硃砂衣九子二十凡巴苴霜丸一九第二服二九加至利為度再單服硃砂衣九子病愈止藥

○祖傳經驗秘方治初破傷風發熱紅腫風邪將欲傳播經絡而未入深者屢驗

杏仁去皮研細

羅白麩各等分

右以二味和勻用新汲水調和如膏付傷處腫消熱退

○一方治破傷風發熱用蟬蛻畧炒研細酒調一錢七服效

○安文陳珙四兄因勸閭毆肩稜骨被打破得破傷風頭面大腫發熱予適在彼家以九味羌活湯服取汗外用杏仁搗爛入白麩少許新汲水調付瘡上腫消熱退而愈後以此法治若千人皆驗

○附糊花瘡一名錦花瘡一名廣東瘡

川芎

天花粉名五

輕粉二錢

雄黃

辰砂一錢二分半

射香五分

右為細末熬餅丸如黍苴大每服八分溫酒下日三服

○一方無川芎天花粉二味亦效

醫學正傳卷之七目錄

○婦人科 上經 論 脉法 丹溪方法 凡三十

固經丸 崩漏有虛有熱 加味四物止血方

崩漏曰氣所使 婦人病宜用當歸說

帶下是濕熱為病 肥人帶下濕痰方

結痰帶下小胃丹 治白帶方 又治白帶方

治帶黃荊子方 羅先生治帶方

帶下必須斷厚味

一人頭風帶下方 四物湯為婦人衆疾摠司

東垣治帶主寒 赤白荊花治帶說

調經升陽除濕湯 凉血地黃湯

酒煮當歸丸 固真丸 烏藥湯

助陽湯 丁香膠艾湯 火府丹

黃芪當歸人參湯 當歸芍藥湯

柴胡調經湯 益胃升陽湯

升陽舉經湯 當歸附子湯 調經補真湯

柴胡丁香湯 延胡苦練湯 桂附湯

人參補氣湯 黃芪白朮湯 增味四物湯

補經固真湯 溫胃補血湯 立効散

四聖散 溫經除濕湯 桃仁散

通經下取方 通經丸 膠艾湯

加減四物湯 元戎加味四物湯

香附一物丸 艾附丸 地黃通經丸

益母丸 苦練丸 丹溪香套

祖傳通經方 又月經不通方

祖傳血崩方 又補傳血崩方

已試鑒驗一條

○婦人科 胎前 論 附期嗣法 脉法

丹溪方法 凡三 固胎飲 安胎飲

安胎丸 又丹溪方法 凡三

懷娠嗜物說 胎動說 胎漏方

又胎漏方 又胎漏方 胎漏方

又胎漏方 又胎漏方 胎漏方

又胎漏方 又胎漏方 胎漏方

心腹諸痛方 又妊娠心腹疼痛方

小腹痛方 又妊娠小腹痛方

妊娠腰脚腫痛方 胎腫方 惡阻方

半夏茯苓湯 孕婦嘔吐鑒按 參橘散

小膠艾湯	又膠艾湯	娠下血不止方
娠下血如月信來方	胎孕無故下血方	
胎動衝心煩悶方	娠因舉重仆跌方	
娠遺尿失禁方	子煩方	
治子煩犀角散	治子煩當歸飲	
治子煩竹瀝湯	產寶澤瀉散	張仲景方法
木通散	金生白朮散	鯉魚湯
紫蘇飲	天仙藤散	安榮散
地膚子湯	治子淋方	冬葵子散
車前散	忘憂散	葛根湯
防己湯	消風散	天門冬飲
百合散	緩息丹	八味丸
丹溪參朮飲	丹溪轉胞論	安胎散
如聖散	加味四物湯	苧根湯
桑寄生散	羚羊角散	歸京節命散
白扁豆散	芎藭補中湯	當歸芍藥湯
芎朮香連丸	娠泄瀉方	芎蘇散
升麻六物湯	娠傷寒體痛方	

傷寒安胎方	又娠傷寒方	催生散
娠咳嗽方	娠嗽紅痰方	
小產下血不止方	小產後心腹痛方	
安榮湯	兒在腹中叫哭方	
又治鳴胎方	丹溪東胎丸	丹溪達生散
臨月養胎方	催生散	紅莧馬齒嚙胎說
難產多是氣血虛說	難產多見於安逸說	
金匱當歸散	金液丸	催生鉛丹
如神丹	如聖散	香桂散
來麤散	霹靂奪命丹	無憂散
催生奪命如神丹	芎歸湯	奪命丹
黑龍丹	胞衣不下方	枳殼散
藥石禁	飲食禁忌篇	臨產須知九條
難產說	灸難產法	橫倒產方
又治橫生方	又橫逆不順方	礙產說
兒身向未順說	治盤腸產法	子死腹中方
下死胎牛膝丸	子死腹中不出方	
又治子死腹中	生子下血過多方	

祖傳經

祖傳治胞衣不下三退黃

丹溪方法
條凡一十

新產不可用芍藥

產後泄瀉方

產婦損破尿脬

當歸黃芪湯

抵聖散

當歸散

四物一黃散

調經散

琥珀散

調中湯

羊肉湯

熟乾地黄丸

旋覆花湯

猪肾子飲

桃仁膏

漏芦湯

丹溪活套

新編醫學正傳卷之七



花

德

老

集

集

集

姪孫震守愚惟明校正

婦人科上月經

論內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消為息奔者死不治難經曰心出血肝納血肺出氣腎納氣蓋婦人百病皆自心生如五志之火一起則心火亦從而熾若夫經閉不通之証先因心事不足由是心血虧耗故乏血以歸肝

醫學正傳

卷七

七

七

而出納之用已竭經曰母令能子虛是以脾不磨而食亦少所謂二陽之病發心脾者此也二陽者陽明也因食少故肺金亦失所養而氣滯不行則無以滋腎陰况月經全籍腎水施化腎水既乏則經血日以乾涸以致或先或后淋瀝無時若不早治漸而至於閉塞不通甚則為癥瘕血隔勞極之証不易治也又如崩漏不止之証先因心火亢甚於是血脉泛溢以致肝實而不納血出納之道遂廢經曰子能令母實是以肝腎之相火挾心火之勢亦從

而相扇所以月水錯經妄行無時而泛溢也若不

早治漸而至於崩中不息甚則化為白濁白淫血

枯發熱勞極之証不可治矣經曰邪氣盛則實正

氣奪則虛所謂心血不足者正氣奪也心火亢甚

者邪氣盛也邪氣者相火也丹溪曰天非此火不能生物

人非此火不能有生但貴乎適中凡動必聽命乎

心君則無以上諸証大抵經閉不行與夫經漏不

止其初皆由心事不足以致月經不調早不調治

直至危篤求鑿雖妙手莫能為矣東垣經閉不行

有三論崩漏不止亦有三論學者宜參究其論以

治之不可拘泥

脈法

○脈經曰寸口脈微而濇微則衛氣不足濇則榮氣

無餘衛不足其息短其形燥血不足其形逆榮衛

俱虛言語謬妄跌陽脈微而濇濇則胃氣虛則

短氣咽燥而口苦胃氣濇則失液少陰脈微而遲

微則無精遲則陰中 濇則血不來此為居經三

月一來

○脉微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利為不可
者此為居經三月一來

○脉微弱而澁年少得此為無子中年得此為絕產

○寸口脉沉而遲沉則為水遲則為寒寒水相搏跌

陽脉伏水穀不化脾氣衰則驚澹胃氣衰則身

體腫少陽脉少陰脉細男子則小便不利婦

人則經水不通經為血不利則為水名曰水分

○寸口脉沉而數數則為出沉則為入出則為陽實

入則為陰結跌陽脉微而弦微則無胃氣弦則

不得息少陰脉沉而滑沉則為在裏滑則為實

沉滑相搏血結胞門其藏不瀉經絡不通名曰

血分○經水前斷後病水名曰血分此病難治

先病水後經斷名曰水分此病易治

○婦人帶下六極之病脉浮則為腸鳴腹滿緊則為

腹中痛數則為陰中痒痛則生瘡弦則陰戶掣

痛

○婦人帶下脉浮惡寒漏下者不治

○婦人寸口脉浮而弱浮則為虛弱則為血浮則短

氣弱則有熱而自汗出

○跌陽脉浮而滿浮則氣滿滿則有寒喜噫吞酸其

氣時下小腹則寒

○少陰脉滑而數者陰中生瘡

○少陰脉數則氣淋陰中生瘡

○少陰脉弦者白腸必挺核

○少陰脉浮而動浮則為虛動則為痛婦人則脫下

○婦人漏血下赤白日下血數升脉急疾者死遲者

生

○婦人漏下赤白不止脉小虛滑者生大緊實數者

死

○婦人疝瘕積聚脉弦急者生虛弱小者死

○少陰脉浮而緊緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮

則亡血惡寒絕產

○肥人脉細胞中有寒故令少子其色黃者胃上有

寒

○婦人月經一月再來者經來其脉欲自如常而反

微不利不汗出者其經二月必來

方法
三十三條

丹溪曰經候有枯閉不通者有不及期與過期者
有妄行者有色紫黑及淡者有成塊者有作疼者
夫經不通或因墮胎及多產傷血或因久患潮熱
消血或因久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少
進而不生血或因痢疾失血治宜生血補血除熱
調胃之劑隨証用之或因七情傷心心氣停結故
血閉而不行宜調心氣通心經使血生而經自行
矣

醫學正傳 卷七 十一

○虛中有熱月事不來以

四物湯加黃芩治之

○常過期者血少也以

芎歸丸兼瘀藥治之

○過期紫黑有塊作痛血熱也以

四物湯加香附黃連

○過期色淡挾痰者以

二陳湯加芎歸

○常不及期者血熱也以

四物湯加黃芩黃連香附肥人多兼瘀藥治之

○血枯經閉者以

四物湯加紅花桃仁

○痰多粘住血海地位因而下多者目必漸昏肥人

多有之以南星蒼朮川芎香附作丸服之

○肥人軀脂滿經閉者以

導痰湯加芎歸黃連不可服地黃泥滯故也如

用必以姜汁炒肥人少子亦由痰多脂膜閉塞

子宮不能受精而施化也宜服上藥

○瘦人子宮無血精氣不聚亦令無子以

四物湯養血養陰等藥

○經水未行臨經將來作疼者血實也一曰瘀血鬱

滯也以四物湯加桃仁香附黃連紅花或加減

胡索義朮木香有熱加柴胡黃芩

○經水行後而作疼者氣血俱虛也以八物湯加威

煎服

○夫血為氣之配因氣而行成塊者氣之凝將行而

痛者氣之滯行後作痛者氣血虛也色淡者亦

虛也而有水以混之也錯經妄行者氣之亂也
紫者氣之熱黑則熱之甚也今人悉指為風冷
而行溫熱之劑禍不旋踵

○調經散治經水或前或後或多或少或踰月不至
或一月兩來皆可服

川歸酒洗一錢 麥門冬去心二錢 吳茱萸擇去開目者湯泡七次焙乾半錢

人參去蘆一錢 半夏湯泡一錢 白芍藥一錢

川芎一錢 牡丹皮去心一錢 肉桂半錢

阿膠珠 甘草各七分

醫學正傳卷之十

右細切作一服水一盞加生三片煎至一盞

空心稍熱服

○月經過期不行宜服

當歸半錢 川芎五分 熟地黃一錢

白芍藥一錢 桃仁二十箇去尖研 紅花三分

香附米一錢 肉桂半錢 蓬莪朮一錢

甘草五分 蘇木一錢 木通八分

右細切作一服水一盞半煎至一盞空心溫服

○月經先期而來宜服

歸身半錢 川芎半錢 白芍藥八分

生地黃一錢 阿膠珠半錢 艾葉半錢

條芩一錢 甘草半錢 香附一錢

黃蘗半錢 知母半錢 黃連姜汁拌炒八分

右細切作一服水煎空心服

○經不通用馬鞭草杆汁熬膏為丸或燒存性為丸

紅花當歸煎湯送下

○固經丸治經水過多不止

黃芩 龜板 白芍藥各一兩

醫學正傳卷之十

樗根白支半錢 黃柏炒二錢 香附重便沒一宿焙乾二錢半

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九

白湯下

○崩漏有虛有熱虛則下溜熱則流通急則治其標

用白芷湯調下百草霜服或棕櫚灰或狗頭骨

燒存性或五靈脂半生半炒俱以酒調服後以

四物湯加乾姜調服之緩則治其本四物湯加

岑連參芪香附乾姜之類

○四物湯加荊芥穗條芩止血神効

○崩漏多因氣所使而下香附末一錢炒黑歸身一

錢白芍藥一錢酒炒熟地黃一錢川芎黃芪蒲

黃地榆人參各半錢白朮一錢升麻三分煎服

甚者加棕枳灰為末酒調服

○婦人血病宜用當歸若肥白人與人參黃芪同用

瘦黑人宜與生地黃香附同用

○帶下是濕熱為病白屬氣赤屬血以二陳湯加蒼

朮治濕為主氣虛入參朮血虛入芎歸

○帶下是胃中痰積沉下滲入膀胱當升之無人知

醫學正傳入卷之七

此以二陳湯加蒼朮升麻柴胡甚者上用吐

法以提其氣下用二陳加二朮仍用瓦壺子以

燥其濕痰

○肥人帶下多是濕痰海石半夏南星黃蘗蒼朮川

芎香附樗皮冬加乾姜瘦人少有此病有者是

熱以滑石樗皮川芎海石青黛丸服

○結痰帶下以小胃丹津液嚥下數九候積下後以

補藥調治

○一方治白帶

煆白皮

山茱萸

苦參

香附各伍錢

龜板酥炙

梔子各二兩

黃蘗一兩

乾姜

貝母各二錢半

白芍藥七錢半

右為細末酒糊為丸服

○又方

白芷

四兩以石灰半斤淹三宿去灰以白芷

炒焦為末清米飲調空心服之

○又方以黃荊子一味炒焦為末米飲調服上可治

心痛下可治白帶以其能燥濕痰也

醫學正傳入卷之七

十本

○羅先生治帶用十棗湯神祐丸玉燭散此法實者

可用虛者不可峻攻

○帶下必須斷厚味凡用藥寒月少加姜附臨機應

變用之

○一人上有頭風鼻涕下有白帶用南星蒼朮酒芩

辛夷川芎

黃蘗

炒焦滑石半夏牡蠣粉丸服

○四物湯乃婦人衆疾之總司也

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

右細切等分水煎服

○東垣治崩漏帶下多主於寒學者宜再思之不可

一途而論經曰陰虛陽搏謂之崩觀此可知

○東垣曰葵花白者治白帶赤者治赤帶用之果驗

○東垣調經升陽除濕湯治女子漏下惡血月事不

調或暴崩不止多下水漿之物皆曰飲食不節

勞倦所傷或素有心氣不足致令心火乘脾必

怠惰嗜卧困倦乏力氣短氣急脾主滋榮周身

者也脾胃虛而心胞乘之故漏下月水不調也

况脾胃為血氣陰陽之根蒂也當除濕去熱抑

風氣上伸以勝其濕又云火鬱則發之

當歸 酒洗 獨活 各半錢 蔓荊子 七分

防風 炙甘草 升麻

藁本 各一錢 柴胡 羌活

蒼朮 黃芪 各一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗空心溫

服少時以早飯壓之可一服而止○如灸足太

陰脾經中血海穴三七壯亦已○此藥乃從推

之法因風勝濕為胃氣下陷而氣迫於下以故

其血之暴崩也住後必須服黃芪人參炙甘草

當歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加血

藥便是也若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此

湯一服立止

○涼血地黃湯治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守

胞絡相火故血走而崩也

黃芩 荊芥穗 蔓荊子 各一分

黃蘗 知母 藁本

細辛 川芎 各二分 黃連

羌活 柴胡 升麻

防風 各三分 生地黃 當歸 各半錢

甘草 一錢 紅花 少許

右細切作一服水三大盞煎至一盞去粗空心

稍熱服

○酒煮當歸丸治癰疽白帶下疳脚氣腰以下如在

冰雪中居火炕以厚衣重蓋猶寒肌肉消瘦小

便與白帶長流而不禁固面白目青目黃無

所見身重如山行步欹側腿膝枯細大便閉澀
心下痞悶懷食不下面垢背蒸此上中下三
陽俱虛脉沉緊而澁按之空虛洪而無力尤為
中寒之証乃氣血俱虛之極也

苗香 五錢 黑附子 炮 良姜 銹七
當歸 一兩

右四味細切以好酒一升半煮至酒盡焙乾

炙甘草 苦棟 生用 丁香 各半錢

木香 赤麻 錢各一 柴胡 一錢

炒黃鹽 全蝎 各三錢 玄胡索 四錢

右與前四味同研為細末酒煮麴糊為丸如梧
桐子大每服五十九空心淡醋湯送下忌油
膩冷物及酒濕麴等

○固真丸治白帶久下不止脘腹冷痛陰中亦冷目
中溜火視物昏花齒惡熱飲但喜乾食此皆寒
濕乘於胞內肝經陰火上溢故目中溜火其惡
熱飲者陽明經中伏火也法當大瀉寒濕以此
丸治之

黃蘗 酒洗 白芍藥 各伍 柴胡
白石灰 各錢火煨 白龍骨 酒炙水飛日
當歸 酒洗各 乾姜 四錢炮

右除龍骨石灰水飛日乾另研外餘共為細末
麴糊為丸如鷄頭仁大日乾空心白湯下少時
以早飯壓之是不令熱藥犯胃也忌生冷硬物
酒濕麴

○烏藥湯治婦人血海疼痛

當歸 一錢 甘草 木香 各伍分

烏藥 一錢半 香附子 二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服
○助陽湯治白帶下陰戶中痛空心面急痛身黃皮
緩身重如山陰寒如水

生黃芩 橘紅 各伍 防風

高良姜 乾姜 郁李仁

甘草 各一錢 柴胡 一錢 白葵花

右細切分作二服水二盞煎至一盞去粗食前
稍熱服

○丁香膠艾湯治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲

食不節所得其脉兩尺俱弦緊而按之無力自

覺臍下如冰冷白帶及白滑之物多間有如屋

漏水下時或有鮮血右尺脉時或浮洪

熱地黃

白芍藥各三川

丁香各四分

阿膠珠六分生艾葉一錢

當歸一錢二分

右以川芎地黃丁香另為細末其當歸芍藥艾

葉各細切連前共六味入水五大盞煎至一盞

半去粗入阿膠再上火煎至一大盞稍熱空心

服

○水府丹治婦人久虛積冷經候不行癥瘕痞塊腹

中暴痛面有黯黥黎黑羸瘦

硃砂

紙隔湯紅豆已上各桂心另為末

木香

乾姜各一兩砂仁二兩

花蕊石

煨研一班貓去頭足生地黄汁

童子尿

各一升臘月狗膽七枚

元精

三百箇去頭足拌米同炒黑色去米

右九味為細末同三汁熬為膏和丸如雞頭實

大硃砂為衣每服一九食前細嚼溫酒送下米

飲亦可

○黃芪當歸人參湯治婦人經水暴崩不止先因損

身失血自後一次縮一十日而來其後暴崩不

止蓋因其人心窄性急多驚而心氣不足及飲

食不節得之診得掌中寒脉沉細而緩帶數九

竅不利四肢無力上喘氣促口鼻氣不調脾胃

虛弱胃脫當心而痛左脇縮急當臍有動氣腹

鳴下氣大便難宜先治其本餘証可去安心定

志和脾胃益元氣補血養神以大熱劑去其寒

少加生地黄去命門相火不令四肢痿弱

黃連一分

生地黄三分炒神麴

補紅

桂枝各五分草薢各八分

黃芪

人參各一錢麻黃各一錢

當歸身

一錢半杏仁五枚另研如泥

右細切作一服水二盞半先煎麻黃令沸掠去

沫煎至二盞下諸藥同煎至一盞食前服立止

又以草豆蔻九十五丸以止胃脘客寒之痛再與肝積之藥除其病根

○當歸芍藥湯治婦人經水漏下不止其色鮮紅時值炎月先因勞役脾胃虛弱氣短氣逆自汗不止身熱悶亂不思飲食四肢困倦大便時泄後復因心氣不足經水暴下不止微覺氣下行氣逆氣短懶於語言此藥主之

柴胡二分 炙甘草 生地黃各三分

黃芪 陳皮連白 熟地黃各五分

醫學正傳 卷之七 三十三

蒼朮 米泔浸 白朮 川歸

白芍藥各一錢半

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服

○柴胡調經湯治經水不止其色鮮紅項筋急腦痛

脊骨強痛不安

炙甘草 當歸身 葛根各三分

獨活 藁本 升麻各半錢

柴胡七分 羌活 蒼朮各一錢

紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服取微汗立止

○益胃升陽湯治婦人經候凝結黑血成塊左脘有血瘀水泄不止食有時不化後血塊暴下并水泄俱作是前後二陰有形血脫竭於下既久經候猶不調水泄日三四行食罷煩心飲食減少形瘦弱血脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先務蓋甘能生血陽生陰長之理也人身以穀氣為寶故先理胃氣為要

醫學正傳 卷之七 三十四

柴胡 升麻 各五分 炙甘草

當歸身 酒洗 陳皮 各一錢 人參 有熱不用

炒神麴 各二錢 黃芪 一錢半 白朮 二錢

生黃芩 二分

右細切作一服水二大盞煎至一盞去粗熟服

如腹中痛加白芍藥三分中桂少許○如渴或

口乾加葛根三分不拘時服

○升陽舉經湯治經水不止右尺脉按之空虛是氣

血俱脫大寒之証輕手其脉數疾舉指弦緊或															
澁皆陽脫之証陰火亦亡見熱証於口鼻眼或															
渴此皆陰燥陽欲先去也當溫之舉之升之浮															
之燥之此法乃大升浮血氣補命門之下脫															
肉桂	要月	不用	白芍藥	各二分	紅花	半分									
細辛	三分	人參	熟地黃												
川芎	各半分	獨活根	黑附子	炮											
炙甘草	各七分	羌活	藁本												
防風	各一錢	白朮	當歸												
黃芪	各一錢	柴胡	各一錢												
右細切作二服每服用水一大盞煎至一盞															
空心熱服															
○當歸附子湯治臍下冷痛赤白帶下															
當歸	四分	炒塩	三分	蠟稍											
升麻	各五分	甘草	炙六分	柴胡								七分			
黃蘗	炒	附子	炮	乾姜								炮			
良姜	各三分														
右細切作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱服															

或為細末酒麪糊為丸亦可																									
○調經補真湯冬後一月微有地泥水泮其白帶下																									
陰戶中寒一服立止																									
獨活	乾姜	炮	藁本																						
防風	蒼朮	各二分	麻黃	不去節																					
炙甘草	人參	去片	當歸身																						
白朮	生黃芩	升麻	各五分																						
黃芪	七分	良姜	澤瀉																						
羌活	各一錢	柴胡	四分	杏仁	二枚																				
桂枝	少許	白葵花	七朵																						
右細切作一服除黃芩麻黃另外先以水三盞																									
煎麻黃一味令沸掠去沫入餘藥同煎至二盞																									
再入生黃芩煎至一盞空心服之候一時許可																									
食早飯																									
○柴胡丁香湯治婦人年三十歲左右臨經先腰臍																									
痛甚則腹中亦痛經縮三二日																									
生地黃	五分	丁香	四分	當歸身																					
防風	羌活	各一錢	柴胡	二錢	二分																				

全蝎 一钱

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食前稍

熱服之

○延胡苦楝湯治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

黃蘗一分 延胡索 苦楝子各二分

附子 肉桂各三分炙甘草五分

熟地黃一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服

○桂附湯治白帶腥臭多悲不樂大寒証

黃蘗為引用 知母各五分肉桂五分

附子 炮三錢

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服○

如少食即飽腹中滿悶加白芍藥半錢○如不

思飲食加五味子二十箇○如煩惱面上如虫

行乃胃中元氣極虛加黃芪一錢半人參七分

炙甘草升麻各半錢

○人參補氣湯治四肢懶倦自汗無力

丁香末二分 生甘草 炙甘草各三分

生地黃 白芍藥各半 熟地黃六分

人參去芦 防風去芦 羌活

黃蘗 知母 當歸身

升麻各七分 柴胡一錢 黃芪一錢半

全蝎 五味子二十箇

右細切作一服水二大盞煎至一盞空心稍熱

服

○黃芪白朮湯治婦人四肢沉重自汗上至頭頭惡

風頭痛躁熱

細辛二分 吳茱萸 川芎各三分

柴胡 升麻各四分 當歸身六分

黃蘗酒炒 炙甘草 羌活各八分

五味子一錢 白朮 人參各一錢半

黃芪二錢半

右細切作一服水二大盞生薑五片煎至一盞

去粗食前稍熱服

○增味四物湯治婦人血積血癥

當歸 川芎 白芍藥

當歸 川芎 白芍藥

熟地黃

京三稜

乾漆

炒烟灰另石

肉桂去粗皮

廣茂各等分

右細切每服五錢水二大盞煎至一盞去粗空
心溫服

○補經固真湯治婦人白帶下流不止其心胞尺脉

微細蓋始病血崩久則血少復亡其陽故白滑

之物下流不止所謂崩中日久為白帶也乃本

經血海枯竭津液復亡不能榮養筋骨以本部

行經藥為引用以大辛甘油膩之藥潤乾枯而

醫學正傳六

卷之七

二十九

滋津液以大辛熱之藥補其陽道生其血脉以

苦寒之藥泄其肺而救上熱傷氣以人參補之

以微苦溫之藥

為佐而益元氣

白蒺藜

研爛四分

陳皮

五分

不生黃芩

細研另入

柏李仁

研如泥

甘草炙

柴胡

各一錢

乾姜

細末

人參二錢

右細切除黃芩外以水三盞煎至一盞半入黃

芩同煎至一盞去粗空心熱服少時以早飯壓

之

○溫胃補血湯治婦人耳鳴鼻不聞香臭口不知教

味胃氣不快四肢困倦行步欹側髮脫落食不

下膝冷陰汗帶下喉中吟吟不得卧口燥咽乾

太息頭不可以回顧項筋緊急脊骨強痛頭旋

眼黑頭痛噴嚏

生地黄

白朮

藿香

黃蘗

各二分

牡丹皮

蒼朮

王瓜根

陳皮

吳茱萸各三分

醫學正傳六

卷之七

三十

當歸身

四分

柴胡

人參

炙甘草

地骨皮

各五分

升麻

生甘草各六分

黃芪一錢

丁香一箇

桃仁三箇

白葵花

右細切作一服水二大盞煎至一盞食前熱服

○立効散治婦人血崩不止

當歸

蓮花心

白綿子

紅花

茅花已上各一兩

右剉如豆大白紙包裹泥固火煨存性為細末

每服三錢○如乾血氣研血竭為引溫酒調服
或加輕粉半錢如血崩甚不止加麝香為引溫
酒調服

○四聖散治婦人赤白帶下

川烏

生白礬錢各一紅娘子三箇

斑貓十箇

右為細末煉蜜為丸如皂子大綿裹塞陰戶中

○溫經除濕湯治婦人值冬月四肢無力乃痿厥濕

熱在下焦也醋心者是濁氣不下降欲為中滿

醫學正傳

卷之七

十一

也合服麻木作者陽道不行也惡風寒者上焦

之分皮膚中氣不行也開目不麻者陽道少行

而陰寒之氣暫退也頭旋目眩者風氣下陷於

血分不得伸越而作也近火則有之

黃連二分

柴胡 草豆蔻

神麴炒

木香各三分麻黃不去根節

獨活

當歸身 黃蘗

升麻

羌活各半錢炙甘草

人參

白朮

猪苓

澤瀉各七分 黃芪 陳皮

蒼朮各一錢 白芍藥一錢半

右細切作一服水二大盞煎至一盞食遠服治

肢節疼痛無力之聖藥也

○桃仁散治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來

狀如瀉水虛弱不進飲食腹中堅痛不可行動

月水或前或後或經月不來身體沉重惟欲眠

卧多思酸物

桃仁去皮尖 甘草炙 半夏各三分

醫學正傳

卷之七

十一

赤芍藥 生地黃錢各一 澤蘭葉

川牛膝 當歸 桂心

牡丹皮 人參 蒲黃

川芎各七分

右細切作一服加生薑三片水二盞煎至一盞

空心溫服

○通經下取方曾經試驗神効

海蛤粉半兩 苦葶蘆 牙皂各二錢半

巴豆暴去油 天花粉 苦丁香

紅娘子各一錢 麝香少許

右為細末每川一錢慈涎同搗為丸薄綿裹以

五寸竹管納陰戶中候熱時先通黃水次則經行

○通經丸治婦人室女月經不通或成血癥疼痛

桂心 青皮 大黃酒浸紙裹煨

川椒 莪朮 乾姜

川烏炮去皮 乾漆碎之炒 當歸

桃仁去皮尖炒研如泥各等分

醫學正傳卷之七

右為細末將四分之一以米醋熬成膏和餘藥

末成劑白中杵汁勻丸如梧桐子大每服二十

丸空心淡醋湯下漸加至三四十丸溫酒亦可

下性畏漆者入鷄子清和藥內

膠艾湯治勞傷氣血衝任虛損月水過多淋瀝不

止

阿膠炒成珠 川芎 甘草炙各半錢

當歸 艾葉各七分 熟地黃

白芍藥各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服○

一方加地榆 黃芪見胎前門

○加減四物湯治經候微少漸致不通手足煩疼形

癯潮熱脉息微數

本方去地黃川芎加澤蘭葉三倍甘草半份如

經候過多本方去熟地黃加生地黃如經行身

熱脉數頭昏本方加柴胡黃芩如經行微少或

脹或痢四肢疼痛本方加延胡索沒藥白芷共

為末以淡醋湯調下如經候不調心腹疼痛只

醫學正傳卷之七

用芎歸二味煎服名君臣散以歸倍於芎也

○元戎加味四物湯因氣衝經脉故月事頻併臍下

多痛本方加白芍藥○如經欲行臍腹疼痛本

方加玄胡苦楝榔榔木香○如經水過多本方

加黃芩白朮○如經水疏少本方加葵花紅花

○如經水適來適斷或往來寒熱宜先服小柴

胡湯以去寒熱然後以四物湯和之或以二方

併服名柴胡四物湯

○香附一物丸治經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭

眩惡心崩漏帶下並宜治之

香附子一片去皮毛不拘多少米醋浸一日夜用瓦鍋炙令熟焙乾

右為細末醋糊為丸如梧桐子大日乾每服五

十九淡醋湯下

○艾附丸治証如前

香附子一片醋炙 艾葉四兩 當歸二兩

右為細末醋糊為丸服

○地黃通經丸治婦人經候不行結成血瘕在臍下

如覆杯

醫學正傳大 卷之七 三十五

熟地黃三兩 蜜虫炒去翅足 水蛭糯米炒去

桃仁各五十箇

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸

空心溫酒下未止加至七八十丸

○益母丸治婦人赤白帶惡露時下不止及治婦人

胎前產後及經中諸般奇病無所不療

益母草一名荒蔚子紫花方莖俗名野天麻五月採陰乾磨為細末勿犯鐵器煉蜜為

丸如彈子大每服一丸用熱酒加童便化下

或酒或童便調下此婦人之仙藥也

○苦楝丸治赤白帶下最妙

苦楝 茴香 當歸各等分

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸

空心溫酒送下

丹溪活套曰

凡婦人經候不調皆當以四物為主治○如經候

過而腹中作痛綿綿無休息者屬血虛本方倍當

歸熟地黃無氣虛者本方加人參黃芪挾寒者加

乾姜○如經候將來腹中陣陣痛乍作乍止者血

醫學正傳大 卷之七 三十六

氣實也本方用生地黃加黃連香附桃仁紅花玄

胡索牡丹皮之類○如經水常不及期而行者血

熱也本方用生地黃加黃連黃芩白芷之類○如

經水常過期而來者瘦人多應是血少本方倍當

歸熟地黃加黃芪甘草少佐以紅花菴仁泥以為

生血之引用也○肥人大槩是氣虛挾痰阻滯升

降然也本方去地黃加參芪甘草茯苓半夏陳皮

香附等藥○常過期而紫黑成塊者血熱也多作

腹痛本方用生地黃加香附黃連玄胡索五靈脂

乳香沒藥之類。○過期而血淡色者痰多血少。
本方用生地黃合二陳湯煎服。○肥盛婦人或三
二箇月一行者痰盛而軀脂閉塞經脉以導痰湯
加芳歸香附蒼白朮之類。○如經水適來適斷從
來寒熱如瘧者本方合小柴胡煎服。○如經行過
三五日腹中綿綿走痛者此血行而滯氣未盡行
也本方加木香枳殼煎服立愈。

○祖傳經驗秘方治婦人室女月經不通漸成脹滿
及治男子墜馬跌撲損傷以致瘀血停積欲成血

醫學正傳

卷之七

三十七

蟲病者悉皆治之名曰桃奴飲子

苑奴

苑樹上嫩桃乾朽不
落者冬月及正月收

兩鼠糞

即推鼠糞也
頭尖者是

玄胡索

肉桂

香附米

五灵脂

已上各
錢炒砂仁

苑仁

去皮尖另研

右各等分為細末每服三錢空心溫酒調下

○一方治月經不通只以鼠糞一合黑炒研細溫酒

調下立効

○又方治婦人血崩不止用蒼耳草燒存性好酒調

服立止或調入四物湯中亦効

一老婦人年五十三血崩久不止諸藥不効予以
橡斗蒼耳草根二物燒存性用四物湯加白芷
芫花乾姜煎湯調服其經血自此而止再不行
矣

婦人科中胎前

論

內經曰陰搏陽別謂之有子謂陰脉搏手其是為
中別有陽脉也

血氣和平陽施而陰化也蓋為人之夫婦猶天地

然天地之道陰陽和而後萬物育夫婦之道陰陽

醫學正傳

卷之七

三十八

和而後男女生是故欲求嗣者先須調其婦之經

脉經脉既調則氣血和平氣血和平則百病不生

而樂乎有子矣脉經曰診其手少陰之脉動甚者

妊子也蓋手少陰心脉也心主胞脉故也又腎為

胞門子戶尺中脉按之不絕當妊子也又曰婦人

妊娠一月之時足厥陰脉養之二月足少陽脉養

之三月手少陰脉養之四月手少陽脉養之五月

足太陰脉養之六月足陽明脉養之七月手太陰

脉養之八月手陽明脉養之九月足少陰脉養之

十月足太陽脉養之是以諸經脉各養三十日也
若夫至期常養之經虛實不調則胎孕為之不安
甚則下血而墮矣夫手足十二經氣血虧不同如
手足厥陰太陽少氣多血手足太陽明氣盛血多安胎
氣手足少陽氣多血少手足陽明氣盛血多安胎
之法宜各按月依經視其氣血虛實而調之固無
胎墮之患其或感冒風寒別生異証又宜各按法
而調治之機要曰治胎產之病當從厥陰經論之
母犯胃氣及上二焦謂之三禁不可汗不可下不
可利小便若發汗者如傷寒下早之証利大便秘者
則脉數已動于脾利小便者則內亡津液胃中枯
燥刺方之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱止
矣皆鑒者之繩墨也其為妊娠之婦早當絕去嗜
慾安養胎元性宜靜而不宜躁體宜動而不宜勞
味宜涼而不宜熱衣宜溫而不宜寒母久立母久
坐母久行母久卧又宜却去一切炙其煎燂油膩
辛辣鹹酸水菓魚鱉狐兔鴛雀之類即無胎漏胎
痛胎動下血子腫子癰等証及橫產逆生胎死腹

中之病矣丹溪曰難產之婦皆是八九箇月內不
能謹慾以致氣血虛故也傳曰古者婦人妊子寢
不側坐不欹立不蹕不食邪味割不正不食席不
正不坐目不視邪色耳不聽淫聲口不出傲言夜
則令謦誦詩道正事則生子形容端正才過人矣
古所謂胎教也妊娠之婦可不慎歟

附期嗣論

夫人欲求嗣必先視其婦之經脉調否其或未調
必以藥而調之經脉既調宜以人事副之按其法
而行之庶不失其候也訣云三十時中兩日半二
十八九君須筭落紅滿地是佳期金水過時空霍
亂七七之時枉費工樹頭樹底覓殘紅但解開花
能結子何愁丹桂不成叢此蓋婦人月經萬絕金
水纔生此時子宮正開乃受精結胎之候妙合太
和之時過此佳期則子宮閉而不受胎矣然男女
之分各有要妙存焉如月候方經一日三日五日
交會者成男二日四日六日交會者成女過此則
不孕矣又云陰血先至陽精後衝縱氣來乘血開

聚精陰外陽內則成坎卦之象而為男若陽精先入陰血後參橫氣來助精開裹血陰內陽外則成離卦之象而為女若胎成三月之內男女未分之時亦有轉女為男之術其法以鐵斧一柄置於妊婦床席之下勿令人見知更佩雄黃一二兩於妊婦身左或佩萱花亦可已上三法皆驗不可輕忽傳曰不孝有三無後為大古詩云無官一身輕有子萬事足誠哉是言也無孕者宜深思之無怠

脉法

醫學正傳卷之七

四十一

脉經曰婦人三部脉浮沉正等按之無絕者妊娠也○妊娠初時寸微小呼吸五至至三月而尺數也○脉滑疾重以手按之散者胎已三月也脉重手按之不散但疾不滑者五月也○妊娠四月脉左疾為男右疾為女俱疾為生二子○又法得太陰脉為男得太陽脉為女○又法左手沉實為男右手浮大為女左右手俱沉實為生二男左右手俱浮大為生二女○又法尺脉左偏大為男右偏大為女左右手俱大生二男

大者如○又法左右尺俱浮當作為生二男不實伏尔則女作男生左右尺俱沉當作為產二女不尔則男作女生也此男女兼形之說也

○婦人懷妊脉離經而浮設腹痛引腰脊為欲生也○又法婦人欲生其脉離經半夜覺日中即生也○懷妊六七月脉實大牢強弦緊者生沉細者死○懷妊至六七月暴下斗餘水其胎必散而墮此非特孤漿預下故也○寸口脉洪而滿洪則為氣滿則為血氣動丹田其形則溫滿在於下胎冷若冰陽氣胎活陰氣必終洪則為血者死欲別陰陽其下必疆假令陽經蓄血若杯陰為蓄血問婦人雙胎其一獨死其一獨生醫為下其死者其病則愈然後竟免軀其脉何以別之師曰寸口脉衛氣平調榮氣緩舒陽施陰化精盛有餘陰陽俱盛故知雙軀今少陰微緊血則濁凝經養不調胎則偏大少腹冷滿膠膈疼痛腰重起難此為血瘀若不早去害母失胎○婦人經自斷而有軀其脉反弦恐其後

醫學正傳卷之七

四十二

必大下不成胎也大下謂大血也

方法丹溪方注

丹溪曰婦人無子者多由血少不能攝精俗醫悉謂子宮虛冷投以辛熱之藥前熬藏府血氣沸騰禍不旋踵或服艾者不知艾性至熱入火炙則下行入藥服則上行多服則致毒咎將誰執

○瘦怯婦人子宮乾澀宜滋陰養血四物加香附黃芩之類肥盛者乃軀脂滿溢閉塞子宮宜行溫燥痰南星半夏川芎滑石防風羌活一本有蒼朮或無防風羌活

尊痰湯之類

○墮胎乃血氣虛損不能營養胎元而自墮耳猶枝枯則果落榦萎則花墜也又曰恚怒傷肝內火便動亦能墮胎猶風盪其木人折其枝也火能銷物造化自然病源乃謂風冷傷於子臟未得病情者也大抵屬虛屬熱二者又當視其輕重而治之

○一婦有胎即墮其脉左大無力重取則濡而少也以其妙年與補中氣使血自榮濃煎白朮湯調黃芩末一錢服未至三四兩得保全而生

○固胎飲

熟地黄 歸身尾 人參

白朮 川芎 陳皮各五分

甘草一分

桑樹上羊兒藤七葉圓者愚恐當作如砂結葉者即俗名疾絲也真

少加黃連黃柏入糯米五七十粒煎服血虛不

安者加阿膠珠胎氣痛者加縮砂

○安胎飲孕成之後覺胎氣不安或腹微痛或腰間

作疼或飲食不美宜服或至五六箇月常服數貼甚好

白朮 當歸 白芍藥

熟地黄各一錢 人參 川芎

條黃芩 陳皮各半錢 甘草

砂仁 紫蘇各三分

右細切作一服加生姜三片水煎服

○安胎丸

白朮 條芩 神麴炒各等分

右為細末粥丸每服五十九清米湯下蓋白朮條芩乃安胎之聖藥也

○丹溪曰天行不息所以生也而無窮荒蔚子活血行氣有補陰之妙命名益母以其行中有補也故曰胎前無滯產後無虛○條芩白朮乃安胎之聖藥俗以黃芩為寒而不用反謂溫熱藥能養胎殊不知胎孕宜清熱養血使血循經而不妄行乃能養胎黃芩必取細挺沉實者用之○縮砂安胎以其止痛行氣故也縮仁非八九箇月內不宜多用

○懷妊嗜物乃一藏之虛如愛酸物乃肝藏正能養胎而虛也

○胎動者因火逼動胎逆上作喘急用條芩香附之類

○胎漏者謂胎動而血漏下也屬血虛動火用四物湯加阿膠白朮條芩縮仁炒香附童便浸炒加

○又方治胎漏下血

條芩五錢 白朮一兩 縮仁

阿膠炒成珠各三錢

右為細末每服二錢煎艾湯調服水煎服亦可

○又方

枳殼炒 黃芩各一兩 白朮一兩

水煎食前溫服

○胎痛宜用當歸地黃湯

當歸 熟地黃各二錢

右細切水一盞半煎至一盞溫服

○心腹諸痛九姓婦偶有所傷腹痛不安或從高墜

下重物所壓觸動胎元痛不可忍及下血者甚

妙

砂仁不拘 和皮畧炒勿令十分焦黑去皮取

仁為末熱酒調服不飲酒者米飲或艾湯益湯

皆可調服如覺胎中熱其胎即安矣此方即驗

大抵妊娠不可缺此常服安胎易產

○九姓婦二三箇月忽心腹疼痛不安用

當歸三錢 阿膠炒二錢 甘草炙二錢

葱白四十

右細切分作二服每服用水二盞煎至一盞溫服

○凡妊婦四五箇月忽心腹疼痛

大棗

十四枚 或破令赤

右為末取一撮許酒調服之立愈

○治妊娠心腹大痛氣欲絕者

川芎

川歸

茯苓

厚朴各一兩

右細切作一服用水三升煎至一升分為二服

醫學正傳

卷之七

四十七

立飲而愈

○川芎散治婦素有冷氣冲心如刀刺者

川芎一錢

人參

吳茱萸各半錢

茯苓

桔梗各四分

當歸一錢

厚朴半錢

芍藥七分半

枳殼

炙甘草各二分

右細切作一服水一盞半煎至一盞稍熱服

○妊娠腰痛如折不能轉側

鹿角

半兩

續斷

右以火燒令赤酒淬再燒再淬以碎為度細末

酒調服

○治妊娠腰脚腫痛

白茯苓

白朮

甘草

炙各一錢

杏仁三錢去皮尖另研

右細切作一服水一錢半煎至一錢溫服

○治腫謂直胎或手足或頭面通身浮腫者是也屬

濕多或用山梔子一合炒為末米湯調下丸服

亦可

醫學正傳

卷之七

四十八

○惡阻乃有孕而惡心阻其飲食者是也多從痰治

用二陳湯之類○又方以白朮為丸服一曰肥人是痰

瘦人是火

○半夏茯苓湯治惡阻不食吐逆頭眩四肢怠惰煩

疼惡

寒自汗

半夏

湯泡七次生薑汁拌炒黃色

生薑各一錢

茯苓七分

熟地黃

陳皮

桔梗

旋覆花非數不

人參

芍藥

甘草

川芎各半錢

古國水煎空心服○千金方有紫蘇細辛半錢

○一婦孕兩月嘔吐頭眩盤以參朮川芎陳皮茯苓服之愈重脉弦左為甚此惡阻病必怒氣所激問之果然肝氣既逆又挾胎氣參朮之補大非所宜以茯苓湯下抑青丸二十四粒五服稍安脉畧數口苦乾食即口酸意其膈間滯氣未盡行以川芎陳皮梔子生薑湯下抑青丸十五粒而愈但口酸易飢此肝熱味以熱湯下

醫學正傳卷之七

四十九

抑青丸十粒愈後兩手脉平和而右甚弱其胎必墮此時肝氣既平可用參朮以防之服一日而胎自安

○參橘散治妊娠三月內惡阻吐逆不食或心虛煩悶

橘紅

茯苓

各一錢

麥門冬

白朮

厚朴

姜製

甘草

炙各半錢

右細切作一服加生薑三片竹茹一錢或加參一錢水一盞煎七分溫服

○小膠艾湯治妊娠婦內煩仆挫跌胎動不安或胎墮上逼心或腹痛血下

阿膠

艾葉

指迷方加秦艽

兩一

為細末川水三升煎至一升半分三服

○膠艾湯不問月數淺深安胎極妙

熟地黃

艾葉

當歸

甘草

川芎

阿膠

黃芪

各半錢

醫學正傳卷之七

五十一

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○治妊娠下血不止胎上冲心四肢厥冷悶仆欲死

阿膠

艾葉

竹茹

白砂蜜

二合

右用水二升煎至一升入蜜更煎一二沸分二

服

○治妊娠下血如月信來者若致胞乾非特損子亦

能損母

熟地黃

乾姜

炮各一兩

右為細末每服三錢一日夜三四服

○治胎孕無故下血腹痛不可忍或下黃汁如漆如
水如豆汁者

野苧根沙 金根各一兩

右用水酒各一盞煎至一盞去粗分作二服不
拘時服

○胎動沖心煩悶欲死安胎止痛

當歸酒洗 川芎 人參

阿膠炒成珠 甘草炙各一兩 葱白切一升

醫學正傳卷之七 五十一

右用水七升煎至三升分三服

○妊娠因舉重仆跌損傷胎氣不安或子死腹中

川芎一兩

右為細末每服一匙連進三服死胎即下

○治妊娠遺尿失禁

白薇 白芍藥各等分

右為細末酒調方寸匙日三服

○子煩 妊娠苦煩悶不安又曰心煩熱悶謂之子

煩

麥門冬去心 茯苓 防風

知母各一錢

右細切作一服用水二盞煎至一盞入竹瀝一

二匙服

○犀角散治子煩

犀角屑鎊 地骨皮 條芩

麥門冬 赤茯苓各一錢 甘草半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞入竹瀝一

合溫服

醫學正傳卷之七 五十二

○當歸飲治子煩

當歸一錢 川芎 阿膠珠

豆豉半 桑寄生各七分 葱白七至

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○竹瀝湯治子煩

竹瀝一合 防風 黃芩

麥門冬去心 白茯苓各一錢 白芍藥一錢半

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗入竹

瀝再數沸溫服

○產寶澤瀉散治妊娠氣壅身體腹脇浮腫喘急氣

促小便閉澀不利謂之子腫

澤瀉

桑白皮

蜜炒

枳殼

麩炒

檳榔

水通

赤茯苓

各等分

右細切每服四錢加生姜五片水一盞煎八分

溫服

○張仲景曰婦人本肌肉肥盛頭舉自滿今反羸瘦

頭舉中隆胞系子疾亦多致此病但利小便即

愈宜服腎氣丸蓋藥中有茯苓故也地黃為君

醫學

功在補胞

卷之七

五十三

利

木通散治妊娠身體浮腫四肢脹急小便不利謂

之子腫

木通

一錢

木香

一錢

訶子皮

各三分

香薷

一錢

枳殼

炒半錢

枳殼

半錢

桑白皮

一錢

條苓

半錢

紫蘇莖葉

一錢

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一

盞溫服

○金生白木散治妊娠面目虛浮肢體腫脹名曰子

腫

腫

白朮

一兩

生薑皮

大腹皮

陳皮

茯苓

各半兩

指迷方用茯苓皮多桑白皮無朮

右為細末每服二錢米飲調下

○鯉魚湯治妊娠腹脹滿或通身浮腫小便不利或

胎死腹中此方甚驗

當歸

白芍藥

各一錢

白茯苓

一錢半

白朮

二錢

橘紅

半錢

鯉魚

一尾

不拘

醫學

功在補胞

卷之七

五十四

本

右細切作一服將鯉魚去鱗腸白水煮熟去魚

用汁一盞半生薑七片煎至一盞空心服當見

胎水下如水去未盡或胎死腹中脹悶未除再

合一劑服之水盡服除為度

○紫蘇飲治胎氣不和湊上心腹脹滿疼痛謂之子

懸

大腹皮

川芎

白芍藥

陳皮

紫蘇葉

當歸

各六兩

人參

甘草

各二分

右細切作一服加生姜三片葱五莖水煎服

○天仙藤散治妊娠三月成胎之後兩足自脚而漸

腫至膝行步艱難喘悶妨食若水腫甚至足指

間有黃水出者謂之子氣

天仙藤洗淨器炒即青木香藤也

香附子炒

陳皮

甘草

烏藥

木香各等分

右細切每服三錢加生姜三片紫蘇五葉水煎

日三服腫消止藥

醫學正傳卷之七

五十五

○安榮散治妊娠小便澁少遂成淋瀝謂之子淋

麥門冬去心

通草

滑石

當歸

燈心草

甘草各五錢

人參

川芎各一兩

右為細末每服二錢煎麥門冬湯調下○此方

恐滑石大重而滑胎若胎臨月可用若六七箇

月已前俱不可輕用宜去此味或加梔子細薑

石榆之類最穩羅麥亦恐損胎不可用也

○地膚子湯治子淋小便澁數

地膚子

與芥菜相似俗名地膚

車前子各一錢

知母去心

黃芩

赤茯苓

白芍

枳殼炒黃芩

升麻

通草

甘草

各三錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

又方治子淋

地膚子四兩石以水四升煮取二升分三服或新

取地膚子搗取自然汁服亦可不獨治子淋

凡小便淋閉服之無不效驗

外冬葵子散治子淋小腹疼痛胎動不安

冬葵子炒

柴胡

去心

桑白皮

赤茯苓

赤芍藥

當歸各等分

右細切每服四錢水一盞半加姜三片葱白七

寸煎至一盞去粗溫服

外車前散治子淋或小便不通下焦有熱

枳殼

木通

陳皮

去白

赤茯苓

車前子

赤芍

當歸

滑石

石葦

長赤毛

右各等分每服三錢水一盞半煎至一盞溫服

○忘憂散治妊婦心經蘊熱小便赤澀不利淋瀝作

痛

琥珀不拘多少

萱草根一握

右以琥珀研為細末每服半錢濃煎

○葛根湯治妊婦臨月忽發風癰悶亂不省人事吐

逆瞞少時醒後復發謂之子癰

貝母

葛根

牡丹皮

防已

防風

當歸

醫學正傳

卷之七

五十七

木

川芎

桂心

茯苓去皮

澤瀉各半錢

甘草炙二分

獨活

石膏研

人參各一錢

右細切作一服水三盞煎至一盞溫服日三服

其貝母令人易產未臨月者以升麻代之忌稔

菜

○防已湯治妊娠中風口噤四肢強直角弓反張

防已五錢

羌活一錢半

右為細末別用黑豆一合炒焦黑投好酒中沸

定去豆調藥末攤開口灌之稍醒再灌有效

○消風散治妊娠頭眩目眩視物不見頤頰腫核

石膏煨

井菊花去毒

防風去蘆

荆芥穗

羌活

羚羊角銹

川芎

大豆黃卷炒

當歸酒浸

白芷各半錢

甘草二分半

右為細末作一服加茅茶半錢水一盞半煎至

一盞食後溫服

○天門冬飲治妊娠外感風寒久嗽不已謂之子嗽

醫學正傳

卷之七

五十八

花

天門冬

紫苑茸

知母去毛

桑白皮炙各一錢

五味子

桔梗去蘆

右細切作一服水一盞半煎至一盞嗽血者加

阿膠半錢大便澀者加苦葶歷子半錢

○百合散治妊娠咳嗽心煩不欲飲食

百合

紫苑茸

麥門冬去心

桔梗去蘆

桑白皮各一錢

甘草半錢炙

竹茹一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞入蜜半匙

再煎二三沸去粗溫服

○丹溪參朮飲治姙轉胞

四物湯加 人參 白朮

半夏湯泡透 陳皮各三錢 甘草炙

右為細末加姜水煎服

○丹溪曰轉胞之証胎婦之稟受弱者憂悶多者性

急躁者食味厚者庸或有之古方皆用滑利藥

鮮有應效因思胞不自轉為胎所壓轉在一邊

胞系了戾不通耳胎若舉起居於其中胞系目

醫學正傳 卷之七 五十九

疎水道自利夫胎之墜下必有其由吳宅寵人

患此兩手脉似瀦重按似弦左和予曰此得之

憂患瀦為血少氣多則胎氣弱而不能舉弦為

有飲血少則胎弱氣多有飲中焦不清而隘則

胞知所避而就下乃以已上藥與服隨以指探

喉中吐出藥汁候少頃氣定又與之次早亦然

至八貼安猶恐此法偶中後又治數人亦效

○安胎散治姙娠胎寒腹痛胎熱多驚舉動腰痛腹

滿胞急卒有所下或因頓仆閃肭或食毒物或

感冒時疾寒熱往來致傷胎藏並皆治之

川芎 熟地黃 枳殼 糯米 一合

石細切作一服水一盞半生薑三片大棗一枚

更加金銀三五錢同煎至一盞溫服

○如聖散治姙娠腹痛胎動不安

鯉魚皮 當歸 熟地黃

阿膠 炒成珠 白芍藥 酒炒 川芎

川續斷 酒浸 甘草 炙各等分

右細切每服四錢水一盞半生薑三片苧麻根

半錢許煎至一盞溫服○一方加乾姜竹茹無

續斷

○加味四物湯治姙娠下血不止

本方加艾葉 三十片 阿膠珠 一錢

右細切每服四錢水一盞半加烏梅肉少許同

煎至一盞熱服連進三四服即止

○苧根湯止血安胎

野苧 炒二兩 用酒水各一盞入金銀同煎至一盞

溫服

○桑寄生散治妊娠下血不止胎動不安

桑寄生

川歸

川續斷

川芎

香附子

童便浸炒

阿膠炒

茯神

白朮

人參

甘草 各半錢

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一

盞溫服

○羚羊角散治妊娠中風頭項強直筋脉掣急言語

蹇澁痰涎壅盛或時發搐不省人事謂之子癰

醫學正傳卷之七

木十一

木十一

木十一

羚羊角 鎊

獨活

酸棗仁 炒

五加皮 各八分

薏苡仁

防風

當歸

川芎

茯神

杏仁 各四分

木香

甘草 各二分

右細切作一服加生姜三片水煎服

○歸涼節命散治妊娠面赤口苦舌乾心煩腹脹等

証

川芎

苧根

白芍藥

麥門冬 去心

川歸

白朮

糯米

荊芥穗

甘草 各半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞入蜜一匙

服

○白扁豆散治妊娠誤服草藥及諸般毒藥毒物

白扁豆 炒生去皮

右為細末清米飲調方寸匕神效

○芎藭補中湯養新血去瘀血補虛扶危

阿膠珠

五味子

乾姜 各四分

黃芪 蜜炙

川歸 酒浸

白朮

醫學正傳卷之七

木十二

木十二

木十二

川芎

赤芍藥 各七分

人參

杜仲

甘草 炙各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服後有

一方名同多木香治小產

○當歸芍藥湯治妊娠下痢赤白腹中疝痛

白芍藥 一錢 酒炒

當歸

白茯苓

澤瀉

白朮

條苓 各半錢

甘草

黃連

木香

檳榔 各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服○如
白痢腹痛甚者恐有寒也去苓連加乾姜三分
○芍木香連九治証同前

阿膠珠

白木各五錢

乳香

木香

各二錢

枳殼 麩炒

乾姜炮各二錢

黃連

去一兩美用黃連

砂仁

川芎各五錢

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十九
白湯下

醫學正傳

卷之七

六十三

大

○治妊娠泄瀉兩脇虛鳴臍下冷痛因食瓜果生冷
等物及當風取涼所致者

訶子皮

白木各一錢

陳皮

良姜炮

木香

白芍藥酒炒

甘草

半錢

肉豆蔻

麩炒

右細切加生姜五片水一盞半煎至一盞溫服

○芍蘇散治妊娠外感風寒渾身壯熱頭目眩暈

紫蘇葉

川芎

白芍藥

白木

麥門冬去心

陳皮

乾葛

各六分

甘草五分

右細切作一服加生姜五片葱白三寸水一盞
半煎至一盞溫服不拘時候

○升麻六物湯治妊娠六七箇月傷寒壯熱或發赤
斑變異

升麻二錢

梔子

杏仁

大青

小草

甘草各一錢

右細切作一服加葱白三寸水一盞半煎至一
盞溫服

醫學正傳

卷之七

六十四

大

○妊娠傷寒百節疼痛壯熱不急治即落胎

柴胡

乾葛

知母

石膏各六錢

大青八錢

梔子一兩

升麻八錢

葱白四莖

右細切用水七盞煎至三盞半分四服

○傷寒安胎

白木

黃芩

各等分新瓦上焙令焦

右細切每服三錢加生姜三片水煎服

○治妊娠傷寒

柴胡一錢

前胡

當歸各七分

人參四分

芍藥

生地黃各六分

甘草三分

右細切作一服加生姜三片葱三莖水一盞半

煎至一盞去粗溫服

○催生散治妊娠傷寒熱病胎死腹中身冷唇青不

能自出

蒼朮一錢

桔梗半錢

橘紅三分

白芷

桂心去皮

甘草炙各一分

醫學正傳卷之七

本十五

三

當歸酒洗

乾姜炮

厚朴姜汁製炒

芍藥

半夏湯泡七次去皮

川芎

枳殼各二分

南木香

杏仁去尖

右細切作一服水一盞半加生姜三片大棗一

枚煎至一盞溫服未下再進一服

○治妊娠咳嗽

紫苑茸

麥門冬各一錢半

桑白皮一錢炒

杏仁炒去尖

炙甘草各二分

桔梗去蘆頭

右細切加生姜三片竹茹一塊彈子大用水一

盞煎至一盞去粗入白蜜一蛤殼許再煎數次

溫服

○妊娠痰嗽見紅

當歸

熟地黃

天門冬

麥門冬

紫苑各半錢

桑白皮蜜炙

杏仁

甘草炙

桔梗

片黃芩

五味子

阿膠炒成珠

右細切作一服痰盛加竹茹一團水煎入小煎

汁同服

醫學正傳卷之七

本十六

不

○小產後下血不止

人參

黃芪

當歸

白朮

白芍藥

艾葉

甘草炙

阿膠炒成珠

川芎

青皮

香附

砂仁

右各等分白水煎服

○小產後心腹疼痛

當歸

川芎

熟地黃

白芍藥各一錢玄胡索七分

桃仁去尖

紅花 各三錢

香附子

青皮 炒黑

澤蘭

牡丹皮 各二錢

右細切水一盞半入童便酒各半盞煎至一盞溫服

○安榮湯治胎氣不固時常小產宜預服此以固胎元

四物湯加阿膠珠香附子白朮條芩砂仁糯米桑寄生白水煎服

○治兒在腹中呌哭

醫學註傳 卷之七 六十七
用多年空房下鼠穴中上一撮令妊婦噙之即止

○又方用黃連三五錢搗汁呌下自止

一云臍帶上疙瘩乃兒口中含者因妊婦登高取物脫落兒口以此作聲令妊婦曲腰向地拾物使兒復得含入口中即止

○丹溪求胎丸至七八箇月內服之

黃芩

炒夏一兩 秋七錢 冬五錢

白朮 三兩

茯苓 七錢半

陳皮 三兩 不見火

右為細末粥丸如梧桐子大每服三四十丸白

湯下

○達生散孕至八九箇月內服十數貼甚好易產腹

少痛

大腹皮

原本三錢恐太多合用二錢先扯股今改用一錢胎乾再用烏豆汁洗淨方可用

人參

陳皮

紫蘇

連葉 各半錢

白芍藥

酒洗

白朮

當歸

各一錢

甘草 各二錢

醫學註傳 卷之七 六十八
右細切作一服外入黃楊腦七箇食少胎瘦葱

五葉夏加黃芩黃連五味子春加川芎防風秋

加澤瀉冬加砂仁或通加枳殼砂仁胎動不安

加金銀三五錢野苧麻根一截氣上逼心加紫

蘇地黃性急加柴胡多怒或加黃芩佐之食少

加砂仁神麴渴加麥門冬黃芩能食倍加黃楊

腦 此味能瘦有痰加半夏黃芩

○臨月用以養胎方

黃芩

黃芩

陳皮

白朮

香附各一錢

白芷二分

甘草二分

右細切水煎調益元散一錢服虛者加人參

七分

○催生散

白芷炒焦黑

百草霜

白滑石各等分

右為細末煎芎歸湯調下二三服

○紅莧菜及馬齒莧俱能墮胎妊婦忌臨產用以

催生煮食亦效

醫學正傳

卷之七

六十九

木

○難產多是氣血虛亦有氣血凝滯而不能轉運者

亦有因八九箇月內不能謹愆者

○難產多見於安逸鬱悶之人富貴奉養之婦其貧

賤者未之有也古方瘦胎飲本為湖陽公主設

蓋以其奉養厚而氣實故為此方以耗其氣使

氣血和平而易產耳非至論也

○金匱當歸散安胎養血清熱孕婦時常宜服

當歸

川芎

芍藥

白朮

條芩各等分

右為細末每服二錢溫酒或湯調服

○金液丸治橫生倒產

飛生毛火燒樹下者尤佳

血餘無病女人髮燒灰

公母羊糞已上各半錢

伏龍肝一錢

黑鉛三錢用小罐子火上鑪投水銀半錢急攪結成砂子傾出細研

右為細末用粽子尖為丸如菽豆大遇難產以

順流水送下五丸兒身自順而正產子母俱活

矣

○催生鉛丹治橫生逆產

醫學正傳

卷之七

七十

黑鉛一錢

右以小銚子火上鎔化投入水銀二錢急攪結

成砂子傾出用熟絹紐作九子如菽豆大臨產

以溫水送下立產

○如神丹治難產用巴豆三枚葶麻子七枚各去壳燒灰

研入麝香少許捏作餅子貼臍

詩曰巴三草七脫衣裳細研如泥入麝香

搗作彈丸臍下貼須臾子母便分張

○催生如聖散用黃蜀葵子不拘多少炒

右為細末每服二錢熱酒調下如不飲酒熱湯調亦可或以蜀葵花焙乾熱酒調下一錢亦效詩曰黃葵子炒百餘粒 研爛酒調濟君急若還臨危難產時 免得全家俱哭泣

○香桂散下死胎 麝香少許 官桂三錢為末

右件和勻作一服溫酒調下須臾即下

○來時散治孕婦欲產未產之時忽然暈悶不省人事

木香不見火 神麴炒 陳皮去白

麥門冬去心 黃芪 生薑切碎

阿膠炒成珠 白芍藥各半兩 糯米一合

芋根一錢 甘草三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗幹開口灌下未醒再煎一服連接灌之即甦

○霹靂奪命丹治臨產未產之時目翻口禁面黑唇青口中沫沫子母俱殞命在須臾若兩臉微紅

子死母活急用此藥救之

蛇退一條洗淨日乾入瓶 鹽泥干里馬路

金銀鉤各七片 髮灰 桑心紙一錢

乳香五錢另研 黑鉛一錢半 川水七分半 炒

右共為細末以攢猪心血和丸如梧桐子大每

服二九倒流水送下如灌不化開 脩合此藥

時勿令婦人孝子雞犬見

○無憂散治分娩難產及胞衣不下等証孕婦臨月

預服此藥日進二服則子易生而胞易落也

當歸酒洗 川芎 白芍藥各七分

木香不見火 甘草各五分 枳殼麩炒黃色

乳香各一錢 血餘灰四分

右為細末分作二服水一盞煎八分濾去粗溫

服不拘時候

○催生奪命如神丹

牡丹皮 枳殼麩炒 赤芍藥各一錢

蛇退二錢 青皮 阿膠珠

甘草炙 五加皮 芸薹子

買象 馬鳴退炙焦各半錢 龍涎石八錢半

乳香一錢另研

右為細末煉蜜丸如彈子大臨產細嚼一九漿

湯送下未產小頃又嚼一九以產為度

○芳歸湯一名佛手散治妊娠因事跌仆子死腹中

惡露妄下疼痛不已口噤欲絕用此藥擦之若

子死腹中立便逐下若腹痛隨止子母俱安又

治臨產難生胞衣不下及產後血暈不省人事

狀如中風血崩惡露不止腹中血刺疼痛血滯

浮腫入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身

醫學正傳六卷之七

熱頭痛或似癰非癰一切胎前產後危急狼狽

畜死等証並皆治之

當歸酒洗去芦川芎七錢

右細切分作四服每服用水一盞煎水將乾投

酒一盞半煎五七沸溫服如口噤幹開灌之如

人行五里許再灌盡此四服便有立產神驗

○奪命丹治胞衣不下蓋兒之初生惡血流入衣中

衣為血所脹塞故不得下須臾中上逼心即死

急服此藥

黑附子炮半兩牡丹皮一兩

乾漆二錢半研細

右為細末用米醋一升大黃末一兩同煮成膏

和前藥末為丸如梧桐子大每服五七丸溫酒

下

○黑龍丹治難產及胞衣不下血迷血暈等証

當歸 五靈脂 川芎

良姜 生地黄已上各二錢細切入雞子壳內紙

百草霜一兩 硫黃 乳香各二錢

琥珀 花蘆石各一錢

右件連前藥共為細末酒米糊為丸如彈子大

如用時將一二丸仍用火煨紅為末以童子小

便合酒調灌下垂死者灌三四丸即活其功不

可尽述

○一方治胞衣不下

川牛膝二錢 當歸一錢半 木通三錢

滑石四錢 黃葵子二錢半

右用水煎連進三四服立下

○枳殼散治妊娠八九箇月內胎氣壅滿常宜服之滑

胎易產安和子臟益血舒氣

枳殼五兩 麩炒 分甘草半 一兩 香附子 一兩 炒

右為細末每服二錢空心沸湯點服日進三服

一方加糯米炒同為末白湯點服令兒易產初

生胎氣微黑百日後肥白此為古方之冠若妊

婦稍弱者單衣恐胎寒腹痛胎弱多驚於內加

當歸一兩木香半兩不見火如此用之則陽不

致強陰不致弱二氣調和有益胎嗣

○自妊娠初得以至臨月藥石禁忌歌

歌曰 蛇斑水蛭及蠱虫 烏頭附子與天雄

野葛水銀并巴豆 牛膝薏苡連蜈蚣

三稜代赭羌花射 大戟蛇蛻黃雌雄

牙硝芒硝牡丹桂 槐花牽牛皂角同

半夏南星與通草 瞿麥乾姜蟹甲瓜

硃砂乾漆兼桃仁 地膽茅根莫用好

○飲食禁忌

雞肉合糯米食令子生寸白虫○食犬肉令子

無声○鮎鯉同雞子食令子生疳蝕瘡○食栗

肉令子缺唇○食羊肝令子多厄難○食醬肉

令子項短縮頭○鴨子與桑椹同食令子倒生

心寒○鮮魚同田雞食令子疥癩○雀肉同豆

醬食令子面生雀卵斑點○食螃蟹橫生○食

姜芽令子多指○食水獺令絕產○食雀肉飲

酒令子多淫無耻○食茨菰消胎氣○食驢馬

肉過月難產○豆醬合蠶菜食墮胎○食山羊

肉令子多病食鯀鱈無 魚難產○食諸般菌

生子驚風而夭○食雀腦令子患雀目○勿妄

服湯藥勿妄針灸勿過飲酒漿勿舉重登高

陟險心有大驚子必癰癩勿多嚙吐須時時少

步動和血脉勿勞力過傷使腎氣不足子必解

顛腦破不合○衣毋太溫食毋太飽若脾胃不

和榮衛虛損子必羸弱多病戒之戒之

○臨產須知

○一臨月不可洗頭以多橫生逆產

○一懷妊十月已滿陰閉氣足忽然脘腹陣痛胎

早偏陷腰間重腹較重抵逆漿水林下其兒遂

生此乃正產若當生日有其時如瓜熟蒂懸栗熟自落之類

○一凡臨產宜擇年高有識穩婆及純謹婦人三四人扶持一應外來閑雜之人從服穢濁之婦預宜杜絕勿令觸犯胎氣致產不利產後客氣犯兒亦主傷害

○凡臨產房中不得喧鬧宜緊閉門戶靜以待生

一月歲前足方覺腹痛不可驚動大早早則舉家霍亂卜筮問神巫覡之流稱說鬼神多方哄嚇

醫學正傳

卷之七

七十七

火

媒利產婦聞之恐怖夫恐則氣怯氣怯則上焦閉下焦脹氣乃不行以致難產如犯此急宜服紫蘇飲以寬其氣

一凡臨月忽然腹痛或作或止或一日二日三五

日胎水已來腹痛不止者名曰弄痛非當產也

又有一月前忽然腹痛如欲便產却又不產者

名曰試月非當產也不問胎水來與不來俱不

妨事但當寬心候時若果當產時腰腹痛及不

已救逆挺逆眼中火出其時便產豈有或痛不

痛欲產不產之候邪人多於此胡行亂做枉了性命可不慎歟

一凡初覺腹痛而腰不甚痛者未產也且扶行熟忍若行不得則凭物而立行得又行

一世人不識但見腹痛絕作便謂生產生婆疎狂者不候時至便言試水試水併胞漿先破風入產戶以致腫脹門戶狹小乾澁難產

一將產之時產母甚痛不肯舒伸行動固執曲腰眠睡胎元轉動尋到生門已被遮閉又轉又尋

醫學正傳

卷之七

七十八

火

再三胎已無力決至難產

一初覺不痛且當任意坐卧勉強飲食毋致臨產乏力

一凡產母初覺欲生便須惜力調養不可妄亂用力兒身一轉便被用力一逼令兒錯路以致橫

逆須待臨到產門用力一逼兒即下生此所當

用力也譬如登厠時候未至用力何益

一凡產母如覺心中憤悶可取白蜜一匙溫水調

服

一產母如覺饑餓可進以軟白粥不令飢渴以致乏力亦不可食硬飯糍粽恐產後有傷食之病一未產之先或煩渴欲飲水只可與清米飲之為佳

一凡產不可服催生符水况血得寒即凝血一凝則胎滯而反致難產夫催生符籙蓋是野道士求食媒利之設有何益哉

一凡產婦胞漿未下但當穩守無妨胞漿既破一飯時候不生便當服催生藥要緊夫胞漿者本

醫學正傳卷之七十九

胞內養兒之水也兒既拆胞其水既下胎隨水而下則為易生胎元無力轉頭遲慢漿下即血來閉塞道路令子無路可通故難產也如用蜀葵子等破血之藥逐去惡血兒得路而生故曰催生藥也

一凡催生多用滑利迅速之藥如

兔腦 筆頭灰 弩牙

蛇退之類是也

二凡催生若見水血先下子道乾澀不能下者如

猪脂 油 蜜

酒 葱白 葵子

牛乳 榆白皮 滑石之類是也

○三九催生若稽停勞力之久風冷乘虛入於子宮使氣血凝滯而難產者如

牛膝 葱 桂

五積散 順元散之類

○四九催生有觸犯惡氣心煩燥悶難產者如

麝香 朱砂 乳香

醫學正傳卷之七十九

青竹茹之類

○夫產育之難者皆由產婦不謹慎聞說生育道

理臨事倉惶用力失宜遂有難產一危是故有

逆產者則先露足有橫生者則手露坐產者則

先露其臂比皆用力太早之過去當脐腹疼痛

之初兒身繞轉而未順用力一過遂致橫逆若

手足先露者用細針刺兒手足心一二分深三

四刺之以益塗其上輕輕送入兒得痛極轉一

縮即順生之矣或兒脚先下者之陷蓮花生

急以鹽塗兒脚底又可急搔之併以鹽摩母腹上則正生矣

○灸法治難產及胞衣不下急於產母右脚小指尖頭上灸三壯如小麥大立產

○凡橫倒難產用蛇蛻一條全者燬退紙一方右以二物入新甕瓶中鹽泥固濟燒存性為末煎榆白皮湯入乳香同調服下則順生

○又方治橫生先露手足
阿膠炒 滑石二兩 冬葵子一合

醫學正傳卷之七 八十一

酥油一兩
每服四錢水一大盞煎至七分連進二三服

○又方治橫逆不順子死腹中用

伏龍肝心紅土也

右為細末溫酒調下一二錢其兒頭戴土而出甚驗

○礙產

凡兒身已順門戶俱正兒已露頂而不能生此因兒身回轉肚帶攀住兒肩不能下也治法急

令產母仰卧輕輕推兒向上徐徐引手以中指按兒肩下其脐帶須候兒身為順產母用力一送兒即下生。又法令穩婆款款分開脐帶外將紙燃

○凡兒身向未順生路未正被產母用力一逼令兒偏生或左腿或右腿或臀或左右額角雖兒身已逼產門而不能下但云兒已露頂非頂也治

法當令產母仰卧看生人輕輕推兒近上以手正其項用力一逼即下若是頭之後骨偏柱殼

醫學正傳卷之七 八十二

道兒則露額當令看生人以綿衣炙令溫暖裹手急於救道外傍輕輕推兒頭令正然後用力

一送兒即下生

○治盤腸產法 有臨產則子腸先出甚可驚恐治

法以盆盛溫水溫潤其腸令產母仰卧且以言語安慰其心却用好米醋半盞和新汲水七分攪勻忽喚產母面或背則打頓而收每一喚令

一縮三喚三縮腸則盡收矣合用參芪歸芎等

大劑補藥加升柴防風之類以升牽之未有不

安者也○又法急以草麻子去殼研細貼產母
顛頂上即收

○一方治產難數日子死腹中不出母氣欲絕

瞿麥六兩 通草三兩 桂心三兩

牛膝四兩 榆白皮四兩

一方無榆白皮有天花粉四兩大能隨胎右細
切用水五升煎取三升去粗分三服頓飲即下

○又方牛膝九下死胎

川牛膝三兩 紫金藤七錢 肉桂二錢

醫學正傳天 卷之七

當歸四錢 蜀葵根七錢 麝香半錢

右為末米糊為丸如梧桐子大硃砂為衣每服

五十九粒香湯送下

○又方治子死腹中不出

用黃牯牛屎不拘多少塗母腹上立出○一云
以牛屎炒令大熟入醋半盞以青布包裹於母
臍上下熨之立下

○又治子死腹中用雞子黃一箇生薑自然汁一合
調勻頓服分婢後用芸薹粥補之

○生子下血過多子死腹中曾寒手指甲青面色青

黑胎上捨心悶亂欲死冷汗自出喘滿不食或

食毒物或誤服草藥傷胎下血不止胎尚未損

可安若已死即下極妙

牡丹皮 赤芍藥 桂心

芫仁 白茯苓

右各等分為細末煉蜜為丸如彈子大每服一

丸細嚼淡醋湯送下連服數丸立驗

○一方治胞衣不下

醫學正傳天 卷之七

川牛膝三錢 當歸身尾二錢 木通三錢

滑石四錢 冬葵子二錢半

右細切水煎連進二三服即下

○丹溪活套

凡婦人胎前諸疾只須以四物湯為主治看証

加減調治○如覺腹中煩悶口苦厭食不問月

數多少本方加白朮條芩砂仁煎服○如五六

箇月後胎動不安或逆捨逼心本方加阿膠艾

葉砂仁枳殼條芩白朮野苧根

入金銀同煎服。如氣血虛心煩脉虛大無力或怔忡手戰及時有微熱本方加人參白朮黃芩甘草酸棗仁遠志麥門冬地骨皮等藥。如五六箇月前無故下血或因事下血謂之汎聆本方加條芩白朮甘草白芷茅根地榆桑寄生之類。如七八箇月前後面且及四肢浮腫本方加茯苓澤瀉白朮條芩煨梔子厚朴甘草稍麥門冬之類。如孕中忽然口噤吐沫不省人事言語錯亂本方合二陳湯加麥門冬竹茹遠志石菖蒲之類。如感冒風寒頭痛發熱或身體疼痛本方合小柴胡湯或更加細辛白芷防風羌活等藥。如二三箇月內嘔吐惡心不納飲食謂之惡阻本方去地黃加陳皮半夏麴砂仁神麴藿香麥芽陳蒼朮白朮之類。或因事動胎致胎不安動撞不已及下血欲墮本方加入參白朮白茯苓條芩白芷桑寄生砂仁阿膠珠甘草等藥。或時有白濁白帶本方加白茯苓陳皮蒼朮半夏麴壯螭龍骨之類。如無

故腹痛瀉利清水或發熱胎動不安本方加白朮茯苓猪苓澤瀉蒼朮訶子皮砂仁神麴乾姜之類

○祖傳經驗秘方治難產瀝漿胞乾胎不得下用香油蜂蜜各一碗和勻用銅鈔慢火煎一二沸掠去沫調白滑石末一兩重搗勻頓服外以油蜜於母腹臍上下用之立產

○又方准主曾試甚驗用兔頭骨家狗頭骨各一箇烈火煨地上出火毒研為極細末每服二三錢濃煎芫歸湯調下即產

○又方治胞衣不下三退飲

蛇退三條全者蠶退紙一方三蟬退四十九箇用瓦瓶盛燒存性細研順流水調服立下
婦人科下產後

論

內經曰一息不運則機絨窮一毫連續則穹壤判所謂氣血周流循環無端少有不續則身危矣若夫妊娠之婦子在腹中母子一氣流通全賴漿水

滋養十月數足血氣完全形神俱備忽如夢驚
自能用手拆胞求路而出既出胞外母子分
呼吸殊息其可久羈於內而使其氣化不運
續我夫胎元壯健者胞既折即隨漿而下故
易產也其困弱者轉頭遲緩胞漿既乾汚血來
塞道路凝滯是以橫生逆產子死腹中而產
母之命死在頃刻可不畏乎凡見將生之際
胞漿既下踰時尚未分娩便當傍惶設計用
藥逐去惡血使子路通暢而無難產之患豈
可袖手以待

斃哉是故催生之藥即芎歸益母草冬葵子
之類皆使之逐去汚血者也若腰腹未甚痛
漿水少淋瀝而下名為試漿實非胞內真漿
也且宜寬心守待切不可輕易便令穩婆接
取產母用力逼胎太早多致橫逆不順切須
謹慎其或先見手足不順者額偏露者但當
以手輕輕撥正以待其自下可也若分娩之
後胞衣未下者為可惧宜多方用藥逐下甚
不可令粗率之婦摘取嘗見有斃破尿脬致
終身之害者有取下

肝葉而產母隨時殞命者可不謹與若夫難
產之婦皆是產前恣慾所致非獨難產且產
後諸疾皆由是而生焉或有乍寒乍熱似瘧
非瘧或大熱頭疼牀痛如傷寒狀或卒中口
噤如瘳如癰或左癱右瘓角弓反張或妄言
見鬼神恍惚或耳目口鼻忽覓黑氣如烟薰
之狀或腹中作痛綿綿不絕已上諸証皆非
惡露未盡即是勞傷血氣大虛之証丹溪曰
凡產前當清熱養血為主產後宜大補氣血
為要雖有雜証以未治之此萬世不易之確
論也雖然亦有離褥太早或澡浴身垢以致
感冒風濕或多啖雞子糞糞難消之物皆能
惡寒發熱變証多端醫者宜潛心診察脉候
以持危拯急不可苟且妄治以夭折人之天
年也

脉法

脉經曰新產婦人有三病一者病瘧二者
病鬱胃三者大便難云師曰亡津液胃燥故
大便難產婦鬱胃其脉微弱嘔不能食大便
反堅但頭汗出所以然者血虛而厥也而必
胃家欲解必大汗

出以血虛下厥孤陽上出故但頭汗出以產始盡汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復所以便堅者嘔不能食也小柴胡湯主之病解能食七八日而更發熱者此為胃熱氣實承氣湯主之

婦人產後七八日無太陽証小腹堅痛此為惡露不盡四五月不大便跌陽脈微實再倍其人發熱日晡所煩躁者譫語不能食利之即愈宜承氣湯以熱在裏結在膀胱也

醫學正傳

卷之七

九

按川溪曰產後宜大補氣血為主雖有雜証以未治之及曰產後不可汗下故和以仲景治傷寒法用承氣小柴胡等藥欲退產後之熱也非至理可法之語姑述於此以待資者再議而採擇之可也

丹溪曰產前脉細小產後脉洪數皆死又曰產前

脉當洪數既產而洪數如故豈得不死此亦大藥言也

今見產後豈無脉洪數而生者

方法丹溪方九條

丹溪曰產後當大補氣血為主雖有雜証以未治

之

○產後補虛用參朮黃芪陳皮歸身尾川芎炙甘草

如發熱輕則加茯苓淡滲之其熱自除重則加乾姜或云大熱而用乾姜何也曰此熱非有餘之邪熱乃陰虛生內熱耳蓋乾姜能入肺分利肺氣又能入肝分引衆藥生血然必與補陰藥同用之此造化之妙非天下之至神其孰能與於此哉

醫學正傳

卷之七

本

產後發熱惡寒或口眼歪邪等証皆是血氣虛甚當以大補氣血為主治左手脉不足補血藥多於補氣藥右手脉不足補氣藥多於補血藥切不可用小續命湯表散之劑

○產後惡寒發熱腹痛者當去惡血若腹不滿者非惡血也

○惡露不盡小腹作痛名兒枕痛用五靈脂香附為

末醋糊丸甚者加去尖桃仁一云用神麴糊丸

白朮陳皮湯下氣虛者四君子湯下

○治血刺痛用當歸乃和血之法若因積血而刺痛

者宜桃仁紅花當歸頭之類血在下焦當用梔尾

○產後血運用韭葉細切盛於有嘴瓶中以滾醋浸之急封瓶口以瓶嘴納產婦鼻中即甦或川行石燒紅投醋中薰之亦良法也

○又方用鹿角一段燒存性出火毒為末滾酒調下即愈

○血運因氣血俱虛痰火沆上作運二陳導痰隨氣血加減硃砂安神丸亦可服以麥門冬湯下

○一方治血運

人參一兩 紫蘇半兩

醫學正傳六 卷之六

右細切童便酒水三物同煎服

○嚴氏清血散治產後血運昏不知人

澤蘭葉 人參各一兩 荆芥穗四兩

甘草炙八錢 川芎二兩

右為細末每服二錢溫酒入童便調下更用漆器燒烟薰之頻置於醋炭更服此藥

○愈風湯治產後中風口噤牙關緊急手足痲痺角

弓反張

荆芥穗 當歸各等分焙乾

右為細末每服三錢豈淋酒調下童便亦可○
豈淋酒用大黑豆不拘多少炒焦投好酒中

○新產後不可用芍藥以其酸寒能伐發生之氣也

○產後乳汁不通用通草七分瞿麥柴胡天花粉各一錢桔梗二錢青皮白芷木通赤芍藥連翹甘草各半錢作一貼水煎食後細細飲之更摩乳房或無子食乳者要消乳用麥蘖二兩炒分作四服白湯調下

○產後泄瀉利用陳皮白朮茯苓川芎酒炒芍藥黃芩

醫學正傳六 卷之七

芍藥石炙甘草煎服立効○一方無甘草有乾姜按二物皆不可缺

○凡乳母但覺小水短少即是病生便須服藥調治

蓋兒飲母乳母安兒安防患未然治法之善者也

○有產婦因收生者不謹損破尿管而致淋瀝不禁

因思肌肉破尚可完補診其脉虛甚蓋難產因氣血虛故產後猶虛試與峻補以參朮為君芍

歸為臣桃仁陳皮黃芪茯苓為佐以猪羊脬煎

湯熬藥汁極飢飲之一月而安蓋氣血驟長其
時即完恐稍遲亦難成功也

○黑神散治產後惡露不盡或胎衣不下血氣攻冲
心腹疼痛及血迷血運等証

黑豆炒半升

熟地黄

當歸酒浸洗

肉桂去粗皮

乾姜炮

甘草炙

白芍藥酒炒

蒲黃各四兩

濟生方無蒲黃有附子

右為細末每服二錢童便和酒調服

醫學正傳卷之七

九十三

東

○人參當歸散治產後去血過多血虛則陰虛陰虛
生內熱令人心煩短氣自汗頭痛

熟地黄

人參

當歸身

肉桂

麥門冬

白芍藥炒各一錢

右細切作一服入淡竹葉五片生姜三片水煎
服

○當歸黃芪湯治產後或失血過多腰痛身熱自汗

當歸身三錢

黃芪二錢

白芍藥炒一錢半

右細切作一服水一盞半加生姜三片煎至一

盞溫服

○失笑散治產後心腹疼痛欲死及兒枕痛

蒲黃炒

五靈脂各等分

右為細末每服二錢熬成膏白湯化下

○三聖散治兒枕痛

當歸

肉桂

玄胡索各等分

右為細末每服二錢熱酒或童便調下

○抵聖湯治產後血氣傷於脾胃腹脇滿悶嘔逆惡
心

心

醫學正傳卷之七

卷之七

九十四

三

赤芍藥

半夏

澤蘭葉

陳皮

人參各二錢

甘草炙一錢

右細切作一服入生姜三片水煎服之

○當歸羊肉湯治產後發熱自汗肢體疼痛日久不
愈名曰褥勞

當歸身

生薑半兩

人參各七錢

黃芪一兩

右細切用羯羊肉一片煮取清汁五大盞去肉

粗入煎藥慢火煮取四盞分六服徐徐飲之

○茯苓散治產後心虛怔忡不定言語錯亂

人參 甘草炙 山藥炒

當歸各一錢 遠志去心 茯苓

桂心 麥門冬各半錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞

半煎至一盞去粗溫服

○當歸散治產後氣血俱虛惡露增客熱宜服此以去

惡露

當歸 白芍藥酒炒 川芎

醫學正傳 卷之七 九十五

黃芩各一兩 白朮半兩

右為細末每服二錢童便入溫酒調下

○黃芪湯治產後虛汗不止

黃芪二錢 白朮 防風

熟地黃酒煮 牡蛎粉煨 白茯苓

麥門冬去心 炙甘草各半錢

右細切作一服加大棗一枚水煎服

○增損四物湯治產後陰虛發熱或日間明了暮後

寒熱

當歸 川芎 生地黃酒炒

柴胡各等分

右細切每服五錢水一盞半煎至一盞溫服

○四物一黃散治產後腹中血塊作痛

當歸炒 川芎 熟地黃酒煮

白芍藥炒各半 蒲黃炒二錢

右為細末每服二錢空心溫酒調下

○產室黑龍丹治產後一切血疼垂死者但灌藥得

下無有不安者

醫學正傳 卷之七 九十六

五靈脂 生地黄 當歸

川芎 高良姜各二錢

右細切用砂鍋一箇盛藥外以赤石脂為細末

醋調封縫又以紙筋鹽泥固濟文武火煨過置

地上出火毒研細入後藥

硫黃一錢半 花蕊石另研 乳香另研各錢

琥珀另研一錢

右同前藥共為極細末醋糊為丸如彈子大每

服一丸用生姜自然汁無灰酒各一合童便半

盞合和將藥於炭火上燒紅投入姜酒內研散
頃服立效

○烏金散治產後血迷血運敗血不止淋瀝不勝
腹痛頭目昏眩多汗無力及治崩中下血不
止

麒麟竭

亂髮

皂莢水洗

松墨

煨醋淬

百草霜

當歸

去芦

肉桂

去粗皮

赤芍藥

延胡索

鯉魚鱗

燒存性

右各等分為細末每服二錢溫酒調下

醫學正傳

卷之七

九十七

卯

○調經散治產後虛浮蓋敗血乘虛停積府藏流注
肌肉腐壞成水令人面目四肢浮腫切不可用
導水泄利之藥是謂重虛其虛多致大亡此藥
主之

沒藥

研一錢另

琥珀

研一錢另

桂心

赤芍藥

當歸

各一兩

細辛

麝香

半錢另

右為細末每服一錢匕姜汁溫酒童便和調服
之

○正脾散治產後通身浮腫及治婦人大病後脾氣
虛弱中滿腹脹等病

蓬莪朮

醋浸宿炒

香附米

童便浸茴香炒

甘草

炙

陳皮

右各等分為細末每服二錢燈草水通湯下

○柏子仁散治產後語言妄語皆心血虧欠心神不
守所致

柏子仁

去壳

遠志

去心

人參

去芦

赤寄生

防風

去芦

琥珀

另細研

當歸

熟地黃

甘草

炙

右各等分細切每服五錢先用白羊心一枚
煮汁二盞煎藥至一盞去羊心及粗溫服不
拘時

琥珀

散治產後瘀血攻心迷悶妄言見鬼

鐵粉

各一兩

人參

茯神

生地黃

阿膠

珠各七錢

硃砂

五錢

甘草

麝香

各一錢另

右為細末和勻每服一錢用金銀煎湯調下

○交感地黃煎九治產後舌強不語眼見黑花或

狂見鬼及胞衣不下心腹脹滿等証

生地黃新根生薑各二斤各用石臼杵無以布

當歸去芦一兩延胡索一兩碎蒲黃炒香四兩

琥珀一兩另研

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九煎當

歸湯化下食前服

○七珍散治產後不語

人參 石菖蒲 川芎

熟地黃各一兩細辛一兩防風五錢去芦

右為細末每服一錢匕薄荷湯調下不拘時服

○調中湯治產後瀉利臍腹疼痛六脉沉細

高良姜 當歸 桂心

白芍藥 附子 川芎各一錢

甘草炙半錢

右細切作一服加生薑五片水一盞半煎至一

盞溫服

○定痛散治產後惡血不尺腹中作痛

當歸 芍藥各一錢 肉桂一錢

右細切作一服酒水各一盞半生薑五片煎至

一盞服

○麻仁丸治產後大便秘結

麻仁去壳 枳殼 人參

大黃 當歸各八分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸

白湯下未通漸加丸數以便潤為度

○羊肉湯治產後腹中虛痛氣血不足羸弱力倦及

寒月中生產寒氣入於產門臍下脹滿手不可

犯此寒病也此藥主之此方乃張仲景

精羯羊肉四兩當歸二兩生薑一兩

陳皮二兩

右細切水三碗酒一盞煎至一碗去粗分二服

加葱鹽亦可

○滋腸五仁丸治產後血氣虛損大腸閉澀傳道艱

難

杏仁去皮尖 桃仁如上一兩 柏子仁半兩

松子仁二錢半 柳李仁一錢 裴橘紅 西兩別研

右五仁另研為膏合橘皮末和勻再研煉蜜丸

如梧桐子大每服三十九加至五六十食前

清米飲下一方加當歸稍五錢

○固經丸治產後血氣未復而有房事及勞役損傷

致血暴崩或淋瀝不止

沒藥

赤石脂

楠骨脂

木賊各半兩

附子一枚炮去皮脂

右為細末米糊為丸如梧桐子大每服二十九

醫學正傳 卷之七

溫酒下或陳米飲下

○熟乾地黄散治証同前亦治婦人一切崩中下血

不止頭目沉重

熟地黄一錢 甘草一分

蒲黃炒黑色半錢

白茯苓半錢

桂心二分半

阿膠一錢 炒得鹿角膠

白芍藥半錢

伏龍肝七分半

昆布男子根性也錢煨存性

當歸一錢

右細切作一服入竹茹一錢用水二盞煎至一

盞溫服

○拒勝湯治產後腹脹滿悶嘔吐不定蓋敗血入於

脾胃而脾不能運化故胃不能納穀以致嘔吐

腹脹等証

赤芍藥

半夏泡七

澤蘭葉

人參去芦

陳皮去白各一錢

甘草炙一分

右細切作一服生姜三片水一盞半煎至一盞

溫服

○八味理中丸治新產血氣俱傷藏府暴虛體弱多

汗一百日內常服壯氣補虛止嘔吐

醫學正傳 卷之七

人參去芦

甘草炙一分

乾姜炮一兩

白朮二兩

砂仁一兩

白茯苓一兩

麥蘖炒

神麴炒各一兩

右為細末米糊為丸如梧桐子大每服三十九

食前姜湯下有痰者宜加半夏麴

○旋覆花湯治產後感冒風寒咳嗽喘急痰涎壅塞

坐卧不能

前胡

麻黃去節

杏仁去皮尖

五味子

茯苓

甘草炙

旋覆花

半夏麴

荊芥穗

赤芍藥各半錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎至一盞去粗溫服

○四神散治產後留血不消積聚作塊噤疾痛下利不止

當歸去芦

乾姜炮

川芎

赤芍藥各半

右為細末每服三錢溫酒調下

醫學正傳卷之七

○當歸養血丸治產後惡血不散發熱腹痛及惡露

不尽臍腹堅脹煎治婦人室女經候不調赤白

帶下腹痛疼痛

當歸去芦

赤芍藥各四

桂心炒

延胡索炒各

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九或

酒或米湯任下

○猪腎子飲治產後勞傷寒熱如瘧咳嗽頭疼自汗

體瘦腹中疝痛

猪腰子一對切當歸

白芍藥各一兩

右以當歸芍藥二味細切用水三碗煮至二碗

去粗將腰子切碎如骰子狀入前藥汁內用晚

粳米一合香豉一兩葱白五七根同煮糜爛空

腹食之日進一服

○當歸黃芪飲治產後陰脫○謂陰戶中宮脫下也

當歸

白芍藥

黃芪

人參各二錢

升麻半錢

右細切作一服水煎溫服未收再服

醫學正傳卷之七

○當歸散治婦人陰脫又名疝癰

當歸

黃芩

白芍藥各

蛭皮性平兩燒存牡蛎二兩

右為細末溫酒或米湯調下忌登高舉重

○桃仁膏治產後陰疼煩悶

桃仁

五味子

枯礬

為末研桃仁膏拌付

○硫黃湯治產後玉門不飲

硫黃四兩

吳茱萸

兔絲子各一兩

蛇床子一兩

右細切每服四錢水一碗煎湯頻洗之自飲

○婦人乳汁不通有二種有血氣壅盛乳脉滯而不

行者有血氣虛弱乳汁絕少者夫虛者補之用

鍾乳粉猪蹄鯽魚之類盛者行之用通草漏芦

王瓜根之類方見于後

○漏芦湯治婦人肥盛氣脉壅滯乳汁不通或留結

為壅腫痛將欲成膿者

漏芦二兩 蛇退炙一條 土瓜根十根切

醫學正傳卷之七 按土瓜當作王瓜此物也其實如 而小如荔枝色黃藤蔓

右為末每服貳錢酒調下仍吃熱羹湯助之

○鍾乳散治婦人氣虛血少脉澁不行乳汁絕少

鍾乳粉細研 每服二錢濃煎漏芦湯調下

○母猪蹄湯治乳汁不通

母猪蹄一隻 通草四兩 用水一斗煮取

四五升取汁飲之未下更作一料服之

○丹溪活套云

新產不可用芍藥以其酸寒能伐發生之氣

之內只以黃芪四物湯為補虛之要藥以黃芪

易芍藥是也○如氣虛者木方加參木茯苓其

草發熱者加乾姜○自汗多者少用川芎勿用

茯苓倍蜜炙黃芪○如口渴加五味子麥門冬

○如腹痛者非芍藥不可雖新產亦用但以酒

炒不妨○如惡露不尽作痛四物湯煎調香附

五灵脂末服甚者加桃仁泥四五分○新產子

宮未飲作痛名兒枕痛又名癥母塊痛用醋炒

芍藥漿殼甘草水煎入少米醋或以三物為末

醋湯調服酸以收之之義也○產後有惡血不

去發寒熱成癥瘕者四物湯加三稜蓬朮乳香

沒藥香附五灵脂乾漆菴仁紅藍花之類○產

後腹痛不息宜四物湯加烏藥香附桂心高良

姜陳皮童便和醋煎服甚效○產後月餘經血

淋瀝不止四物加白芷升麻調血餘灰○產後

陰痛四物加藁本防風○產後通身浮腫四物

加乳香沒藥桂心木通大腹皮高良姜血竭

柳海金沙○產後子腸不收四物湯加升麻防
風須以酒炒黃芪為君○產後中風口眼歪斜
四物加附子荊芥少加防風羌活煎服

醫學正傳卷之七終

醫學正傳卷之八目錄

小兒科 論 又變氣論

小兒脉法總論 三關脉法形狀 湯氏察形色

總斷 面上諸候形證歌證七 內八段錦首四

外八段錦十首

急慢驚門 論 脉法 卅溪方法餘二

東垣治驚風論 東垣黃芪湯 東垣益黃散

錢氏安神丸 錢氏白朮散 又治驚風方

又急慢驚風方 又急慢驚風方 又治慢驚風方

鎮驚丸 奪命丹 利驚丸

瀉青丸 抱龍丸 千金龍膽湯

宣風散 五福化毒散 金鉞丸

釣藤飲 溫白丸 涼驚丸

發搐門二 男發搐 女發搐

早晨發搐 日午發搐 日晚發搐

夜間發搐 傷風發搐 傷食發搐

百日内發搐 補腎地黃丸 瀉青丸

道赤散 涼驚丸 益黃散

大青膏

牛黃膏

甘露飲

白餅子

奎願法

浴體法

五癰門三

論五癰形證

五色丸

諸疳門四

論

地黃丸

安神丸

益黃散

又名補脾散

木香丸

胡黃連丸

蘭香散

白粉散

如聖丸

香蟾丸

蘆薈丸

治疳積腹大方

又治小兒疳方

祖傳經驗秘方

吐瀉門五

論

錢氏方法

木瓜丸

兒生三日內吐

兒生三日至十日

吐瀉

五月二十五日後吐瀉

玉露散

六月十五日

已後吐瀉

七月七日已後吐瀉

八月十五日

溫中丸

已後吐瀉

吐瀉泄黃傷熱乳病

虛

弱脾胃不和

吐瀉調脾平胃散

治吐瀉黃疸

方

夏月吐瀉用益元散極効說

附證

腹脹論

腹脹論

腹脹搗氣丸

小兒腹虛脹方

又治腹脹方

腹痛傷食法

又腹瀉方法

白餅子

白朮散

心腹痛方法

安虫散

集効丸

又治虫痛方

治蛇虫痛方

小兒吃糞腹痛方

又治小兒腹痛

小兒夜啼方

治夜啼花火膏

治小兒驚啼方

小兒風痰盛

小兒痰熱骨蒸方

又治前證方

小兒解頤方

小兒吃泥方法

小兒脫肛方

又治脫肛方

小兒赤痢方法

又治前證方

小兒赤痢方

白玉散

臍中汁出方

小兒癩頭方

又治癩頭方

丹溪醫按一條

小兒尾間骨痛

小兒弄舌

瀉黃散

小兒龜胸

重舌木舌

又治前證方

龜背

小兒口瘡方

鵝口瘡方

又治前證方

又治木舌方

又治小兒口瘡方

又口瘡方

又治驚口瘡方

又治小兒口瘡方

又口瘡方

小兒額上生瘡

小兒走馬牙疳

又治牙疳方

小兒臍風撮口方

痘疹門六

論

丹溪方法總論

丹溪方法總論

丹溪方法總論

丹溪方法總論

丹溪方法九三十二條

丹溪方法總論

丹溪方法總論

丹溪方法總論

痘疹初登二載形証一

痘疹初登二載形証一

痘疹初登二載形証一

痘疹初登二載形証一

斑痘所發之源三

辨內外因四

王氏惺惺散 升麻葛根湯 木香三蘇散

四君子湯 和中散 紫霜丸

○辨形氣病五

補肺散 鮮毒防風湯 當歸丸

十奇散

○辨三陰三陽經候六 荊芥甘草防風湯

連翹防風湯 升麻湯 理中湯

醫學正傳大 卷之八

木香散 異功散

○辨三陽證治七 連翹升麻湯 犀角地黄湯

解毒丸 宣風散 百祥丸

龐氏地黃膏 黃膏 玉露散

甘露飲子 猪心龍腦膏

○辨三陰證法八 調中丸

○辨形氣不足九 芎歸湯

○辨表裏虛實十 消毒飲 葛根麻加芍藥湯

活血散 勻氣散 二物湯

百花膏

○平治諸方十一 三荳湯 油飲子

鳳龍膏 四物鮮肌湯

○瘡出不快十二 活血散加防風 龐氏紅花湯

紫草湯 四聖散 樺皮飲子

五積散 正氣散 調鮮散

辰砂五苓散 肉荳蔻丸 絲瓜湯

阮氏萬金散 湯氏安斑湯 透肌散

如聖湯

醫學正傳大 卷之八

○辨外證逆順十三

○辨初末形證十四

○辨不藥而愈十五

○辨五不治證十七

辨疹陰陽證十八

○傷寒時氣發斑附十八 玄參升麻湯

○辨防敗毒散 化斑湯 龐氏石膏湯

陽毒升麻湯

○辨瘡後餘毒十九 消毒飲 十六味流氣飲

必勝膏

蚬子水

五福化毒丹

如聖湯

雄黃解毒丸

黃連阿膠丸

駐車丸

決明散

密蒙花散

撥雲散

蛤粉散

祖傳經驗秘方

又痘後不大便方

○古人拯治痘瘡要法方論二十

陷伏倒靨黑陷證

不換金正氣散

辟穢丹

再甦散

猪尾膏

白龍散

敗草散

馮氏天花散

罩胎散

獨聖散

安胎散

醫學正傳卷之八目錄

醫學正傳卷之八目錄

醫學正傳卷之八

花柳傳毒能集

姪孫虞守愚惟明校

小兒科

論

嘗聞小方脉科古人謂之啞科最費調治誠哉是言也蓋以嬰之流難問證難察脉耳抑且臟腑脆嫩而孟浪之劑與夫峻寒峻熱之藥俱不可輕用試詳論之夫孺子之在襁褓中也內無七情六慾之交戰

醫學正傳卷之八

外無大風大寒之相侵奚其幼科之疾若是之繁且甚與抑考其證太半胎毒而少半傷食也其外感風寒之證十一而已曰變蒸曰痘疹曰斑爛曰驚悸曰風痼曰發搐曰痰壅曰赤瘤曰白禿曰解顛曰重舌木舌已上諸證豈非孕母不謹胎毒之所致與夫小兒之在胎也母飢亦飢母飽亦飽辛辣適口胎氣隨熱情慾動中胎息輒躁或多食煎燂或恣味辛酸或嗜慾無節或喜怒不常皆能令子受患其為母者胎前既下能謹節產後又不能調護是以惟務姑息不能防

微杜漸或未滿百晬而遂與酸酸之味或未穀週歲而輒與肥甘之物百病由是而生焉曰吐瀉曰黃疸曰五疳曰腹脹曰腹痛曰水腫曰瘰曰痢曰痰喘豈非吃食過傷調養失宜之所致與先王所謂古者婦人妊子寢不側座不邊立不暝不食邪味等語誠有旨哉其餘飲食男女養胎幼幼之法必深得造化生生不息之意故古人多壽考兒少夭折者即此之由也嘗見今有稟性溫良之婦有娠不嗜慾從口生子少病而痘疹亦稀亦可以為師法矣為兒醫者臨證

醫學正傳卷之八

之際宜察色觀容不可鹵莽假如額赤知為心熱鼻紅知為脾熱左腮青知為肝有餘右頤白知為肺不足頰白知為腎虛之類更察之以虎口三關之脉其小兒之病情斯過半矣傳曰幼吾幼以及人之幼仁人之心斯言其可忽諸又論變蒸

夫小兒之初生血氣未足陰陽未和臟腑未實骨格未全有變蒸之後每三十二日一發熱或吐或汗或呻吟不食此為長血脉全智慧之常候不須治而自愈按諸家所論皆謂乃小兒長骨脉臟腑與神志也

自生之日始每三十二日一變凡人有三百六十五骨除手足四十五碎骨外止有三百二十骨自生下骨而上一日十骨三十二日乃為一變骨氣始全一變生一歲或一府十變則藏府始足每變發為虛熱諸證亦有胎氣壯實暗變而無發熱證者此骨節藏府由變而全胎毒亦因變而散也為兒醫者可不審乎

脉法總論

按古法曰凡小兒證候難以手太陰尺寸脉診如一

醫學正傳卷之八

九

歲至六歲曰嬰孩惟以男左女右手次指三關之脉以為驗病輕重死生之訣第一節名風關無脉則無病有脉則病輕第二節名氣關脉見則病重尚可以藥治而已第三節名命關脉見則病劇乃九死一生之惡候也多不可治七歲八歲曰齒九歲十歲曰髻始可以一指探掌後尺寸三部之脉而以一息七八至為無病之常脉十一歲至十四歲曰童稚而以一息五六至為常脉也數則為熱遲則為寒浮則為虛為風沉則為實為積為痛浮而數者為乳癰驚悸虛

而軟者為慢驚癰聚而實者為風癰牢而重者
便秘沉而弦者為食積為腹痛緊而弦者為氣急為
風寒洪數者為熱伏結為傷食軟細者為虫痺若氣
促脉代散亂無倫次者死在頃臾而不治也業幼科
者其可不盡心於此乎

今將手指三關之脉繪圖分注開列于後



一風關易治
二氣關病重
三命關死候

三關青是四足驚 三關赤是水驚 三關黑是人驚

醫學正傳卷之八

十

如有此三關通度脉候是極重之證必死餘並可治

風關青如魚刺易治乃初驚之候也黑色難治

氣關青如魚刺主痺勞身熱易治

命關青如魚刺主虛風邪傳脾難治

風關青黑色如懸針主水驚易治

氣關赤色如懸針主疳病兼肺藏積熱尤為可治

命關凡有此脉不問五色皆是死候

又三關通度如懸針者主慢驚風難治

小風關如水字主驚風入肺咳嗽面赤

氣關如水字主驚風極夾驚候不拘五色三關
通度者不治

乙風關如乙字主肺藏驚風易治

氣關如乙字主驚風病重

命關如乙字青黑色主慢驚風難治

甲風關如甲字主疳病積聚胃前如橫排等子肚皮
如吹胖猪脬

氣關如曲虫主大腸有穢積

命關如曲虫主心痛傳肝難治

醫學正傳卷之八

十一

乙風關如環主肝藏有疳積聚

氣關如環主疳入胃吐逆不治

命關如環候惡不治

癸此紋若在風氣二關易治若在命關通度難治

此紋若在手心或面上或左右腹脇上

脉曲向裏者是氣痺

脉曲向外者是風痺

脉斜向右者是傷寒身熱不食無汗

脉斜向左者是風傷身熱不食有汗

◎雙鉤脉者是傷寒

◎三曲如長虫者是傷硬物

◎兩曲如鉤者是傷冷物

◎脉一頭如環有獨脚者是傷冷

◎面上有此點子必是再發之候

◎受九頭面上或肚腹上有大脉併青筋如此者並是

食毒物及驚積難治

脉如亂虫是常痺亦有虫痺蚘痺食積之痺皆可

治

醫學正傳卷之八

凡脉微細不足者並是風氣俱宜消痺然後取虫

積肥孩兒是良法也

附湯氏察小兒神色總斷

○凡看小兒病宜先觀形證神色然後察脉假如肝

之為病則面青心之為病則面赤脾之為病則

面黃肺之為病則面白腎之為病則面黑先要

分別五藏形證次看稟受盈虧胎氣虛實明其

標本而治之無不可者

面上諸候形證歌

○痢疾眉頭皺驚風面頰紅渴求唇帶赤毒熱眼瞤

瞤

又一首

○山根若見脉橫青此病明知兩度驚赤黑困疲時

吐瀉色紅啼夜不曾停

又

○青脉生於左太陽須驚一度見推詳亦是傷寒微

燥熱黑青知是乳多傷

又

醫學正傳卷之八

○右邊青脉不須多有則頻驚怎奈何紅赤為風抽

眼目黑青三日見闍羅

又

○指甲青黑黑暗多唇青惡逆病將瘥忽作鴉声心

氣急此時端的命難過

又

○蛻虫出口有三岐口鼻中來大不堪如或白虫燕

黑色灵丹縱服病難安

又

○四肢瘡痛不為祥下氣冲心兼滑腸氣喘汗流身不熱手拿膏膈定遭殃

內入段錦

○紅淨為安不用驚若逢紅黑便難寧更加紅亂青尤甚取下風痰病立輕

○赤色輕微是外驚若如水粒勢難輕紅散多因乘怒乱更加搐搦實難平

○小兒初誕月腹痛兩肩頻卑號盤腸氣時啼哭又如反目仰視者天吊風也

醫學正傳卷之六

○小兒初誕月飢休瘦疳羸髮禿毛稀少元因鬼主

胎

外八段錦

○先望孩兒眼色青次看背上冷如水陽男搐左無

妨事搐右令人甚可驚女搐右邊猶可治若逢

搐左疾非輕歪斜口眼終為害縱有仙丹也莫

平

○眼中赤脉實難量大數元來一不祥最怕乱文鋪

目下更嫌赤脉貫瞳光

○額門腫起定為風此候應知最是凶忽陷成坑如

盛足未過七日命須終

○鼻門黑燥渴難禁面黑唇青命莫存肚大青筋俱

惡候更嫌腹有直身絞

○忽見眉間紫帶青者來立便見風生青紅碎雜風

將起必見疳癥隔氣形

○乱絞交錯紫熈青急急求醫免命傾盛紫再加身

体熱須知藏府惡風生

○紫少紅多六畜驚紫紅相等即疳成紫點有形如

醫學正傳卷之六

米粒傷寒夾食證堪評

○紫散風傳脾藏間紫青口渴是風痼紫隱深沉難

治療風痰祛散命須還

○黑輕可治死還生紅赤傷寒痰積停赤青脾受風

邪證青黑脾風作慢驚

○紅赤連方赤紋輕必然乳母不相應兩手忽然無

脉見定知衝惡犯神靈

急慢驚風一

論

內經曰諸風掉眩皆屬肝木夫小兒八歲已前曰純陽蓋其真水未旺心火已炎故肺金受制而無以平木故肝木常有餘而脾土常不足也為父母者而有失於保養其或衣服寒暄不調以致外邪侵襲或飲食之飢飽失節以致中氣損傷是故急慢驚風之候作矣夫惟急驚屬肝木風邪有餘之證治宜清涼苦寒瀉氣之藥慢驚屬脾土中氣不足之候治宜中和甘溫補中之劑若夫急驚之候因聞不常之聲或遇驢馬禽獸之驚以致面青口噤或聲嘶而厥發過則醫學正傳卷之八
容色如故良久復作其身熱面赤引飲口鼻中氣熱大小便黃赤色惺惺不睡蓋熱甚則生痰痰盛則生風偶因驚而發耳宜用錢氏利驚丸瀉青丸抱龍丸宣風散五福化毒丹等藥慢驚之證多因飲食不節損傷脾胃以致吐瀉日久中氣大虛而致發搐發則無休止時其身冷面黃不渴口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足瘳癱筋脉拘攣蓋脾虛則生風風盛則筋急俗名天弔風者即此候也治宜東垣黃芪湯錢氏鈎藤丸溫白丸丹溪參朮湯送下硃

砂安神丸之類錢氏謂急驚為無陰之證因心經實熱而陰不能以配陽是為陽盛陰虛之候也謂慢驚為無陽之證因脾土虛甚而陽不能以勝陰是為陰盛陽虛之候也愚按小兒急慢驚風之證其虛實寒熱如天淵之隔故急驚者十生一死慢驚者十死一生俗醫多不諳此理混為一途而治誤人多矣業幼科者宜推幼幼及人之心為心庶免斯世無夭折之赤子矣幸甚脉訣並見前摠章
方法用參朮湯
醫學正傳卷之八
丹溪曰錢氏方乃小兒科之祖其立例極妙若能增損而用之無不驗也
又曰驚風有二慢驚屬脾虛所主多死宜溫補一云當養脾用參朮煎湯下安神丸○急驚屬痰熱宜涼瀉一云用養血藥作湯下降火清痰九
子抱龍丸世以一藥通治二證甚謬
○東垣治驚論曰外物驚宜鎮心以黃連安神丸若氣動所驚宜寒水石安神丸大忌防風丸治風辛溫之藥必殺人何也辛散浮溫熱者火也因

補金大補其土是為神治之法

○黃芪湯 治慢驚風之神藥也

黃芪二錢 人參一錢 炙甘草半錢

加白芍藥一錢

右細切作一服水一大盞煎至半盞去遠溫

服

上三味皆甘溫能助元氣其能瀉火內經云熱淫于內以甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒寒能瀉火酸味能瀉肝而大補肺金所補得奎之位

大旺火虛風木何由而來尅土然後瀉風之邪

○又曰夫益黃散理中丸養神丸之類皆治脾胃寒濕太盛神品之藥也若得脾胃中伏熱勞役不足之證及服熱藥巴豆之類致胃虛而成慢驚之證用之必傷人命夫慢驚風者皆由久瀉脾胃虛而生也錢氏以羌活膏療慢驚風誤矣脾胃虛者由火邪乘其土位故曰從後來者為虛邪火旺能實其木木旺故來尅土當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒更於脾土中補金以酸涼使脾土中金旺火衰風木自虛矣損食多進藥愈上藥是也

○益黃散治胃中風熱

黃芪二錢 陳皮去白 人參各一錢

白芍藥七分 生甘草 炙甘草各五分

黃連少許

右為細末分三服每服用水一盞煎至半盞食

前服

○錢氏安神丸治邪熱驚啼心忪面黃煩赤壯熱

麥門冬去心

馬牙硝

白茯苓

乾山藥

寒水石

甘草炙各半兩

硃砂一兩

龍腦一字

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服半丸砂糖

水磨化下慢驚用參朮煎濃汁化下

○錢氏白朮散治積痛和胃生津止瀉頻瀉利將欲

成慢驚風者服之決効

人參

白朮

木香

白茯苓去皮

甘草炙

霍香各一錢

乾葛二錢

右細切分二服每服水一中煎至半盞溫服○

丹溪用為藥白扁豆 肉豆蔻炙 麝香火煨各一錢 全蝎生薑

一煎○若慢驚風作加細辛天麻各一錢 全蝎三錢

枚去稍白附子 異類八分 同煎服不拘時候

○一方治驚風用母丁香一粒細嚼入中白少許以

其母中指取血調擦牙上即甦

○急慢驚風熱口瘡手心伏熱痰熱痰嗽痰喘並用

湯法重劑用瓜蒂散輕劑用苦參赤小豆末以

酸漿汁調服吐之吐後稍定更用防風通聖散

為末蜜丸服之間以桑葉乾為末米飲調服以

平其風氣

○又方治急慢驚風

薄荷葉

寒水石各半兩

青黛

白殭蚕

硃砂各一錢

全蝎二枚炒

猪牙皂角槐角各半錢

右為細末燈草湯和乳汁調時時灌之

○又方治慢驚風子母俱服

人參

白朮各一錢

茯苓

陳皮各半錢

甘草

薄荷各一分

半夏

天麻各七分

細辛

全蝎去毒炒

右細切作一服加姜三片水一盞煎至七分服

○鎮驚丸鎮驚寧神退心熱夜啼化痰止嗽

珍珠一錢

琥珀

天竺黃

雄黃各三錢

金鎖研細

膽星五錢

牛黃二錢

射香半錢

硃砂三錢半

右為細麥麵糊為丸如梧桐子大每服五六丸

薄荷姜蜜湯化下

○奪命丸治急驚不省人事目睜口視牙關不開唇

白或黑者

南星

半夏各四錢為末以生薑汁和作餅子焙乾

珍珠

新白者三錢研

巴豆

去油淨一錢

硃砂四錢

金鉞

銀鉞各十片

輕粉

射香各半錢

右為細末麵糊丸如黍米大每歲兒一丸燈心

湯化下

利驚丸治急驚風神効

天竺黃

輕粉

青黛各一錢

黑丑

頭末半兩生用

右為細末研勻煉蜜丸如梧桐子大一歲兒一

丸二歲兒二丸五歲兒三丸溫薄荷水下食後

服

○瀉青丸

又名瀉肝丸

治肝熱急驚搐搦等證

羌活

川大黃

溫經散

川芎

梔子仁

草龍膽

當歸

防風

去芦各

右為細末煉蜜丸如芡實大每服半丸至一丸

煎淡竹葉湯同砂糖溫水化下

○抱龍丸治傷風瘟疫身熱昏睡氣促風熱痰實壅

嗽又治驚風潮搐及蟲毒中暑沐浴後並可服

壯實少兒宜時與服之則免痰熱驚悸之證

桂黃

二錢半

辰砂

另研五錢

天竺黃

一兩

天南星

煨為末

四兩如無只將生乾者去皮臍炒熟

用然不

及膽星

射香

半兩別研恐太多今用二錢半

右為末煮甘草湯丸如皂子大溫水化下百日

兒每丸分作三服一歲兒半丸五歲兒二丸童

叟三五丸室女白帶伏暑用鹽少許細嚼一二

丸新汲水送下臘月用雪水煮甘草和丸尤佳

一法用漿水或新汲水南星三日煮三五沸去皮

取白肉切焙炒黃色為末每八兩以甘草二兩

半拍破用水二碗慢火煎至半碗去粗旋旋通

入南星末徐徐研之令甘草水淨入餘藥

千金龍膽湯治嬰兒出腹血脈實盛寒熱交作四

肢驚掣併諸疳驚等證

草龍膽

鈎鈎藤

柴胡

黃芩

桂枝

茯苓

芍藥

甘草各三錢

礬蛭各七枚

大黃五錢

右細切用水一升煮至五合徐徐服之

宣風散治急驚風搐搦不定

枳榔二枚

陳皮

甘草各五錢

醫學正傳卷之六

主而

主

黑丑四兩半生半炒

右為細末二三歲兒蜜湯調下半錢已上一錢

食前服

五福化毒丹治急驚風痰執搐搦等證

桔梗微炒

玄參洗焙各一兩

青黛研

牙硝枯各二兩

人參去二兩

茯苓去皮五兩

甘草炙一兩半

銀鉤去衣

金鉤去衣

射香半錢另研

右為細末入研藥拌勻煉蜜丸每兩分作十二

凡一歲兒每一丸分四服用薄荷水化下瘡疹

餘毒上攻口齒涎血臭氣以生地黄自然汁化

一丸以鷄翎刷口內

金鉤九治急慢驚風痰涎壅盛

半夏湯泡七次

天南星煨裂

白附子炮

防風去芦各半兩

雄黃

硃砂各二錢半

生犀末錢

牛黃

龍腦

射香各半錢

金鉤二十片

右為細末姜汁調麵打糊為丸如麻子大每服

醫學正傳卷之六

主五

主

三五丸至一二十丸人參湯下慢驚風去龍腦

釣藤飲治吐利脾胃氣弱虛風慢驚

釣鈎藤半錢

蟬蛻

防風去芦

人參

麻黃去節

白殭蚕炒

天麻

蝎尾去毒炒各二分

甘草炙

川芎各半

右細切作一服水一盞煎至六分溫服量人大

小加減分數與之虛寒者加附子末半分

○溫白丸治小兒脾氣虛弱泄瀉瘦怯冷泄

吐瀉久病轉成慢驚身冷瘰癧等證

天麻半兩 白礬蚕炒 白附子生

金蝎去毒炒 天南星湯泡七次焙各二錢五分

右為細末湯浸寒食麵為丸如菴荳大每服五

七丸至二三十丸空心姜米湯下

○涼驚丸治驚悸

草龍膽 防風去芦 青代各三錢

鉤藤二錢 黃連一兩二錢 龍腦一錢

牛黃 射香各一兩

醫學正傳卷之六

三十一

卷之六

右為細末麥麵糊丸如黍米大每服三五丸至

一二十丸煎金銀湯送下

發搐二

○男發搐目左視無聲右視有聲

○女發搐目右視無聲左視有聲相勝故也更看所發時候

○早晨發搐因寅卯辰時潮熱目上視手足動搖

口流涎涎頸筋急此肝木太旺當補腎抑肝補

腎地黃丸抑肝瀉青丸主之

○日午發搐因巳未時潮熱心神驚悸目上視白睛

赤色牙關緊急口流涎手足動搖此心火太旺

也當補肝瀉心補肝地黃丸瀉心導赤散涼驚

丸主之

○日晚發搐因申酉時潮熱搐而喘目微斜視睡則

露睛手足冷大便下瀉淡黃水此是肺病當補

脾而益心肝補脾抑黃散抑心導赤散抑肝瀉

青丸主之

○夜間發搐因亥子丑時潮熱不甚搐而卧不穩身

体温無壯熱目睛斜視喉中有痰大便銀褐

醫學正傳卷之六

三十一

卷之六

色乳食不消多睡不惺當補脾抑心補脾黃散

抑心導赤散涼驚丸主之

○傷風發搐口中氣出熱呵欠煩悶手足動搖當發

散大青膏主之小兒稟賦素怯者多病此

○傷食發搐身體溫多唾多噎或吐不欲食而搐當

先定搐搐退用白餅子後服安神丸

○百日内發搐有真假二證真者不過三二次必死

假者發頻不為重真者內生驚癇假者外傷風

冷蓋血氣未實不能勝邪乃發搐也奚知假者

口中氣出熱也治之宜發散大青膏主之及用
塗頤法與沐沐法

○補腎地黃丸 見辨病門 瀉青丸 見前驚風門

○導赤散治心熱

生乾地黃 水通 甘草 炙各半分

右細切每服三錢水一盞入淡竹葉七片同煎
至半盞食後溫服 一本無甘草有黃芩

○涼驚丸 方見前 益黃散 方見辨病門

○大青膏治小兒傷風吐瀉心溫乍涼乍熱

醫學正傳卷之八

天麻 青代末 各一錢 白附子 一錢半

蝎尾 去毒 烏蛇肉 酒浸焙乾 硃砂

天竺黃 射香 各一錢

右為細末生蜜和成膏每服半皂子大或一皂

子大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄荷水化一

處服之五歲已上同并露飲服 錢本有天麻無大青按此知開

孝忠加減方也

○牛黃膏治熱及傷風壯熱引飲

雄黃 甘草 甜硝

寒水石 錢生各二 麝香 一錢 景荳粉 五錢

腦子 一錢

右為細末和勻蜜和成膏薄荷水化下半皂子

大食後服

○并露飲治心胃熱咽痛口舌生瘡併瘡疹已發末

發皆可服又治熱氣上攻牙齦腫牙齒動搥含

漱併服 方見痘疹門

○白餅子 又名E餅子 治小兒腹中有癖但飲乳嗽而生

痰

醫學正傳卷之八

滑石 輕粉 半夏 湯泡七次

南星 各一錢 巴豆 二十四粒去皮膜用水一升煮水不為度一作水三升

右研勻巴豆後入衆藥以糯米飯為丸如景豆

大捏作餅子三歲已上兒三五餅已下一二餅

煎薄荷湯下臨卧服

○塗頤法

射香 蜈蚣末 牛黃末

青代末 各一字 蝎尾 去毒為末半錢 薄荷葉 半錢

右同為細末研勻熟棗肉劑為膏新綿上塗勻

貼額上四方可出一指許火上炙手頻熨百日
裏外兒可用此及浴法

○浴体法治肥胎併胎怯胎熱

烏蛇肉酒浸焙末白礬

青代各二錢

天麻二錢

蝎尾去毒為末

硃砂各半錢

射香一字

右同研為細末每服用三錢水三碗帶葉桃枝
一握同煎至十數沸溫熱浴之勿浴背

○伍癩三

醫學正傳卷之六

三

云

九治小兒五癩皆當隨臟治之每臟各有一獸
所屬如大癩反折上竄大斗肝也○牛癩目直
視腹滿牛斗脾也○鷄癩驚跳反折手綻鷄斗
肺也○猪癩如尸吐沫猪斗腎也○羊癩目瞤
吐舌羊斗心也○伍癩重者死病後甚者亦死
治法並用五色丸主之

○五色丸

硃砂另研

珍珠末各五錢

水銀二錢半一作二兩

雄黃一兩一作三兩

黑鉛二兩同水熬○按用黑鉛二兩水銀當作二兩者為足無疑矣

石煉蜜丸如麻子大每服三四丸煎金銀薄荷
湯下

諸疳證四

論

內經曰數食肥令人肉熱數食甘令人中滿蓋其病
因肥甘所致故命名曰疳若夫襁褓中之乳子與四
五歲之孩提乳哺未息胃氣未全而穀氣尚未克也
父母不能調攝惟務姑息禽犢之愛遂令恣食肥甘
與夫瓜果生冷及一切煎餅調和之味朝食暮食漸
成積滯膠固以致身熱體瘦而色痿黃或肚大青筋
垂痛瀉利而諸疳之證作矣錢仲陽曰小兒病疳多
因大病後或吐瀉後以藥下之致脾胃虛損亡津液
而成蓋此證實由愚醫之所害耳斯言也特一端耳
未可悉以為然其所謂大病吐瀉豈非飲食之所致
與夫仲陽為兒醫之祖豈有誤耶其所論諸疳形證
治法班班可攷學者不可不審如疳在肝則膜睛
法當補肝地黃丸主之疳在心則面頰赤身體壯熱
法當補心安神丸主之疳在脾則體黃腹大好食泥

上法當補脾益黃散主之痺在肺則氣喘口鼻生瘡
 亦當補脾益黃散主之此虛者補其母也痺在腎則
 極瘦而身生瘡疥法當補腎地黃丸主之筋痺則濕
 血而瘦當服補肝地黃丸骨痺喜卧冷地當服補腎
 地黃丸內痺則目腫腹脹利色無常或沫青白漸而
 瘦弱此冷證也宜服木香丸外痺鼻下赤爛自鼻
 頭有瘡不結迦遠目而生當用治瘡爛香散白粉
 散等藥法曰諸痺皆依本藏而補其母則子自安假
 令日中潮熱是心經虛熱也肝為心之母宜先補肝
 肝實而後瀉心心得母氣則內平而潮熱愈矣餘皆
 倣此大抵痺病當辨冷熱肥瘦而治其初病者為肥
 熱痺久病者為瘦冷痺冷則用木香丸熱則當用胡
 黃連丸冷熱痺並宜如聖丸之類惟小兒之府藏柔
 弱不可痛擊大下必亡津液而成痺證為兒醫者常
 當以幼幼之心為心而善調之母縱巨膽妄為施治
 以絕人之嗣續幸甚
 瘰癧法並見前總章
 方法

地黃丸 補肝腎虛 治肝痺白膜遮睛筋痺瀉血腎痺
 身瘦瘡疥骨痺喜卧冷地又治胃怯不言鮮順
 小兒年長不能行者專服神効
 熟地黃 酒洗 山茱萸 乾山藥
 澤瀉 牡丹皮 白茯苓 各三錢
 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大三歲以下兒
 三丸至五丸熟水空心化下年長者量增丸數
 ○安神丸 治邪熱驚啼心痺面黃頰赤壯熱 方見驚風門
 ○益黃散 又名補脾散 治小兒脾胃虛寒脾痺體黃
 醫學正傳 卷之八
 腹大好食泥土肺痺氣喘口鼻生瘡等證
 陳皮 一錢 青皮 訶子皮
 甘草 炙各半錢 丁香 二分
 右作一服細切水一盞煎至六分溫服 愚每於本方加一錢効
 ○木香丸 治瘦冷痺
 木香 青皮 枳櫚
 肉苳菰 各二錢 射香 一錢 續隨子 去油
 蝦蟇 大壯者一名蟾酥俗名風鷄三箇燒存性

右為細末煉蜜丸如葦荳大每服三五丸至一
二十丸薄荷湯送下

○胡黃連丸治肥熱疳

胡黃連

宣黃連 各半兩 硃砂 一錢半

右為細末和勻填入獾猪膽內用淡漿煮以杖
子如鉋子上用線釣之勿著底候一條時取出
研入荳蔻射香各一分飯丸如麻子每服五七
丸至一二十丸米飲下○一方是蝦蟇半兩焙
乾不燒

醫學正傳

卷之六

三十五

水

○蘭香散治外疳鼻下赤爛

蘭香葉

聚名二錢 燒存性 銅青

輕粉 各半錢

右為末細乾付之

○白粉散治疳瘡

烏賊魚骨末

七

白芨末

三七

輕粉 一七

右為末和勻先用清漿水洗瘡拭乾付之

○如聖丸治冷熱疳瀉

史君子

一兩 去壳

胡黃連

川黃連

白蘆莢

去皮炒射香 各二兩 另研

乾蝦蟇

五箇 搗成膏

右為細末以蝦蟇膏和丸如麻子大二三歲兒
五七丸已上十九至十五丸人參湯下不拘時
服

○香蟾丸治疳消食積虫積肉積及治腹脹大

三稜

醋浸炒

蓬莪木

醋浸炒

青皮 去白

神麴

炒

麥蘖曲

炒

草龍膽 酒浸炒

檳榔 各五錢

木香 二錢

川練子 去核酒

史君子 去壳

胡黃連

川黃連 各四錢

白朮 一兩

乾蟾 五箇

醫學正傳

卷之六

三十五

水

右以白朮以上藥俱研為細末以乾蟾用醋煮
爛成膏和藥如乾再加醋糊為丸如麻子大每
服十五丸清米湯下

○荳蔻丸治小兒疳氣腹脹骨熱

荳蔻

另研

木香

檳榔 各二錢半

蝦蟇

酒浸多黃

黃連 各一兩

蘆莢 去皮

青皮

去白

陳皮 各五錢

巴豆

三七粒 去壳同上四味炒黃去豆

右為細末猪膽汁丸如小荳大三歲兒三十丸

米湯下

○又方治疳積腹大

胡黃連

去疳積一云

阿魏

醋浸去肉積各

射香

當門子

川黃連

炒大熱積神麴炒去食積

右為細末猪膽汁和丸如麻子大每服三十丸

白朮湯送下○一方有蒼朮半錢

○又方治小兒疳病

黃連

白朮

山查肉各五錢

胡黃連

蒼朮

三錢另蕪荑二錢五分

醫學正傳卷之八

三十一

五

神麴炒一錢

右為細末猪膽汁為丸如麻子大量兒大小加減

丸數與之

○祖傳經驗秘方檳榔丸小兒疳病積氣成塊腹大

有虫等證其效如神

檳榔

一兩

三棱

醋炒

蓬莪朮

醋炒各

青皮

炒大熱

陳皮

半兩

蕪荑

水洗淨二

雷丸

五錢

鶴虱

三錢

乾漆

五錢炒無

木香

三錢

良姜

二錢

砂仁

一錢

麥藥麴

五錢炒

胡黃連

三錢

甘草

三錢炙

神麴

五錢炒

山查肉

五錢

右為細末醋糊為丸如菉荳大每服三五十丸

空心淡薑湯送下

吐瀉五

論

內經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱又曰濕勝則

濡泄夫小兒之吐瀉皆由乳食過度傳化失常蓋食

滯則成熱熱鬱則成酸酸而成吐成瀉此必然之理

醫學正傳卷之八

卷之八

三十七

也又曰食滯於胃口者為吐食滯於大小腸者為瀉

有生下而遂吐不休者胞胎中穢惡流於腸胃而為

吐也丹溪曰錢氏五補五瀉之法俱可選用謹遵而

依法具錄如左

脈法 並見前總章

方法

錢氏曰小兒初生下吐蓋拭掠兒口中穢惡不盡噤

入喉中故吐木瓜丸主之

凡生手於未啼時先

拭令爭後以黃連甘草二味等分煎汁灌之

則無已上疳病出痘疹亦稀少若啼聲一舉則

下矣亦當用黃連片
草汁飲之不可忽也

○木瓜丸

木瓜末

木香末

射香末

賦粉

即是輕粉也

檳榔各一字

右再研勻麪糊為丸如黍米大每服三二九并草湯送下

○初生三日內吐瀉壯熱不思乳食大便乳食不消

或白色知是傷食當下之而後和胃不用白餅

子和胃益黃散上二方俱見前

醫學正傳六

卷之八

三十八

三十八

○初生三日以上至十日吐瀉身不熱或乍熱乍涼

不思乳食大便青白色乳食不消此上實下虛

也更有五藏兼見證宜詳○肺病則睡多露睛

喘氣○心則驚悸飲水○脾則困倦饒睡○肝

則呵欠頓悶○腎則不語畏明常先見兒兼藏

補脾益黃散主之蓋此二證多病在夏秋也常

見兒藏其未詳思有脫簡以俟知者正之

○五月二十五日以後至後吐瀉身壯熱此熱乃

藏腑中十分中九分熱也或因傷熱乳食吐乳

不消瀉深黃色玉露散主之

○玉露散一名非露散

石膏

寒水石

各半兩

生甘草二錢半

右為細末每服一字或半錢溫水調下

○六月十五日以後大暑吐瀉身溫似熱臟腑六分

熱四分冷也嘔吐乳食不消瀉黃白色似渴或

食乳或不食食前少服益黃散食後多服玉露

散

按丹溪用去桂五苓散倍白水加蒼朮甚者二

醫學正傳六

卷之八

三十九

三十九

朮炒用或入益元散和勻米湯調下甚効

○七月七日以後立秋後吐瀉身溫涼七分熱也不

能食乳多似睡悶亂哽氣長出氣睡露睛唇白

多噦欲大便不渴食前多服益黃散食後少服

玉露散

○八月十五日以後秋分吐瀉身冷無陽也不能食

乳乾噦瀉青褐水當補脾益黃散主之不可下

也

○吐瀉泄黃傷熱乳也吐瀉瀉青傷冷乳也皆當下

白餅子主之傷熱乳者非露散傷冷乳者

散溫中丸並於下後服之亦有不須下但服此

藥愈者

○溫中丸

人參

甘草

白朮

各一兩

右為細末姜汁麴糊為丸如棗豈大每服一二

十九粳米飲下

○虛弱脾胃不和不能食乳致飢肉消瘦亦有因大

病後或吐瀉後脾胃尚弱不能傳化穀氣也有

醫學正傳六

卷之六

四十一

冷者時時下利唇口青白有熱者身溫壯熱肌

肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香丸夏月不可

亦須少熱者胡黃連丸冬月不宜服木香丸胡

黃連丸二方並見前

○吐瀉調脾胃散入熱蜜和蘇合香丸名萬安膏

米飲調服

○一方治吐瀉黃疸

三稜

義木

青皮

陳皮

神麴

麥蘖

黃連

甘草

白朮

按各等分

右為細末溫水調服傷乳食吐瀉加山查時氣

吐瀉加滑石發熱加薄荷

○夏月吐瀉川益元散極効當表而出之

○附證

愚按小方脉科惟急慢驚風與夫痘疹等證最

為酷疾以其吉凶及掌生死須臾故也次則五

疳吐瀉為證不一亦不可以易而治也已上四

醫學正傳六

卷之六

四十一

證各立篇目辨論詳明外其余一切小疾繁瑣

多端一一不能詳盡故各附於吐瀉之後以備

檢閱參用云爾

一腹脹

二腹痛

三夜啼

四痰熱

五解顛

六吃泥

七脫囊

八脫肛

九赤痢

十臍汁出

十一頭瘡

十二尾骨痛

十三重舌木舌十四鵝口口瘡十五走馬牙疳十

六疳風撮口

腹脹條

天腹脹由脾胃虛氣攻作也亦有實者必悶亂喘滿可下之宜用紫霜丸白餅子不喘滿者虛也不可下若誤下致脾虛氣上附肺而行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類脾主四肢母氣虛甚則目胞腮腫也色黃者屬脾也治用塌氣丸漸消之未愈漸加九數不可以丁香木香桂皮豆蔻大溫散藥治之蓋脾虛氣未出腹脹而不喘者可以溫散藥治使上下分消其氣則愈也若虛氣已出附肺而行則脾胃內弱每生虛氣入於四肢面目矣小兒易為虛實脾虛不受寒溫脹寒則生冷証脹溫則生熱証當識此不可也胃久虛熱多生痘病或引飲不止脾虛不能勝濕隨肺之氣上行於四肢若水狀濕氣浸浮於肺則大喘也此當服塌氣丸而愈

○塌氣丸治小兒虛脹如腹大者加羅麻子名偽丸

子

胡椒 一兩

蝎尾 去毒 半兩

一方二味各 四十九箇

右為細末麵糊為丸如粟米大每服五七丸至一二十丸陳米湯下無時○一方有木香一錢○治小兒腹虛脹先服塌氣丸不愈腹中有食積結糞小便秘黃微喘脉伏而實時欲飲水能食者可下之宜消積丸紫霜丸蓋脾初虛而後結有積所治宜先補脾而後下之後又補脾則愈也可補肺恐生虛氣

○一方腹脹

蘿蔔子

紫蘇梗

乾葛

醫學正傳卷之八

四十一

陳皮各等分

甘草少許

右細切水煎服食少者加白朮

腹脹多是飲食所傷

白朮一錢半

陳皮去白

青皮去穢各七分

山查去核

神麴炒

麥芽炒

砂仁各一錢

甘草炙半錢

有熱加黃芩

有寒加藿香吳茱萸

右為細末每服一錢七分清米飲或白湯調下

○腹脹口中氣溫面黃色目無精彩或白睛多及多

睡畏食或大便酸臭者當磨積宜消積丸甚者

用白餅子下之後和用白木散

○白餅子方見前論等下

○白木散方見前論等下

○消積丸

丁香九粒

砂仁十二箇

巴豆二箇去皮心腹及去油

右為細末麪糊為丸如黍米大三歲已上三五

丸已下一二丸溫水下

○心腹痛面眊白口中沃沫及清水出發痛有時當

醫學正傳卷之八

四十五

作蛭虫治又曰凡積痛食痛寒痛虫痛大同小

異惟虫痛者當口淡而沫自出小兒本怯故胃

寒冷故虫動而心頭痛與癰畧相似但目不斜

而手不搖耳安虫散主之

○安虫散室鑑用米糊為丸名安虫丸

黃粉炒黃色

枳榔

川練子去核

鴨虱各二兩

白礬二錢半火枯

右為細末每服一字大者半錢或一錢溫米飲

下臨痛時服

○集効丸治虫痛

木香

鷓鴣炒

枳榔

訶子煨去核

蕉莢

附子去皮脂炮

乾姜

大黃一兩半

烏梅去核二錢半

右為細末煉蜜為丸陳皮湯下或醋湯下一方

加黃芩黃連

○一方治虫用鷄子炒白臘塵酒糊丸服一云治寸

○一方治蛭虫作痛用二陳湯加苦練根煎服或只

以苦練根向東南生不出土者刮去蠶皮取白

醫學正傳卷之八

四十五

皮細切濃煎汁一盞徐徐飲之不可飲多先以

糖蜜或炒肉食之引虫頭向上然後服之看兒

大小斟酌與之

○小兒吃糞腹痛用白酒藥加黃連末合研湯調服

之即愈

○一方治小兒腹痛

甘草炙

乾姜各二錢

伏龍肝一兩

人參

茯苓

百草霜

白朮各五錢

右為細末粥九梧桐子大每服三五十丸陳皮湯下

○小兒夜啼作心經有熱有虛治

人參 黃連姜汁炒各半 甘草五分

竹葉二十片

右為細切分作二貼每貼加生姜一片水煎服

一本無人參

○錢氏曰小兒夜啼者脾藏冷而痛也當以溫中藥

之宜益黃散及以法穰之花火膏之類愚按上說不

醫學正傳卷之八 四十六

脾寒未和執是

○花火膏

燈花三顆以乳汁調抹兒口或抹好乳上令兒

吮之

○治驚啼邪熱衆心也安神九主之方見前

○小兒風痰藥盛用

南星五錢切片以白礬湯泡晒乾

白附子二兩

右二件共為末麪糊為丸如芡實大每服一丸

姜蜜薄荷湯化下

○小兒痰熱骨蒸用

二陳湯半碗加升麻二錢 葛根

白芍藥各一錢 人參一錢 五味子三十粒

右細切分三貼加姜棗水煎服

○又方治前證用

胡黃連 檳榔各一錢 陳皮

雷丸各一錢半 神麴半錢

史君子 白芍藥各二錢

醫學正傳卷之八 四十七

右為細末麪糊為丸如黍米大每服三五十丸

白湯下

○小兒解顱頭縫不合也因母氣虛與熱多也錢氏曰主

下而顱不合腎氣未成也雖長必少笑更有目

白睛多面眦白色瘦者多愁少喜也丹溪用四

君子湯合四物湯有熱加黃連酒炒煎服更以

帛緊束及以白歛末付之

○小兒吃泥胃氣熱也用欬石膏黃芩陳皮茯苓白

朮煎服

○小兒脫囊陰囊腫大墜下而不收也亦有囊皮脫爛者木通甘草黃芩

當歸苦茶煎服囊爛者以野紫蘇葉紅者為

末香油調付皮脫兩丸露者外以青荷葉包之

付藥後自生皮

○脫肛門脫下也用東壁土泡湯先薰後洗

○又方治前證用五倍子為細末付而頻托入之

○又方治前證用蠶頭燒存性香油調付一云以此

良收

○小兒疳積俗名赤痢風也此蓋熱毒氣客於腠理搏於血

醫聖正傳入卷之八 四十八

氣發於皮外赤如丹也用

生地黃 木通 荊芥本有為藥桃仁

若寒帶表之藥外以芒硝泡湯洗之又以芭蕉

油塗之戲氏用白玉散付之皆効

○白玉散

白堊即白也五錢寒水石二兩

右為細末米醋或汲水調

○小兒臍中汁出併痛用白礬火煨枯乾付或用

栢末付之

癩頭用通聖散酒拌除大黃另用酒炒共為末再

以酒拌焙乾每服一錢水煎服外以白炭燒紅

淬入水中乘熱洗之更以胡荽子伏龍肝懸龍

尾黃連白礬為末油調付之

○又方治癩頭以松樹厚皮燒存性二兩黃丹火飛

一兩白礬火枯黃連大黃各五錢白膠香火飛

傾石上一兩輕粉四味共為末熟香油調付

○丹溪治一小兒二歲滿頭生瘡一日瘡忽自平遂

患痰喘知其為胎毒也詢其母孕時多食辛熱

醫聖正傳末卷之八 四十九

物遂以人參連翹黃連甘草陳皮川芎芍藥木

通濃煎入竹瀝與之數日而安

○尾骨痛屬陰虛有痰

陰虛用四物湯加炒黃柏酒知母少用桂為引

或以前胡木香為引如痛不止加乳香沒藥○

痰用二陳湯加知母黃柏澤瀉必用前胡木香

為引蓋陰虛故痰盛也如痛不止亦加乳香沒

藥○二法必先以玉燭散或通經散痰小胃丹

大小後用之或神祐丸十棗湯皆可與治帶同

小兒弄舌因脾藏有微熱令舌絡微繁時時弄舌
舐之勿用冷藥及下之少與瀉黃散徐徐服之
有欲飲水者非熱也脾胃中津液少也不可下
若大病後弄舌者凶

○瀉黃散

藿香葉 七分

梔子 一錢

石膏 半錢

甘草 七分半

防風 四分

右細切作一服用蜜酒炒香熟用水一盞煎至
半盞去粗時時與之

醫學正傳六卷之八

五十一

水

○龜膏乃肺熱脹滿攻於膏肓即成龜背又乳母多
食五辛熱物亦成此證宜瀉白散加黃芩

瀉白散

桑白皮

蜜水拌炒地骨皮 一錢

甘草 炙半錢

加黃芩 一錢

右作一服水煎

○龜背兒生下客風入脊逐於骨髓即成龜背治之
以龜尿點骨節即平○取龜尿法用草葉置龜
於上尿自出

○重舌木舌乃小兒舌下生舌也

用三稜針於舌下紫脉刺之出惡血即愈

○又方用竹瀝調蒲黃末付舌上神効

○又方治小兒木舌塞口欲滿者用紫雪二錢竹瀝
半合細研和勻頻付口即愈

○治小兒口瘡用鹽白梅

燒存性

紅棗 連核燒存

鉛丹 火飛

人中白 火飛

龍腦 少許

共為細末服之神効

○治小兒鵝口瘡因白屑滿舌及兩脰故名鵝口用

醫學正傳六卷之八

五十二

三十五

水

髮纏指頭蘸井花水拭口令淨又用濃煮粟米
汁以綿纏指頭拭之更以煨過黃丹搽之即愈

○又方治鵝口瘡不能食乳用地鷄搗水塗瘡即愈

地鷄即隔虫也人
家磚石下多有之

○治小兒口瘡瀉心湯用黃連為細末蜜水調服

○治小兒口瘡用黃柏細辛各等分為細末付之

○治小兒頰上生瘡痛痒難忍用白楊木枝燒於刀

上出瀝付之及治鵝口瘡神効

○治小兒走馬牙疳方其効如神

白礬

黃丹

京東

共為末付之

又方治牙疳用白礬置於五倍子內煨過為末付之

治小兒臍風撮口因臍斷傷風或尿在胞中遂成

臍風發熱面赤啼聲不出名曰撮口風

赤脚金頭蜈蚣一條瞿麥五分 蝎稍四箇

蟬蛻七箇

右末鵝毛管吹些少入鼻中如噴嚏叶聲可治

醫學正傳卷之八

五十二

後用薄荷汁調與服之

痘疹六

論

內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火夫小兒痘疹之證最為酷疾不日之間死生反掌蓋因胎毒藏於命門遇歲火太過熱毒流行之手則痘毒因之而發作矣一發則出於心肝脾肺四藏而腎無留邪者為吉若初發便作腰痛見點則紫黑者多死蓋毒氣留於腎間而不發越故耳錢氏須有百祥丸大下之法

上無一二大抵痘瘡之法多歸重於脾肺二經蓋脾

主肌肉而肺主皮毛故遍身為之斑爛也其為證也

宜發越不宜鬱滯宜紅活凸縱不宜紫黑陷伏瘡出

之後醫者當察色詳證以辨表裏虛實用藥其吐瀉

不能食為裏虛不吐瀉能食為裏實灰白色陷頂多

汗為表虛紅活凸縱無汗為表實又諸痛為實諸痒

為虛外快內痛為內實外虛外痛內快為內虛外實

裏實而補則結雍毒表實而復用實表之藥則潰爛

不結痂也如表虛者瘡易出而難醫表實者瘡難出

而易收裏實則出快而輕裏虛則發遲而重表實裏

虛則陷伏倒靨裏實表虛則發慢收遲治之之法三

日已前未見紅點必用升麻湯三蘇飲之類以發其

表務令微汗為度若未汗如表猶未解雖畧見紅點

隱約於肌肉間而升散開發之劑尚未可除凡見出

遲發慢者根窠欠紅活者便當憂慮調攝切勿袖手

待斃夫古人用藥寒熱迥別主意不同醫者再宜臆

度寒暄推詳運氣而治如陳文中之木香散異功散

用丁附姜桂等峻熱之藥而與內經病机不合丹溪

論發揮其誤亦有用得其當者屢獲捷効若劉河間
張子和輩悉用本連人黃等寒涼之劑丹溪亦曰酒
炒本連各解痘毒依法用之而獲安者亦不少也今
之醫者往往不同依陳氏而行者多用熱藥宗劉張
而治者多用涼劑是故不偏於熱則偏於寒此刻舟
求剴之道也愚按內經有曰寒者熱之熱者寒之微
者逆之甚者從之又曰逆者正治從者反治從少從
多觀其事也陳氏用從治之法權也劉張用正治之
法常也然皆不外乎參苓芪草芳歸茯苓芍藥等補

醫學正傳六 卷之八

五十四

氣血藥為主治焉亦當看時令寒熱緩急施治固不
執一見也楊氏曰痘瘡發於肌肉陽明胃氣主之脾
土一溫胃氣隨暢決無陷伏之患湯氏曰如痘人籠
蒸之法但欲其鬆耳滄淵翁呂復折衷衆說着方立
論適中用藥寒熱攻補斟酌時宜未嘗執一治也學
者能遵守其法而行之庶無一偏之患矣

○丹溪治小兒痘方法 九三十二條

夫小兒痘瘡大抵與傷寒相似發熱煩躁臉赤唇紅
身痛頭痛乍寒乍熱噴嚏呵欠喘嗽痰涎始發

有因傷風傷寒而得有時氣傳染而得有因傷食發
熱嘔吐而得有因跌撲驚恐蓄血而得或為目窠驚
猪如風之證或口舌咽喉肚腹疼痛或煩躁狂悶昏
睡或自汗或下利或發熱或不發熱證候多端卒未
易辨必須以耳冷尻冷驗之蓋瘍疹屬陽腎藏無證
其耳與尻俱屬腎故腎之所部獨冷又不善視其耳
後有紅脉赤綫為之真如此可以稽驗矣治療之法
首尾俱不可妄下但溫和之劑煎而濟之解毒和中
安表而已虛者益之寒者損之寒者溫之熱者清之

醫學正傳六 卷之八

五十五

是為權度昔人有喻云小兒人籠蒸之法但欲其鬆
耳蓋毒發於表如苟妄汗則榮衛益虛重令開泄轉
增瘡爛由是風邪乘間變證者多矣專根如裏如苟
妄下則內氣益虛毒不能出而返入焉由是土不勝
水變黑歸腎身體振寒耳尻返熱眼合肚脹其瘡黑
陷十無一生汗下二說古人深戒以此觀瘡疹證狀
雖與傷寒相似而其治法實異傷寒從表入裏瘡疹
從裏出表故也解肌之法葛根升麻紫蘇之類可也
其或氣實煩躁熱熾大便秘結則與犀角地黃湯或

人參敗毒散又或紫草飲多服亦未利之也雖云六便不通者少與大黃尤宜仔細斟酌不可妄用猛浪如小便赤澀者分利小便則熱氣有所滲而出凡熱不可驟遏但輕解之若無熱則瘡又不能發也

○凡瘡疹春夏為順秋冬為逆

○凡痘疹分人清濁就形氣上取勇怯

○凡瘡疹但覺身熱証似傷寒疑似未明便當先與惺惺散

或參蘇飲熱甚者升麻葛根湯人參敗毒散若

見紅點便忌葛根湯恐發得表虛也

○凡痘瘡初欲出時身發熱耳尻冷呵欠咳嗽面赤必是出痘之候便宜服升麻葛根湯加山查大力子其瘡出必稀少而易愈

○凡痘瘡初出時或末出時宜服後藥多者可少少者可無重者可令輕也方一絲瓜俗名天蘿近蒂三寸連皮子燒存性細研砂糖拌乾吃入硃砂尤妙

○又方以硃砂一味為細末看兒大小或半錢或一錢蜜水調服亦少可少少可無

○凡痘疹發熱之時更以惡質子為末蜜調貼額間免眼疾之患

○凡痘瘡初出之際須看背脊前若稠密急宜服清毒飲加山查黃芩酒洗紫草煎食者加人參

○凡痘瘡初出之時色白者便當大補氣血參朮芪芍升麻乾葛甘草木香丁香酒當歸白芍藥如大便泄加訶子肉豆蔻

○凡痘瘡初起發時自汗不妨蓋濕熱薰蒸故也甚者當以參芪等實表之藥以防其難靨也

醫學正傳卷之八

五十七

木

○凡痘瘡初起發時煩躁譫語狂渴引飲若飲水則後來靨不齊急以涼藥解其標如益元散之類

○凡痘瘡已出可少與化毒湯出不快者加味四聖散紫草飲子紫草木香湯快班湯絲瓜湯之類

○凡痘瘡出稠密甚者人參敗毒散犀角地黃湯

○凡痘瘡疎則毒少密則毒甚宜以清涼之藥解之酒炒芩連之類雖數服亦不妨庶無害眼之患

○凡痘瘡灰色白淨者作寒紫黑色者齊湯者煩

忌作熱看黑屬血熱涼血為主白屬氣虛補

氣為主中黑陷而外白起得遲者則相煎而治

○凡痘瘡常分表裏虛實吐瀉少食為裏虛不吐瀉

能食為裏實裏實而補則結癰毒陷伏倒靨灰

白色者為表虛紅活凸綻者為表實表實而復

實其表則潰爛不結痂也表虛不起候者或川

燒人尿驗

○凡痘瘡症分氣虛血虛用補藥氣虛者人參白朮

加解毒藥血虛者四物湯加解毒藥酒炒芩連

合解毒藥蓋本連為瘡家之要藥加以酒炒以制其酸寒之性故有清涼解毒之能是

醫學正傳卷之八
痘瘡之症常用
以殺其毒耳
五十八

○凡痘瘡雖分氣血虛實大抵多屬氣血不足然當

於不足中以別其優劣而以補氣也藥中分輕

重為用以平為期耳有挾外邪而實者少加防

風等藥

○大法活血調氣安表和中輕清消毒溫涼之劑調

而治之此平治之法也溫如黃芪當歸木香輩

涼如前胡乾葛升麻輩佐之以川芎白芍藥枳

殼桔梗羌活木通紫草之屬則可以調適矣

○黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者酒炒黃芪

紫草人參等藥

○凡黑陷甚者亦用燒人尿別用無病小兒糞燒存

性蜜水調服一方用人狗猪犬四糞於臘月燒

灰名萬金散

○痒塌者於形色脉上分虛實實則脉有力氣壯虛

則脉無力氣怯痒以實表之劑加涼血藥實痒

如大便不通者以大黃等寒涼之藥少與之下

其結糞氣怯輕者用淡蜜水調滑石末以鵝翎

醫學正傳卷之八
五十九
刷瘡上潤之

○瘡乾者宜退火止用輕清之劑荊芥薄荷升麻乾

葛之類

○瘡濕者肌表間有泄氣也宜瀉濕藥白芷防風之

類蓋風藥能勝濕也

○咽喉痛者如聖散鼠粘子湯

○喘滿氣壅者麻黃黃芩湯

○煩渴者甘草散烏梅湯

○下利嘔逆者木香理中湯

○顏色正者以前法平治則安將欲成就脚色淡者宜助血藥用當歸川芎酒芍藥之類或少加紅花以潤血色將成就之際脚色紫者屬熱用涼藥解其毒升麻葛根湯炒苓連及連翹之類甚者必用犀角蓋犀角大解痘毒

○將靨時金白色如痘殼者蓋因初起時飲水多其靨不齊名曰倒靨不好宜服實表之藥及消息大小便何如大便秘宜利大便秘宜利小便如小便赤澀者大連翹湯甘露飲大便秘結內煩外熱者小柴胡湯加枳殼最穩當或少服四順清涼飲子

○夫瘡疹用藥固有權度大小二便不可不通其大便看陷下黃黑色其毒氣已盛不可多與熱劑但少用化毒湯可也或不用亦可若大小二便一有秘結則腸胃壅遏脉結氣滯毒氣無從發泄目閉聲啞肌肉黧黑不旋踵而變矣陷入者加味四聖散更以胡荽酒薄傳其身厚傳其足噴其床帳衣被併以厚綿衣蓋蔽未起獨聖

醫學正傳

卷之六

六十一

痘

醫學正傳

卷之八

六十二

痘

散入木香煎服若其瘡已黑乃可用宣風散加青皮錢氏云黑陷青紫者百祥丸下之不黑者慎勿下余知其所下者瀉膀胱之邪也又云下後身熱氣溫欲飲水者可治水穀不消或寒戰者為逆余知其脾強者土可以制水也百祥丸恐太峻當以宣化散代之瀉後溫脾則用人參茯苓白朮等分厚朴木香甘草各減半為妙蓋瘡發肌肉陽明主之脾土一溫胃氣隨暢獨不可消勝已泄之腎水乎此錢氏不刊之秘也

○其壞瘡者一曰內虛泄瀉二曰外傷風寒三曰變黑歸腎

○近時治痘瘡者悉宗陳文中木香散異功散殊不知彼立方之時必運氣在寒水司天之令及值嚴冬大寒為因氣鬱遏痘瘡不得起發紅綻故用辛熱之劑發之其宜也今人不分時令寒熱一槩施治誤人多矣或有雖值溫熱之時山野農家貧賤之人其或偶中一二不可以為常法也

○愚按陳氏木香散異功散二方乃素問從治之法
又謂之熱火處于子母之分不傷皮毛彰君之
德也或云瘡發癰腫於外者屬少陽三焦火也
謂之斑色小紅而行於皮膚中出者屬少陰君
火也謂之疹楊氏曰痘瘡發於肌肉陽明胃氣
主之脾土一溫胃氣隨暢土可勝水決無陷伏
之患

辯內外因

凡瘡欲出而未出因發搔者是外感風寒之邪而

醫學正傳

卷之八

六十三

三百七十一

內發心熱也宜王氏惺惺散或升麻葛根湯木
香參蘇飲 凡瘡欲出未出而吐利者是中焦
停寒或挾宿食也宜四君子湯加砂仁陳皮或
和中散如挾宿食者用紫霜丸

王氏惺惺散

白朮

桔梗

細辛

人參

茯苓

甘草

括麥根

右細切入薄荷葉三片水一盞煎七分時與之

升麻葛根湯

葛根

升麻

芍藥

甘草

各一錢

右細切作一服水一盞煎七分溫服無時

木香參蘇飲

人參

蘇葉

桔梗

乾葛

前胡

陳皮

茯苓

枳殼

木香

一分半

半夏

右細切作一服加生薑三片水一盞煎七分溫服

四君子湯

人參

白朮

茯苓

甘草

右細切水一盞煎六分食前溫服加宿砂陳皮

醫學正傳

卷之八

六十三

三百七十一

名六君子湯因熟用者也蓋痘瘡熱毒拂鬱於
內而不得起發故用丁附木香桂心荳蔻等辛
散劫鬱之劑一二服劫而開之使向之鬱于
內者因藥氣而發越乎外故痘子陷伏灰白色者
皆翕然紅活凸綻而內無遺邪矣切勿過劑如
一二服後劫不起者亦不可多與多則反助其
毒轉增黑爛咽閉声沉而死近世儒醫悉引內
經病机諸痛痒瘡瘍皆屬心火之語以正陳氏
之失此知常而不知權之論也故使後學狐疑

不決當用而不敢用是以袖手待斃哀哉

○痘瘡初發時五藏形証一

面及腮頰赤噴嚏呵欠煩悶屬時發驚悸

○痘瘡五藏形色二

肝藏發水痘色微青以液為淚故

肺藏發膿痘色微白以液為涕故

脾藏發疹或如糖漿其色如淺黃

心藏發斑其色主血故純赤

腎藏居下獨不受穢毒故無候但耳尻冷耳聾

醫學正傳

卷之八

六十四

痘瘡黑陷耳及尻及熱者為逆

○斑痘所發之源叁

夫嬰兒之胚脾也必資胎養以長其形焉緣母

失節慎縱欲恣食感其穢毒之氣藏之藏府近自

孩提遠至童稚值寒暄不常之候瘡疹由是而發

因其所受淺深而為稀稠焉其原實係於心云

相火之氣所為故入於肺則成膿胞俗名疏豆

亦名麻豆以相火乘金故尻冷也入肝肺則成水

疹俗名楚瘡入于脾則成癰疹入於心則成斑以

○和中散

厚朴姜汁制 白朮半錢 乾姜炮

甘草炙各

右細切作一服加生姜一片水一盞煎六分稍

熱服

○紫霜丸

杏仁五十枚 赤石脂一兩 巴豆三十粒

代赭石煅醋淬

右各另研為末和均湯浸蒸餅為丸如黍米大

醫學正傳

卷之八

六十五

三歲以下兒二三九八歲以上十數丸食前米

飲或乳汁送下

○辯形氣病四

如瘡已出而聲不更者形病也瘡未出而聲變

者氣病也宜補肺散加生芪○瘡出而聲不出

者形氣俱病也形病身溫者宜解毒防風湯大

便閉者宜當歸丸○形氣俱病小兒稟賦素弱

者宜豫服十奇散倍歸散以木香煎服

○補肺散

阿膠一錢半 牛旁子炒三分 馬兜鈴半錢

非草二分半 杏仁三粒 糯米一錢

加生黃芪半錢

右為末分二服水一小盞煎六分食後時時與之

○解毒防風湯

防風去蘆 地骨皮 生黃芪

芍藥 荊芥穗 鼠粘子炒各半錢

右細切作一服水煎或為細末溫水調服亦可

○當歸丸

當歸半兩 黃連一錢 大黃二錢半

甘草四錢

右先以當歸熬成膏以下三味研為細末以膏

和為丸如胡椒大三歲以下兒十九七八歲兒

二十九食前清米飲下漸加至以利為度

○十奇散即托裏十補散又

黃芪 人參 當歸各二錢

厚朴姜制 桔梗去蘆各一錢 桂心三分

川芎 防風 甘草

白芷各一錢

右為細末每服一錢或二錢溫酒調下細切

煎亦可

○辯三陰三陽經候五

太陽病寒身熱小便赤澀出不快宜荊芥甘草

防風湯少陽病乍寒乍熱出不快宜連翹防風

湯

陽明病身熱目赤大便閉實瘡遍肌肉出不快

○宜升麻葛根湯加紫草

太陰病自利四肢逆冷宜附子理中湯本香散

少陰病瘡黑陷口舌燥宜四物湯加紫草紅花

厥陰病舌卷伸縮時發厥逆宜異功散

三陰病法當救裏故宜以溫劑助之

○荊芥甘草防風湯

荊芥 薄荷 牛旁子

防風 甘草各六分

右細切作一服水一盞煎六分

○連翹防風湯

連翹

防風

瞿麥

荊芥穗

木通

車前子

當歸

柴胡

赤芍藥

白滑石

蟬蛻

黃芩

紫草茸各三分

甘草一分炙

右細切作一服水一盞煎七分隨時大小量數

輕重與之大小便自利者不宜用

○升麻葛根湯方見前條每服加粳米五十粒紫草半錢

煎

又一方升麻湯治斑在面

升麻一錢

犀角

射干

黃芩酒浸乾

人參

甘草各半錢

右細切作一服水一盞煎六分食前溫服

○理中湯

人參

甘草炙

白朮

乾姜炮各八分

右細切作一服加炮附子三分甚者五分量完

大小加減水煎食前稍熱服

○木香散

木香

大腹皮

人參

桂心

青皮

赤茯苓

前胡

訶子煨去核

半夏姜制

丁香

甘草各三分

右細切作一服加生姜三片棗一枚水煎量大

小加減分數與之

○異功散

木香

當歸酒洗去片

桂心

白朮麩炒

茯苓

陳皮

厚朴姜製

人參

肉蓯蓉麩炒

丁香

半夏湯泡七次

附子炮各三分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎服

○辯三陽証治九痘疹春夏為順當純陽之時也古人治法與傷寒同

足脛熱

兩腮紅

大便秘

小便澀

渴不止

上氣急

脉紅數

已上七証不宜服熱藥

瘡疹一發便密如黍種布或如糠粃者合清毒
宜連起升麻湯或末出而先發者是熱外感風
寒之邪宜荊芥湯下解毒丸及犀角地黄湯瘡出
不快清便自調如其在表當微發散升麻葛根
湯若瘡青乾黑陷身不大熱大小便澀滯是熱
蓄於內宜煎大黃湯下宜風散若表大熱者不
可下黑陷甚者有祥丸○若瘡已發稠密微喘
渴欲飲水宜微下之當歸丸及龐氏地黃膏外
以黃柏膏塗面佳

醫學正傳

卷之八

七十一

下焦

值盛夏暑熱正熾適瘡火發煩渴大便實者宜
玉露散及甘露飲子或昏冒不知人時作搐搦
察側脣黑陷者宜猪心龍腦膏

○連翹升麻湯

連翹升麻湯一分是也

○犀角地黄湯

犀角

鎔

生地黄

牡丹皮

赤芍藥

各等分

右細切水煎服

○解毒丸

寒水石

研各

青代

兩

右以二石細研如粉入青黛和均湯浸蒸餅為
丸如芡實大每服一丸食後新汲水化下或細
嚼姜水下亦可三歲兒服半丸量歲數加減服
之

○宜風散

換御

二枚

陳皮

甘草

各半兩

黑丑

末四兩收頭

右為末量見大小以密湯調服

醫學正傳

卷之八

七十一

下焦

○百祥丸

紅牙大戟

不拘多少陰乾漿水煎極軟去骨日中曝乾後納汁中煮汁盡焙乾為細末

右一味以湯浸蒸餅為丸如粟米大每服十

丸研碎升麻湯下量見大小加減丸數與之

○龐氏地黃膏

生地黄

四兩

豈豉

半升

雄黃

一錢

射香

半錢

右以猪膏一斤和均露一宿煎五六沸令三分

去絞去下椎黃射香攪均稍稍飲之毒從皮

膚中出即愈

○黃柏膏

黃柏一兩去粗皮 生麻油一兩 甘草四兩

右為細末以生芝麻油調從耳前至眼眶並厚塗之日三二次如用早能令瘡不至面縱有亦稀少

○王露散方見前

王海藏云非腎熱相火盛者不宜服此藥利此方

○其露飲子卷之八

生地黃並用 熟地黃並用 天門冬

麥門冬 枇杷葉去毛 枳殼炒

黃芩 石斛去根子 山茵陳

甘草各等分

右細切作一服水一盞煎六分食後溫服

○猪心龍腦膏

梅花腦子一字研

右取新宰猪心血一箇為丸如芡實大每服

一九或半九量見大小與之紫蘇湯下或井花

水化下亦可

○辯三陰証治凡瘡發於秋冬為逆

足胫冷 腹虛脹 糞青色 面

皎白 嘔乳食 目睛青 脉沉

微 已上七証不宜服寒藥

疽瘡盛出四肢逆冷或自利係在太陰脾經宜急

溫之用異功散附子理中湯調中丸○疽瘡平塌

灰白色不澤此是正氣不足宜十補托裏散倍黃

○醫學正傳卷之八

芪加熟附子○或四肢厥逆時作搐搦係在厥陰

宜溫之異功散加防風青皮或和中散去乾葛蘆

香加附子肉桂心

調中丸

白朮炒 兩 人參半兩 甘草炙 半兩 乾姜炮 四

右為細末煉蜜為丸如棗豈大每服多不過二十

丸溫水食前送下

形氣不足八

肺主氣不足則致後三証

自汗聲不出 瘡頂而損 不綻肥

並宜十奇散自汗倍黃錢聲不出倍枯梗

心主血血不足則致後三証

灰白色 根窠不紅 不光澤

並宜芍歸湯加芍藥紫草紅花良驗

○芍歸湯

川歸 川芍各二錢半 右細切水煎服

辯表裏虛實九

醫學正傳卷之八

表裏俱實其瘡難出而易靨

表裏俱虛其瘡易出而難靨

諸痛為實內快外痛為外實內虛內痛外快為內實外虛

諸寒為痛凡瘡外身痛不為外寒所折則內寒厚傷宜分而治之若紅點方見為寒

所折而肉林有熱宜木香參蘇飲輕者消毒飲或葛根升麻加芍藥湯肉

膜毒者宜活血散併均氣散

諸痒為虛凡血氣不足多痒此証所謂諸痒為虛宜十補托裏散及木香散加丁香

官桂胃主肌肉尤宜四君子湯加芍

歸本香紫草煎服或患者不能忌口因食毒物而作痒者四物湯百花清或四君子湯加解毒藥

○消毒飲

牛旁子三錢炒一名鼠粘子一名大力子 荆芥 一錢 甘草

半錢生用防風半錢

右細切作一服水煎加生犀角尤妙

○葛根升麻加芍藥湯升麻芍藥湯倍芍藥是也

○活血散

白芍藥 右為細末每服一錢溫水調下止痛

用酒調尤驗王海藏云四肢出不快加防風一

方用赤芍藥

醫學正傳卷之八

○勻氣散即濟生方八味順氣散加水香也

白水 白茯苓 白芷

陳皮 烏藥 人參各三錢

甘草 炙二分半 木香 一分半

右細切作一服水一盞煎七分服或細末酒調

亦可

○二物湯

甘草 炙二兩 右為末水煎時

時服之

○百花膏

石蜜不拘多少暑用湯和時時以鵝相刺之瘡易落無痕

○平治諸方以平為則不失一

右壁胡氏曰小兒難任非常之熱亦不可任非常之冷如熱藥太過輕則吐利腹脹重則陷伏倒靨是宜溫涼適中可也仁齋楊氏曰諸熱不可驟去宜輕解之蓋痘瘡無熱則不能起發史氏曰比之種痘值天時暄煖則易生

○凡值天時不正鄉隣痘瘡盛發宜服禁方不出方醫學正傳卷之八

三豈湯 油飲子 鳳龍膏

○凡初覺痘瘡發當先解利與傷寒相類疑似之間兼用解表胡氏云非微汗則表不解解表當於紅斑未見之時宜用

王氏惺惺散 錢氏惺惺散 張氏防風湯

升麻葛根湯 張氏四物解肌湯 參蘇飲

○三豈湯

赤小豈 大黑豈 藁豈各二升

甘草三兩

又以三豈淘淨用水八升煮豈熟為度逐日空心任意飲豈汗七日求不出

○油飲子

真麻油一升 逐日飲盡求不出

已上三方出扁鵲倉公方

○龍鳳膏

烏雞卵一个 地龍一条活者細小者

右以雞卵開一小竅入地龍在內夾皮紙糊其

竅飯鍋上蒸熟去地龍與兒食之每歲立春日

醫學正傳卷之八

食二枚終身不出痘瘡覺隣里有此症流行時

食一二枚亦好

○錢氏惺惺散方見前條與王氏同但一方有防風川芎減半

○鮮毒防風湯方見前

四物解肌湯

白芍藥 黃芩 升麻

葛根各七分

右細切作一服水一盞煎六分溫服不拘時

食出不快宜

活血散如防風湯

○龐氏紅花湯

紅花子各一 右以水半升煎百沸服之

○紫草湯治瘡出不快及大便自利一名紫草湯

紫草 木香 茯苓

白朮各一錢 甘草五分

右細切作一服入糯米一百粒水一盞煎六分

食前服

○四聖散

醫聖正傳卷之八 生八

紫草 木通各一錢 甘草

枳殼楚炒黃色各半錢

右細切作一服水一盞煎七分溫服不拘時

樺皮飲子

樺木皮二兩 用水一升煮取半升時時細飲

凡痘瘡出不快者有五証臨病審見調之

一證天時嚴寒為寒所折不能起疹宜散寒溫表冬

三月寒甚紅班初見宜五積散正氣散參蘇飲

楊氏調解散陳氏木香散

五積散

白芷 川芎各三分 桔梗去芦一分

芍藥 茯苓 甘草炙

川歸 肉桂去粗皮 半夏各三分

陳皮去白 枳殼楚炒 麻黃去根節各半錢

蒼朮楚炒 甘草炙 厚朴姜制四分

右除肉桂枳殼二味別為粗末外一十三味細

切慢火炒令轉色攤冷次入二味末令均作一

服水一盞半入生姜三片煎至一盞去粗稍熟

醫聖正傳卷之六 七十九

服

正氣散

甘草炙三分 陳皮 藿香去梗

白朮各五分 厚朴姜制 半夏姜制各一錢半

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎服

調解散

青皮 陳皮 枳殼楚炒

桔梗去芦 人參 半夏炙

川芎 木通 乾葛各四分

甘草

紫蘇各二分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎服

一方加紫
草糯米

一証炎暑隆盛煩渴昏迷瘡出不快宜辰砂五苓散

煎生地黃麥門冬調服身熱甚者小柴胡加生

地黃煩渴而使實者白虎加人參湯輕者人參

竹葉湯加生地黃煎服

○辰砂五苓散五苓散加辰砂細研為末是也

○小柴胡湯○人參白虎湯○人參竹葉湯方俱見傷寒門

醫學正傳卷之六

十一

一証服涼藥損傷脾胃或胃虛吐利當溫中益氣宜

理中湯吐利甚者加附子或陳氏異功散木香

薑薤丸

肉薑薤丸

木香

砂仁

白龍骨

訶子肉各五錢赤石脂

枯白礬各七錢半

肉薑薤五錢溫麪黍煨熟

右為細末麪糊為丸如黍米大每服三十丸至

五十丸煎異功散送下

一証或成血痢一半尚是紅點此毒氣奔越不透必

不能食大便如常者宜半溫裏半助養之劑用

四聖散加減及紫草木香湯絲瓜湯阮氏萬全

散湯氏安班湯

○四聖散 紫草木香湯方併見前

○絲瓜湯

絲瓜不拘

連皮子燒存性為末每服一抄時時用米湯調

服

醫學正傳卷之六

十一

一面金木

此物發痘瘡最妙或以紫草甘草煎湯調服尤

佳

○阮氏萬全散治痘瘡出不紅潤

防風

人參

蟬蛻各等分

右細切服四錢水一盞入薄荷三葉煎六分溫

服熱而實者加升麻

○湯氏安班湯

証外實之人皮膚厚肉腠密毒氣難以發泄

不快宜消毒散透肌散如大便秘實於消毒散

內加大黃梔子仁煎服瘡出大稠宜犀角地黃

湯張氏解毒防風湯血氣不足宜十奇散咽噎

不利宜如聖湯加薄荷以殺口中氣熱咽痛口

舌生瘡宜甘露飲子驚風搐搦宜抱龍丸煩渴

宜獨參湯黃芪六一湯

○透肌散

紫草茸

綠升麻

粉甘草各一錢

醫學年傳六卷之六

全二

右細切水煎服或與消毒飲同煎服尤妙

○如聖湯

桔梗二錢

甘草一錢

一方加牛旁子

麥門冬各二錢

右細切水煎時服之

○抱龍丸 見驚風門

辯外証逆順

身體溫煖者順

寒涼者逆

能食大便實者順

不能食大便利者逆

外証輕重

輕者作三次出

根窠紅活

頭面稀少

重者渴利而渴

身溫腹脹

頭溫足冷

痘瘡初末形証

微者其邪在腑發為細疹狀如蚊啄所螫點點

赤色俗名麤瘡○甚者其邪在藏為痘瘡狀如

豌豆根赤頭白穴出濃水俗名痘瘡二三日始

見微微欲出如粟如黍或如葦莖或如水珠光

澤明淨者佳四日大小不等根窠紅光澤者輕

醫學年傳六卷之六

全三

如稠密陷頂併渴者者重六日七日瘡形肥紅

光澤者輕如身熱氣喘口乾腹脹足指冷者重

八日吐長足紅滿瘡蠟色者輕如寒戰悶亂

脹煩渴氣急咬牙者重之至也十日十一日瘡

當結膿加欲落之時將愈十二十三日當膿

不腐者為逆熱利之以防其餘毒身不壯熱

或腹脹或瀉渴用十二味異功散救之

不藥而愈

痘瘡餘毒

根窠紅綻

不瀉不渴

乳食不減 四肢溫和 身無大熱

已上六証並不須服藥惟宜善加調護須使房室溫益并諸穢氣忌見外人毋犯房色及性未婦人月水併服臭者皆不可近惟宜燒大黃蒼朮以辟惡氣勿宜燒沉檀降真乳香腦射棉帳之內宜懸胡荽或以胡荽浸酒噴床帳併燒木香為佳夫痘瘡之毒最怕穢惡之氣觸犯切不可信僧道者經鮮穢况無纖毫之力而返恐被其穢惡之氣觸犯亦不可恃其能鮮而不預防戒之戒之

辨伍不治証

痒塌寒戰咬牙渴不止 痘紫黑色喘喝不寧

灰白色陷頂腹脹 頭溫足冷悶亂飲水

氣促泄瀉渴

辨疹有陰陽二証

赤疹屬陽遇清涼而消 白疹屬陰遇溫緩而

傷寒時氣發班附

溫毒發班宜玄參升麻湯重用劑防敗毒散

胃爛班因陽明胃實失下或下之太早所致宜化班

湯龐氏石膏湯○時氣班宜石膏湯○陽毒班

胃實之人誤服熱劑或加以風暑宜陽毒升麻

湯

○玄參升麻湯

玄參 升麻 甘草 各一錢半煎服

○荆防敗毒散

柴胡 甘草 人參

桔梗 川芎 茯苓

枳殼 前胡 姜活

獨活 荆芥穗 防風 各四分

右細切作一服水一盞煎七分溫服或加薄荷

五葉

○化班湯即白虎湯加玄參也

○龐氏石膏湯

香豉 一合 葱白 五錢 石膏 一兩

梔子 一錢 生姜 半兩 大青

升麻 芒硝 各一錢

右細切作一服水升半煮取七合去粗下芒硝
放溫徐服之

○陽毒升麻湯

升麻 犀角 射干

黃芩 人參 甘草各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞食前溫服
辨瘡後餘毒

一毒氣流於陰陽脾經則癰發四肢手腕併膝
腫痛宜消毒飲重者十六味流氣加附子或

醫學正傳卷之八

八十六

酒浸大黃煎服及必勝膏蜆子水等付之

○消毒飲方見前

○十六味流氣飲

川芎 川歸 芍藥

防風 人參 木香

黃芪 桂心 桔梗

白芷 枳殼 厚朴

烏藥 甘草 紫蘇

枳殼各四分

右細切作一服水一盞煎七分服氣血虛而自
利者加熟附子大便實加大黃

○必勝膏

馬齒莧 猪膏 石蜜

右以二味共熬為膏塗腫處

○蜆子水

蜆子 不拘多少活者以水養五日旋
取此水洗手而漸生肉無痕痕

一毒氣留於陰肺經則臍內併手腕腫流為赤
癰毒宜消毒飲如聖湯五福化毒丹雄黃解毒

醫學正傳卷之八

八十七

九利之氣血虛者十補湯加桔梗枳殼犀角煎
服咽喉不利或腫痛宜薄荷如聖湯

○五福化毒丹方見驚風門

每兩分作十二丸一歲見一丸分作四服用薄
荷水化下瘡餘毒上攻口齒涎血臭氣以生地
黃自然汁化一丸用刷刷入口內

○如聖湯方見前

雄黃解毒丸

雄黃 砒石各 巴豆 去皮膜油

右為細末醋煮麪糊為丸如棗豈大每服二三

丸熟茶清下量見大小與之

○一毒氣流入大腸則便膿血或下腸垢或人便秘

結宜犀角地黃湯身煩熱渴黃連解毒湯熱

勢盛者小承氣湯下

○黃連阿膠丸

黃連二兩 阿膠炒成珠 茯苓去皮二兩

右以黃連茯苓同為細末水調阿膠末搜和為

丸如梧桐子大每服二十九溫米飲送下

醫學正傳卷之六 全

○駐車丸

阿膠炒成珠 當歸六兩各 黃連三十兩

乾姜炮十兩

右為末以阿膠和成餅丸如梧桐子大每服二

十九食前清米飲下日三服小兒丸如麻子大

量兒大小加減

○一痘瘡入眼宜决明散密蒙花散搽云散蛤粉散

决明散

草决明 赤芍藥 天花粉

甘草

右各等分為細末每服半錢匕食後茶清調下

○密蒙花散

密蒙花 青箱子 决明子 車前子

右各等分為細末用羊肝一片破而為三摻藥

入肝內令均却仍搗令併為一以酒水溫服匕

重包裹於澆灰中煨熟勿令焦焙乾研末入射

香少許每服二錢重食後米飲調下

○撥雲散

醫學正傳卷之六 全

羌活 防風 甘草炙各

柴胡加倍

右為細末每服二錢水一盞煎七分食後臥服

薄荷汁茶清或菊花苗煎湯調皆可忌藏鹽鮓

醬溫麪炙燂氣及一切風動火之物

○蛤粉散

穀精草 海蛤粉各等分

右為細末每服二錢匕用獺猪肝許以竹刀批

開摻藥在內捲了外以青箭箬包裹麻線扎縛

定水一碗煮令熟入小口瓶內薰服候溫取食之日一服不過十服遂退

一熱毒流於三陽之後終則腮項結核腫痛宜荆防敗毒散十補湯戒桂膠消毒飲倍加忍冬藤煎服

○荆防敗毒散

十補托裏散即十奇散也消毒飲方並見前

祖傳經驗効方凡痘後不問癰毒承於何經初起上紅腫時却用黑景赤三莖以酸醋浸研漿時上

醫學正傳入卷之八

以鵝翎刷之隨手退去其効如神

一小兒痘後二十日不大便其糞燥作痛垂死曾用大黃芒硝枳殼巴豆等藥及用導法又服香油一碗許俱不通愚令一婢以真麻含口內用小竹筒一箇納穀道中吹油入腸內須臾即通真良方也

古人治痘瘡要法

王氏指迷云痘瘡亦時氣之一端一人受正傳染其餘又云瘡疹有熱則易出一出遍及於肌

膚○張氏喚曰痘子氣均則出快蓋血隨氣行

氣逆血則滯○王氏疹者脾所生脾虛時旺藥

之木能勝土熱動心神而生驚○錢氏曰肝風

心火二藏交爭而致搐又曰痘症未形而先搐

大忌涼心蓋瘡屬心心主血心寒則血不能行

痘欲出而不可得也切須慎之大抵治驚推平

肝利小便均氣最妙仁齋楊氏曰大熱當利小

便宜五苓散導赤散小熱當解毒宜消毒散四

聖散

醫學正傳入卷之八

○陷伏倒靨黑陷

一証變壞歸腎黑陷宜錢氏百祥丸宣風散

一証外感風寒所致冬時宜五積散減麻黃加桂

心紫草春時不換金正氣散加川芎白芷防風

或風邪所襲宜消風散加紫草煎服

一証乳食所傷內氣壅遏宜楊氏調解散或四君

子湯加縮砂木香川芎紫草大便自利宜附子

理中湯

一証或父母不謹犯房事月水及乳母腋氣穢濁

諸忤所致宜阮氏辟穢丹焚而薰之仍以胡荽
酒熨帛帳及懸胡荽於床帳中甚者以胡荽湯
化下蘇合不丸煎薰亦妙聖制丹甦散神効

○不換金正氣散

厚朴姜制

藿香去梗

甘草炙

半夏湯洗七次

去皮

蒼朮米泔

陳皮各半錢

右細切作一服加生姜三片棗二枚水一盞煎
七分服

○辟穢丹

蒼朮

此細辛

甘松

川芎

乳香另研

降真香各半分

右為細末烈火焚之 今世依例以黃茶燒煙
薰之最好

○辟穢散治瘡癰 毒氣入內

明白礬

此散用七少

右為末每服半錢用猪尾血一椀許用新汲
水少許調下不拘時

○猪尾膏即前危腦膏錢氏用小獐猪尾取血研用
之

凡痘瘡膿汁不乾蓋瘡出太盛表虛難靨以致膿水
粘衣着席濕痛不能轉側宜白疳散敷散等附
之

○白疳散

黃牛糞日乾火煨成灰取心中白者為末帛裹
撲之

○敗毒散

用蓋屋及牆脊上遠年腐草洗淨焙乾為細末

帛裹撲之及鋪床席上佳

○馮氏天花散治痘後失音

天花粉

桔梗

白茯苓

阿子肉

石菖蒲

甘草各半分

右為末用水調半匙在研內外以小竹七莖黃
荆七條縛作一束點火在碗內煎臨臥服

凡孕婦身發痘瘡宜馮氏單胎散若胎動不安宜獨
聖散安胎飲身熱甚宜木香參蘇飲或瘡稠密

宜十奇散倍芍藥當歸減桂加香附烏藥如胎已五月則半夏桂心之屬俱不必禁

○單胎散

赤茯苓

白朮

川歸

白芍藥

赤芍藥

北柴胡

乾葛

人參

桔梗

條芩

防風

陳皮

荊芥

枳殼

紫草

阿膠

糯米

白芷

甘草

川芎

縮砂

大熱加鬱金各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞乳柿蒂七箇野苧根七寸甜瓜蒂一箇用銀器煎以荷葉

蓋定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散用連殼縮砂去殼為末每服半匙溫酒調

下動則服服後覺胎熱則安矣

○安胎散

○安胎散

大腹皮酒洗淨研乾再用黑參

陳皮

白朮

白芍藥

川歸

川芎

香附米童子尿浸

砂仁

紫蘇

茯苓各等分

甘草少許

右細切作一服水一盞半燈草七莖糯米一撮

煎一盞食前溫服

滄洲翁先生跋云凡乳嬰之與童小當岐為兩途以

治之乳嬰當兼治乳母俾其氣血清和飲食有節

按以調氣通榮之劑以釀其乳使兒飲之則其瘡

必肥滿光澤無陷伏之憂童小之子必當備切其

尿審其表裏虛實以汗下之苟不實不虛則但保

其冲和使脾胃氣流暢則肺金藉呼之助易於灌膿

速於成痂無倒搦之患或至此盛而膚腠厚密尤

須預為汗解或大便結與澁澁者尤宜下之利之

庶無患也餘証則當於藥內倍其分兩百無一失

學者宜致思焉

醫學正傳卷之八終

重刊醫學正傳序

夫醫學何以正傳云也花溪氏憫醫門之偏而著之也蓋自神農製本草黃帝興素問堯用鴻術尹作湯液周禮醫師掌養萬民之疾病而以五藥療之其傳固有所自也厥後以醫鳴世若扁鵲華陀仲景思邈叔和張倚東垣河間所著難經十書金匱玉函普濟袖珍脉經奇效等集其學不可謂無傳但以書目既多議論亦異此是彼非若伯鄙惠和惠病伊任不能無偏門之弊矣幸有朱氏丹溪受學文懿許公門得考亭之緒餘而發前人所未發固聖於醫者也然若不參以諸賢所著則亦未足以集醫道之大成而歸之正惟我花溪天民虞氏幼承祖父家學私淑丹溪遺範詳究天

醫學正傳後序

五

地人身陰陽五行表裏虛實氣稟厚薄風土炎涼與夫經絡脉證之故輕重緊慢之殊因根據乎素難綜裁乎諸說苦心極力類次為醫學正傳一編中加以或問附以奇方膚腠則用輕清膏肓施之瞑眩見明知審製精用當真猶良將行師精熟古法而不執一道臨敵之際隨機制勝而所向有功亦如吾孔氏夫子聖學時中集夷惠尹之清任和而時出之焉者允矣濟世之仁術而為余之素所樂觀也一日

醫學正傳後序

五

郡伯巽川桂公慮是書之久而或失傳也命余重梓而傳之余授命因再拜而颺言曰大哉仁人之用心憫天札而躋壽域裨世之功不小也又况世之人視醫為小道者皆曰不足為而庸醫之不

學無術民命又將焉賴之國脉又將焉
綿之余於是益信是書之不可以不重
刊也敬為序以引諸末簡

萬曆戊寅五月望日

賜進士出身文林郎長垣縣知縣邊有猷
謹書

醫學正傳八卷

浙江范懋柱家
天一閣藏本

明虞搏撰搏字天民自號花溪恒德老人義烏人
是書成於正德乙亥其學以朱震亨為宗而參以
張機孫思邈李杲諸家之說各選其方之精粹者
次於丹溪要語之後復為或問五十條以申明之

